

ANTONII GOUAN
... HORTUS
REGIUS
MONSPELIENSIS,
SISTENS...

Antoine Gouan





11.5.139

44.5.132
ANTONII GOÜAN,

Doct̃oris Medici Monspeliensis, Regiæ Societatis
Scientiarum Socii,

HORTUS REGIUS
MONSPELIENSIS,
SISTENS PLANTAS TUM INDIGENAS
TUM EXOTICAS N°. MM. CC.

A D

GENERA RELATAS,

C U M

NOMINIBUS SPECIFICIS,
SYNONYMIS SELECTIS,
NOMINIBUS TRIVIALIBUS,
HABITATIONIBUS INDÍGENARUM,
HOSPITIIS EXOTICARUM,

S E C U N D U M


SEXUALEM METHODUM
DIGESTAS.

In gratiam Philiatorum Monspeliensium.



LUGDUNI,
Sumptibus FRATRUM DE TOURNES.

M. DCC. LXII.



ILLUSTRISSIMO
NOBILISSIMOQUE VIRO
D. D.

JOANNI EMMANUELI
DE GUIGNARD,

Equiti, Vice-Comiti de St. Priest, Regi à
Confiliis, Libellorum Magistro Honorario,
Rei Judiciaræ & Ærariæ, necnon Disci-
plinæ Politicæ in Occitania, & Horri Regii
Monspeliensis Præfecto.

VIR ILLUSTRISIME,

MÆCENATEM ambierunt te plurimi,
habuerunt hætenùs nulli, laudibus meritiissi-
mis in tabulâ tibi nuncupatâ necessario cunu-
â ij

landis tuâ se semper subripiente modestiâ. Si ergo in lucem prodit tuo nomine insignitum tentamen hocce, nihil inde nobis accedit superbiæ probè consciis tanti favoris copiam fecisse operis materiem, non dignitatem. Eccui consecranda veniebat Horti Regii Monspelienſis descriptio, nisi Horti ejusdem PRÆFECTO VIGILANTISSIMO, qui benefico afflatu Floram nostratē exsuscitavit languidam, marcescentem ab interitu penè vindicavit? Hic tantum Botanici partes ago. Quid si Civis! quid si Occitani! Verba profectò desicerent, non dico extollendis, verum etiam enarrandis virtutibus eximiis paria, quibus & Urbem & Provinciam beas. Bona dum potimur ad eò multigena, anxia nos tenet cura ne citò è manibus effluant. Ad majora te vocant, VIR ILLUSTRISſIME, Regis dilectissimi perspicacia, æquitas, in populos amor. Quæcumque te maneant grandia regni munia, ut diu sospes & incolumis vivas vehementissimè exoptat Occitania, & ut ipsi, quod hæcenus fecisti, in posterum favere pergas enixè rogat,

VIR ILLUSTRISſIME,

Devotissimus tui nominis cultor
ANTONIUS GOÛAN.



PHILIATRIS AMANTISSIMIS
AUCTOR.

IAM dudum in describendis Faunæ
Monspeliacæ animalibus occupatus ,
in vestrorum gratiam à primario la-
bore recessi ; & ut votis vestris annuerem cu-
ras potiores habuit Floratantisper excussa. Pro-
prias de Plantis observationes publicæ ventila-
tioni exponere profecto non ausus essem , nisi
vobis potius quàm mihi consultum iri voluis-
sem , & laboris suscipiendi Auctores fuissent
Linnaeus (a) & *Sauvagesius* nulli non suspi-
ciundi rei Botanicæ principes , qui ætate licet
& scientiâ longè imparem suâ me amicitia
beare non dedignati sunt : palam hic profiteri
juvat quàm urbanos in libris communicandis ,
in exhibendis speciminibus vivis aut exsiccatis
faciles , in dubiis explicandis benignos sese
præbuerint. Neque illaudatos dimittam cla-
rissimos Viros *Seguierium* , *Bauxium* Nema-
usenses , & *Cussonium* & *Barignium* Doctores
Medicos Monspelienfes oculatissimos , quibus
similia officiorum genera accepta referre non
piger.

(a) Egregiè me herclè tui characteres ex habitu adjecti
fructificationi placent , cum pandant viam ad ordines natura-
les , & explicent faciem Plantarum. *Linnaei*, *Epist.* 15. Dec. 1762.

ã iiij.

Memori etiam animo prosequar *Imberti* ;
Universitatis Monspeliacæ Cancellarii amplif-
simi, humanitatem, quo annuente plantas in
horto regio hospites nullâ horâ, nullo tem-
pore examinare non licuit.

His auxiliis suffulto, tantâ locupletato spe-
cierum ac varietatum suppellectile animus pri-
mum fuerat Plantas Monspelienses novâ me-
thodo distributas exhibere. Attributum sane
primarium ad classes condendas suppedita-
bant organa Plantarum foemineæ, secundarium
verò ad ordines instituendos virilia : quam
hactenùs licet intentatam systematicam divi-
sionem valere jussi, ne methodum sexualem
frustraneè inversam proponerem & in simiam
propriam tandem incideret egregius Linnæus.

Potuissem etiam Tournefortianam metho-
dum cum Linnæana maritare, desumptis scili-
cet à corollæ figurâ ac regularitate classibus,
ordinibus verò à staminibus ; aut vice versâ.

Neque deficiebant aliæ fructificationis par-
tes quæ in classium atque ordinum attributum
inito novo fœdere cedere nobis valebant.
Verum eas omnes methodos missas volumus
probè conscii quantum illas perfectissimè licet
elaboratas vincat systema sexuale.

Itaque consilia in melius referens metho-
dum Linnæanam elegi utpotè vobis dilec-
torem, magis absolutam, pleniorē, niti-
dissimam, genera & species rigorosius, per-
fectius sistentem. Character Plantarum gene-
ricus est primarius vel secundarius. Primarium
subministrant calyx, corolla, stamina, pistil-


11
IV
lum, fructus. Genera omnia caractere hujus-
cemodi egregiè donavit illustris *Linnaeus*, cui
vos volumus amandatos. Secundarium suppe-
ditant placentatio, radicatio, caulescentia,
foliatio, inflorescentia, fulcratio. Hunc à Lin-
naeo excogitatum, à nemine tentatum in hoc
opere proponimus, omiffa placentatione circa
quam nondum nobis suppetit observationum
fufficiens numerus. Notas secundarias omnibus
generis cujusque speciebus communes in me-
dium proferre vehementer exoptassemus.
Obftabat Plantarum plurium cognitarum qui-
dem, aft in horto regio nondum hospitantium
defectus. Characteres igitur juxta species à
nobis enumeratas dirigere coacti fuimus. No-
mina specifica à Linnaeo mutuati fumus, mutatis
paucis. Species plures in agro Monspessulano
nondum detectas, aut quasdam tum indigenas
tum exoticas Linnaeo ignotas addidimus. Syno-
nymias à Tournefortio, Magnolio, Sauvagesio,
Bauhinis, Seguierio, defumimus. Nomina
Gallica & vernacula adjecimus. Habitationes
indigenarum & hospitia exoticarum assignavi-
mus. Plantarum icones duas minus accuratas,
duasque novas sculpendas curavimus. Pollice-
mur fore ut quondam opus istud incudi redda-
mus additis caracterebus secundariis, placen-
tatione, Fauna insectorum Monspeliensi, &
virtutibus Plantarum usualium probatissimis.
Interim his fruimini quantulacumque sint. Valete.

*Dabam Monspeliì, die 9.
mensis Januarii 1762.
à iij*


A U C T O R E S.

- B** *Aub. Pin.* Caspari Bauhini pinax. 1. vol. in-4^o.
Baub. prod. ejusdem prodromus. 1. vol. in-4^o. cum figuris.
J. B. hist. Joannis Bauhini historia Plantarum. 3. vol. in-fol. cum figuris.
Dod. Pempt. Dodonæi pemptades. 1. vol. in-fol. cum figuris.
Corn. Can. Jacobi Cornuti historia Canadensis. 1. vol. in-8^o. cum figuris.
Bot. Mons. Petri Magnolii Botanicum Monspeliense, cum figuris. 1. vol. in-12.
Hort. Mons. ejusdem Hortus Monspeliensis. 1. vol. in-4^o. cum figuris.
Gen. pl. ejusdem genera Plantarum. 1. vol. in-4^o.
Tour. Tournefortii Institutiones rei Herbariæ. 3. vol. in 4^o. cum figuris.
T. cor. ejusdem Corollaria. 1. vol. in-4^o.
Barv. ic. Barrelieri icones. 1. vol. in-fol. cum figuris.
Lob. ic. Lobelii icones Plantarum. 1. vol. in-8^o.
Linn. Syst. nat. Linnæi systema naturæ. 2. vol. in-8^o.
Exit. 10^o. 1759.
Linn. gen. Linnæi genera Plantarum. 1. vol. in-8^o. Edit. 4a. 1752.
Linn. sp. pl. ejusdem species Plantarum. 2. vol. in-8^o.
Linn. hort. Ups. ejusdem hortus Upsaliensis. 1. vol. in-8^o.
Linn. hort. Cliff. ejusdem hortus Cliffortianus. 1. vol. in-fol.
Linn. aman. Acad. ejusdem amœnitates Academicæ. 5. vol. in-8^o.
Linn. fl. Suec. ejusdem flora Suecica. 1. vol. in-8^o.
Seg. ver. Seguieri Nemaufensis Plantæ Veronenses. 3. vol. in-8^o.
Sauv. Sauvagesii methodus foliorum. 1. vol. in-8^o.
Mich. gen. Michellii nova genera Plantarum. 1. vol. in-fol. cum figuris.

'15'23



TAB. 2.



11-5-10


1

11



115

(1)





EXPLICATIO TABULARUM.

TABULA PRIMA.

RADICATIO.

RADIX seu truncus in terram descendens, ex ipsa alimentum hauriens.

Fig. 1. Perpendicularis. Napus, brassica, umbelliferæ ferè omnes.

8. Horizontalis. *Auricula muris, aquaticæ plantæ plures.*

Repens. . . .

Stolonifera; cauliculos vel scapos hinc indè reptando exferens, *viola, auricula muris, passiflora.*

1. Fusiformis seu napiformis; altero apice attenuato. *Carota.*

Tereti-attenuata; eadem sed in gradu minimo. *Thesium.*

1. Simplex.

2. Ramosa.

Lignosa; propria fruticibus arboribusque.

4. Fibrosa; constat radiculis capillaceis fasciculatis. *Musci, gramina.*

Rapacea; à figura rapæ, carnosa subglobosa. *Geranium, rapa.*

3. Tuberosa constat carne dura. *Geranium, ranunculus.*

6. Tuberosa pendula - filipendula.

7. Tuberosa fasciculata; tuberibus simul pluribus approximatis, ex eodem puncto enatis.

Ranunculus, pæonia. Dicitur etiam grumosa.

Species plurimæ ranunculi, leontodon tuberosum.

4. Bulbosa; constat carne pulposa. *Cepa, allium, lilium.*

EXPLICATIO

- Fig. 4.* Bulbosa tunicata, membranis se invicem
tegentibus. *Cypripedium*.
5. Bulbosa squamosa, squamis imbricatis. *Lilium*.

TABULA SECUNDA.

FULCRATIO.

FULCRA seu varia adminicula plantæ.

1°. STIPULÆ. Foliola ad basim foliorum enata.

Fig. 9. 10. 11. 12. A.

Fig. 9. 10. Laterifoliæ. *Trifolium*, *lotus*, *medicago*.

12. Oppositifoliæ. *Coronilla minima*.

9. 10. Geminae.

12. Solitariae. *Coronilla minima*, *ornithopus scorpioides*.

11. Interfoliaceæ. *Geranium*, *xygophyllum*.

9. Solutæ seu liberæ, nec petiolo nec sibi
invicem adnatæ. *Lotus*.

10. Adnatæ. Prioribus opponuntur. *Trifolium*, *medicago*.

2°. BRACTEÆ. Foliola ad apicem pedunculorum
vel ad basim florum sita.

Fig. 13. Ovata. *Geranium*.

Subulata. *Medicago*.

Setaceæ.

Solitariae.

Pinæ.

13. Ternæ. *Lotus*.

Quaternæ.

13. Integerrimæ. *Trifolium*.

Serratæ. *Medicago*.

Palmatæ. *Anthyllis*.

Involucriformes, plures simul involu-
crum mentientes. *Androsace*.

3°. FILUM. Appendix setacea flexilis ad apicem pe-
dunculorum, sæpius solitaria simpli-
cissima.

Fig. 14. A. *Ononis*, *medicagines plures*.

T A B U L A R U M

4°. CIRRHUS. Appendix filiformis contorta rigida:

Fig. 15. A. B.

Fig. B. Solitarius. *Passiflora*.

Geminus. *Smilax*.

B. Petiolaris. In ipsomet petiolo.

Laterifolius, ad latera petioli vel folii sessilis.

Axillaris, ex eorum ala.

A. Terminalis, ad apicem petioli.

B. Simplex.

A. Ramosus.

Diphyllus; foliola duo terminans.

Tetraphyllus; foliola bijuga terminans:

Lathyrus clymenum.

Polyphyllus; foliola plura. *Vicia*, *ervum*.

Aphyllus; è medio stipularum prodit, foliolis destitutus, *lathyrus aphaca*.

5°. GLANDULÆ. Vasa excretoria plantæ. Fig. 16. C. B.

Fig. B. Sessiles, pedunculo nullo.

C. Pedunculatæ. *Passiflora*.

C. Petiolares, in ipsomet petiolo.

B. Epiphyllæ; in superiori foliorum pagina:

Hypophyllæ; in inferiori *Laurus*, *padus*.

Stipulares, stipulis insidentes.

Calycinæ, calycibus. *Plumbago*, *hypericum*.

Bracteales, bracteis. *Sigesbeckia*.

Pedunculares, pedunculis.

Solitariae.

Geminæ.

Concavæ. *Mimosa*, *Laurus*.

Capitatae. *Plumbago*.

6°. SPINÆ. Fig. 16. A. Expansio substantiæ lignosæ.

7°. ACULEI. Fig. 16. B. Expansio substantiæ corticalis.

8°. TUBI. Fig. 17. Conici inversi, vaginantes radicaliarum apicem; *lemna minor*, *lemna trifolca*.

EXPLICATIO

TABULA TERTIA.

FOLIATIO SIMPLEX ET FLORESCENTIA.

FOLIA simplicia sic dicuntur cum petiolus simplex unicum gerit foliolum.

Fig. . A. Radicalia, e radice prodeunt.

Caulina, è caule.

Ramea, è ramis.

Primordialia, e gemmis primo vere.

Seminalia, è semine.

C. C. E. Alterna. *Achillea*.

D. D. Opposita. *Leonurus*, *phlomis*.

I. Verticillata, eaque diversimodè.

Terna, *erica*.

Quaterna.

Quina.

Sena, *gallium*, *crucianella*.

Odon, *gallium*.

C. D. K. Sessilia, seu petiolo destituta. *Draba incana*.

L. X. Z. R. Petiolata. *Oxalys*.

E. Perfoliata. *Gentiana perfoliata*.

F. Amplexicaulia. *Thlaspi montanum*.

G. Vaginantia, caulem instar vaginæ ambiunt.

H. Connata, occurrunt in foliis oppositis.

X. O. N. Q. S. Integra, ad margines crenata, ferrata, ciliata vel dentata.

D. I. M. E. F. Integerrima, marginibus prorsus intactis.

T. X. Z. Incisa.

T. Triloba.

X. Partita.

M. Dolabriformia.

T A B U L A R U M.

Fig. O. Præmorfa.

N. Deltoidea.

L. Serrata.

S. Obversè-ovata.

S. Crenata.

K. Geminata.

Radicantia ; foliorum pagina altera
radices agit. *Marchantia*.

F L O R E S C E N T I A.

FLORES. 1. 2. 7. 8. Axillares.

Ramei, è ramis.

Caulini, è caule.

Radicales, è radice.

Terminales, ad apicem ramorum aut
caulis.

Aggregati, plures simul ex eadem plan-
tæ regione, ut ex ala, apice rami aut
caulis vel folii.

2. { Solitarii.

{ Sessiles, pedunculo nullo donati.

1. { Solitarii.

{ Pedunculati.

K. I. Interfoliacei, occurrunt in foliis oppo-
sitis vel geminatis. *Atropa*, *physalis*.

3. Verticillati. *Phlomis*, *salvia*.

Laterifolii ; ad latera petiolorum vel
folii sessilis. *Boerhavia*.

4. Thyrsoides. *Syringa lilac*.

6. Racemosi. *Phytolacca*.

6. Corymbosi. *Spiræa species*.

7. Paniculati, } **Propria graminibus.**

8. Spicati, }

9. Umbellati. *Daucus*, *euphorbia*.

10. Capitati. *Lotus*, *trifolium*.

6. Oppositifolii. *Geranium vitifolium*,
phytolacca.

Fasciculati plures sibi invicem approxi-
mati. *Dianthus barbatus*.

EXPLICATIO TABULARUM.

TABULA QUARTA.

FOLIA COMPOSITA.

FOLIA sic dicta constant foliolis plurimis communi petiolo affixis, sessilibus vel petiolatis.

- Fig.* 1. Binata, } foliolis basi adnatis, sessilibus.
 2. Ternata, }
 3. Ternata, foliolis liberis petiolatis. *Trifolium*.
 4. Digitata, foliolis quinis, septenis. *Potentilla*, *quinquesolum*.
 5. Pedata. *Helicoborus*.
 6. Impari-pinnata, foliolis petiolatis.
 7. Abrupte seu pari-pinnata, foliolis sessilibus, oppositis; dicuntur etiam conjugata. *Orobus*, *vicia*, *lathyrus*.
 8. Eadem foliolis alternis.
 9. Impari & interruptè-pinnata. Solani species 9.
 10. Abruptè-pinnata & cirrho terminata. *Vicia*, *ervum*.
 11. Binata & cirrho terminata. Propria *lathyris*.
 12. Decursivè-pinnata, }
 13. Articulatè pinnata, } foliolis tibi invicem
 14. Lyrato-pinnata, } adnatis. Ad simplicia
 15. Biternata, } *pinnatifida* accedunt.
 16. Abruptè-bipinnata. *Mimosa*, *poinciana*.
 17. Duplicato-ternata.
 18. Abruptè-tripinnata.
 19. Impari-tripinnata.

EXTRAIT DES REGISTRES de la Société Royale des Sciences.

Du 11. Mars 1762.

Mrs. DE SAUVAGES, CUSSON & BATIGNE, qui avoient été nommés pour examiner un Ouvrage de M. GOUAN, qui a pour titre : *Hortus Monspeliensis sive Plantas exoticas & indígenas secundum sexualem Methodum digestas*, &c. en ayant fait leur rapport, la Compagnie a jugé que dans le grand nombre de Plantes qu'il a décrites M. Gouan, il y en avoit plusieurs de nouvelles, & d'autres qu'on n'avoit désignées jufques ici que fort confufément ; que les caractères fécondaires tirés heureusement du port de la Plante & de ses différentes parties, à l'exception des Fleurs & des Fruits, pouvoient être d'un grand fecours pour hâter les progrès de la Botanique ; qu'à l'aide de ces caractères il seroit fur tout très facile d'acquies en peu de temps la connoissance des Plantes des environs de Montpellier, en fuyant d'ailleurs la methode de M. LINNÆUS, adoptée par l'Académie ; & qu'en general l'Ouvrage étoit utile & méritoit l'impression. En foi de quoi j'ai signé le présent Certificat. A Montpellier, ce 11. Mars 1762.

DE RATTE, Secrétaire perpétuel
de la Société Royale des Sciences.

APPROBATION

De Messieurs les Docteurs ordinaires en l'Université des
Médecins de Montpellier.

NOS CLAUDIUS CHAPTAL, PETRUS CUSSON, FRANCISCUS GOUTAUDIER, ET GASPARDUS JOANNES RENE', in Alma & Regia Montpensium Medicorum Universitate Doctores ordinarii, unanimi & eorum omnium Congregationum consensu & firmitate & expresse examine in Libro cui titulus est : ANTONII GOLAN, *Dissertatio Medica, &c. Hortus Regius Monspeliensis sive Plantarum exoticarum & indigenous, &c.* Existimamus hoc non solum utilis sed et verum etiam omnibus Rei herbarie generibus cultoribus juvandum ad modum atque utile futurum esse, & Praefatum virum magna promereri encomia, qui rem herbariam & hactenus intentatam confecerit, ad methodum naturalem viam expetivit, Botanici Monspeliensis potentia pluribus additis Plantarum speciebus antea prætermissis, propulavit, frugem Botanicae Meriti in studium ab aliquot annis denegatam laute pergit, & Honoris nostram exemplum, Marce dentem, inter nostram imminente laborum in causam Reihedem litteras has testimonias propria Syngrapha roboratas dedimus. Actum Montpel die 18. mensis Martii anni 1762.

CHAPTAL. CUSSON. GOUTAUDIER. RENE.

XII

Classis I.

MONANDRIA

MONOGYNIA.

C A N N A.

Character primarius. Vide Linnæi genera plantarum 1.

Character secundarius. *Radicatio* bulbiformis carnosâ nodosa horizontalis. *Caulescentia* culmosa solida foliosa simplex. *Foliatio* simplex alterna vaginans integerrima. *Florescentia* subspicata terminalis simplex liliacea. *Fulcratio* nulla.

1. CANNA foliis ovatis utrinque acuminatis nervosis. *Indica.*

Linn. sp. Pl. pag. 1. Syst. nat. 1759. Tom. 2. p. 843.

Cannacorus latifolius vulgaris. Tourn. pag. 367.

2. *Cannacorus* flore luteo punctato. *Tourn. ibid. & amplissimo folio flore rutilo. Ibid.*

Le Balister.

HOSPITATUR sub dio. Radix perennis. Florer maio, augusto & julio; floribus varians coccineis & luteis.

3. Floribus duplo minoribus gaudet quam 1^a. species.

B O E R H A V I A.

Char. prim. vid. Lin. gen. pl. 38.

Char. sec. *Radic.* fibrosa. *Caulesc.* herbacea, ramosa foliosa. *Foliat.* opposita petiolata simplex integerrima. *Floresc.* laterifolia ramosa pedunculata. *Fulcr.* nulla.

1. BOERH. floribus umbellatis, seminibus fusiformibus truncatis, apice tuberculatis. *Scandens.*

Boerhavia (scandens) caule scandente. Linn. sp. pl. pag. 3. Syst. nat. 1759. T. 2. p. 843.

La Boerhave.

HOSPITATUR sub dio. Perennis. Caulis scandens, glaber, cylindricus. Folia subcordata, glabra; petioli

2 MONANDRIA MONOGYNIA.

foliis duplo breviores. Flores diandri umbellati. Corollæ plicatæ campanulatæ, viridescentes. Pedunculi ad latus foliorum, ipsis triplo fere longiores. Involucrum umbellulæ ex foliolis minimis deciduis 5-6. Floret vere, æstate & autumnno.

Erecta. 2. BOERH. floribus paniculatis, seminibus pentagonis truncatis.

Boerhavia (*erecta*) caule erecto. *Linn. sp. pl. 3. Syst. nat. 1759. T. 2. pag. 843.*

Boerhavia (*angustifolia*) foliis lanceolatis. *Sauv. p. 108.*

HOSPITATUR sub dio. Annua. Folia ovata, subtus incana. Corollæ minimæ dilute purpurascens. Petioli foliorum subrubri, breves. Floret æstate.

Obs. Species omnes glutinosæ admodum, præsertim semina speciei primæ.

SALICORNIA.

Char. prim. vid. *Linn. gen. pl. 8.*

Char. sec. *Radic.* ramosa. *Caulesc.* articulata succulenta ramis oppositis. *Fol.* nulla. *Floresc.* in articulis. *Fulcr.* nulla.

Europæa. 1. SALIC. articulis apice crassioribus obtusis. *Linn. sp. pl. 3. Syst. nat. 1759. T. 2. p. 843.*

Annua. Salic. geniculata annua. *Tourn. cor. 51.*

Kali geniculatum annuum. *Bauh. pin. 289. Magnol. Bot. monf. 147.*

Salicornia annua. *Sauv. pag. 7.*

Kali geniculatum. *Barr. icon. 192.*

Perennis. β. Salic. geniculata sempervirens. *Tourn. cor. 51.*

Salic. sempervirens. *Sauv. 7.*

Kali geniculatum majus. *Bot. monf. 147.*

Salicor. vernaculè *sonfoursre.*

HABITAT in toto tractu Monspeliensi, ad mare & stagna: floret julio & augusto.

HIPPURIS.

Char. prim. *Linn. gen. pl. 9.*

Char. sec. *Radic.* articulata horizontalis radiculis perpendicularibus. *Caulesc.* articulata herbacea. *Fol.* verticillata ad articulos. *Floresc.* axillaris, sessilis, *Fulcr.* nulla.

MONANDRIA DIGYNIA.

3

1. HIPPI. *Linn. sp. pl. 4. Sauv. 159. Linn. syst. nat. 1759. vulgaris.*
T. 2. p. 843. equisetum palustre, brevioribus foliis
polypermum. B. pin. Mag. Bot. 89.
Polygonum fœmina semine vidua. Lob. icon. 792.
Limnopençe, Seg. Fl. Ver. Tom. I. tab. 2. pag. 103. &
Tom. III. p. 64.
La pesse d'eau.
HABITAT in humidis; à Lattes, Selleneuve, Castelnau.
Obf. Articuli digito compressi, cum strepitu dissiliunt;
quâ notâ ab equisetis faciliè dignoscitur.

DIGYNIA.

CORISPERMUM.

- Char. prim. vid. Linn. gen. pl. 10.*
Char. sec. Radic. fibrosa. Caulesc. herbacea ra-
mosa. Foliat. simplex alterna. Floresc. axillaris
alterna. Fulcr. nulla.
1. CORISP. floribus lateralibus. *Linn. sp. pl. 4. Sauv. 52. Hissopifolium*
Linn. hort. ups. 2. hort. cliff. 3.
HABITAT in maritimis; à Agde & au-delà de Cette
vers Meze.
Annuum vidimus in aliis locis frigidioribus.
Caulis scaber perennis villosus diffusus.

BLITTUM.

- Char. prim. vid. Linn. gen. pl. 11.*
Char. sec. Radic. ramosa. Caulesc. herbacea ra-
mosa. Foliat. simplex, sparsa. Floresc. axillaris
glomerata. Fulcr. nulla.
1. BLITT. capitulis sessilibus, lateralibus sparsis. *Linn. Virgatum.*
sp. pl. 4. Syst. nat. 844.
Variat foliis lanceolatis integerrimis.
HABITAT in Hispania. Annuum est.

CALLITRICHE.

- Char. prim. vid. Linn. gen. pl. 1074.*
Char. sec. Radic. fibrosa. Caulesc. herbacea filifor-
mis ramosa. Fol. sessilis opposita simplex inte-
gerrima. Floresc. axillaris pedunculata, solitaria
vel geminata. Fulcr. nulla.

Autumnalis. 1. CALL. floribus hermaphroditis.

Call. foliis omnibus linearibus apice bifidis, floribus hermaphroditis. *Linn. syst.* 644.

Call. (*Bifida*) *Linn. sp. pl.* 969. & (*natans*) *ibid. Sauv.* 123. n^o. 2. & 3.

HABITAT in aquis laterensibus; ubi & foliis omnibus linearibus, vel inferioribus linearibus, superioribus ovatis occurrit; à *Lattes & Caunele*.

Verna. 2. CALL. floribus androgynis.

Call. foliis superioribus ovalibus, floribus androgynis. *Linn. syst.* 644.

Call. (*Palustris*) *Linn. sp. pl.* 969. & (*minima*) *ibid.*

Lenticula palustris bifolia fructu tetragono. *Bot. monf.* 300.

HABITAT Monspeli cum priori, sed rarior. Ludit utraque foliis linearibus bifidis, superioribus quoque vel ovatis linearibusque; unde demptâ florentiâ vix dignoscendæ. Frequentior in aquis *au Pont de Salason & à Lunel*. Pedunculi bini axillares, altero unifloro brevi, altero longiore bifloro,



Classis II.

DIANDRIA
MONOGYNIA.

NYCTANTHES.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 12.

Char. sec. *Radic.* ramosa. *Caulesc.* fruticosa. *Foliat.* opposita simplex integerrima. *Floresc.* terminalis. *ramea.* *Fulcr.* nulla.

1. NYCT. caule fruticoso diffuso, foliis inferioribus *Sambac.*
cordatis obtusis, superioribus ovatis acutis. *Linn.*
sp. pl. 6. *Syst. nat.* 1759. T. 2. p. 847.

Nyct. caule volubili, foliis subovatis acutis. *Linn.*
Sauv. p. 137.

Le Jasmin d'Arabie.

HABITAT in Indus.

HOSPITATUR hyeme in caldario; æstate sub dio; florens, semina nunquam maturans, semper virens.

JASMINUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 13.

Char. sec. *Radic.* ramosa lignosa. *Caulesc.* fruticosa; ramosa. *Foliat.* opposita vel alterna, simplex vel ternata, aut impari pinnata. *Floresc.* ramea, terminalis. *Fulcr.* nulla.

1. JASM. foliis oppositis pinnatis. *Linn. sp. pl.* 7. *Sauv.* *Officinale.*
221. *Linn. Syst. nat.* 1759. 847.

Jasm. vulgarius flore albo. *Tour. Inst.* 597.

2. Jasm. Hispanicum flore majore externe rubente. *Tour.*
597. *Jasmin d'Espagne.*

Le Jasmin ordinaire, vernaculè *lou Joussem.*

HABITAT & colitur in hortis.

HOSPITATUR sub dio, in frigidario & tepidario.

3. In caldario. Frutex, perennis, semina rarè maturans.
Obs. Foliolum terminale sæpiùs lanceolatum, longius.

- Azoricum.* 2. JASM. foliis oppositis ternatis. *Linn. sp. 7. Sauv. 174. Linn. Syst. nat. 1759. 847.*
Jasmin. azoricum trifoliatum flore albo. Tour. Inst. 597.
 HABITAT in Indiis.
 HOSPITATUR in caldario, nunquam semina maturans, frutex, semper virens; variat foliolo terminali (majori) cordato.
- Fruticans.* 3. JASM. foliis alternis ternatis simplicibusque, ramis angularis. *Linn. sp. 7. Sauv. 174. Linn. Syst. nat. 1759. pag. 847.*
Jasmin. luteum, vulgò dictum Bacciferum. Bot. Monsf. 139. Tour. Inst. 597.
Le Jasmin jaune, vernaculè Jaoüfemin jaoüine.
 HABITAT Monspelii ad margines agrorum, ubique frutex perennis. Floret etiam autumnò. Lineæ duæ elevatae ad basim petiolorum, decurrunt in caulem.
- Humile.* 4. JASM. foliis alternis pinnatis, vel ternatis. *Linn. sp. pag. 7. Sauv. pag. 222.*
 HABITAT cum prioribus.

LIGUSTRUM.

- Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 14.*
 Char. sec. *Radic. ramosa, lignosa. Caulesc. fruticosa. Foliat. opposita, simplex integerrima. Floresc. racemosa, ramea, terminalis. Fulcr. nulla.*
- Vulgare.* 1. LIG. *Linn. sp. pag. 7. Sauv. 130. Linn. Syst. 1759. Seguiet. Tom. II. pag. 274. Tour. 596.*
Ligustrum Germanicum. Bot. Monsf. 154.
Le Troëne, vernaculè Troesne.
 HABITAT in variis locis vicinis, *auprès de la Verune, Montferrier, Sellenneuve.*
 HOSPITATUR sub dio. Arbuscula semper virens. Folia ovata, petiolo brevi. Flores albi graveolentes. Racemus conicus, terminans ramos.

PHILLYREA.

- Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 15.*
 Char. sec. *Radic. ramosa lignosa. Caulesc. arborea. Foliat. opposita, simplex. Floresc. axillaris, aggregata. Fulcr. nulla.*
- Angustifolia.* 1. PHILL. foliis lanceolatis subintegerrimis. *Linn. sp. pag. 7. Syst. nat. 1759. pag. 847.*

DIANDRIA MONOGYNIA.

7

Phill. foliis lanceolatis vix crenatis. *Linn. clif. Sauv.* 130.

Phill. folio Ligustri. *Tour.* 596. *Bot. Mons.* 202.

♂. Phill. foliis lanceolatis integerrimis. *Linn. sp. pag.* 8. *Sauv.* 130.

Phill. angustifolia prima. *Bot. Mons.* 202. *Tour.* 596.

Le Filaria ou Filaris, vernaculè *Alader mâle*.

HABITAT ad mare versus *Maguelonne*, *Villeneuve*, & à *Montferrier*.

HOSPITATUR sub dio. Arbor semper virens.

2. PHILL. foliis cordato-ovatis, serratis. *Linn. sp. pag.* 8. *Latifolia*. *Sauv. pag.* 136.

Phill. latifolia spinosa. *Tour.* 596. *Seguier*, *Tom. II.* *pag.* 273.

Phill. folio ilicis. *Bot. Mons.* 202.

HABITAT Monspelii, à *Montferrier*, *Rouquet*, *Valene*.

HOSPITATUR sub dio. Perennis, semper virens.

O L E A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 16.

Char. sec. *Radic.* lignosa ramosa. *Caulest.* arborea:

Foliat. opposita simplex integerrima. *Floresc.*

axillaris solitaria (in unâ specie racemosa.)

Fulcr. nulla.

1. OLEA foliis lanceolatis. *Linn. sp. pag.* 8. *Sauv.* 58. *Linn. Europæ.* *Syst. nat.*

Olea sativa. *Bot. Mons.* 189. *Tour. Inst.* 599.

Olea sativa major oblonga, angulosa amygdali formâ.

Tourn. inst. 599. *Bot.* 189. *Hort. Mons.* 146.

L'Olivier.

Obs. Hujus quamplurimæ varietates occurrunt in agro Monspelienfi. *Sativa* vocatur *Amellaoû*.

♂. *Olea media oblonga angulosa.* *Bot. Mons.* 189. *Hort.* 147. *Ouliviere.*

7. *Olea media oblonga, fructu corni figurâ.* *Bot.* 189. *Hort.* 147. *Tour.* 599. *Courniaoû.*

2. *Olea minor oblonga.* *Bot.* 189. *Hort.* 147. *Pichonline.* *Olea fructu oblongo minore.* *Tour.* 599.

1. *Olea major subrotunda.* *Bot.* 189. *Ampoulaou.*

Olea maxima subrotunda. *Hort. Mons.* 147. *Tour.* 599.

6. *Olea media rotunda viridior.* *Bot.* 190. *Hort.* 147. *Tour.* 599. *Verdale.*

8 DIANDRIA MONOGYNIA.

7. *Olea media rotunda*, *præcox*. *Bot.* 190. *Hort.* 147. *Tour.* 599. *Mourasii*.
8. *Olea minor rotunda*, *racemosa*. *Bot.* 190. *Hort.* 147. *Tour.* 599. *Bouteillaui*.
9. *Olea minor rotunda rubro-nigricans*. *Bot.* 190. *Hort.* 147. *Tour.* 599. *Salierne*.
10. *Olea minor rotunda ex rubro & nigro variegata*. *Bot.* 190. *Hort.* 147. *Tour.* 599. *Pigeon*.
11. *Olea sylvestris*. *Bot. Monf.* 189. & folio duro subrusincano. *B. Pin.* 472. *Tour.* 599. *Olivier sauvage*.
Hæc species inculta, passim provenit ad margines sepium, fructus ferè nunquam profert.
HABITAT in toto agro Monspeliensi. Arbor sempervirens, florens mediâ ætate. Fructus maturans hyeme.
HOSPITATUR sub dio. Perennis.

SYRINGA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 18.

Char. sec. *Radic.* lignosa ramosa. *Caulesc.* fruticosa. *Foliat.* opposita simplex. *Floresc.* terminalis racemosa. *Fulcr.* nulla.

- Pulgaris.* 1. *SYR.* foliis ovato-cordatis. *Linn. sp. pag.* 9. *Sauv.* 136. *Lilac Math.* *Tour.* 601. *Le Lilac.* Monspeli, *leu Lilla*.
HABITAT in Oriente.
HOSPITATUR & colitur in hortis sub dio. Arbuscula perennis, florens maiò, racemi florum compacti.
- Perfica.* 2. *SYR.* foliis lanceolatis. *Linn. sp. pag.* 9. *Sauv.* (integris) 130. *Linn. Syst.* 1759. *pag.* 848. *Lilac Ligustri folio.* *Tour. Inst.* 602.
- Laciniata.* 3. *Syr.* foliis lanceolatis, integris & pinnatifidis. *Linn. sp. pag.* 9. *Sauv.* 221. *Linn. Syst.* *Lilac folio laciniato.* *Tour. Inst.* 602. *Le Lilac de Perse*.
HOSPITATUR sub dio. Occurrit solummodo in horte regio. Flores laxè racemosi, minores quàm in priori specie.

CIRCEA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 19.

Char. sec. *Radic.* ramosa. *Caulesc.* sæpiùs simplex herbacea. *Foliat.* opposita, petiolata simplex integra. *Floresc.* racemosa, terminalis. *Fulcr.* nulla.

DIANDRIA MONOGYNIA.

3

1. CIRC. caule erecto racemis pluribus. *Linn. sp. p. 9. Luteiana: Sauv. 151.*

Circ. foliis longioribus obiter crenatis. *Sauv. 151.*

Circ. Luteiana. *Tour. 301.*

2. CIRC. Canadensis latifolia, flore albo. *Tour. 301.*

La Circée, ou herbe de St. Etienne.

HABITAT à Joyeuse, ad margines viarum.

HOSPITATUR in frigidario. Luxuriat in Labyrintho horti regii.

Descr. Radix perennis. Caulis pedalis, villosus erectus, sæpiùs glaber. Folia opposita, nervosa, subcordata, acuminata, dentata, petioli folus subæquales. Flores laxè racemosi nudi; racemus terminalis longior; laterales breviores; Corollæ 2 petalæ; Calyx 2 phyllus; coloratus; petala inter foliola calycina, corollam simulant tetrapetalam. Capsula infera hispida, compressa. Floret in Labyrintho junio & augusto, semina maturans.

VERONICA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 20.*

Char. sec. Rad. fibrosa. Caul. ramosa, repens vel erecta. Fol. simplex integra, opposita, terna vel alterna. Flor. axillaris, solitaria vel terminalis strictius laxiusve spicata. Fulc. nulla.

* Spicata.

1. VER. spicis terminalibus, foliis ternis lanceolatis æqualiter serratis. *Linn. sp. 10. Spuria.*

Ver. mas surrecta elatior. *Barr. Icon. 391. & 681.*

Ver. spicata angustifolia. *Tour. 143. & longifolia, ibid.*

HOSPITATUR sub dio. Radix perennis. Variat foliis oppositis, vel summis alternis.

2. VER. spicâ terminali, foliis oppositis, crenatis, obtusis, caule ascendente simplicissimo. *Linn. sp. pl. 10. Syst. nat. Spicata.*

Ver. foliis oppositis lanceolatis, caule spicâ terminato.

Sauv. 131. absque varietate.

Ver. spicata minor. *Tour. 144. Seg. ver. 1. p. 234.*

HABITAT Monspelii; circa Sellenewva, la Verune & Lattes.

HOSPITATUR sub dio.

3. VER. spicis lateralibus pedunculatis, foliis ovatis oppositis serratis, caule procumbente. *Linn. sp. pl. 11. Syst. nat. Officialis.*

Ver. mas lupina & vulgarissima. *Tour.* 143. *Bot. Mons.* 275. *Seg. ver. T. I.* p. 233.

Le Thé de l'Europe. La Véronique.

HABITAT Monspelii, abundat à Merviel, à l'Esperou, à Valene.

HOSPITATUR sub dio. In frigidario.

Descr. Caules humifusi villosi, stoloniferi; folia sessilia serrata, ad basim sæpè integra; racemi inferè nudi axillares solitarii. Foliola calycina æqualia.

* *Racemosa.*

Alpina. 4. VER. foliis oppositis lanceolatis, serrulatis; caule frutescente. *Sauv.* 131.

Ver. corymbo terminali, foliis oppositis, calycibus hispidis. *Linn. sp. pl.* 11.

Ver. Alpina frutescens. *Tour.* 144. *Seg. ver. T. I.* p. 235.

HABITAT à l'Esperou.

HOSPITATUR sub dio. In frigidario. Variat foliis integerrimis, ovatis, calycibus lævibus.

Serpyllifolia. 5. VER. foliis imis oppositis ovatis, summis alternis lanceolatis, racemo terminali.

Ver. floribus solitariis. *Sauv.* 134. n°. 98.

Ver. pratensis serpyllifolia. *Tour.* 144.

Ver. racemo terminali subspicato, foliis ovatis, crenatis, glabris. *Linn. sp. p.* 12.

Chamædris spuria angustifolia. Bot. Mons. 59.

HABITAT à l'Esperou & au Puits de S. Loup, au-delà des Mateles.

HOSPITATUR sub dio.

Baccabunga. 6. VER. racemis lateralibus, foliis oppositis planis, caule repente. *Linn. sp. p.* 12.

Ver. aquatica { major, folio subrotundo. *Tour. p.* 145.
 { minor,
 Seg. ver. T. I. p. 239.

Ver. foliis oppositis ovalibus, petiolatis, floribus laxè spicatis lateralibus. *Sauv.* 134.

Anagallis aquatica minor folio subrotundo. Bot. Mons. 18.

Le Cresson de fontaine.

HABITAT Monspelii in aquis; à la Fontputanelle, à Scleneuve, à Lattes.

Anagallis. 7. VER. racemis lateralibus, foliis oppositis lanceolatis serratis; caule erecto. *Linn. sp. p.* 12.

Ver. aquatica { minor, folio oblongo. *Tour.* 145. &
major,

minor *Seg. ver. T. I. p. 240.*

Anagallis aquatica major folio oblongo. *Bot.* 18.

Ver. foliis oppositis ensiformibus, floribus laxè spicatis lateralibus. *Sauv.* 131.

HABITAT cum præcedenti. Utraque exsiccatur difficilimè.

8. VER. racemis lateralibus, foliis ovatis, sessilibus, *Chamædrys.* dentatis; foliolis calycinis linearibus inæqualibus.

Ver. racemis lateralibus, foliis rugosis, ovatis, dentatis; caule debili. *Linn. sp. p. 13.*

Ver. minor foliis imis rotundioribus. *Tour.* 144. *Seg. ver. T. I. p. 236.*

Chamædrys spuria angustifolia. Bot. Monsf. 59.

Ver. foliis cordatis, summis majoribus acutioribus ex alis racemosa. *Sauv.* 135.

Vernaculè, *lou pichot Chaine.*

HABITAT copiosè *Montpelii, à la Pinede de la Valette, & au Terrail.*

HOSPITATUR sub dio. Folia sæpè ad basim integra.

9. VER. racemis lateralibus, foliolis calycinis ovatis integerrimis. *Lavifolia.*

Ver. racemis lateralibus, foliis cordatis, rugosis, dentatis; caule stricto. *Linn. sp. p. 13.*

Ver. maxima. *Tour. p. 144. Seg. ver. Tom. I. p. 236.*

Ver. foliis oppositis plicatis, dentatis, scapis ex alis superioribus laxè spicatis. *Sauv.* 135.

10. *Chamædrys spuria minor angustifolia. B. Pin. 249.*

Ver. foliis ovalibus serratis oppositis, spicis laxis ad alas superiores oppositis. *Sauv.* 134.

HOSPITATUR sub dio. Folia subsessilia. Pedunculi florum longiores; racemi inferne nudi.

* *Pedunculis unifloris.*

10. VER. floribus pedunculatis axillaribus, foliolis calycinis ovatis subæqualibus. *Agrostis.*

Ver. floribus solitariis, foliis cordatis, incisis pedunculo brevioribus. *Linn. sp. p. 13.*

Ver. flosculis pediculis oblongis infidentibus. *Tour.* 145. *Seg. ver. T. I. p. 237.*

Alsiue *chamædryfolia*, flosculis oblongis pediculis infidentibus. *B. pin. Bot. Monsf. 12.*

Ver. foliis cordatis, crenatis oppositis, floribus solitariis peduncularis. *Sauv.* 114.

HABITAT in hortis mixta cum sequenti.

HOSPITATUR sub dio.

Obs. (apud nos) datur foliis dentatis & serratis.

Arvensis. 11. VER. floribus axillaribus, foliolis calycinis lanceolatis inæqualibus.

Ver. floribus solitariis, foliis cordatis, incis, pedunculo longioribus. *Linn. sp. p.* 13.

Ver. flosculis cauliculis adhærentibus. *Tour.* 145. *Segver. T. I. p.* 237.

Alfine veronicæ folio, flosculis cauliculis adhærentibus. *Bot. Monf.* 12.

Ver. foliis oppositis, cordatis, crenatis; floribus solitarius, sessilibus. *Sauv.* 135.

Ver. foliis oppositis, ovatis, crenatis; foliolis calycinis, inæqualibus. *Sauv. ibid.*

HABITAT ubique Monspelii. Priori magis villosa; folia superiora sæpè lanceolata integerrima. Petiolus folii multò brevior quàm in antecedenti: variat foliis alternis.

Hederifolia. 12. VER. floribus pedunculatis axillaribus, foliis cordatis, planis, quinquelobis. *Linn. sp. p.* 13.

Ver. cimbalariz folio verna. *Tour.* 145.

Alfine hederulæ folio. *Bot. Monf.* 12.

Ver. foliis alternis cordatis quinquelobis, floribus solitariis. *Sauv.* 114.

HABITAT Monspelii copiosè; à la Verune, & alibi.

HOSPITATUR in frigidario.

Triphyllor. 13. VER. floribus solitariis pedunculatis axillaribus, foliis inferioribus 3 partitis; summis 3 partitis. *Linn. Hort. clif.* 9. *Sauv.*

Alfine parva recta. *Lob. Icon.* 464.

Ver. verna 3 fido vel 5 fido folio. *Tour.* 145.

Alfine 3 phyllos cærulea. *Bot. Monf.* 12.

Ver. floribus solitariis, foliis digitato 3 partitis, pedunculo brevioribus. *Linn. sp. p.* 14.

HABITAT Monspelii; A Sellencuve, & dans les prés de Caunelles.

HOSPITATUR sub dio.

JUSTICIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 22.

Char. sec. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* arborea. *Fol.* opposita simplex integerrima petiolata. *Flor.* spicata axillaris. *Fulc.* bractea triplex ad basim singuli floris.

1. JUST. arborea foliis lanceolato-ovatis, bracteis ovatis *Adhatoda;*
persistentibus 3nerviis, galeâ corollarum concava.
Linn. sp. p. 15. Sauv. app. 307.

Adhatoda Zeylanensium. Tour. 175.

Le Noyer de Zeylan.

HOSPITATUR sub dio æstate; in caldario hyeme.

Descr. Arbor sempervirens. Folia opposita lanceolato-ovata integerrima; petiolo brevi. Florum spicæ axillares, solitariae, inferne nudæ; corollæ albæ; labio superiore concavo incurvo emarginato; inferiore 3fido, laciniis æqualibus, intermediâ lineis rubris striatâ. Bractææ ad basim florum, 3nerviæ, 5nerviæ vel 7nerviæ, ovatæ. Altera exterior & inferior, laterales & superiores duæ minores. Floret sæpè apud nos, vere, æstate, & autumnò; præsertim in meo hortulo ubi fructus protulit, calceoli formam æmulantes.

GRATIOLA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 25.

Char. sec. *Rad.* horizontalis nodosa fibrosa. *Caul.* angulata herbacea. *Fol.* sessilis opposita simplex integra. *Flor.* petiolata solitaria axillaris. *Ful.* bractea linearis duplex, ad basim cujuslibet floris.

1. GRAT. foliis ovato-lanceolatis superne serratis, bracteis geminis linearibus, calyce longioribus. *Officinalis.*

Grat. floribus pedunculatis, foliis lanceolatis serratis.

Linn. sp. p. 17. Sauv. 137.

Digitalis minima Gratiola dicta. Tour. 165.

Grat. centauroïdes. *Bot. Monf. 123.*

La Gratiolle, ou l'herbe au pauvre homme.

HABITAT Monspelii; *Au bois de Gramont dans le pré à gauche.*

HOSPITATUR in frigidario. Floret maio & junio. Folia sessilia semi-amplexicaulia, serrata, serraturis parvis

remotis ; inferne integra ; pedunculi axillares solitarii uniflori , foliis breviores ; ad basim cujuslibet calycis , bractæ duæ lineares calyce longiores.

UTRICULARIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 24.

Char. sec. *Rad.* fibrosa horizontalis stolonifera. *Caul.* geniculata. *Fol.* simplex capillacea multifida vesiculata opposita. *Flor.* nuda axillaris. *Ful.* nulla.

- Vulgaris.* 1. UTRIC. nectario conico , pedunculis squamosis. *Linn. sp. p.* 18. *Sauv.* 222.
Lentibularia Rivini. Seg. ver. T. I. p. 128.
Linariae affinis millefolii folio lenticulato , flore luteo. Hort. Monsf. 120.
Millefolium aquaticum flore luteo galericulato. Bot. Monsf. app. 302. *Lob. Icon.* 791.
 HABITAT Monspelii ; *A Lattes , à Maupas ;* in aquis.
 HOSPITATUR in frigidario. Floret julio & augusto.
 Flores maximi. Folia multifida , lacinulis capillaribus. Pedunculi squamis vestiti , axillares , multiflori. Pedunculus partialis uniflorus , ex axilla squamæ concavæ bractæ-formis , floribus longior.

VERBENA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 26.

Char. sec. *Rad.* ramosa. *Caul.* tetragona articulata ramosa. *Fol.* opposita simplex integra vel incisa. *Flor.* spicata terminalis & axillaris. *Fult.* nulla.

- Nodiflora.* 1. VERB. tetrandra , spicis capitato conicis axillaribus , foliis ovatis serratis , caule glabro repente. *Linn. sp. pag.* 20.
Verb. nodiflora capite oblongo , seu Verbenaca nodiflora Imperati. Barr. Icon. 855.
 2. Verb. nodiflora iulo longiore. *Barr. Icon.* 854.
 HOSPITATUR sub dio. Perennis. Pedunculi foliis longiores. Semina maturat autumnò (sed rarò.) Variat foliis cuneiformibus ad basim integris & caule obtuse angulato.
Banariensis. 2. VERB. tetrandra , spicis oblongis axillaribus terminalibusque , caule frutescente bicanaliculato.
Verb. spicis fasciculatis ; foliis lanceolatis amplexicaulibus. Linn. sp. p. 20.

DIANDRIA MONOGYNIA. 15

HOSPITATUR sub dio. Caulis perennis, altitudinem humanam superat, hirsutus, pilis patentibus, acute tetragonus; latera opposita alternatim canaliculata. Alibi herbacea annua.

3. VERB. tetrandra, spicis filiformibus longis, foliis hastatis. *Linn. sp. p. 10.* *Hastata.*

Verbena americana altissima, spicâ multiplici, foliis urticæ angustissimis. *Tour. 200.*

Et { floribus cæruleis. *Tour. ibid.*
 { floribus purpureis.

HOSPITATUR sub dio. Perennis. Priori humilior. Variat foliis omnibus lanceolatis.

4. VERB. tetrandra, spicis paniculatis filiformibus, foliis ovatis, serratis petiolatis. *Linn. sp. p. 10.* *Urticifolia.*

Verb. urticifolia Canadensis. *Tour. 200.*

Verb. lamifolia. *Barr. Icon. 1146.*

HABITAT in Canada.

HOSPITATUR sub dio. Perennis. Petioli hirsuti, breves. Folia sæpè duplicato-serrata.

5. VERB. tetrandra, spicis paniculatis, foliis multifidis, caule solitario. *Linn. sp. p. 10.* *Officinalis.*

Verb. foliis multifido-lacinatis, spicis filiformibus. *Sauv. 279.*

Verb. communis flore cæruleo. *Bot. Mons. 275. Tour. 200.*

La Verveine ou Verbene. Vernaculè-Bermene.

HABITAT Monspelii ubique.

HOSPITATUR sub dio. Annua. Caulis glaber sæpè scaber, debilis.

Variat foliis 3partitis dentatis, foliisque summis lanceolato-oblongis integerrimis.

LYCOPUS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 27.*

Char. sec. *Rad. fibrosa. Caul. tetragona ramosa.*

Fol. opposita, simplex incisa. Flor. axillaris verticillata. Fulc. nulla.

1. LYC. foliis ovatis sessilibus, basi sinuato-pinnatifidis superne serratis. *Palustris.*

Lycopus foliis sinuato-serratis. Linn. sp. p. 21.

Lyc. Sauv. 148.

Marrubium Palustre glabrum hirsutum. *Bot. Mons.* 174.
Lyc. palustris glaber villosus. *Tour.* 191.
Le Pied de loup.

HABITAT *Montpelii*; *au Verdanson, Sellenneuve, Lattes,*
le long du Lés.

HOSPITATUR sub dio. Perennis.

ZIZIPHORA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 28.

Char. sec. *Rad.* fibrosa. *Caul.* obtuse tetragona;
 ramosissima. *Fol.* opposita, simplex integra. *Flor.*
 verticillata, axillaris. *Fulc.* nulla.

Tinctor.

1. ZIZIPH. floribus verticillatis pedunculatis, foliis lanceolatis, ciliatis subintegerrimis.

Ziziph. floribus lateralibus, foliis lanceolatis. *Linn.*
sp. p. 21.

Clinopodium orientale hirsutum, foliis inferioribus
 ocymum, superioribus hyssopum referentibus. *Tour.*
Cor. 11.

HABITAT in Mediâ.

HOSPITATUR sub dio, annua; caulis erectus, teres,
 obtuse 4angulus, pubescens, semipedalis. Rami
 debiles, diffusi. Folia sæpius integerrima; petiolo
 ipsis duplo brevior.

Flores axillares sæpè 3. vel quatuor pedunculati. Calyces
 hirsuti, striati, acuminati. Corollæ dilute violacæ,
 fauce notatâ punctis purpureis. Semina maturans.

MONARDA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 32.

Char. sec. *Rad.* fibrosa. *Caul.* tetragona ramosa
 articulata. *Fol.* opposita, simplex integra. *Flor.*
 verticillata. *Fulc.* nulla.

Sifnulofo.

1. MON. verticillis capitatis subsolitariis terminalibus,
 foliis ovatis sessilibus.

Mon. capitulis terminalibus, caule obtus-angulo. *Linn.*
sp. p. 22.

Leonurus Canadensis origani folio. *Tour.* 187.

Origanum Canadense, fistuloso flore purpureo. *Barr.*
Icon. 1211.

HABITAT

HABITAT in Canadâ.

HOSPITATUR sub dio, hyemè in hybernaculo, perennis, vix bipedalis. Variat foliis integerrimis.

R O S M A R I N U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 31.

Char. sec. Rad. ramosa lignosa. Caul. fruticosa ramosa articulata. Fol. opposita simplex, integerrima. Flor. axillaris. Fulc. nulla.

1. ROSM. foliis sessilibus, linearibus, margine revolutis. *Officinalis.*

Rosm. Linn. sp. p. 23. Sauv. 141.

Rosm. coronarius fruticosus. Bot. Monf. 223.

Rosm. spontaneus latiore folio. Tour. 195.

2. Rosm. hortensis angustiore folio. Tour. ibid.

Le Romarin. Monspeli leu Roumanis.

HABITAT Monspeli ubique; à la Garrigue de la Verune, du Terrail, de Montferrier, &c.

HOSPITATUR sub dio. Perennis.

S A L V I A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 30.

Char. sec. Rad. ramosa. Caul. herbacea, ramosa; articulata tetragona. Fol. opposita simplex, integra vel incisa, inferior petiolata, superior sessilis. Flor. verticillata terminalis. Fulc. bractæ ad basim verticillorum.

1. SALV. foliis radicalibus lyratis dentatis, corollarum galea brevissima. Linn. sp. p. 23. Syst. nat. p. 853. *Lyrata.*

HABITAT in Virginiâ.

HOSPITATUR sub dio. Radix perennis; semina raro maturat.

2. SALV. foliis lanceolato-ovatis integris crenulatis, floribus spicatis, calycibus acutis. Linn. sp. p. 23. Syst. nat. p. 853. Sauv. 143. *Officinalis.*

Salvia major. Bot. Monf. 228. Tour. 181.

3. Salvia minor aurita & non aurita. Tour. ibid.

La Sauge. Monspeli, la Saoubia ou Saoubie.

HABITAT Monspeli circa Grabels, St. George.

HOSPITATUR sub dio. Perennis. Flores laxè spicati.

3. SALV. foliis lanceolato-ovatis integris crenulatis, floribus spicatis, calycibus obtusis. Linn. sp. p. 24. Syst. nat. p. 853. *Pomifera.*

Salv. cretica frutescens pomifera, foliis longioribus incanis & crispis. *Tour. Cor.* 10.

Salv. Cretenfis baccifera. *Lob. Icon.* 554.

HABITAT in Cretâ.

HOSPITATUR sub dio. Radix perennis. Petioli foliorum longissimi; raro semina proferens, nec florens quolibet anno.

- Urticifolia.* 4. SALV. folius ovato-oblongis duplicato-ferratis, calycibus 3dentatis, laciniâ summâ 3dentatâ. *Linn. sp. p.* 24. *Syst. nat. p.* 853.

HABITAT in Virginiâ.

HOSPITATUR sub dio, valde hirsuta. Variat labio calycis superiori integro.

5. SALV. folius oblongis crenatis, corollarum galeâ semi-orbiculatâ, calycibus fructiferis reflexis. *Linn. sp. p.* 24. *Syst. nat.* 853. *Sauv.* 143.

Horminum comâ viridi. *Tour.* 178.

HOSPITATUR sub dio. Bractææ virides (summæ.)

- Horminum.* 6. SALV. foliis obtusis crenatis, bracteis summis sterilibus coloratis *Linn. sp. p.* 24.

Salv. foliis obtusis crenatis, spicis colorato-comosis. *Sauv.* 146.

Horminum sativum comâ purpureo-violaceâ. *Tour.* 178.

Horminum creticum comâ purpureo-violaceâ. *Barr. Icon.* 1233.

L'Ormin. Vernaculè, *lou Prud'homme.*

HOSPITATUR sub dio. Floret absque fructu, vix sesquipedalis.

- Sylvestri.* 7. SALV. folius cordato-lanceolatis acutis, bracteis coloratis, flore brevioribus. *Linn. sp. p.* 24. *Syst. nat.* p. 854.

Sclarea folio salvix major maculata. *Tour.* 179. Minor sive glabra. *Tour.* 180.

HABITAT....

HOSPITATUR sub dio.

- Pratenfis.* 8. SALV. foliis cordato-oblongis crenatis: summis amplexicaulibus, verticillis subnudis, corollis galeâ glutinosâ. *Linn. sp. p.* 25. *Syst. nat. p.* 854.

Sclarea pratensis folio serrato. *Tour.* 179. flore caruleo, albo, & suave rubente.

Horminum pratense foliis serratis. *Bot. Monf.* 133.

Salvia foliis ovatis inciso-crenatis, verticillis subnudis. *Linn. Sauv. p. 146.*

HABITAT Monspelii; a Jourvinac, St. George, & pres le Puits de St. Loup. Perennis.

9. SALV. foliis serratis sinuatis, corollis calyce angustioribus. *Linn. sp. p. 25. Sauv. 278. Linn. Syst. nat. p. 854.* *Verbena.*

Horminum sylvestre lavendulae flore. *Bot. Mons. 133. Tour. 178.*

Horminum sylvestre inciso folio, parvo flore Italicum. *Barr. Icon. 208. 220.*

Monspelii Prud'homme.

HABITAT Monspelii ubique; praesertim au bord des Les. Perennis, vix pedalis.

10. SALV. foliis ovatis, basibus mucronato tuberosis, spicis imbricatis, calycibus trifidis. *Linn. sp. p. 25. Syst. nat. p. 854.* *Hispanica.*

HABITAT in Italia & Hispania.

HOSPITATUR sub dio. Hyeme in hybernaculo.

11. SALV. foliis cordatis crenato-dentatis, verticillis subnudis, stylo corollarum labio inferiore incumbente. *Linn. sp. p. 26. Syst. nat. p. 854.* *Verticillata.*

Horminum sylvestre latifolium verticillatum. *Tour. 178.*

12. Horminum sylvestre hirsutum lampsanæ folio, flore caesio. *Barr. Icon. 199.*

HOSPITATUR sub dio. Perennis. Florens æstate & autumno.

Variat foliis lyratis vel cordato-sagittatis in eadem plantâ.

12. SALV. foliis cordato-sagittatis serratis acutis. *Linn. sp. p. 26. Syst. nat. p. 854. Sauv. p. 146. I.* *Glutinosa.*

Salv. glutinosa maxima folius hormini. Tour. 180.

Orvala tertia. Dod. Pempt. 294.

La Sauge de montagne.

HABITAT Monspelii; à l'Esperou.

HOSPITATUR in frigidario. Perennis. Folia inferiora palmaria.

13. SALV. foliis hastato-triangularibus oblongis, obtusis crenatis. *Linn. sp. p. 26. Syst. nat. p. 854.* *Canariensis.*

Sclarea folio triangulari, caule tomentoso. Tour. 180.

HABITAT in Canariis.

HOSPITATUR sub dio. Versus meridiem, subfruticosa, sempervirens, bicubitalem superans altitudinem. Semina raro maturans.

Sclarea.

14. SALV. foliis rugosis oblongo-cordatis serratis, floralibus calyce longioribus concavis acuminatis. *Linn. sp. p. 17. Sauv. 146. Linn. Syst. nat. p. 854.*
Sclarea tabernæ. Tour. 179.

Horminum sclarea dictum. *Bot. Monf. 133.*

La Tente bonne Monspeli.

HABITAT Monspeli, aux prairies de Lattes; humanam superans altitudinem. Folia maxima rugosa cordata. Bractæa coloratæ.

- Ceratophylla.* 15. SALV. foliis rugosis pinnatifidis, lanatis. *Linn. sp. p. 17. Syst. nat. p. 854.*

Sclarea rugoso verrucoso & laciniato folio. Tour. 180.

HOSPITATUR sub dio. Hyeme apricatur. Nuper perit, nondum floruerat.

DIGYNIA.

ANTHOXANTHUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 35.*

- Char. sec. *Rad.* fibrosa. *Caul.* culmosa articulata; simplicissima. *Fol.* (graminea) vaginans subulata simplex integerrima. *Flor.* spicata terminalis nuda. *Ful.* nulla.

- Odonatum.* 1. ANTH. spicâ ovato-oblongâ, flosculis subpedunculatis aristâ longioribus. *Linn. sp. p. 28. Syst. nat. p. 855. Sauv. p. 26. & 35.*

Gramen anthoxanthum spicatum. *Tour. 518.*

Gramen pratense spicâ flavescente. *B. pin. 3.*

Gramen alopecurum spicâ glumosâ luteâ, villis crispis. *Barr. Icon. 114. n° 1.*

HABITAT Monspeli ubique in pratis.

Semina calycibus duplo minora atro-purpurea. Arista altera brevis recta, altera longior fusca vel nigricans geniculata. Spica, vigente florentiâ, virescens, absoluta verò, flavescens.

Classis III.

TRIANDRIA

MONOGYNIA.

VALERIANA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 37.

Char. sec. Rad. fibrosa, tuberosa. Caul. articulata, herbacea, fistulosa, simplex ramosa vel dichotoma. Fol. opposita simplex, integra vel composita, imò utraque in eadem specie. Flor. terminalis corymbosa. Fulc. nulla.

1. VAL. floribus monandris caudatis, foliis lanceolatis integerrimis. Linn. sp. pl. pag. 31. Sauv. 138. Linn. Syst. nat. pag. 860. Rubra.
Val. rubra. Tour. 131.
2. Valer. rubra angustifolia. Tour. 131. Bot. Monf. 273.
Val. foliis lanceolatis, integerrimis, floribus caudatis monandris. Sauv. 131.
La Valériane rouge.
HABITAT Monspelii; au Mont St. Loup, à l'Esperou.
HOSPITATUR in frigidario, sub dio. Perennis. β. semperflorens, foliis lanceolatis. Prior floret tantum æstate; folia (summa) cordata.
2. VAL. floribus monandris, foliis pinnatifidis. Linn. sp. Calcitrapæ.
p. 31. Syst. nat. p. 860. Sauv. pag. 275.
Val. foliis calcitrapæ. Tour. 133. Bot. Monf. 273.
HABITAT Monspelii, versùs Grabels. Rarò vidimus in locis notatis à Magnolio in Bot. Monf.
HOSPITATUR sub dio.
3. VAL. floribus triandris, foliis omnibus pinnatis. Officinalis.
Linn. sp. p. 31. Syst. p. 860.
Val. sylvestris major. Tour. 132. Dod. pempt. 349.
La grande Valériane.
HABITAT....
HOSPITATUR in frigidario.
4. VAL. floribus triandris, foliis caulinis pinnatis, radi- Pitt.
B ii j

calibus indivisis. *Linn. sp. p.* 32. *Sauv.* 221. *Linn. Syst. p.* 860.

Val. Phu folio olusatris. *Tour.* p. 132.

Val. hortensis. *Dod. pempt.* 346.

HABITAT à Fougere.

HOSPITATUR in frigidario; sempervirens. Variat foliis radicalibus lyratis.

- Tripteris.* 5. VAL. floribus triandris, foliis radicalibus cordatis, caulinis ternatis lanceolatis serratis. *Linn. sp. p.* 32. *Syst. p.* 860.

Val. foliis radicalibus cordatis erosis, caulinis sæpè ternatis, floribus 3antheris. *Sauv.* 134.

Val. floribus triandris, foliis radicalibus cordatis, aliis laciniatis. *Sauv.* 276.

Val. alpina 1°. *Tour.* 131. & altera, *ibid.*

Val. alpina minor. *Bot. Monf.* 307.

HABITAT à l'Esperou & aux Capouladoux, à la Serane. Copiosissimam vidi à la Malou pres de Beziers.

HOSPITATUR i frigidario. Folia caulina non præcisè ternata, sed 3fida laciniâ intermediâ majore.

- Zosteris.* 6. VAL. floribus triandris, caule dichotomo, foliis linearibus. *Linn. sp. p.* 33. *Syst. p.* 860.

Val. foliis linearibus integris, seminis apice cochleato, caule dichotomo. *Sauv.* 131.

Valerianella semine umbilicato oblongo nudo. *Bot. Monf.* 274. *Tour.* 133.

Vernaculè, la Chuguette; apud rusticos usui est loco acetarii. Vix palmaris. Folia ad basim uno alterove denticulo.

- Olitoria.* a. Valeriana caule dichotomo, foliis lanceolatis integris, fructu simplici. *Sauv.* 131. *Linn. sp.* 33.

Valerianella arvensis præcox, humilis, semine compresso. *Moris. Tour.* 132.

- Coronata.* A. Valeriana caule dichotomo, foliis lanceolatis dentatis, fructu 6dentato. *Linn. sp. pag.* 34. *Sauv. pag.* 131.

Valerianella semine stellato. *Bot. Monf.* 273. *Tour.* 133.

Vernaculè, lous Passerous.

- Dentata.* 7. Valeriana caule dichotomo, foliis oblongis subserratis, seminis coronâ 3dentatâ. *Linn. sp. pag.* 34. *Sauv.* 130. n°. 62. & pag. 276. n°. 50.

Valerianella cornu-copioïdes echinata *Column. Bot. Mons. 273. Tour. 133.*

Valeriana (echinata) floribus 3andris fructu linearĩ 3dentato extimo denticulo majore recurvato *Linn. Syst. nar. pag. 861. A.*

Valeriana echinata *Bauh. pin. 165.*

Vernaculè *las Ampouletes*

2. Val. caule dichotomo foliis imis dentatis, summis Multifida.
linearibus multifidis *Sauv. 131.*

Valerianella semine umbilicato rotundo nudo. For. Mons. 273. Tour. 132.

Phu minimum. Lob. icon. 716.

HABITAT Monspelii versus *Lavanet, Boutonet & alibi.*

HOSPITATUR sub dio. Annua. Varietates = 3 y. semipedalem attingunt altitudinem: d, vix 3 pollicaris.

7. VAL. floribus triandris, caule quadrifido, foliis Mixta.
imis bipinnatifidis, feminis pappo plumoso. *Linn. sp. p. 34. Sauv. 175. Linn. Syst. nar. p. 861.*

HABITAT Monspelii in saxosis, à *la Colomliere.* Copiosioremi vidi ultra pontem Castrinovi ad lævam, vers *Salason*, mixtam cum cochleariâ saxatili.

HOSPITATUR sub dio. Sæpius ramı quatuor oriuntur ex ipsâ radice, absque caule.

CNEORUM.

Char prim. Vid. *Linn. gen. pl. 39.*

Char. sec. *Rad.* ramosa lignosa. *Caul.* subfruticosa ramosa. *Fol.* alterna sessilis simplex integerrima. *Flor.* axillaris, solitaria. *Fulc.* nulla.

1. CNEOR. foliis oblongis sessilibus integerrimis, pedunculis solitariis unifloris. *Tricoccos.*

Cneor. Linn. sp. p. 34. Syst. nar. p. 861. Sauv.

Chamælea tricoccos. Bot. Mons. 59. Tour. 651. La Camellée.

HABITAT Monspelii ad dexteram viæ quâ itur ad pagum dictum *Monferrier, derriere le Martinet de M. Boulet, le long du Lés dans le bois; & in monte Cetio, ut notat Magnolius in Bot. Mans.*

HOSPITATUR sub dio in frigidario: sempervirens, florens vere & æstate. Frutex.

M E L O T H R I A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 43.

Char. sec. *Rad.* tenuis simplex. *Caul.* herbacea
ramosa volubilis. *Fol.* simplex petiolata alter-
na incisa. *Flor.* axillaris simplex pedunculata.
Ful. cirrosa laterifolia.

Pendula. 1. MEL. foliis cordatis palmato-angulatis petiolatis,
pedunculis axillaribus 1floris.

Mel. Linn. sp. p. 35. Syst. nat. p. 861. Sauv.

Beyonia canadensis folio angulato, fructu nigro.
Tour. 102.

HABITAT in Canadâ.

HOSPITATUR sub dio. *Aplicatur.* Annuâ. Petioli &
pedunculi subæquales.

P O L Y C N E M U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 44.

Char. sec. *Rad.* ramosa. *Caul.* ramosa, repens.
Fol. alterna subulata simplex integerrima. *Flor.*
axillaris. *Fulc.* stipulæ subulatæ solitariae.

Arvense. 1. POLYC. Foliis stipulisque subulatis.

Chenopodium humifusum annuum folio breviori &
capillaceo. Tour. 506. Seg. ver. t. 1. pag. 93.

Champhorata congener, Bot. Monf. pag. 47. hort.
pag. 40.

Herniaria foliis longis angustis acuminatis, glabris.
Aug. char. p. 51.

HABITAT Monspelu, præsertim occurrit in viâ quâ
itur ad Gramuntianum lacum. Perenne.

C R O C U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 45.

Char. sec. *Rad.* Bulbosa. *Caul.* nulla. *Fol.* tereti-
subulata vaginans radicalis. *Flor.* radicalis,
sessilis liliacea. *Ful.* nulla.

Sativus. 1. CROC. spatha univalvi radicali, corollæ tubo lon-
gissimo. Linn. sp. p. 36. Sauv. 19.

Croc. sativus. Tour. 350.

Le safran.

HOSPITATUR in frigidario, floret autumnâ. Bulbi
alii aliis impositi.

I X I A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 46.

Char. sec. *Rad.* horizontalis, tereti - carnosâ nodosa. *Caul.* simplex. *Fol.* ensiformis simplex integerrima alterna amplexicaulis. *Flor.* ramosa liliacea terminalis. *Fulc.* nulla.

1. IXIA foliis ensiformibus, floribus remotis. *Linn. sp. Chinens.* pl. 36. *Syst. nat. p.* 862. *hort. upf. p.* 16.
La Bermudienne.

HABITAT in Indiâ & Chinâ.

HOSPITATUR sub dio. Radix Perennis; floret augusto; semina semper maturans. Antheræ sæpius filamentis longiores. Stamina pistillo breviora.

G L A D I O L U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 47.

Char. sec. *Rad.* Bulbosa, solida. *Caul.* herbacea simplex. *Fol.* ensiformis alterna amplexicaulis, simplex integerrima. *Flor.* terminalis subspicata alterna. *Fulc.* nulla.

1. GLAD. foliis ensiformibus, floribus distantibus. *Communis.* *Linn. sp. p.* 36.

Glad. floribus unoversu dispositis. *Bot. Mons.* 109. *Tour.* 365. *sp.* 3 - 9.

2. Glad. utrinque floridus. *Bot. Mons.* 110. *Tour.* 366. *Le Glaycul.*

HABITAT Monspelii ubique in segetibus.

Radix Perennis. Spatha inferior sæpius corollâ longior. Bulbi alii aliis impositi.

I R I S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 49.

Char. sec. *Rad.* horizontalis, tereti - carnosâ, nodosa vel tuberosa. *Caul.* simplex foliosa, in unâ specie scaposa. *Fol.* ensiformis alterna amplexicaulis; in unâ specie tetragona radicalis. *Flor.* liliacea sparsa terminalis. *Fulcr.* nulla.

* *Barbata.*

1. IRIS corollis barbatis, caule foliis longiore multi- *Germanica.* *floro.* *Linn. sp. p.* 38. *Sauv.* 40.

Iris vulgaris violacea five purpurea sylvestris, J. B.
Bot. Monf. 141. Tour. 358.

Iris horrensis laxifolia Tour. 358. seu *iris nostras*.
La Flambe, Monspeli Coutele.

HABITAT Monspeli ubique ad margines sepium.

HOSPITATUR sub dio. Perennis.

Florentina. 2. *IRIS* corollis barbatis, caule foliis altiore subbifloro,
floribus sessilibus. Linn. Syst. nat. p. 863. A.

Iris alba Florentina B. pin. 31. Tour. 358.

L'Iris de Florence.

HABITAT. . . .

HOSPITATUR sub dio, in frigidario. Perennis. Stigmatis lacinia subtus exserit denticulum unicum bifidum.

Pumila. 3. *IRIS* corollis barbatis, caule foliorum longitudine unifloro. Sauv. 40. n°. 108. & 109.

Iris corollis barbatis, caule foliis brevior. Linn. sp. p. 38. Syst. nat. 863.

Iris perpusilla à caulis ferme saxatilis. Bot. Monf. p. 141.

Iris humilis saxatilis gallica. Tour. 362.

HABITAT Monspeli in saxosis, à Montferrier, vulgarior à Salason.

HOSPITATUR sub dio.

* * *Imberbes*.

Pseudocorus 4. *IRIS* corollis imberbibus, petalis interioribus stigmatibus minoribus, foliis ensiformibus. Linn. sp. pl. p. 38.

Iris corollis imberbibus, foliis ensiformibus, petalis internis stigmatibus minoribus. Sauv. 41.

Iris palustris lutea five *acorus adulterinus*. Bot. Monf. 142. Tour. 360. B.

HABITAT Monspeli ubique in aquis.

HOSPITATUR in frigidario. Lacinia unica stigmatis ad basim denticulum filiformem exserit.

Fasidissima. 5. *IRIS* corollis imberbibus, petalis internis longitudine stigmatis, foliis ensiformibus. Linn. sp. pl. p. 39. Sauv. p. 41.

Iris sylvestris seu *Xyris*. Bot. Monf. p. 141.

Iris fatida seu *Xyris*. Tour. p. 360.

Le Glaycul puant.

HABITAT Monspeli ad margines sepium.

6. IRIS corollis imberbibus, foliis tetragonis. *Linn. sp. Tuberosa.*
p. 40. *Sauv. pag. 43.*

Hermodyctylus folio quadrangulo. Tour. cor. 50.

Dodon. pempt. 249.

Les hermodactes.

HOSPITATUR in frigidario. Radix perennis. Floret autumnum & hyeme. Stigmata à latere exteriori foliola duo gerunt, instar squamæ nectariferos.

7. IRIS corollis imberbibus, foliis subulato-canaliculatis *Xiphium.*
caule brevioribus. *Linn. sp. p. 40.*

Iris caulescens, foliis margine conniventibus, corollis imberbibus. Sauv. p. 43.

Xiphion latifolium caule donatum. Tour. 363.

HOSPITATUR sub dio. Bulbosa, floret maio.

COMMELINA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 50.*

Char. sec. *Rad. fibrosa. Caul. articulata radicans ramosa. Fol. alterna simplex integerrima vaginans. Flor. liliacea terminalis. Ful. nulla.*

1. COMM. corollis inæqualibus, foliis ovato-lanceolatis acutis, Caule procumbente glabro. *Linn. sp. Communis.*
pl. pag. 40. Sauv. 43.

HOSPITATUR sub dio. Floret æstate. Folia ovata acuminata vaginantia Caulem. Pedunculi bini, eadem spathâ vaginati; alter uniflorus tenuis longus; alter brevior sub 4florus crassior; capsulæ maturæ lactescentes.

SCHÆNUS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 52.*

Char. sec. *Rad. fibrosa. Caul. culmosa solida teres foliosa vel nuda. Fol. (graminea) vaginans subulata simplex integerrima. Flor. terminalis spiculis capitatis. Fulc. bractææ binæ vel ternæ subulatæ foliaceæ.*

NOTA. In generibus Schœni, Cyperi & Scirpi, foliola floralia quæ involucria clarissimo Linnæo dicuntur, non pro calyce communi; sed pro genuinâ falcratione haberi debent, & bractearum nomine insigenda. Idem intelligendum de generi-

28 TRIANDRIA MONOGYNIA.

bus graminum & plantarum sequentibus, quæ Auctori prælaudato *involucris*, nobis vero *Bracteis* pariter donantur.

1. SCHÆNUS culmotereti, foliis margine dorsoque aculeatis. *Linn. sp. pl. 42. Sauv. 23.*

Gramen cyperoïdes altissimum, folus & carinâ ferratis. *Bot. Monf. 117.*

Scirpus palustris altissimus, foliis & carinâ ferratis. *Tour. 528.*

Gramen cyperoides. *Boccon. 72.*

HABITAT Monspelii ad stagnorum ripas.

HOSPITATUR sub dio. In frigidario. Perennis. Altitudo bicubitalis. Folia ad margines & nervum ferrato-ciliata, pedunculi axillares, alterni, multiflori, ramosi.

- Mucronatus.* 2. SCHÆNUS culmo tereti nudo, spicis fasciculatis, divaricatis, involucro subulato triphylo. *Linn. sp. pl. 42.*

Schœnus culmo tereti, foliis tribus patulis, flosculisque aggregatis terminato. *Sauv. 9.*

Juncus maritimus capite glomerato. *Tour. 528.*

Gramen cyperoides maritimum. *Bot. Monf. 118.*

Juncus maritimus paniculâ subrotundâ glumosâ. *Barr. Icon. 203. n.º. 1.*

HABITAT Monspelii cum priorî.

HOSPITATUR in frigidario, sub dio. Perennis.

- Nigricans.* 3. SCHÆNUS culmo tereti nudo, capitulo ovato: involucri diphylli valvula altera subulata longa. *Linn. sp. p. 43.*

Schœnus flosculis spicatis. *Sauv. 9.*

Gramen spicatum junci facie lithospermi femine. *Tour. 518.*

Juncus lithospermi femine. *Bot. Monf. Icon. pag. 145.*

HABITAT Monspelii ultra pontem Sallenovæ; *au-dessus de Caunelles*; ubi abundat.

HOSPITATUR sub dio. Perennis.

CYPERUS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 53.*

Char. sec. *Rad.* tuberosa vel fibrosa. *Caul.* culmosa solida, teres vel triquetra, nuda aut foliosa. *Fol.* graminea vaginans simplex inte-

gerrima, alterna vel radicalis. *Flor.* spicata, spiculis compressis in umbellas congestis. *Fulc.* Bractæ ternæ, quaternæ & subulatæ, umbellis sæpe longiores.

1. CYP. culmo folioso triquetro, umbella foliosa supra decomposita, pedunculis nudis, spicis alternis, *Longus.*
Linn. sp. 45. Sauv. 21.

Cyperus odoratus radice longa, seu cyperus officinarum. *Bot. Monf. 84. Tour. 527.*
Le Soucher.

HABITAT Monspelii, à Gramont, au Lés, à Latres & ubique in locis aquaticis vicinis.

HOSPITATUR in frigidario; altissimus; involucria longissima.

2. CYP. culmo nudo triquetro, umbella triphylla, pedunculis simplicibus inæqualibus, spicis confertis lanciolatis. *Flavescens.*
Linn. sp. p. 46.

Cyperus culmo triquetro spicis sessilibus confertis distichis apici trifoliato insidentibus. *Sauv. 21.*

Cyperus minimus panicula sparsa flavescente. *Tour. 527.*

HABITAT Monspelii in herbidis ante pontem pratorum laterensium. *A la campagne des Jésuites.*

Obs. Variat. Vix palmaris, spiculis conglomeratis ovatis; vel cubitatis, floribus pedunculatis, spiculis oblongis.

3. CYP. culmo nudo triquetro, umbella trifida, pedunculis simplicibus inæqualibus, spicis confertis linearibus attris. *Fuscus.*
Linn. sp. p. 46.

Cyp. minimus panicula sparsa nigricante. *Tour. 527.*

Gramen cyperoïdes paniculâ sparsâ minus *Bot. Monf. 118.*

HABITAT cum præcedenti. Raro ad semipedalem crescit altitudinem.

HOSPITATUR in frigidario. Perennis.

S C I R P U S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 54.*

Char. sec. Rad. fibrosa. *Caul.* culmosa solida, teres vel triquetra, nuda vel foliosa. *Fol.* graminea vaginans. Simplex integerrima, al-

30 TRIANDRIA MONOGYNIA.

terna vel radicalis. *Flor.* terminalis vel lateralis, spiculis teretibus. *Fulc.* Bractææ ut in prioribus; raro nullæ.

* *Spica unica.*

- Palustris.* 1. SCIRP. culmo nudo tereti, spica subovata imbricata. *Linn. sp. p.* 47.
Scirp. culmo nudo, spica terminatrice subovata. *Sauv.* 8.
Juncus palustris equiseti capitulo majore. *Bot. Monsf.* 145.

Scirp. equiseti capitulo majore. *Tour. pag.* 529.

Le jonc à masse.

HABITAT Monspelii, à Castelnau, & alibi in humidis.
HOSPITATUR in frigidario.

- Fluitans.* 2. SCIRP. culmis teretibus alternis nudis, caule folioso flaccido. *Linn. sp. p.* 48.
Scirp. caule folioso flaccido, scapis alternis capitatis. *Sauv.* 9.
Scirp. capitulis equiseti minor. *Tour.* 528.
HABITAT cum priori.

** *Culmo tereti polystachio.*

- Lacusfris.* 3. SCIRP. culmo tereti nudo, spicis ovatis pluribus pedunculatis terminalibus. *Linn. sp. p.* 48.
Scirp. teres panicula sub apice culmi ramosa. *Hall. Sauv. p.* 8.
Juncus maximus, seu scirpus major. *Bot. Monsf.* 143.
Scirpus palustris altissimus. *Tour.* 528.
HABITAT Monspelii, à Sellenenue, à Castelnau, in aquis.

HOSPITATUR in frigidario. Spiculæ oblongæ.

- Holoscanus* 4. SCIRP. culmo tereti nudo, spicis subglobosis glomeratis pedunculatis, involucrio diphyllo inæquali mucronato. *Linn. sp. p.* 49.
Scirp. maritimus, capitulis rotundis glomeratis. *Tour.* 528.

Juncus acurus maritimus capitulis rotundis. *Bot. Monsf.* 143.

HABITAT Monspelii ubique, à Castelnau, Lattes.

HOSPITATUR in frigidario.

- Romana.* 5. SCIRP. culmo tereti nudo, capitulo laterali conglobato bractea reflexa. *Linn. sp. p.* 49.

Scirp. capitulo singulari, radice tomentosa. *Barr. Icon.* 255. fig. 3.

HABITAT Monspeli *aux prairies d'Arenes, à la Mon-*
son, à la Mer.

HOSPITATUR in frigidario. Perennis.

6. SCIRP. culmo nudo setaceo, spicis lateralibus subsessilibus subfoliariis. *Linn. sp. p.* 49. *Setaceus.*

Scirp. omnium minimus, capitulo brevior. *Tour.* 528.

Juncellus inutilis, seu chamæschænos. *B. Pin.* 12.

Juncus gramineus minimus, capillari folio, capite squamoso. *Barr. Icon.* 118. n°. 2.

HABITAT Monspeli, à Balaruc & à Bouziques. Junio copiosum, florentem vidi.

HOSPITATUR in frigidario. Vix palmaris. Spicæ vix lentem magnitudine adæquant. Bractea spicis subæqualis.

*** Culmo triquetro, panicula nuda.

7. SCIRP. culmo triquetro nudo acuminato, panicula conglomerata nuda. *Linn. sp. pag.* 50. *Acuminatus.*

Cyperus maritimus capitalis glomeratis. *Tour.* 527.

Juncus acutus maritimus caule triangulo. *Bot. Monf.* 143.

HABITAT Monspeli ad mare & stagna, ubique.

HOSPITATUR in frigidario.

**** Culmo triquetro, panicula foliacea.

8. SCIRP. culmo triquetro, panicula conglobata foliacea, spicularum squamis trifidis, intermedia subulata. *Linn. sp. p.* 51. *Maritimus.*

Cyperus culmo triquetro, panicula foliacea pedunculis simplicissimis spicis confertis. *Sauv.* 20.

Cyperus rotundus vulgaris. *Bot. Monf.* 83.

Cyperus rotundus inodorus germanicus. *Tour.* 527.

9. Gramen cyperoïdes panicula sparsa majus. *Bot. Monf.* 118.

Cyperus vulgarior panicula sparsa. *Tour.* 527.

HABITAT Monspeli; abundat in Urbis fossis cum alopecuro aristato, vers l'Hôpital Général, & in humidis. s. *Au fond du Lés.*

9. SCIRP. culmo triquetro folioso, umbella foliacea, pedunculis nudis supradecompositis, spicis confertis. *Linn. sp. p.* 51. *Sylvaticus.*

Cyperus culmo triquetto, panicula foliosa, pedunculis nudis supra-decompositis, spicis confertis. Roy. Sauv. 21.

Gramen cyperoïdes miliaceum. Bot. Monf. 118.

Cyperus gramineus. Tour. 527.

HABITAT Monspelii in Ledo amne.

ERIOPHORUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 55.

Char. sec. *Rad. fibrosa. Caul. culmosa foliosa.*

Fol. (graminea) vaginans simplex integerrima.

Flor. terminalis spicata, nunc paniculata. Fulcr. bractæ.

Vaginatum. 1. **ERIOPH.** culmis vaginatis teretibus, spica palcacea. *Linn. sp. 52.*

Eriophorum foliis teretibus, spica unica subrotunda. Sauv. 9.

Linagrostis panicula minore. Tour. 664.

HABITAT à l'Esperou, à Rouquet, Valene, in pratis humidis.

HOSPITATUR in frigidario; spica magnitudine spicularum scirpi maritimi, erecta.

Polystachion. 2. **ERIOPH.** culmis teretibus, floribus paniculatis nutantibus.

Erioph. spicis pendulis. Sauv. 9.

Erioph. culmis teretibus, foliis planis, spiculis pendunculatis. Linn. sp. p. 52.

Linagrostis panicula ampliore. Tour. 664.

Gramen pratense junceum, nutante ampla sparsa & bombycina sericea panicula. Barr. Icon. 12.

HABITAT cum precedenti. Squamæ spicularum pelucidæ membranacæ.

NARDUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 57.

Char. sec. *Rad. fibrosa. Caul. culmosa solida foliosa articulata. Fol. linearis (graminea) simplex integerrima. Flor. spicata terminalis. Fulcr. nulla.*

Strilla. 1. **NAR.** spica secunda lineari recta, compacta.

Nar. spica setacea recta. Linn. sp. pl. p. 53.

Gramen

Gramen sparteum juncifolium. *Scheuchz. Agrof. pag. 90. tab. 11. fig. 10.* Icon optima.

Gramen loliaceum minimum, folio junceo, paniculâ unam partem spectante. *Tour. 517.*

HABITAT Monspelu in sterilibus, circa *Montferrier à gauche.*

HOSPITATUR in frigidario. Palmaris; glumæ calycina lanceolata, in setas desinentes, acuminata.

2. NAR. spica incurva æquali, calycina gluma exteriore aristato-acuminata longissima, floribus distantibus alternis. An nardus spica incurva? *Linn. sp. pl. 53. Sauv. p. 26. & 35.* *Incurva*

Gramen junceum nodosum minimum capillare. *Barr. Icon. 117. n^o. 1.*

Gramen exile arundinaceum minimum acumine reflexo. *B. Scheuchz. p. 41. tab. 1. fig. 7. litt. K.* Icon optima.

Le Nard.

Luxuriabat in aridis circa Caunelles, anno præterito, mixtam cum limonio foliis bullatis ipsam vidi bipedalem, fragilissimam, floribus culmo arcte adpressis.

PHALARIS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 59.*

Char. sec. Rad. bulbosa solida, vel fibrosa. Caul. culmosa simplex foliosa articulata. Fol. (graminea) subulata simplex integerrima. Flor. terminalis paniculata. Falc. nulla.

1. PHALARIS panicula subovata spiciformi glumis *Canariensis* carinatis. *Linn. sp. p. 54.*

Phal. radice annua. *Sauv. 37.*

Phal. major semine nigro & albo. *Bot. Monf. 202.*

Gramen spicatum semine miliaceo albo & nigro. *Tour. 518.*

2. Phal. radice perenni bulbosa. *Sauv. 37.*

Gramen phalaroides verius bulbosa radice. *Barr. Icon. 9. n^o. 2.*

La graine de Canari.

HABITAT Monspelii in maritimis.

2. PHAL. panicula cylindrica spiciformi. *Linn. sp. p. 55.* *Phleoides*
Gramen typhoides asperum primum. *Bot. Monf. 114.*

Gramen spicatum spica cylindracea tenuiori longa.
Tour. 520.

Gramen cum cauda muris minus. *J. Bauh. tom. 2.*
p. 471.

HABITAT Monspelii in segetibus; copiosam vidi à la
Garrigue du Terrail.

Descr. Altitudo sesquipedalis. Spiculæ alternæ, disti-
chæ, imbricatæ, culmo appressæ; panicula ad al-
terutrum latus flexa seu arcuata, in lobos dividitur
spiculas distinguentes.

Arundinacea 3. PHAL. panicula oblonga ramosissima ventricosa.
Linn. pag. 55.

Phal. panicula oblonga. *Sauv. pag.* 311.

Gramen aquaticum paniculatum latifolium. *Tour.* 523.
Bot. Monf. app. 397.

Gramen aquaticum phalaridis semine paniculatum.
Tour. 523.

4. Gramen paniculatum folio variegato. *Bot. Monf.* 113.
Tour. 523.

HABITAT Monspelii in humidis, à *Lattes.*

P A N I C U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 62.

Char. sec. Rad. farmentosa, perpendicularis, vel
horizontalis. Caul. culmosa radicans articulata.
Fol. (graminea) vaginans subulata simplex
integerrima. Flor. terminalis, spicata vel pani-
culata. Fulc. nulla.

* Spicata.

Italicum. 1. PAN. spica composita, spiculis glomeratis setis im-
mixtis, pedunculo hirsuto. *Linn. sp. pl. p.* 56.

Pan. italicum sive panicula majore. *Tour.* 515. & pa-
nicula minore. *Bot. Monf.* 197.

Pan. spica composita aristis gluma brevioribus. *Sauv.*
34.

Le Panis.

HABITAT Monspelii in urbis fossis, & circa Molen-
dinas.

Annuum. Altitudo bipedalis. Variat colore & magni-
tudine spicæ.

Ovis galli. 2. PAN. spicis alternis conjugatisque, spiculis subdivisis,
glumis aristatis. *Linn. sp. pl.* 56.

Pan. vulgare spica multiplici, longis aristis circumvallata. *Tour.* 515.

Gramen paniceum spica divisa, aristis longis armata. *Bot. Mons.* 116.

Gramen palustre arundinaceum milii panicula, semine phalaridis. *Barr. Icon.* 8.

HABITAT Monspelii ubique in satis. Variat aristis longissimis aut brevissimis.

3. PAN. spicis aggregatis, basi interiore nodosis, flosculis geminis muticis, vaginis foliorum punctatis. *Sanguinale.*
Linn. sp. p. 57.

Gramen dactylon folio latiore. *Bot. Mons.* 112. *Tour.* 520.

Ischæum vulgare. *Lob. Icon.* 24.

Panicum spicis alternis oppositis & linearibus patentissimis muticis, flosculis alternatim bnis, alt. rutro pedunculato. *Roy. Sauv.* 34.

HABITAT Monspelii passim.

* * *Paniculata.*

4. PAN. spicis digitatis patentibus: basi interiore villosis, floribus solitariis, sarmentis reptantibus. *Dactylon.*
Linn. sp. p. 58.

Gramen dactylon radice repente, sive Officinatum. *Tour.* 520.

Gramen legitimum Clusii. *Bot. Mons.* 111.

Ischæum foliis rigidis spicis glabris. *Sauv.* 34.

Gramen crucis, seu cruciatum tetradactylon. *Barr. Icon.* 753. n^o. 1.

Le Chiendent; Monspelii *lou Gramenas.*

HABITAT Monspelii; sponte provenit in hortis & incultis.

HOSPITATUR sub dio. Perenne.

5. PAN. panicula laxa flaccida foliorum vaginis pubescentibus. *Miliaceum;*
Linn. sp. p. 58. *Sauv.* 35.

Milium semine luteo & albo. *Bot. Mons.* 117. *Tour.* 514.

Le Millet, Monspelii *lou Pichot-mil.*

HABITAT Monspelii circa urbem.

HOSPITATUR sub dio. Annuum. Panicula valde nutans flaccida.

6. PAN. spiculis alternis solitariis muticis secundis linearibus. *Ægyptiacum.*

Gramen paniceum minimum humi-stratum, spica divisa mutica, foliis variegatis. *Sloan. jam. Raj. tom. 3. p. 600.*

HABITAT in Ægypto.

HOSPITATUR sub dio. Apricatur. Annuum (apud nos.) Cauliculi è geniculis radices agunt. Altitudo pedalis. Folia maculis nigris duabus tribusve supra nervum insignita.

PHLEUM.

Char. prim. Linn gen. pl. 60.

Char. sec. *Rad.* fibrosa vel bulbosa; bulbi alii aliis superimpositi. *caul.* culmosa articulata radicans. *Fol.* (graminea) supulata vaginans simplex integerrima. *Flor.* terminalis spicata. *Futur.* nulla.

Schærnoides. 1. PHLEUM spica cylindrica longissima. *Linn. sp. p. 59. Syst. nat. p. 871. Sauv. 34.*

Gramen spicatum spica cylindrica longissima. *Tour. 519. S.*

Gramen typhinum paniceum utriculatum, amplo utriculo. *Barr. icon. 28. n°. 2.*

HABITAT Monspelu. Frequens à *Selleneuve*. Altitudo fessupedalis.

2. PHLEUM spicis ovatis obvolutis, foliis brevissimis mucronatis amplexicaulibus. *Linn. sp. pl. p. 60. Syst. pag. 871.*

HABITAT Monspelii in humidis, *vers la source du Lès, Prades & Montferrier*. Vix palmare. Rami plurimi axillares, foliis duobus tribusve brevibus vestiti, articuloque uno aut altero articuli in totâ plantâ vix semipollicem distantes à se invicem.

Bulbosum. 3. PHLEUM spica ovato-oblonga, basi sterili, culmo sub-repente, radice bulbosâ. *Linn. Syst. nat. pag. 871. A.*

Phleum radice bulbosâ & nodosa. *Sauv. pag. 26. & 34.*

Gramen spicatum spica cylindracea brevi, radice nodosa. *Tour. 520.*

Gramen nodosum spica parva. *Bauh. Pin. 2. prodr.*
3. *Bot. Monf. 114.*

Gramen typhoides asperum alterum. *Scheuchz. agror.*
p. 63. *Bauh. theat. 52.*

HABITAT Monspelii, à Castelnau, & dans les fossés
autour de la Peissine.

A LOPECURUS. *Queue de Renard.*

Char. prim. Vid Linn. gen. plant. 61.

Char. sec. Rad fibrosa vel bulbosa. Caut. cul-
mosa articulata. Fol. (graminea) subulata va-
ginans simplex integerrima Flor. terminalis,
spicata vel paniculata. Ful. stipula in una spe-
cie ad oras vaginæ foliorum.

1. ALOP. culmo spicato erecto, radice bulbosa.

Bm'bo, us.

Gramen typhinum phalaroides, pilosa spica, aqua-
ticum bulbosum, *Barr. Icon. 699. n°. 1.*

Gramen typhinum &c. *Barr. Icon. 680. n°. 1. & 2.*

HABITAT Monspelii: frequens in pratis, vers la
Peissine, & à la descente de la Portaliere pour aller
à Sellenneuve, & dans les prés de Latres.

Descr. Culmus erectus glaber sesquipedalis teretius-
culus. Aristæ calycibus duplo longiores. Folia an-
gusta plana. Spica cylindrica. Radix constar bul-
bis 3-4 sibi invicem incumbenibus. Ex spicâ si-
milis alopecuro pratensi; ex radice phleum bulbo-
sum refert. Variat magnitudine culmi & crassitie
spicæ.

2. ALOP. panicula erecta ovata, glumis calicynis ova- *Aristatus.*
tis aristatis, oris vaginæ foliorum stipulatis.

Alop. altera paludosa anglica maxima seu gra-
men alopecuroïdes maximum. *J. B. Hist. Tom. 2.*
p. 474.

Gramen spicatum spica cylindrica molli & densa. *T.*
Sauv. append.

Alop. majus spica virescente divulsa, pilis longiori-
bus. *Barr. Icon. 115. n°. 2. Scheuchz. agr. p. 155.*

β. Gramen alopecurum minus spica virescente di-
vulsa. *Barr. icon. 115. n°. 1.*

Gramen alopecuros minus spica longiore. *Scheuch.*
pag. 154. corollis nigris.

Alop. Monspeliensis. *Linn. p. 61.*

HABITAT Monspeli, dans les fossés de la Ville, vers l'Hôpital général.

Descr. Altitudo bicubitalis. Culmus erectus pennæ anserinæ crassitiem adæquans. Folia longa glabra. Stipula lata membranacea rigida ad oras vaginæ foliorum. Panícula ovata erecta rufa tripollicaris, in medio ovi gallinacæ molem superans: calyces minimi femilineam longi ovati vix lineæ quartam partem lati. Aristæ infra apicem glumarum calycis, ipsis triplo longiores. Corollæ arista brevissima. Floret Junio & Julio.

Obs. Ipsum habui variantem in solo arido & macro, ita abnormem, ut degener videretur; vix palmaris; culmus crassitiem æquabat aciculæ. Panícula nutans, vix ovulo passeris major; sed adhibitâ attentione, nullam profus (exceptâ mole) inveni differentiam.

Pratensis. 3. ALOP. culmo spicato erecto. *Linn. sp. pl. 60. Sauv. 34. & 309. n.º. 6.*

Gramen spicatum spica cylindraccâ, longioribus villis donata. *Tour. 520.*

Gramen phalaroides majus sive italicum. *Bot. Monf. 115.*

β. Gramen spicatum spica cylindraccâ tenuissima longiore *Tour. 520.*

HABITAT Monspeli in pratis.

Geniculatus. 4. ALOP. culmo infracto spicato. *Linn. sp. pl. 60. Sauv. p. 309. n.º. 7. pag. 34.*

Gramen spicatum aquaticum spica cylindraccâ brevi. *Tour. 520.*

Gramen typhoides culmo reclinato. *B. pin. 4.*

HABITAT frequens Monspeli, in pratis laterensibus.

M I L I U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 63.*

Char. sec. Rad. fibrosa. Caul. culmosa articulata.

Fol. (graminea) subulata vaginans simplex integerrima. Flor. paniculata terminalis. Ful. nulla.

Paradoxum. 1. MIL. floribus paniculatis aristatis. *Linn. Syst. nat. p. 872.*

Agrostis (paradoxa) flosculis aristatis gemellis; altero sterili, terminalibus ternis. *Sauv.* 35. *Linn. sp. pl. pag.* 62.

HABITAT frequens in horti regii ambulacris. Altitudo cubitalis; glumæ glabræ; aristæ calycibus triplo longiores. Panicula laxa.

A G R O S T I S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 65.

Char. sec. Rad. fibrosa. Caul. culmosa articulata: Fol. (graminea) vaginans subulata simplex integerrima. Flôr. terminalis paniculata. Ful. nulla.

* *Aristatæ.*

1. AGR. calycibus inferne ventricosus, valvula exteriore acuminata longitudine aristæ. *Tab.* 1. *Ventricosus.*

HABITAT Monspelii, au Puy de St. Loup & à droite au-delà de Prades.

Descr. Radix fibrosa; culmus aciculæ majoris crassitiem adæquans, erectus, pedalis, vel paulo altior. Folia angusta subulata. Articuli vix pollicem distantes à se invicem excepto supremo qui pollices circiter tres à paniculâ distat. Panicula coarctata spicata virescens, vel argentea vel (matura) rufescens, sesquipollicem longa; calyces inferne ventricosi; valvula altera brevis, altera longior acuminata; arista longitudine valvulæ calycinæ longioris, terminans semen minimum, villosum, in infimâ calycis parte ventricosâ reconditum. In solis locis designatis occurrit.

2. AGR. panicula incrassata, petalo exteriore toto lanato, apice aristato, culmo ramoso. *Linn. Syst. nat. pag.* 872. *Tom.* 2. *Calamagrostis.*

Gramen arundinaceum, panicula densa, viridi-argentea, splendente, aristata. *Scheuchz. agr.* 146. *Tab.* 3. *fig.* 11. A, C. *It. Alp.* 1709.

HABITAT Monspelii; derriere le Mont St. Loup & à l'Espérou ubi altior. Facies avenæ flavescentis. Altitudo bipedalis. Icon *Scheuchz.* optima. Descriptio exactissima.

3. AGR. petalo exteriore, arista recta stricta longissima, panicula parula. *Linn. Syst. nat. pag.* 876. *sp. pl. pag.* 61. *Sauv.* 35. n°. 44. *Spicantia.* C iiij

Gramen capillatum paniculis viridantibus & rubentibus *B. hist. Tour. 514.* & segetum panicula arundinacea. *Tour. ibid.*

HABITAT Monspelii. Frequentior precedenti. Vidi in sterilibus, à Bouziques, à Balaruc; & etiam cum priori in iisdem locis.

Rubra. 4. AGR. paniculae parte florente patentissima, petalo exteriori glabro terminato arista tortili recurva. *Linn. Syst. nat. p. 876. sp. pl. p. 62.*

Panicum serotinum arvense spica pyramidata. *Tour. 515.*

HABITAT Monspelii cum prioribus, & à Lattes.

Canina. 5. AGR. calycibus coloratis, petalorum arista dorsali recurva. *Linn. sp. pl. 62. Syst. nat. p. 872.*

HABITAT Monspelii cum prioribus & à Caunettes, Gramont.

* *Muticæ.*

Solenifera. 6. AGR. panicula ramis divaricatis muticis, culmo repente, calycibus æqualibus, *Linn. sp. pl. pag. 62. Syst. nat. 872.*

AGR. culmo repente foliis radicalibus brevioribus, folii suprema vagina ventricosa, flosculis muticis. *R. Sauv. pag. 34.*

Gramen caninum supinum Monspelienfe. *Bot. Monsf. 123*

Gramen caninum supinum minus *Bauh. pin. 1. Theat. 13.*

HABITAT Monspelii, frequens à Gramont; le long du Lés. Art cui radices agunt.

Capillaris. 7. AGR. panicula capillari patente, calycibus subulatis æqualibus hispidiuseulis coloratis, flosculis muticis. *Linn. sp. p. 62. Syst. nat. p. 872. Sauv. 34.*

Gramen montanum panicula spadicea delicatior. *Tour. 514.*

HABITAT Monspelii, à Castelnau, le long du Lés, Gramont, Se'lencuve.

Minima. 8. AGR. panicula mutica filiformi. *Linn. sp. pl. pag. 63. Syst. nat. 872.*

Poa panicula lanceolata vix ramosa, floribus alternis antrosum versis. *Sauv. 37.*

Gramen minimum paniculis elegantissimis. *Bot. Monsf. 114.*

Gramen loliaceum minimum elegantissimum. *Tour.* 517.

HABITAT Monspeli, passim in vineis, arvis. Vix pollicaris vel bipollicaris, purpurascens.

A I R A. *Foin.*

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 68.

Char. sec. *Rad.* fibrosa. *Cau.* culmosa articulata *Fol.* (graminea) vaginans subulata simplex integerrima. *Flor.* terminalis spicata vel paniculata. *Ful.* nulla.

* *Aristata.*

1. AIRA foliis planis, panicula patente, petalis basi villosis & aristatis: arista recta brevi. *Linn. sp. p.* 64. *Syst. nat. p.* 873. *Sauv.* 36.

Cespitosa.

Gramen segetum panicula arundinacea. *B. pin. Tour.* 522.

Gramen miliaceum majus nutante panicula arundinaceum. *Barr. Icon.* 754.

HABITAT Monspeli in pratis. Arista longitudine glumarum vel brevior ad basim germinis.

2. AIRA foliis setaceis, panicula angustata, flosculis basipilosis aristatis: arista tortili longiore. *Linn. sp. pl. pag.* 65. *Syst. nat. p.* 873.

Montana.

Aira panicula rara calycibus fuscis. *L. Sauv.* 36.

Gramen avenaceum capillaceum minoribus glumis. *Tour.* 524.

Gramen avenaceum paniculatum, foliis capillaceis brevibus, locustis purpureo-argenteis splendentibus & aristatis. *Scheuchz. Tab. IV.* rota planta, & *tab. IV. fig.* 16. locustæ.

HABITAT Monspeli, luxuriat in sterilibus, à *St. George* & vicinis. *Au Puy de St. Loup, Rouquet.* Vidi quandoque prope *le Terrail*. Rami longiores quam in precedenti; item locustæ duplo majores. Arista calycibus longior.

3. AIRA foliis setaceis, summo paniculam inferne obvolvente. *Linn. sp. pl.* 65. *Sauv.*

Canescens.

Gramen loliaceum maritimum biunciale. *Tour.* 517.

Gramen sparteum variegatum.

Gramen foliis junceis radice jubata. *Bauh. pin.* 5.

HABITAT Monspeli, in lueo Gramuncio abundat. Altitudo semipedalis.

Caryophyll. 4. *AIRA* foliis setaceis, panicula divaricata, floribus distantibus, *Linn. sp. pl.* 66.

Aira foliis subulatis, aristis à basi flosculorum tortilibus, flosculo altero pedunculato. *Roy. Sauv.* 36.

Gramen paniculatum minimum molle. *Bot. Mons.* 296. *Tour.* 523.

Caryophyllus arvensis glaber minimus. *Bot. Mons.* 54.

Gramen phalaroides sparsa brisæ panicula minimum angustifolium. *Barr. Icon.* 44. n^o. 1.

HABITAT Monspelii cum præcedenti.

Flexuosa. 5. *AIRA* foliis setaceis, culm s subnudis, panicula divaricata, pedunculis flexuosis. *Linn. sp. pl.* 65. *Syst. nat.* p. 873.

Aira panicula rara calycibus albis. *Sauv.* 36.

Gramen avenaceum capillaceo folio, panicula ampliore, locustis splendentibus. *Tour.* 525.

HABITAT frequenter in pratis laterensibus; ipsam etiam vidi à *Montferrier*, sed rariorem.

* *Muticæ.*

Cristata. 6. *AIRA* panicula spicata, floribus muticis pedunculo longioribus, glumis acuminatis inæqualibus. *Linn. sp. pag.* 63. *Sauv.* 36.

Gramen spica cristata subhirsutum. *Tour.* 519.

HABITAT rarius cum prioribus. Ipsam habui sæpe, à *Cannelles & la Verune*.

Aquatica. 7. *AIRA* foliis planis, panicula patente, floribus muticis lævibus calyce longioribus. *Linn. sp. pl.* p. 64.

Aira culmo inferiore repente, flosculis muticis calyce longioribus lævibus. *Sauv.* 36.

HABITAT Monspelii in Ledo amne, en allant à *Mont-ferrier*; ipsam sæpius vidi à *Prades & à la Source du Lès*.

M E L I C A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 64.

Char. sec. *Rad.* fibrosa. *Caul.* culmosa articulata.

Fol. (graminea) vaginans subulata simplex integerrima. *Flor.* paniculata. *Ful.* stipulata.

utans. 1. *MEL.* petalis imberbibus, panicula nutante simplici

Linn. sp. pl. pag. 66. Sauv. 35. floribus pendulis.
Gramen montanum avenaceum locustis rubris. *Tour.*
524. *Bot. Monsf. 122.*

HABITAT Monspelii; frequens in horto regio.

HOSPITATUR in frigidario; stipula ad oras vaginæ
foliorum, sæpe lineas tres longa subulata colorata.

2. MEL. petalis exterioribus ciliatis. *Linn. sp. pl. pag. Ciliata.*
66. *Sauv. 35.*

Gramen montanum avenaceum lanuginosum. *Bot.*
Monsf. 122. Tour. 524.

3. Mel. spica erecta simplici, floribus alternis solitariis
pedunculatis.

Gramen montanum avenaceum lanuginosum, glu-
mis rarioribus. *Bot. Monsf. 122. Tour. 524.*

HABITAT ubique à la Verune, à Caunelles & in aliis
locis urbi vicinis.

Obs. Prima species variat itidem, culmo spicato,
pedunculis solitariis alternis.

P O A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 69.*

Char. sec. *Rad.* bulbosa vel fibrosa. *Caul.* cul-
mosa articulata. *Fol.* subulata (graminea) va-
ginans simplex integerrima. *Flor.* terminalis
paniculata. *Fulc.* nulla.

1. P O A panicula diffusa, spiculis 6floris linearibus. *Aquatica.*
Linn. sp. pl. 67.

Gramen majus aquaticum. *Lob. Icon. 4.*

Gramen majus aquaticum L. J. *Bauh. tom. 2. p. 481.*

HABITAT Monspelii au Verdanson, au Lés, à Gramont.

2. POA panicula diffusa, spiculis quinquefloris basi *Trivialis.*
pubescentibus, culmo erecto tereti. *Linn. sp. pl.*
p. 67. Sauv. 37.

Poa spiculis trifloris basi pubescentibus. *Linn. Syst.*
nat. p. 874. (trivialis)

Gramen pratense paniculatum medium. *Tour. 521.*

HABITAT in pratis; à Lattes, à Caunelles, aux prés
d'Arenes.

3. POA panicula diffusa, spiculis quadrifloris pubescen- *Angustifolia.*
tibus, culmo erecto tereti. *Linn. sp. pl. p. 67. Syst.*
nat. pag. 874.

Gramen pratense paniculatum majus, angustiore folio. *Tour.* 522.

HABITAT Monspelii cum priori, sed multo altior.

Pratensis. 4. POA panicula diffusa, spiculis quinquefloris glabris, culmo erecto tereti. *Linn. Syst. nat. pag.* 874.

Poa (pratensis) spiculis trifloris glabris. *Linn. sp. pl. pag.* 67. *Sauv. pag.* 36.

Gramen pratense vulgatius. *Bot. Monf.* 113.

Gramen pratense paniculatum majus, latiore folio. *Tour.* 521.

HABITAT ubique in pratis.

Annua. 5. POA panicula diffusa angulis rectis, spiculis obtusis, culmo obliquo compresso. *Linn. sp. pl. pag.* 68. *Sauv.* 36. & 37. n°. 58.

Gramen pratense paniculatum minus album, vel rubrum. *Tour.* 521. *Bot. Monf.* 113.

HABITAT Monspelii à Selleneuve, & aux prés d'Arènes.

Eragrostis. 6. POA panicula patente, pedicellis flexuosis, spiculis serratis decemfloris. *Linn. sp. pl. pag.* 68. *Syst. nat. pag.* 874.

Poa panicula ramosa spiculis multifloris. *Sauv.* 37. absque Synonymia.

Gramen paniculis elegantissimis minimum. *Tour.* 522.

Gramen Phalaroides sparsa buxæ panicula, minus. *Tour.* 522. *Barr. Icon.* 44. fig. 2.

HABITAT Monspelii ubique in satis, variat numerus flosculorum uti in congeneribus.

Compressa. 7. POA panicula coarctata secunda, culmo obliquo compresso. *Linn. sp. pag.* 69. *Sauv. p.* 311.

Gramen murorum radice repente B. *prod.* 2.

HABITAT Monspelii passim in viis & arvis.

Nemoralis. 8. POA panicula attenuata, spiculis sub-bifloris mucronatis scabris, culmo incurvo. *Linn. sp. pl. pag.* 69. *Syst. nat. p.* 874.

Gramen paniculatum angustifolium alpinum, &c. *Scheuchz. tab.* 2. Icon optima; tota planta.

p. Gramen cirrhoa & villosa spongia ad singula genicula donatum, paniculatum, minimum alpinum. *Bocc. mus.* 2. p. 70. *tab.* 59.

HABITAT Monspelii.

Hanc primò videram à Prades, & au Puy de Saint Loup; Æstate proxime elapsa Botanophili à monte

L'Esperou eandem inscii attulere pulchre ad nodum quemlibet villis rufescentibus implicatis revinctam. Scire cupiens undenam proveniret fasciculus ille, scalpello detexi nodos plures & vidi incisuram linearem ex internodii parte infima ad usque nodum seu articulum subjacentem productam; diductis incisuræ labiis in conspectum venit larva insecti mortua oblonga, mihi nondum visâ, crudelique fato in omnibus speciminibus quæ allata fuerant ne unam quidem vivam reperire datum est.

9. POA panicula secunda patentiuscula, spiculis quadri- *Bulbosa*
floris. *Linn. sp. pl. p. 70.*

Gramen paniculatum proliferum. *Tour. 523.*

Gramen arvense panicula crispa. *Bot. Monf. 113.*
Baub. prod. 6.

HABITAT Monspelii ubique.

Obs. Variat sæpissime numerus flosculorum in hocce genere. Species aliæ calycibus trifloris, quadrifloris, &c.

B R I Z A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 70.*

Char. sec. *Rad. fibrosa. Caul. culmosa articulata; Fol. (graminea) vaginans subulata simplex, integerrima. Flor. terminalis spicata vel paniculata. Ful. nulla.*

1. BRIZA spica nutante simplici, spiculis alternis pendunculatis subsolitariis ovaris, calycibus quinque- *Mohspestulana*
floris.

Gramen tremulum minus panicula magna. *Bot. Monf. 113.*

Gramen tremulum maximum. *Baub. prod. 5. Icon optima.*

Gramen paniculatum minus locustis magnis tremulis. *Tour. 523.*

Gramen phalaroides tremulum. *Barr. Icon. 23. n° 1. & 2. non male representat.*

HABITAT Monspelii in luco Gramuntio. Planta vix palmaris. Pedunculi vix pollicis quartam partem longitudine adæquant, alterni, raro bini, ad summum tres quatuor vel quinque in unico culmo. Calyces vero septemflori. Folium supremum sæpius

inferne involvens spicam; quandoque illam superans; spiculæ ovatæ nec compressæ ut in Briza: hanc cettè diversissimam credo à Brizâ maximâ Linn. sp. pag. 70. tum ratione magnitudinis proportionis & numero flosculorum in quolibet calyce.

Eragrostis. 2. BRIZA spiculis lanceolaris, flosculis viginti. Linn. sp. pl. p. 70.

Briza seu Gramen paniculis elegantissimis, sive eragrostis majus. Sauv. app. 310.

Gramen paniculosum phalaroides. Bot. Mons. 114.

Gramen paniculis elegantissimis sive eragrostis majus. Tour. 522.

HABITAT Monspelii ubique. Variat calycibus 7-10fioris, sed semper facile dignoscenda. Spica matura nigricat vel fufcescit.

Minor. 3. BRIZA spiculis triangularis, calyce flosculis (7) longiore. Linn. sp. p. 70. Sauv. 37.

Gramen tremulum minus, panicula parva. Bot. Mons. 114.

Gramen paniculatum minus, locustis parvis tremulis. Tour. 524.

HABITAT Monspelii in pratis; à Selleneuve, Cannelles; omnium rarior.

Media. 4. BRIZA spiculis ovatis, calyce flosculis (7) brevioris. Linn. sp. pag. 70. Sauv. 37.

Gramen paniculatum tremulum majus locustis candidibus. Tour. 523.

Gramen tremulum majus. Bot. Mons. 113.

Les Amourettes tremblantes; Monspelii les Amourettes.

HABITAT aux prés d'Arcnes; le long du Lés. Panicula ramulosa.

Maxima. 5. BRIZA spica nutante simplici, spiculis alternis subfoliariis, pedunculis simplicibus bifidisque, calycibus quindecimfloris.

Briza spiculis cordatis, flosculis septemdecim. Linn. sp. pl. 70. Syst. nat. p. 875.

Briza spiculis ovatis, flosculis septemdecim. Sauv. 37.

Gramen paniculatum locustis maximis tremulis candidibus. Tour. 523.

HABITAT Monspelii; à Gramont; le long du Lés.

Variat flosculis purpureis rufis, ferrugineis, quindecim-

cim, sexdecim, septemdecim & viginti. Pedunculi alterni sæpissimè solitarii semper ferè simplicissimi; raro bifidi; unde potius spicæ nomen meretur quàm paniculæ.

DACTYLIS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 67.

Char. sec. Rad. fibrosa. Caul. culmosa articulata. Fol. (graminea) subulata vaginans, simplex integerrima. Flor. paniculato-glomerata, terminalis. Fulcr. nulla.

1. DAC. vagina foliorum ancipiti.

Glomeratus.

Dac. panicula secunda glomerata. Linn. sp. pl. 71.

Cynosurus panicula secunda glomerata. L. Sauv. app. 310.

Gramen paniculatum spicis crassioribus & brevioribus. Tour. 521.

Gramen spicatum folio aspero. Bot. Mons. 114.

Gramen spicatum folio aspero, spica grumosa longa vel brevior. Barr. Icon. 26. n°. 1. & 2.

HABITAT Monspelii ubique.

CYNOSURUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 72.

Char. sec. Rad. fibrosa. Caul. culmosa articulata. Fol. (graminea) vaginans, subulata, simplex integerrima. Flor. terminalis spicata vel paniculata. Fulcr. bractææ integræ vel incisæ.

1. CYN. bractæis pinnatifidis. Linn. sp. pl. pag. 72. *Cristatus.* Sauv. 37.

Gramen pratense cristatum, seu spica cristata laevi. Bot. Mons. 114.

Gramen spicatum glumis cristatis. Tour. 519.

HABITAT Monspelii; à Gramont; spicula oblonga cylindrica; bractææ flosculis majores. Altitudo bipedalis.

2. CYN. bractæis pinnato-paleaceis aristatis. Linn. sp. pl. *Echinatus.* pag. 72. Sauv. 38.

Gramen alopecuroides spica aspera. Bot. Mons. 116.

Gramen spicatum echinatum locustis unam partem spectantibus. Tour. 519.

- HABITAT Monspeli; *derriere Boutonnet, près de l'Aire qui est à gauche.* Spica secunda glomerata.
- Indicus.* 3. CYN. spicis digitatis linearibus, floribus ovato-lanceolatis. *Linn. sp. pl. pag. 72.*
Gramen dactylon Americanum. Minus. *Scheuch. p. 107.*
HABITAT in Indis. Involucra integerrima. Spicæ secundæ. Calyces sub-quadriflori alterni imbricati. Spicæ maturæ introitum convolvuntur.
- Panicum.* 4. CYN. Panicula subspicata, flosculis simplicibus biaristatis. *Linn. sp. pl. pag. 73.*
Gramen panicum spica aspera. *Bot. Monf. 116.*
Panicum vulgare simpliciter, spica aspera. *Tour. 515.*
Panicum vulgare spica composita, aristis spica longioribus. *Savv. 34.*
La Paniff, Monspeli; lous Rats.
HABITAT Monspeli; ubique. Viret in hortis & agris.

FESTUCA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 74.*

Char. sec. Rad. fibrosa. Caul. culmosa articulata.
Fol. (graminea) subulata vaginans simplex integerrima. Flor. terminalis paniculata, paniculæ æquali vel secunda, nutante vel erecta. Ful. nulla.

* Panicula secunda.

- Ciliata.* 1. FEST. foliis & valvulâ corollarum interiore ciliatis, spiculis alternis solitariis sessilibus, panicula stricta simplici secunda.
Gramen festuceum myurum elatius, spica heteromalla gracili. *Barr. Icon. 99. f. 2. Scheuch. Gram. 295.* idem nomen.
Fest. (incrassata) *Linn. sp. pl. pag. 75.* an Bromus (ciliatus) *Linn. sp. pag. 76?* vel potius, Bromus distachyos *Cent. 11^a.*
HABITAT Monspeli; *vers la Peissine; in fossis; & autour de la Ville.*
Obs. Icon Barrelieri nullo modo repræsentat Gramen istud. Descriptio Scheuchzeriana optima; Icon bona; folia ciliata pilis rigidis; quandoque superficies foliorum itidem pilosa. Summo culmo insident. Spiculæ sessiles, alternæ, solitariae compressæ, glabræ 7-8floræ; glumæ externæ omnes (corollarum) terminatæ

terminatæ arista longissima; glumæ interiores obtusæ ciliatæ.

Apud nos raro datur culmo ramoso seu paniculato; denominatio Linnæana festucæ incrassatæ non convenit huic graminī, etenim pedunculi nulli & spicæ sessiles.

Denominatio 2^a. (*Bromus ciliatus*) potius conveniret, sed remanet difficultas altera; nam aristæ corollarum terminant valvulas, non autem infra apices earum, ergo nec *Bromus ciliatus*.

2. FEST. panicula secunda coarctata aristata, culmo tetragono nudiusculo foliis setaceis. *Linn. sp. pl.* 73. *Ovina*
Gramen loliaceum minus capillaceo folio, spica Brizæ longissima. *Tour.* 517.

HABITAT Monspelii, frequens à la Colombiere, la Valette.

3. FEST. panicula secunda, scabra, spiculis 6floris, flosculo ultimo mutico, culmo semitereti. *Linn. sp. pl. pag.* 74. *Rubra*

HABITAT Monspelii in satis. Altitudo bipedalis.

4. FEST. paniculâ spicatâ nutante, calycibus minutissimis muticis, floribus scabris. *Linn. sp. pl. p.* 74. *Myuros*
Gramen festuceum myurum, minori spica heteromalla. *Scheuch. pag.* 294. *tab. VI. fig.* 12.

HABITAT Monspelii; à gauche de Boutonnet, in rupibus, cum valantiâ murali.

5. FEST. paniculâ secundâ, spiculis erectis, calycis altera valvula acuminata, altera integra. *Linn. sp. pl. p.* 75. *Bromoides*
Gramen paniculatum bromoides minus, paniculis unam partem spectantibus. *Scheuch. gram.* 297. *tab. VI. fig.* 14. *Tour.* 514.

HABITAT cum præcedenti. Multum affines.

* *Panicula æquali.*

6. FEST. paniculâ ramosâ erectâ, spiculis subsessilibus teretibus muticis. *Linn. sp. pl. pag.* 75. *Fluitans*
Gramen aquaticum fluitans multiplici spica. *Bot. Monf.* 119.

Gramen paniculatum aquaticum fluitans, *Tour.* 521.

Gramen aquaticum miliaceum semine rufo. *Barr. Icon.* 7.

HABITAT Monspelii in aquis. Dans le Verdanson, aux prés de Latres & d'Arcne.

B R O M U S.

Char. prim. Vid Linn. gen. pl. 73.

Char. sec. Rad. fibrosa. Caul. culmosa articulata. Fol. (graminea) vaginans subulata simplex integerrima. Flor. spicata vel paniculata. Fulc. nulla.

Secalinus. 1. BROM. panicula patente erecta, spiculis ovatis : aristis rectis. Linn. sp. pag. 76.

Festuca culmo paniculato, spicis compresso ovatis. Sauv. 38.

Festuca graminea glumis glabris. Bauh. pin. 9. Scheuch. gram. pag. 251. tab. V. fig. 10.

Gramen Gros Montbelgard. Bot. Monsf. 121.

Gramen avenaceum locustis glabris purpurascens & aristatis. Tour. 525.

2. Gramen ad gramen du Gros accedens. Bot. Monsf. 121.

Gramen avenaceum locustis villosis crassioribus. Tour. 526.

Festuca graminea glumis hirsutis. Scheuch. gram. 250. tab. V. fig. 9.

HABITAT Monspelii ubique. A. in urbis fossis copiose reperitur prope hortum regium. Variat spiculis glabris hirsutis; culmo spicato indiviso palmari, spiculis alternis sessilibus.

Squarrosus. 1. BROM. panicula patula nutante, spicis ovatis, aristis divaricatis. Linn. sp. pl. p. 76.

Brom. seu festuca graminea glumis vacuis. Sauv. 38.

Bauh. pin. 9. prodr. 19. n°. 64. Bot. Monsf. 121.

Gramen avenaceum locustis amplioribus glabris candidantibus aristatis. Tour. 525.

Gramen phalaroides acerosum, erecta parva panicula. Barr. Icon. 9. n°. 1.

HABITAT Monspelii à Castelnau près de la métairie de Mr. Viala & à Gramont. Variat ut prior spiculis alternis, &c. ad summum 4. in uno culmo.

Sterilis. 3. BROM. panicula patula, spiculis oblongis distichis, glumis subulato-aristatis. Linn. sp. pl. pag. 77.

Brom. culmo paniculato, spicis compressis. Sauv. 38.

Gramen avenaceum panicula sparsa, locustis majoribus aristatis. Tour. 526.

HABITAT Monspelii ubique.

4. BROM. panicula nutante, spiculis ovato-oblongis. *Linn. Arvensis.*
sp. pl. pag. 77.
 Brom. panicula diffusa spiculis teretibus. *Sauv. 38.*
 Festuca graminea nemoralis latifolia mollis. *B. pin. 10.*
 Gramen pratense paniculatum altissimum. *Tour. 524.*
 HABITAT Monspelii passim in arvis.
5. BROM. panicula nutante, spiculis linearibus. *Linn. Tegetum.*
sp. pl. pag. 77.
 Festuca graminea hirsutis brizæ glumis compactior.
Barr. Icon. 83. n°. 1. & glumis non hirsutis. Barr.
Icon. 73. n°. 1.
 Gramini murali Dalechampii simile si non idem. *J.*
Baub. 2. p. 438.
 HABITAT ubique Monspelii.
6. BROM. spica stricta disticha, spiculis alternis solitariis *Pinnatis.*
 sessilibus decemfloris oblongis, corollis subaristatis.
 Brom. culmo indiviso, spiculis alternis subsessilibus teretibus. *Linn. sp. pl. p. 78.*
 Festuca culmo alternatim spicato, spicis teretibus.
Sauv. 38. & 39. n°. 85.
 Gramen spica Brizæ majus. *Bot. Mons. 121, &*
minus. Ibid.
 Gramen loliaceum altissimum, spica brizæ prælonga,
 aristis brevibus donatum. *Tour. 517.*
 Gramen sparteum spicata brizæ panicula, corniculatum. *Barr. Icon. 25. Bona.*
 HABITAT Monspelii ubique; variat altitudine pedali
 & bipedali; calycibus vel decem vel 15 floribus;
 glumis arista brevissima donatis vel muticis.

S T I P A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.*

Char. sec. *Rad.* fibrosa. *Caul.* culmosa articulata. *Fol.* (graminea) subulata vaginans simplex integerrima. *Flor.* terminalis paniculata. *Ful.* nulla.

1. STIPA aristis lanatis. *Linn. sp. pl. pag. 78.* *Pinnatis.*
 Festuca aristis paniculæ circiter longitudine plumosis
R. Sauv. 38.
 Gramen sparteum pennatum majus. *Barr. Icon. 46.*
Bona.

Gramen spicatum aristis pennatis. *Bot. Monsf.* 119.
Tour. 518. *Scheuch.* tab. 3. fig. 13.

HABITAT Monspelii, versus *Menferrier à droite & aux environs.* Au Puy de Saint Loup. A Valene, à l'Esperou & a la mer vers Cette.

Juncea. 2. STIPA aristis nudis, calycibus semine longioribus
Linn. sp. pag. 78.

Festuca aristis nudis. *Roy. Lugd.* 68.

Gramen sive festuca junceo folio longissimis aristis.
Bot. Monsf. 122. *Scheuch.* 151. tab. III. fig. 13. A.

HABITAT Monspelii cum priori à l'Esperou & au Puy de Saint Loup.

A V E N A.

Char. prim. Vid. *Linn gen. pl.* 75.

Char. sec. Rad. bulbosa vel fibrosa. Caul. culmosa articulata. Fol. (graminea) vaginans subulata simplex integerrima. Flor. spicata vel paniculata terminalis. Falc. nulla.

Obs. In hoc genere occurrunt species polygamæ.

Bromoides. 1. AV. panicula subspicata stricta spiculis binatis, altera pedunculata, altera sessili; aristis divaricatis; calycibus octofloris.

Gramen alpinum avenaceum glabrum angustifolium locustis aristatis in spicam dispositus. *Scheuch. gram. pag.* 218. tab. IV. fig. 21. & 22. icon & descriptio exactæ.

HABITAT Monspelii ultra pontem Sallenovæ ad dexteram, mixta cum junco lithospermi semine, cum limonio bulbatis foliis, & in locis vicinis; *Journignac & Caunelles.*

Descr. Altitudo bipedalis. Culmus teres vix aciculæ crassitiem adæquans. Spiculæ teretes sæpius binaræ (altera sessili, altera pedunculata) erectæ, albicantes, veluti argenteæ, quandoque etiam solitariae, alternæ, sessiles vel pedunculatæ. Calyces 4. 5. 6. 7. sæpius octoflori; aristæ è medio dorso tortiles, divaricatæ: facies bromi squarrosi.

Miror unde nullus Botanicus hanc in agro Monspelulano detexerit.

2. AV. calycibus dispermis, seminibus levibus. *Linn. sp. pl. pag.* 79. *Sauv.* 38.

AV. nigra & alba. *Tour.* 514. *Bor. Monf.* 35.

L'Avoine, *Monspeli Civada*, *civade*.

HABITAT in arvis.

3. AV. calycibus bifloris, flosculo hermaphrodito mu- *Elatior.*
tico, masculo aristato. *Linn. sp. pag.* 79.

AV. panicula nutante, calycibus bifloris: altero aristato. *R. Sauv.* 38.

- β. Gramen nodosum avenacea panicula, radice tuberibus prædita. *Tour.* 525.

Gramen bulbosum nodosum. *Lob. Icon.* 23.

HABITAT Monspeli passim in arvis, vineis. Variat flosculis duobus aristatis; arista flosculi hermaphroditi brevissima infra apicem glumæ ut in bromis. Arista flosculi masculi, multo longior, ad basim fere dorſi; variat etiam aristis æqualibus.

4. AV. panicula patente, calycibus trifloris, flosculis basi pilosis. *Linn. sp. pl. pag.* 80. *Fatua.*

AV. seminibus basi hirsutis. *L. Sauv.* 38.

Gramen sive festuca dumetorum, utriculis lanugine flavescentibus. *Bor. Monf.* 121.

Gramen avenaceum locustis lanugine flavescentibus. *Barr. Icon.* 75. n°. 2. *Tour.* 525.

Monspeli Civade Conguante.

HABITAT ubique in satis. Panicula (matura) valde nutans. Aristæ ad basim aciculæ majoris crassitiem æquant.

5. AV. panicula laxa, calycibus trifloris brevibus, flosculis omnibus aristatis. *Linn. sp. pl. pag.* 80. *Flavescent.*

Gramen avenaceum pratense elatius, panicula flavescente, locustis parvis. *Tour.* 525.

HABITAT Monspeli. Vulgatissima à la Verune, à Bione-la-Mouſon.

Panicula densissima; spiculæ vix æquant molem spicularum poæ pratensis.

6. AV. spicata, flosculis subquaternis calyce longioribus. *Linn. sp. pag.* 80. *Fragilis.*

Gramen loliaceum spurium hirsutum; aristis geniculatis. *Barr. icon.* 905. fig. 1. 2. 3.

HABITAT Monspeli. Frequens cum avena Bromod. n°. 1. à Cannelles après Selleneuve.

7. AV. calycibus quinquefloris, panicula spicata. *Linn. sp. pl. pag.* 80. *Pratensis.*

Gramen avenaceum montanum, spica simplici, aristis recurvis. *Tour.* 525.

β. Gramen avenaceum glabrum panicula purpureo-argentea splendente. *Tour.* 525.

HABITAT Monspelii. Ipsam vidi pulchrè pictam in pratis: *au-delà de Montferrier, vers la source du Lés.* Rara in pratulis *au-delà de Caunilles.* Variat calycibus trifloris & 7floris, argenteis nec variegatis. Culmo iudem spicato nec paniculato.

L A G U R U S.

Char. prim. vid. Linn. gen. pl. 66.

Char. sec. *Rad.* fibrosa. *Caul.* culmosa articulata. *Fol.* (graminea) vaginans subulata simplex integerrima. *Flor.* glomerata terminalis. *Fulc.* nulla.

OVATUS. 1. LAG. spica ovata. *Linn. sp. pl. pag.* 81. *Sauv.* 38. Gramen alopecuroïdes spicâ rotundiore. *Bot. Mons.* 115.

Gramen spicatum tomentosum longissimis aristis donatum. *Tour.* 517.

Gramen alopecuroïdes molle spica incana acuta minus & obtusa majus. *Barr. icon.* 116. n^o. 1. & 2.

Monspelii & Cetiis, *Coïseta de lapin.*

HABITAT Monspelii in toto tractu maritimo, & ad stagnorum ripas. Spica incana, mollis, folia lanugine quâdam obsita, flexilia; floret Augusto.

A R U N D O.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 76.

Char. sec. *Rad.* horizontalis articulata bulbosa solida nodosa. *Caul.* culmosa articulata fistulosa. *Fol.* graminea vaginans subulata simplex integerrima. *Flor.* paniculata terminalis. *Fulc.* nulla.

DONAX. 1. AR. calycibus trifloris panicula diffusa. *Linn. sp. pl. pag.* 81. *Sauv.* 38.

Ar. sativa quæ donax Dioscoridis. *Bot. Mons.* 29. *Tour.* 526.

Le Roseau. Monspelii *la Cana*, cane.

HABITAT ubique in hortis, ad margines agrorum.

2. AR. calycibus quinquefloris, panicula laxa. *Linn. Phragmites*.
sp. pl. pag. 81.

AR. vulgaris seu phragmites. *Bot. Monsf. 29, Tour. 526.*

HABITAT Montspeli in pratis laterensibus ubi floret
in fine Septembris. Variat calycibus 2floris, triflo-
ris vel quinquefloris.

3. AR. calycibus unifloris, culmo ramoso. *Linn. sp. pl. Calam agrosti*
pag. 82. Sauv. 38.

Gramen plumosum Vulgi. *Lob. icon. 6.*

Gramen arundinaceum, panicula molli spadicea,
Tour. 523.

Gramen sparteum bromoides panicula spicata ma-
joribus utriculis. *Barr. icon. 18. fig. 1.*

HABITAT cum prioribus.

4. AR. calycibus unifloris, foliis involutis mucronato-
pungentibus. *Linn. 82. Arctaria.*

Gramen foliis junceis convolutis ac pungentibus. *Bot.*
Monsf. 120.

Gramen sparteum spicatum, foliis mucronatis lon-
gioribus. *Bot. Monsf. 119.*

Gramen secalinum, spicatum, maritimum, maxi-
mum spica longiore. *Tour. 518.*

Gramen loliaceum maritimum foliis pungentibus.
Tour. 516.

HABITAT Montspeli ad stagna.

L O L I U M:

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 77.*

Char. sec. *Rad. fibrosa. Caul. culmosa articulata.*

Fol. (graminea) vaginans. subulata simplex
integerrima. Fior. spicata terminalis. Fulc. brac-
tea monophylla ad basim spicularum.

1. LOL, spica mutica. *Linn. sp. pl. pag. 83.*

Gramen loliaceum angustiore folio & spica, seu phœ-
nix Dioscoridis. *Bot. Monsf. 120. Tour. 516.*

Fausse Ivraye. Montspeli lou Margat.

HABITAT ubique.

2. LOL. spica aristata. *Linn. sp. pl. pag. 83.*

Gramen loliaceum spica longiore seu lolium Diosco-
ridis. *Bot. Monsf. 120.*

Parennæ.

Templemont.

Gramen loliaceum spica longiore aristas habens.
Tour. 516.

L'Ivraye. Monspeli, *leu Giol.*

HABITAT ubique. Calix sæpius quadriflorus, corollis fere longior & latior. Flosculus ultimus sæpe abortiens marcescens.

E L Y M U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 1075.

Char. sec. *Rad.* horizontalis fibrosa. *Caul.* culmosa articulata. *Fol.* (graminea) subulata vaginans simplex integerrima. *Flor.* spicata. *Futc.* bractea duplex.

- Arenarius.* 1. ELY. foliis mucronato-pungentibus. *Linn. sp. pl.* p. 83.
Triticum foliis acuminato-pungentibus. *Sauv.* 39.
Secale spiculis geminatis. *Sauv.* 311.
Gramen loliaceum radice repente maritimum. *Tour.* 516.
Elymus spica erecta, arcta, calycibus tomentosis, flosculis longioribus. *Linn. Syst. nat.* pag. 879.
HABITAT Monspeli ad mare.

S E C A L E.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 79.

Char. sec. *Rad.* horizontalis fibrosa. *Caul.* culmosa articulata. *Fol.* (graminea) vaginans subulata simplex integerrima. *Flor.* spicata terminalis. *Futc.* bractea duplex.

- Cereale.* 1. SEC. glumarum ciliis scabris. *Linn. sp. pl.* 84.
Secale hybernum majus & vernum minus. *Tour.* 515.
Bot. Monf. 235.
Le Seigle, Monspeli *la Seta.*
HABITAT ubique.
- Villosum.* 2. SEC. glumarum ciliis villosis, squamis calycinis cuneiformibus. *Linn. sp.* pag. 84.
Gramen spicatum secalinum, glumis villosis in aristas terminatis. *Tour.* 518.
HABITAT Monspeli, *aux Mateles,* & à l'entrée du bois de Valene pres de Rouquet; sed frequentissimum aux bains de Lamatou pres de Beziers.

TRITICUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 78.

Char. sec. Rad. fibrosa. Caul. culmosa articulata.

Fol. (graminea) vaginans subulata simplex integerrima. Flor. spicata terminalis. Fulc. nulla.

* *Annua.*

1. TRIT. glumis ventricosus glabris imbricatis aristatis. *Linn. sp. p. 85.* *Æstivum.*

Trit. radice annua spica glabra aristata. *Sauv. 39.*

Trit. aristis circumvallatum. *Tour. 512.*

HABITAT Monspelii.

2. TRIT. glumis ventricosus lævibus imbricatis submuticis. *Linn. sp. pag. 86.* *Hybernum.*

Trit. radice annua spica mutica. *Sauv. 39.*

Trit. hybernum aristis carens. *Bot. Monf. 271. Tour. 512.*

Monspelii la Touzella ou Rascalade.

3. TRIT. calycibus truncatis quadrifloris, flosculis aristatis hermaphroditis, intermedio neutro. *Linn. pag. 86.* *Spelta.*

Hordeum flosculis lateralibus muticis involucri defuturis. *Sauv. 39.*

Fausse Epautre.

HABITAT à Alais, Castres.

4. TRIT. involucriis unifloris, floribus aristatis, spica disticha. *Linn. sp. 86. Sauv. 39.* *Monococcum.*

Zea briza dicta seu monococcus germanica. *Bot. Monf. 282.*

Hordeum distichum seu briza. *Tour. 513.*

L'Epautre. Monspelii la Spouta.

HABITAT Monspelii.

* *Perennia.*

5. TRIT. calycibus subulatis trifloris acuminatis. *Linn. sp. pag. 86.* *Repens.*

Trit. radice repente, foliis viridibus. *Sauv. 39.*

Gramen loliaceum radice repente seu gramen Officinarum. *Tour. 516.*

6. Gramen laifolium & angustifolium spica triticea compacta. *Bauh. pin. 8. Prod. 13.*

Le Chundent; Monspelii ou Gramenas.

- Caninum.* 6. TRIT. calycibus subularis æqualibus quadrifloris, aristatis. *Linn. sp. pag. 86.*

Gramen loliaceum radice repente, seu gramen officinarum longioribus aristis donatum. *Tour. 516.*

HABITAT frequens in maritimis.

Obs. Variat in istis generibus numerus flosculorum, in quolibet calyce; idem evenit in poâ, briza.

H O R D E U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 80.*

Char. sec. *Rad.* fibrosa. *Caul.* culmosa articulata. *Fol.* (graminea) vaginans subulata simplex integerrima. *Flor.* spicata terminalis. *Falc.* bractea 6phylla.

- Vulgare.* 1. HOR. flosculis omnibus hermaphroditis aristatis, ordinibus duobus erectioribus. *Linn. sp. pag. 84.*

Hor. polystichon vernum. *Tour. 513.*

L'Orge. Monspelii *l'Ordi.*

HABITAT in arvis.

- Distichon.* 2. HOR. flosculis lateralibus masculis muticis, seminibus angularibus patentibus corticatis. *Linn. sp. p. 85.*

Hor. distichon, quod spica binos habeat ordines. *Tour. 513.*

Monspelii *la Paoumoule.*

HABITAT in arvis.

- Murinum.* 3. HOR. flosculis lateralibus masculis aristatis. *Linn. sp. pag. 85.*

Gramen hordaceum minus & vulgare. *Bot. Mons. 121.*

Gramen vulgare spicatum secalinum *Tour. 517.*

HABITAT Monspelii ubique in arvis & sepibus.

T R I G Y N I A.

P O L Y C A R P O N.

Char. prim. Vid. *Linn. Syst. pl. p. 881.*

Char. sec. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea, ramosa.

Fol. verticillata sessilis simplex integerrima.

Flor. terminalis paniculata dichotoma. *Falc.* stipula opposita bina interjecta pedicellis.

- Tetraphyllum.* 1. POL. foliis quaternis ovatis, panicula dichotoma. *Linn. Syst. nat. tom. 2. pag. 881.*

TRIANDRIA TRIGYNIA. -39

Mollugo tetraphylla. *Linn. sp. pl. pag. 89. Sauv. 164.*

Anthyllis marina incana alpinefolia Narbonensium.

Bot. Monf. 22. Lob. icon. 468.

Herniaria alpines folio. *Tour. 507.*

HABITAT ubique Monspeli. Caulis glaber viridis vix semipalmarem excedens altitudinem.

B U F O N I A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 1034.*

Char. sec. *Rad. tenuis simplex. Caul. herbacea teres articulata ramosa. Fol. opposita (graminea) subulata simplex integerrima subconnata. Flor. axillaris solitaria pedunculata. Fulc. nulla.*

1. BUF. *Sauv. 141. Linn. sp. 123.*

Trouisolia.

Herniaria angustissimo & gramineo folio. *Hort. Monf. 97. tab. 97.*

Polygonum angustissimo & gramineo folio. *Bot. Monf. 211.*

Alchimilla gramineo folio flore minore. *Tour. 508. La Buffon.*

HABITAT à Castelnau, Boutonet, Camelles, & in faxosis circa Montferrier. Foliola calycis margine membranacea, folia inferiora internodiis æqualia vel longiora, basi connata subvaginantia. Variat staminibus duobus, tribus, vel etiam pistillis binis tribusve.



Classis IV.

TETRANDRIA
MONOGYNIA.

GLOBULARIA.

Charaeter primarius. Vide Linnæi genera plantarum 88.

Char. sec. *Rad.* simplex, tenuis vel ramosa. *Caul.* herbacea vel fruticosa, simplex vel ramosa. *Fol.* alterna sessilis integra. *Flor.* capitata terminalis. *Fulcr.* nulla.

- Alypum.* 1. GLOB. caule fruticoso foliis lanceolatis tridentatis integrisque. *Linn. sp. pl. pag. 95.*
Globularia fruticosa myrtifolio tridentato. *Tour.* 467.

Alypum montis Ceti Bot. Monsf. 8.

Thymelæa foliis acutis capitulo succisæ. Bot. Monsf. 253.

HABITAT Monspelii in monte Ceti.

- Vulgaris.* 2. GLOB. caule herbaceo, foliis radicalibus dentatis, caulinis lanceolatis. *Linn. sp. pl. pag. 96.*
Globularia vulgaris. *Tour.* 467.
Bellis carulea caule folioso. *Bot. Monsf. 37.*
La Globulaire.

HABITAT Monspelii, à Castelnau & in pinetis, à la Valette & au Martinet de Mr. Boulet.

DIPSACUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 89.

Char. sec. *Rad.* fusiformis. *Caul.* angulata ramosa. *Fol.* opposita connata simplex, integra vel incisa. *Flor.* capitata terminalis. *Fule.* aculei caulini, & epiphylli.

- Fullenium.* 1. DIP. foliis sessilibus serratis, *Linn. sp. pl. pag. 97.*
Dipsacus foliis connato-persolatus, aristis fructus rectis. *Sam. v. 156.*

TETRANDRIA MONOGYNIA. 61

Dipsacus sylvestris sive *labrum veneris*. *Bot. Monf.* 86.

Dipsacus sylvestris aut *virga pastoris major*. *Tour.* 466.

1. *Dipsacus aristis fructus hamatis*. *Sauv.* 156.

Dipsacus sativus. *Tour.* 466.

Le Chardon à bonnetier, ou Chardon à foulon.

HABITAT *Monspelli*, frequens *au Verdanson*; à *Lavanet*. Foliola perianthii communis, capitulis duplo longiora, aculeata. 2. Foliola capitulis breviora subinermia.

2. DIP. foliis connatis sinuatis. *Linn. sp. pl. pag. 97.* *Laciniat.*

Dipsacus folio laciniato. *Tour.* 466.

Le Chardon à bonnetier, à feuilles découpées.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo humana; laciniae foliorum laterales obtusae dentatae, terminales acuminatae.

SCABIOSA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 90.*

Char. sec. Rad. fibrosa vel ramosa. Caul. herbaea vel subfruticosa, simplex ramosa, dichotoma (in una specie) Fol. opposita, inferior petiolata, superior sessilis amplexicaulis, nunc simplex integerrima, integra incisa, nunc impari pinnata. Flor. terminalis aggregata capitata. Fulc. saepius nulla; aculei in una specie ad apicem denticulorum calycis.

* *Corollulis 4fidis.*

1. SCABIOSA corollulis quadrifidis aequalibus, floribus cernuis, foliis pinnatis, foliolis serratis lanceolatis *Linn. sp. pl. pag. 98.* *Alpina.*

Scabiosa alpina foliis centaurei majoris. *Tour.* 464.

Scabiosa alpina maxima. *Lob. Ic.* 537.

HOSPITATUR sub dio. Perennis, valde hirsuta. Folia pinnata ex foliis subaequalibus serratis acuminatis, quorum superiora seu terminalia ad basin coadununtur. Squamae calycinae acuminatae extus villosae.

2. SCAB. corollulis quadrifidis aequalibus, squamis calycinis ovatis obtusis. *Linn. sp. pl. 98.* *Lanceolata.* Foliis pinnatifidis, *Sauv.* 241.

62 TETRANDRIA MONOGYNIA.

- Scabiosa montana calidarum regionum. *Bot. Monf.* 231. *Lob. Ic.* 538.
 Scabiosa flore globoso niveo. *Tour.* 464. & fruticans angustifolia alba *ibid.*
 HABITAT Monspeli ubique in sterilibus & saxosis, à Castelnau, Selleneuve, &c.
- Succisa.* 3. SCAB. corollulis quadrifidis æqualibus, caule simplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis. *Linn. sp. pl. pag.* 98.
 Scabiosa folio integro hirsuto. *Tour.* 466. & glabro *ibid.* Succisa seu morsus diaboli. *Bot. Monf.* 247.
 HABITAT Monspeli in pratis laterculis à Selleneuve, à Montferrier. Variat corollis quinquefidis, foliis glabris denticulatis acuminatis.
- Syracca.* 4. SCAB. corollulis quadrifidis æqualibus, calycibus aristatis caule dichotomo, foliis lanceolatis. *Linn. sp. pl.* 98.
 Scabiosa fruticans latifolia alba. *Tour.* 464.
 HOSPITATUR sub dio; folia serrata. Caulis inferne glaber, superne aculeis brevibus.
- integrifolia.* 5. SCAB. corollulis quadrifidis, foliis omnibus lanceolatis serratis. *Linn. sp. pl.* 99. *Sauv.* 156.
 Scabiosa annua integrifolia seu folio bellidis. *Bot. Monf.* 231. *Tour.* 465.
 HABITAT Monspeli; le long du Lès à Castelnau, à Montferrier, à la Colombière.
- Arvensis.* 6. SCAB. corollulis quadrifidis radiantibus, caule hispido. *Linn. sp. pl. p.* 99.
 Scabiosa major hirsuta folio laciniato. *Bot. Monf.* 230.
 Scabiosa pratensis hirsuta quæ officinarum. *Bauh. pin.* 26. *Tour.* 464.
 Scabiosa corollulis quadrifidis, squamis calycinis ovatis acutis, flore duplo brevioribus, foliis pinnatifidis, caule hirsuto subnudo. *Sauv. pag.* 241.
 HABITAT Monspeli frequens au Mont S. Loup. A Viols, à S. Martin; caulis sæpius simplicissimus semipedalis, perfolius æmulans cardunculum montis Lupi; folia (apud nos) lyrato-pinnatifida.
- Gramm-nana.* 7. SCAB. corollulis trifidis, foliis caulinis tripinnatis filiformibus. *Sauv.* 268.

TETRANDRIA MONOGYNIA. 63

Scabiosa triandra. *Linn. sp. pl.* 99. f. *Gramuntiana*.
Syst. nat. pag. 889.

Scabiosa capitulo globoso, foliis in tenuissimas lacini-
as divisib. *Bot. Monf.* 231.

Scabiosa capitulo globoso minor. *Bauh. pin.* 270.
Tour. 466.

HABITAT Monspelii *au bois de Gramont*; à *Cannelles*,
& dans toutes les *Garrigues*.

Obs. Synonymiam Bauhinianam, claris. *Linnaeus*
scabiosæ columbariæ opposuerat quam ad hanc
potius pertinere credimus.

* * Corollulis quinquefidis.

8. SCAB. corollulis quinquefidis, foliis radicalibus *Columbaria*,
ovatis crenatis, caulinis pinnatis setaceis. *Linn. sp.*
pl. 99. *Sauv.* 241.

Scabiosa capitulo globoso major. *Tour.* 465.

Scabiosa minor vulgaris. *Bot. Monf.* 230.

HABITAT Monspelii; abundat versus castrum no-
vum.

9. SCAB. corollulis quinquefidis, foliis dissectis, re- *Acerpurpu-*
ceptaculis florum subulatis. *Linn. sp. pl.* 190. *rea.*

Scabiosa peregrina rubra, capite oblongo. *Tour.*
464.

Le Regardez-moi des Jardiniers.

HABITAT Monspelii. Colitur in hortis. Annuæ.

10. SCAB. corollulis quinquefidis radiantibus, foliis *Ochroleuca*,
bipinnatis linearibus. *Linn. sp. pl.* 101.

Scabiosa multifido folio flore flavescente. *Tour.* 464.

Scabiosa corollulis quadrifidis, foliis pinnatis fo-
liolis lanceolatis superne incis. *Sauv.* 241.

Scabiosa sulphurea incis. foliis. *Barr. Ic.* 770.
n°. 2.

HABITAT Monspelii, *au Mont St. Lomp*, à *St.*
George, à *l'Esperon*.

11. SCAB. corollulis quinquefidis, caule herbaceo, *Papposa*,
calycibus foliosis florem superantibus. *Linn. sp.*
pl. pag. 101.

Scabiosa cretica, capitulo pappos mentiente *Tour.* 34.

HABITAT... Annuæ apud nos.

12. SCAB. corollulis quinquefidis, radiantibus calyce *Maritima*.

64 TETRANDRIA MONOGYNIA.

brevioribus, foliis pinnatis, summis linearibus integerrimis. *Linn. sp. pl. pag. 889. cent. 2. pag. 8.*

Obs. Hujusce semina attulerat juvenis (hycoyneau, nullo nomine insignita. Corollulæ radii dilute cærulescentes.

HABITAT in maritimis, à Ceste, au Nazareth, & à la Plage vers Agde.

K N A U T I A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 91.

Char. sec. Rad. ramosa. Caul. herbacea ramosa.

Fol. opposita sessilis simplex integerrima. Flor. terminalis simplex aggregata. Fulc. nulla.

Orientalis.

KNAUT. *Linn. Syst. nat.*

Knautia orientalis. Linn. sp. pl. 101.

HABITAT... Annua. Folia linearilanceolata.

S P E R M A C O C E.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 94.

Char. sec. Rad. simplex tenuis. Caul. herbacea ramosa tetragona articulata. Fol. opposita sessilis simplex integerrima. Flor. axillaris sessilis verticillata. Fulc. nulla.

Tennior.

1. SPER. glabra, foliis lanceolatis, floribus verticillatis. *Linn. Syst. nat. pag. 890.*

Spermacoce glabra, staminibus inclusis. Linn. sp. pl. pag. 102.

HABITAT... Annua. Caulis acute tetragonus; fructus scaber, hispida. Flores albi minimi.

S H E R A R D I A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 92.

Char. sec. Rad. ramosa. Caul. herbacea ramosa tetragona articulata. Fol. sessilis simplex integerrima verticillata, vel inferior verticillata, superior opposita. Flor. pedunculata terminalis & axillaris aggregata. Fulc. bractea aculeata octofida, vel simplex & integerrima.

Arvensis.

1. SHER. foliis omnibus verticillatis, floribus terminalibus. *Linn. sp. pl. pag. 102.*

Rubia

Rubia parva flore cæruleo se spargens. *Bot. Monsf.* 224.

Aparine pumila supina flore cæruleo. *Tour.* 114.

Asperula flore carneo, acuto folio. *Barr. ic.* 41. n°. 1.

HABITAT Monspelii ubique. Caulis inferne aculeis minimis scaber. Folia inferiora quaterna sena, item ad margines scabra seu aculeis ciliata; pedunculi axillares solitarii foliis duplo longiores, terminati bractea magna multiflora; rami etiam terminati floribus.

2. SHER. foliis floralibus binis oppositis, binis floribus. *Muralis.*
Linn. sp. pl. 103.

Rubia quadrifolia verticillato semine. *Bot. Monsf.* 226.

HABITAT in sterilibus à Lavalette, la Colombière.
Annuæ.

ASPERULA.

Char. prim. *Linn. gen. pl.* 93.

Char. sec. *Rad.* ramosa. *Caul.* ramosa articulata tetragona herbacea. *Fol.* sessilis simplex integerrima verticillata. *Flor.* terminalis fasciculata, sessilis vel pedunculata. *Fulc.* nulla.

1. ASPER. foliis octonis lanceolatis, florum fasciculis pedunculatis. *Linn. sp. pl.* 103. *Odorata.*

Aparine latifolia humilior montana. *Tour.* 114. *Seg. Ver. T. 1. pag.* 187.

HABITAT... Folia glaberrima.

HOSPITATUR sub dio.

2. ASPER. foliis senis, floribus sessilibus aggregatis terminalibus. *Linn. sp. pl.* 103. *Arvensis.*

Rubia cærulea elatior vel erectior. *Bot. Monsf.* 224.

Gallium arvense flore cæruleo. *Tour.* 115.

HABITAT Monspelii ubique. Folia floralia sæpius ad basin ciliata; omnibus glabris.

3. ASPER. foliis quaternis ovato-lanceolatis, floribus fasciculatis terminalibus. *Linn. sp. pl. p.* 103. *Syst. nat. pag.* 891. *Taurina.*

Cruciata alpina latifolia lævis. *Tour.* 115.

Asperula foliis quaternis ovato-lanceolatis, ramis alternis. *Sauv.* 164.

Rubia minor quadrifolia atrovirens. *Barr. ic.* 547.

HABITAT Monspelii à la Verune & vers Pignan. Corollæ multo longiores quàm in priori; foliaque latiora.
E

- Tinctoria.* 4. ASPER. foliis linearibus; inferioribus senis, intermediis quaternis, caule flaccido, floribus plerisque trifidis. *Linn. sp. pl. p. 104.*
Asperula foliis quaternis linearibus, floribus sæpe trifidis. *Sauv. 163.*
 HABITAT Monspelii cum priori.
- Cynanchica.* 5. ASPER. foliis inferioribus senis, intermediis quaternis subulatus triquetris floribus quadrifidis. *Linn. sp. p. 104.*
Asperula foliis linearibus quaternis, summis oppositis. *Sauv. 163.*
Rubia cynanchica. *Bot. Mons. 225.*
Rubeola vulgaris quadrifolia lævis floribus purpurascens. *Tour. 130.*
 HABITAT Monspelii. Frequens à *Boutouner*. Folia summa sæpe bina linearia, sæpius etiam quaterna, alternis minoribus brevioribus.

GALLIUM.

Char. prim. *Linn. gen. pl. 97.*

Char. sec. *Rad. ramosa. Caul. herbacea ramosa articulata tetragona, erecta vel procumbens. Fol. sessilis verticillata simplex integerrima. Flor. axillaris & terminalis ramosa subpaniculata. Falc. sæpius nulla; in paucissimis aculei ad margines foliorum.*

* *Fructu glabro.*

- Palustre.* 1. GAL. foliis quaternis ovatis inæqualibus, caulibus diffusis. *Linn. sp. pl. pag. 105.*
Cruciata palustris alba. *Tour. 115.*
Gallium palustre album. *Bot. Mons. 105.*
Gallium aquaticum flore albo. *Barr. Icon. 82.*
Le Cailletait blanc.
 HABITAT Monspelii in rivulis, à *Castelman*, *Selle-neuve*, &c.
- luteum.* 2. GAL. foliis octonis linearibus sulcatis, ramis floriferis brevioribus. *Linn. sp. pl. p. 107.*
Gallium luteum. *Bot. Mons. 105. Tour. 115.*
Le Cailletait jaune.
 HABITAT cum priori. Caulis obtuse quadrangulus, rami floriferi foliosi.

TETRANDRIA MONOGYNIA. 67

3. GAL. foliis octonis ovatis linearibus subserratis patentissimis mucronatis, caule flaccido, ramis patentibus. *Linn. sp. pl. p. 107.* *Mollugo.*
Gallium montanum latifolium ramosum. Tour. 115.
Rubia sylvestris laevis. Bot. Monf. 224.
HABITAT Monspeli in umbrosis, à gauche le long du Lés, à Castelnau.
4. GAL. foliis verticillatis linearibus, pedunculis dichotomis, summo caule floriferis. *Linn. sp. pl. p. 107.*
Sauv. 161.
Rubia montana angustifolia. Bot. Monf. 225.
Gallium saxatile glauco folio. B. Tour. 115.
HABITAT Monspeli, à la Colombiere, Lavalette, Gramont.

* * Fructu hispido.

5. GAL. foliis quaternis ovatis laevibus obtusis, panicula dichotoma, seminibus hispidis. *Linn. sp. pl. 108.* *Rotundifolium.*
Cruciata lusitanica latifolia glabra flore albo. Tour. 115.
Cruciata minor glabra, flore molluginis albo. Barr. Icon. 323.
Gallium foliis quaternis ex ovato-lanceolatis, feminibus longe peduncularis. H. Sauv. 161.
HABITAT Monspeli vers Saint George & au-delà de la Verune.
6. GAL. foliis octonis lanceolatis carinatis scabris retrorsum aculeatis, geniculis villosis, fructu hispido. *Linn. sp. pl. p. 108.* *Aparine.*
Aparine foliis acuminatis scaberrimis, corollis fructu minoribus. R. Sauv. 163.
Aparine vulgaris. Bot. Monf. 25. Tour. 114.
Le Grateron.
HABITAT Monspeli ubique. Aculei ad margines foliorum & in dorso.

C R U C I A N E L L A.

- Char. prim. Linn. gen. pl. 95.*
Char. secund. Rad. Ramosa. Caul. herbacea ramosa articulata tetragona. Fol. sessilis simplex integerrima verticillata. Flor. terminalis spicata.

Fulc. bractæ simplices integerrimæ solitariae sub quolibet calyce.

- Angustifolia.* 1. CRUC. erecta foliis senis linearibus. *Linn. sp. pl.* 108.
Rubia angustifolia spicata. *Bot. Mons.* 225.
Rubeola angustiore folio. *Tour.* 130.
Rubia spicata angustifolia. *Barr. Icon.* 550.
 HABITAT Monspelii, à la Colombiere, Gramont. Spicæ bracteis lanceolatis.
- Latifolia.* 2. CRUC. procumbens foliis quaternis lanceolatis, floribus spicatis. *Linn. sp. plant.* 109.
Rubeola latiore folio. *Tour.* 130.
Rubia latifolia spicata. *Barr. Icon.* 520.
Rubia spicata latifolia Imperati. *Barr. Icon.* 549.
 HABITAT Monspelii, proche Merviel.
- Maritima.* 3. CRUC. procumbens foliis quaternis, spicis interruptis. *Crucianella* procumbens foliis quaternis, floribus subverticillatis. *Linn. sp. pl.* 109.
Rubia maritima. *Bot. Mons.* 226. *Barr. Icon.* 315.
Rubeola maritima. *Tour.* 130.
Rubia marina, strigosior, flore rubello. *Barr. Icon.* 355.
 HABITAT in maritimis circa *Perauls*, *Villeneuve*, &c. Bractæ ovatae ad margines ciliatae membranaceae. Flores longitudine foliorum axillares solitarii.
- Monspeliana.* 4. CRUC. repens, foliis senis, spicis longis. *Linn. sp. pl.* 109.
Rubia spicata repens. *Bot. Mons.* 225.
Rubeola supina spica longissima. *Tour.* 130.
 HABITAT Monspelii ultra pontem Castrinovi, à La-valette & à la Colombiere.

RUBIA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 99.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea ramosa tetragona articulata. *Fol.* sessilis, simplex integerrima verticillata. *Flor.* paniculata axillaris & terminalis. *Fulc.* aculei ad margines & nervos foliorum.

- tinctorum.* 1. RUB. foliis senis. *Linn. sp. pl.* 109. & quinis. *Savv.* 161.
Rubia sylvestris monspessulana major. *Bot. Mons.* 224.

TETRANDRIA MONOGYNIA. 69

Rubia sylvestris monspessulana major. *Tour.* 114.

9. Rubia tinctorum sativa. *Bot. Monf.* 224. *Tour.* 114.

La Garence.

HABITAT Monspeliï passim.

PLANTAGO.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 106.

Char. secund. Rad. fibrosa vel ramosa. Caul.

scaposa vel foliosa, herbacea vel fruticosa.

Fol. in scaposis radicalis simplex integra vel

incisa, in foliosis caulina opposita integerrima.

Flor. spicata terminalis. Falc. bractæ mono-

phyllæ solitariae ad basim singuli calycis.

* *Scapo nudo.*

1. PLANT. foliis ovatis glabris, scapo nudo tereti, spica *Major:*
flosculis imbricatis. Linn. sp. pl. 112.

Plantago latifolia sinuata. *Bot. Monf.* 205. *Tour.* 126.

2. Plantago latifolia rosea floribus quasi in spicam dis- *Rosea.*
positis. *Tour.* 126.

Le plantain à bouquet.

HABITAT Monspeliï ubique . . . 2. non occurrit

in agro monspessulano. Scapus vix semipedalis;

spica conica; bracteis ovatis petiolatis. Folia ad

basim duobus, tribusve denticulis remotis; ad hanc

referatur plantago maxima tota glabra. *Bot. Monf.*

205.

3. PLANT. foliis ovato-lanceolaris pubescentibus, spica *Media.*
cylindrica, scapo tereti. Linn. sp. pl. 113. Spicis

teretibus. *Sauv.* 38.

Plantago latifolia incana. *Bot. Monf.* 303. *Tour.*

126.

HABITAT Monspeliï, à Saint Guille le désert & à

la Serane.

4. PLANT. foliis lanceolatis, spica subovata nuda, scapo *Lanceolata.*
angulato. Linn. sp. pl. 113.

Plantago angustifolia major. *Bot. Monf.* 206. *Tour.*

127.

Le plantain; vernaculè, plantage ou herbe de cinq

côtes.

HABITAT ubique Monspeliï.

70 TETRANDRIA MONOGYNIA.

- Lagopus*. 4. PLANT. foliis lanceolatis, spica ovata hirsuta, scapo angulato. *Linn. sp. pl.* 114.
Plantago angustifolia paniculis lagopi. Bot. Monf. 206. *Tour.* 127.
Plantago foliis ovato-lanceolatis pubescentibus, spicis globosis. Sauv. 16.
 HABITAT Monspelii in maritimis.
- Alicans* 5. PLANT. foliis lineari-lanceolatis hirsutis, spica cylindrica erecta, scapo tereti, foliis longiore. *Linn. sp. pl.* 114.
Plantago angustifolia albida Monspelienfis. Tour. 127.
 6. *Holosteum hirsutum albicans minus. Bot. Monf.* 132.
Plantago foliis lanceolato-linearibus, scapo foliis duplo longiore. Sauv. 26.
 HABITAT Monspelii, vers Castelnau.
- Alpina* 6. PLANT. foliis linearibus planis hirsutis, spica oblonga erecta. *Linn. sp. pl.* 114.
Plantago alpina folio angusto longo & nigricante. Tour. 127.
Plantago foliis linearibus, spica oblonga. H. Sauv. 16.
 HABITAT Monspelii à la Serane, au mont St. Loup, à Saint Guillen le d'essert.
- Maritima* 7. PLANT. foliis semi-cylindraccis integerrimis basi lanatis, scapo tereti. *Linn. sp. pl.* 114.
Plantago maritima major tenuifolia. Tour. 127.
Coronopus maritima major. Bot. Monf. 76.
Plantago foliis semi-cylindraccis integerrimis. L. Sauv. 26.
 HABITAT Monspelii ad mare. Folia carnosæ.
- Subulata* 8. PLANT. foliis subulatis triquetris rigidis, scapo tereti. *Linn. sp. pl.* 115.
Plantago gramineo folio minor. Tour. 127.
 9. *Coronopus serpentina. Bot. Monf.* 79.
Plantago gramineo folio major. Tour. 127.
 HABITAT Monspelii, au mont Saint Loup, à Valene.
 10. *Luxuriat à Sumene.*
- Coronopus* 9. PLANT. foliis linearibus pinnato-dentatis. *L. Sauv.* 275.
Plantago foliis linearibus dentatis scapo tereti. Linn. sp. pl. 115.
Coronopus hortensis. Bot. Monf. 79. *Tour.* 128.
 La corne d' cerf.
 HABITAT Monspelii passim in arvis.

TETRANDRIA MONOGYNIA. 71

* * *Caulis ramoso.*

20. **PLANT.** caule ramoso subfruticoso, foliis integerrimis, spicis aphyllis. *Linn. Syst. nat. p. 896.* *Psyllium.*
Psyllium majus supinum: Bot. Mons. 214. Tour. 128. Sauv. 126.
21. **PLANT.** caule ramoso, foliis integerrimis, spicis foliosis. *Linn. sp. plant. pag. 115. Sauv. 126.*
L'herbe aux puces.
HABITAT Monspelii in sterilibus, à Sellenenue, Lamofon, Castelnau, Gramont.
22. **PLANT.** caule ramoso herbaceo, foliis dentatis recurvatis, spicis aphyllis. *Linn. Syst. nat. pag. 896.* *Cynops.*
Psyllium majus erectum. Bot. Mons. 214. Tour. 128.
Plantago foliis dentatis, caule ramoso, spicis aphyllis. Linn. sp. pl. pag. 116.
HABITAT cum priori.

SANGUISORBA.

Char. prim. vid. Lin. gen. pl. 107.

Char. secund. Rad. ramosa. **Caul.** herbacea teres ramosa foliosa. **Fol.** alterna petiolata amplexicaulis pinnata, foliolis petiolatis, simplicibus integris. **Flor.** terminalis, spicata. **Fulcr.** stipulæ petiolares, integræ binæ oppositæ reniformes.

Obs. Petioli foliorum sæpius etiam stipulis ovatis instruuntur.

1. **SANG.** spicis ovatis. *Linn. sp. pl. 116. Sauv. 220.* *Officinalis.*
Pimpinella sanguisorba major. Bot. Mons. 204. Tour. 156.

La Pimprelle; vernaculè, la Pimpanela.

HABITAT Monspelii; à Lattes, la Verune. **Caulis & folia** glaberrima. **Folia** pinnata, ex foliolis quindécim vel 17. cordato-ovatis, serratis petiolatis sæpius oppositis. **Stipulæ** duæ reniformes serratæ, supra basim petioli nascuntur. **Stipulæ** verò foliolorum ad basim petiolorum.

CORNUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 110.

Char. secund. Rad. lignosa ramosa. **Caul.** arbo-

72 TETRANDRIA MONOGYNIA.

rea. *Fol.* opposita petiolata simplex integerrima. *Flor.* ramea terminalis cymosa. *Fulc.* nulla.

Mas. 1. CORN. arborea, umbellis involucrum æquantibus.

Linn. sp. pl. 117.

Cornus hortensis mas. Bot. Monsf. 79.

Cornus hortensis mas. Tour. 641. Et sylvestris. *Ibid.*

Cornus drupis ovalibus. Sauv. 151.

Le Cormier, ou Cornouiller; vernaculè, lou Cournier, las Cornies.

HABITAT Monspelii; à Valene, & au-delà du Pont de Selleneuve, à gauche dans le petit bois qui est vers la Verune, & à Castelnau.

Sanguinea. 2. CORN. arborea cymis nudis. *Linn. sp. pl.* 117.

Cornus drupis globosis. Sauv. 151.

Cornus femina. Bot. Monsf. 79. *Tour.* 641.

Sanguine; vernaculè, lou Sangui.

HABITAT ubique; à Castelnau; & cum priori.

P T E L E A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 112.

Char. secund. Rad. lignosa. Caul. fruticosa. Fol. petiolata alterna integerrima ternata. Flor... Fulc. ...

Trifoliata. 1. PTEL. foliis ternatis. *Linn. sp. pl. pag.* 118.

R I V I N A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 121.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. herbacea perennis. Fol. alterna petiolata simplex integerrima. Flor. axillaris pedunculata racemosa solitaria. Fulcr. nulla.

Humilis. 1. RIV. humilis. *Linn. sp. pl.* 121.

HABITAT. ... Caulis pedalis; folia ovata acuminata; petioli foliis breviores; racemi inferne nudi, longitudine foliorum. Floret æstate; semina maturans.

C A M P H O R O S M A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 1042.

Char. secund. Rad. lignosa ramosa. Caul. subfruti-

TETRANDRIA MONOGYNIA 73

cosa. *Fol.* alterna subulata sessilis, simplex integerrima. *Flor.* axillaris glomerata. *Fulcr.* nulla.

1. CAMP. foliis hirsutis linearibus. *Linn. sp. pl.* 123. *Sauv.* 45.

Camphorata hirsuta. *Bot. Monf.* 47. *Tour. alt.* 1705. pag. 313.

Camphorata Monspeliensium. *Lob. Icon.* 403.

La Camphorata.

HABITAT Monspelii ubique in sterilibus.

ALCHEMILLA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 122.

Char. secund. *Rad.* subfusiformis. *Caul.* herbacea teres foliosa ramosa. *Fol.* alterna petiolata, simplex lobata integra, vel quinto-digitata. *Flor.* axillaris & terminalis, pedunculata paniculata, vel sessilis glomerata. *Fulcr.* stipulæ geminæ, petiolares, adnatæ vaginantes foliaceæ integræ, nunc membranaceæ integerrimæ.

1. ALCH. foliis lobatis, stipulis foliaceis, serratis. *Vulgaris.*

Alchemilla foliis lobatis. Linn. sp. pl. 123.

Alchemilla vulgaris. Tour.

Le Pied de lion.

HABITAT Monspelii; au Mont de St. Loup, à la Serane, à l'Esperou. Folia glaberrima 7-9lobata serrata, inferiora longe petiolata, superiora subreniformia, petiolis brevioribus.

2. ALCH. foliis digitatis, stipulis membranaceis integerrimis. *Alpina.*

Alchemilla (alpina,) foliis digitatis serratis. Linn. sp. pl. 123.

Alchemilla alpina quinquefolii folio subtus argenteo. Tour. 508.

Alchemilla argentea montana pentaphyllos. Barr. Icon. 756.

Le Pied de lion à feuilles argentées.

HABITAT cum priori. Foliola ovata ad apicem serrata, subtus villis argenteis.

DIGYNIA.

APHANES.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 123.

Char. secund. *Rad.* ramola. *Caul.* herbacea teres.

Fol. alterna petiolata simplex incisæ. *Flor.* axillaris sessilis glomerata. *Fulc.* stipulæ geminæ petiolares adnatæ, vaginantes incisæ.

Arvensis. 1. APH. arvensis. Linn. sp. pl. 123.

Alchemilla minima montana. Bot. 7.

HABITAT Monspelii in Sylva Gramuntiana. Folia sæpius trifida, laciniæque iterum trifidæ, stipulæ serratæ magnitudine ferè foliorum.

CUSCUTA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 124.

Char. secund. *Rad.* conspicua nulla. *Caul.* filiformis volubilis parasitica florifera. *Fol.* nulla. *Flor.* glomerata sessilis sparsa. *Fulc.* nulla.

1. CUS. floribus sessilibus. Linn. sp. pl. 124.

Cuscuta nuda repens funiformis. Sauv. 11. & filiformis, *Ibid.*

Cuscuta major. Bot. Mons. 81. Tour. 653.

Cuscuta minor sive epithymum. Bot. Mons. 82. Tour. 653.

La Cuscute; vernaculè, *la Rasque*.

HABITAT ubique Monspelii.

HYPECOUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 126.

Char. secund. *Rad.* fusiformis tenuis. *Caul.* scaposa teres simplicissima. *Fol.* radicalis pinnata foliolis incisæ. *Flor.* terminalis subsolitaria. *Fulc.* bractæ foliaceæ incisæ, solitariae vel binæ infra flores.

Procumbens. 1. HYP. filiquis arcuatis compressis. Linn. sp. pl. 125.

Hypocoum latiore folio. Tour. 230.

Hypocoum filiquosum. Bot. Mons. 134.

HABITAT Monspelii propè Sacellum ad aquas bellil-

TETRANDRIA TETRAGYNIA. 75

canas, frequentius *au Pont de la Peyrade*, à *Cette*; luxuriat circa urbem & in Horto regio.

2. HYP. filiquis cernuis teretibus cylindricis. *Linn. sp. pl. Pendulum.*
124. *Sauv.* 263.

Hypocoum tenuiori folio. *Tour.* 230.

Hypocoi altera species. *Bauh. Pin.* 172.

Hypocoum tenuifolium Hispanicum flore pallido.
Barr. Icon. 352.

HABITAT Monspelii cum priori, sed rarius.

TETRAGYNIA.

I L E X.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 127.

Char. secund. Rad. lignosa ramosa. Caul. arborea.

Fol. alterna petiolata simplex integra. Flor.
axillaris glomerata. Fulcr. aculei ad margines
foliorum.

1. ILEX foliis ovatis, acutis, spinosis. *Linn. sp. p.* 125. *Aquifolium;*

Agrifolium vulgò. *Bar. Mons.* 6.

Aquifolium vulgò, sive *Agrifolium.* *Tour.* 600.

Le Houx.

HABITAT Monspelii; *au Capouladou & à Valene.*

Arbor sempervirens.

POTAMOGETON.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 128.

Char. secund. Rad. articulata horizontalis, radicu-
lis perpendicularibus fibrosis, ad articulos. Caul.
herbacea teres ramosa articulata. Fol. alterna
vel opposita, sessilis vel petiolata, integerrima
vel incisa. Flor. axillaris solitaria spicata. Fulc.
stipulæ. . . .

1. POT. foliis oblongo-ovatis petiolatis natantibus. *Linn. Natans.*
sp. pl. 126. *Sauv.* 14. & 73.

Potamogeton rotundifolium. *Tour.* 233.

HABITAT Monspelli in Ledo amne ad dextram Castri-
novi. Floret Septembri. Folia longe petiolata integerrima
opposita.

76 TETRANDRIA TETRAGYNIA.

- Densum.** 2. POT. foliis ovatis acuminatis oppositis confertis, caulis dichotomis. *Linn. sp. pl.* 126.
Potamogeton minus, foliis densis, mucronatis, non ferratis. *Bor. app. pag.* 304. *Tour.* 233. *Sauv.* 124.
HABITAT Monspelu in rivulis laterensibus
- Crispum.** 3. POT. foliis lanceolatis, alternis, undulatis, ferratis. *Linn. sp. pl.* 126.
Potamogeton foliis crispis, sive lactuca ranarum. *Bor. Mons.* 213. *Tour.* 233.
HABITAT ubique Monspelii in aquis; à Castelnau, Lamoignon.
- Setaceum.** 4. POT. foliis lanceolatis oppositis acuminatis. *Linn. sp. pl.* 127.
Potamogeton angustifolium racemosum. *Bor. Mons.* 213.
Potamogeton ramosum angustifolium. *Baub. prod. pag.* 100. *Tour.* 233.
HABITAT Monspelii in Ledo amne propè Molendinas.
- Pusillum.** 5. POT. foliis linearibus oppositis alternisque distinctis, basi patentibus, caule tereti. *Linn. sp. pl.* 127.
Potamogeton minimum capillaceum. *Baub. prod. Bot. Mons.* 213.
Potamogeton pusillum gramineo folio, caule rotundo. *Raj. Synon.*
HABITAT Monspelii secus fluvium; au-delà de Cannelles, & à la source du Lés.

R U P P I A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 843.

Char. secund. Rad. fibrosa. Caul. herbacea articulata teres ramosa. Fol. alterna sessilis linearis simplex integerrima. Flor. axillaris pedunculata solitaria ramosa. Fulc. stipulæ geminæ membranaceæ vaginantes adnatæ integerrimæ.

- Maritima.** 1. RUP. *Linn. sp. pl. pag.* 127.
Gramen maritimum fluitans cornutum. *B. Bot. Mons.* 119.
Fucus Folliculaceus fœniculi folio longiore. *B. pin.* 365.
Gramen aquæ innatans, cum utriculis, sive fœniculacea marina. *J. Baub. Tom. III. pag.* 784.
Fucus ferulaceus. *Loh. Icon.* 275.
HABITAT Monspelu in stagnis.

S A G I N A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 129.

Char. secund. Rad. fibrosa. Caul. teres articu-
lata, simplex vel ramosa. Fol. opposita sessi-
lis, simplex integerrima. Flor. pedunculata
solitaria axillaris & terminalis. Fulc. nulla.

1. SAG. ramis procumbentibus. Linn. sp. pl. 128. Sauv. Procumbens.
142.

Alfene pusilla graminea flore tetrapetalo. Tour. 243. &
Seguier, Tom. 1. pag. 421. tab. 5. f. 3.

Alfene littoralis graminea. Bot. Monsf. 290.

HABITAT Monspelii in luco Gramuntio.

Pedunculi 1 flori axillares solitarii foliis triplo longiores,
erecti. Corolla magnitudine calycis vel paulo major.
Folia lineari-lanceolata; pedunculi fructiferi recurvi.

2. SAG. caule erecto unifloro. Linn. sp. pl. 128.

Alfene verna glabra. Bot. Monsf. 14. Tour. 242.

HABITAT Monspelii cum priori in locis Mnio & Bryo
obstitis, & frequentior à Caunelles.

Planta vix sesquipollicaris rarò bipollicaris, foliorum-
que oppositionibus 4-7; terminata pedunculo longo,
nudo, sub-unifloro.

Erecta.

T I L L Œ A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 83.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. herbacea sub-
ramosa. Fol. sparsa sessilis simplex inte-
gerrima. Flor. axillaris sessilis solitaria. Fulc.
nulla.

1. TIL. erecta, floribus lateralibus, foliis obtusis. Sauv. Rubra.
129. Linn. sp. pl. 129.

Sedum annuum stellatum rubrum. Bot. Monsf. 238.
tab. 237.

HABITAT Monspelii in colle Ferran, & ad lævam
Castri novi, ut & etiam in olivetis circà Caunelles; &
etiam in ingressu luci Gramuntii, ubi pulchrè mixta
cum saxifraga tridactyl.

2. TIL. procumbens. Sauv. 129. Linn. sp. pl. 129.

Polygonum muscosum minimum. Bot. Monsf. 211.
Bocc. musf. 2. p. 36. t. 22.

HABITAT cum priori; utraque sæpiùs uncialis.

Muscosa.

PENTANDRIA

MONOGYNIA.

HELIOTROPIMUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 130.

Char. sec. *Rad.* ramosa. *Caul.* teres ramosa foliosa herbacea glabra. *Fol.* alterna simplex integerrima, sessilis vel petiolata. *Flor.* terminalis conjugata, spicis cum florent recurvis & convolutis, dum fructum ferunt erectis strictis. *Fulc.* nulla.

- Europæum.** 1. HEL. foliis ovatis petiolatis, caule erecto.
Heliotropium foliis ovatis integerrimis tomentosis rugosis, spicis conjugatis. Linn. sp. pl. 130. Sauv. & Bot. Monf. 305.
Heliotropium majus Dioscoridis. Bot. Monf. 125. Tour. 139.
Heliotropium majus & herba Cancræ. Lob. Icon. 160.
L' Héliotrope, l'herbe aux verrues; vernaculé, herbe de la Verrugue.
HABITAT Monspelii ubique. Annuum. Altitudo cubitalis.
- Curassavicum.** 2. HEL. foliis spathulatis sessilibus.
Heliotropium foliis lanceolato-linearibus glabris aveniis, spicis conjugatis. Linn. sp. pl. 130.
Heliotropium curassavicum foliis lini umbilicati. M. Tour. 139.
HOSPITATUR in hybernaculo. Planta terræ incumbens, glauca glaberrima, annua. Flores albi, calycibus vix longiores.
Obs. Singulare in hocce genere quod pars spicularum fructificans strictissima, pars verò florida recurva & convoluta evadat. Idem evenit in sequenti.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 79

MYOSOTIS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 131.

Char. sec. *Rad.* fibrosa. *Caul.* herbacea teres;
Fol. sessilis alterna hirsuta simplex integerrima.
Flor. terminalis racemosa, racemis solitariis dum
 florent recurvis & convolutis, dum fructum
 ferunt erectis strictis. *Fulc.* nulla. *Aculei* supra
 capsulas in primâ specie.

1. MYOS. seminibus nudis : foliorum apicibus callosis. *Scorpioides.*
Linn. sp. pl. 131. Sauv. 63.

2. Myosotis foliis hirsutis. *Linn. hort. Cliff. 46.*
Echium scorpioides arvense. Bot. Monsf. 87. *Arvensis.*
Lithospermum arvense minus. Tour. 137.

3. Myosotis foliis glabris. *Linn. hort. Cliff. 46.*
Echium scorpioides palustre. Bot. Monsf. 88. *Palustris.*
Lithospermum palustre minus flore cæruleo. Tour. 137.
Lycopsis montana cærulea, seu buglossum minimum
montanum. Barr. Icon. 404.

Myosotis foliis glabris mollibus lanceolatis. Sauv. 63.
L'Oreille de Souris.

HABITAT ubique in umbrosis circa *Lavalette, Castelnaud.* Annua. Pedalis vel sesquipedalis.

2. MYOS. seminum aculeis triglochidibus, foliis lanceolatis pilosis. *Linn. sp. pl. 131. Sauv. 63.* *Lappula.*

Cynoglossum medium & minus. Baub. Pin. 257. Bot. Monsf. 83.

Buglossum angustifolium semine echinato. Tour. 134.

Echioides minus globoso echinato & singulari capite.
Barr. Icon. 1246.

HABITAT Montpelii, à *St. Martin de Londres* auprès
 du Château, & à *Vials.* Annua.

3. MYOS. seminibus nudis, foliis hispidis, racemis foliosis. *Linn. sp. pl. 131.* *Apula.*

Anchusa lutea minima. Bot. Monsf. 19.

Buglossum angustifolium luteum annuum minimum.
Tour. 134.

Lithospermum seminibus lævibus, corollis vix calycem superantibus, foliis lanceolatis. Sauv. 62.

HABITAT Montpelii circa *Sellenenue, Castelnaud.*
 Annua.

LITHOSPERMUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 132.

Char. sec. Rad. ramosa lignosa. Caul. herbacea teres ramosa vel fruticosa. Fol. alterna hirsuta, sessilis simplex integerrima. Flor. solitaria subsessilis laterifolia. Fulc. nulla.

- Officinale.** 1. LITH. seminibus lævibus, corollis calycem vix superantibus, foliis lanceolatis. Linn. sp. pl. 133.
Lithospermum sive milium solis. Bot. Monsf. 163.
Lithospermum majus erectum. Tour. 137.
Le Gremil.
HABITAT Monspeli passim circa Castelnau. Annuum.
Calyces pedunculo brevi donantur.
- Arvense.** 2. LITH. seminibus rugosis, corollis vix calicem superantibus. Linn. sp. pl. 132.
Lithospermum nigrum quibusdam flore albo semine echii. Bot. Monsf. 164.
Buglossum arvense annuum lithospermi folio. Tour. 134.
HABITAT Monspeli; abundat circa Castelnau & Sellenue. Annuum; calyces pedunculari.
- Purpureo - cauleum.** 3. LITH. seminibus lævibus, corollis calycem multoties superantibus. Linn. sp. pl. 133.
Lithospermum repens majus. Bot. Monsf. 163.
Lithospermum minus repens latifolium. Tour. 137.
L'Herbe aux Perles.
HABITAT Monspeli in pratis humidis ultra Ledum circa Molendinas; folia lanceolata uninervia. Floret Aprili.
- Tinctorum.** 4. LITH. villosum, caulibus procumbentibus simplicissimis. Linn. sp. pl. 133.
Anchusa Monspeliaca. Bot. Monsf. 18.
Buglossum radice rubra, sive anchusa vulgarior floribus cæruleis. Tour. 134.
L'Orcanette.
HABITAT Monspeli ultra Castrum novum ad dexteram.
- Fruticosum.** 5. LITH. fruticosum, staminibus corollam æquantibus. Linn. sp. pag. 133.
Buglossum fruticosum rorismarini folio. Tour. 134.
Anchusa lignosior angustifolia. Bot. Montf. 18.
Anchusa minor & lignosior. Bauh. Pin. 255.

Anchusa

Anchusa lignosior Monspeliensium flore violaceo.
Barr. Icon. 1168.

HABITAT Monspeliū circa *Montferrier*, *Lavalette*,
Calyces sessiles, caulis perennis hispida.

A N C H U S A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 133. Adde folio-
lum calycis unicum cæteris sublongius.

Char. sec. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea teres ra-
mosa hispida. *Fol.* alterna hispida sessilis sim-
plex integerrima. *Flor.* terminalis capitata vel
subspicata. *Fulc.* nulla.

1. ANC. foliis lanceolatis, spicis imbricatis secundis. *Officinalis.*

Linn. sp. pl. p. 133.

Buglossum angustifolium majus. *Bot. Monf.* 40.

Buglossum angustifolium majus flore albo. *Tour.* 134.
& cæruleo *ibid.*

La buglosse.

HABITAT Monspeliū ubique, frequens circa *la Verune*.
Rami alii ex axillis foliorum; alii ex ipso caule
oriuntur.

2. ANC. pedunculis diphyllis capitatis. *Linn. sp. pl.* 134. *Semper virens.*

Buglossum latifolium semper virens. *Tour.* 134.

Buglossum semper virens. *Lobel. Icon.* 575.

HOSPITATUR sub dio. Priori multo minus hirsuta.

Pedunculi axillares foliis breviores; folia duo ad
basim capitulorum; corollæ azureæ, extus rubentes
præsertim ante expansionem.

C Y N O G L O S S U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 134.

Char. secund. *Rad.* ramosa napiformis. *Caul.* her-
bacea ramosa villosa. *Fol.* alterna villosa mollis
sessilis simplex integerrima. *Flor.* terminalis
ramosa. *Fulc.* nulla.

1. CYN. staminibus corolla brevioribus foliis lato-lan- *Officinalis.*
ceolatis tomentosis sessilibus. *Linn. sp. pl.* 134.

Cynoglossum majus vulgare. *Bot. Monf.* 83. *Tour.* 139.

La langue de chien; vernaculè, *lengue cane*, ou *herbe*
d'autal.

HABITAT ubique Monspeliū, annuum; occurrit versus
Prades & Montferrier copiosum. F

82 PENTANDRIA MONOGYNIA.

- Cheirifolium*. 2. CYN. foliis spathulatis incanis tomentosis semi-amplexicaulibus.
 Cynoglossum corollis calyce duplo longioribus, foliis lanceolatis. *Sauv.* 64. *Linn. sp.* 134.
 Cynoglossum creticum angusto argenteo folio. *Bot. Monf.* 83. *Tour.* 140.
 HABITAT Monspelii frequens versus *Sellenave*, *Cas-selnau*, &c. Annuum. Calyces duplo longiores quàm in omnibus speciebus.
- Apeninnum*. 3. CYN. staminibus corollam æquantibus. *Sauv.* 64. *Linn. sp. pl.* 134.
 Cynoglossum montanum maximum. *Tour.* 139.
 HABITAT Monspelii à la Source du Lés & au Puy de Saint Loup. Folia digito indice longiora. Annuum & bienne.
- Linifolium*. 4. CYN. foliis lineari-lanceolatis ciliatis, pedunculis axillaribus multifloris subnudis.
 Cynoglossum foliis lineari-lanceolatis glabris. *Linn. sp. pl.* 134. *Sauv.* 54. & 64.
 Omphalodes lusitanica folio lini. *Tour.* 140.
 Linum album blattariæ folio semine discofo. *Barr. Icon.* 1234.
 β. Omphalodes lusitanica elatior cynoglossi folio. *Tour.* 140.
 HOSPITATUR sub dio. Annuum.

P U L M O N A R I A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 136.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. herbacea villosa simplex. Fol. alterna hirsuta simplex integerrima, radicalis basi attenuato-petiolata, caulina sessilis amplexicaulis. Flor. terminalis congesta. Fulcr. nulla.

- Officinalis*. 1. PUL. foliis radicalibus ovato-cordatis scabris. *Linn. sp. pl.* 135. *Sauv.* 101.
 Pulmonaria Italarum ad buglossum accedens. *Tour.* 136.
 La pulmonaire.
 HOSPITATUR in frigidario. Perennis; folia radicalia palmaria, basi veluti in petiolum attenuata. Floret primo vere, imò & autumno.

SYMPHYTUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 135.

Char. secund. *Rad.* fusiformis vel tuberosa, horizontalis vel perpendicularis. *Caul.* herbacea pilosa. *Fol.* sessilis hirsuta simplex integerrima decurrens alterna (in una specie inferior alterna superior, opposita) *Flor.* subaxillaris pedunculata, pedunculis multifloris. *Fulc.* nulla.

1. SYM. foliis omnibus alternis.

Officinale.

Symphytum folius ovato-lanceolatis decurrentibus.
Linn. sp. pl. pag. 137.

Symphytum consolida major. *Bot. Monf. 247. Tour. 138.*

La grande consoude, ou l'oreille d'âne.

HABITAT Monspeli circa Castrum novum, le long du Lès & à Lattes.

2. SYM. foliis inferioribus alternis, floralibus oppositis. *Tuberosum.*

Symphytum foliis summis oppositis. *Linn. sp. pl. pag. 136.*

Symphytum majus, radice tuberosa. *Bot. Monf. 248. Tour. 138. majus & minus.*

HABITAT Monspeli in pratis laterensibus.

HOSPITATUR in frigidat.o.

Obs. in utraque specie (apud nos) folia decurrunt in caulem & in pedunculos.

CERINTHE.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 141. Adde foliolum unum calycis cæteris brevius angustius, alterum longius, latiusque.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea teres ramosa glabra vel hispida. *Fol.* simplex integerrima hispida alterna, sessilis vel amplexicaulis. *Flor.* solitaria pedunculata laterifolia. *Fulcr.* nulla.

1. CER. foliis amplexicaulibus, fructibus geminis, corollis obtusiusculis patulis. *Linn. sp. pl. 136. Major.*

Cerinte foliis amplexicaulibus florum dentibus revolutis. *Sauv. 63.*

§4 PENTANDRIA MONOGYNIA.

Cerinte quorundam major flore ex rubro purpureascente. *Tour.* 80.

- ρ. Cerinte quorundam spinoso folio flore flavo. *Tour.* 80.

Le melinet.

HOSPITATUR sub dio; radix perennis. Ludit foliis emarginatis, glabris; antheræ sagittatæ; primo vere imò & hyeme florens.

- Zehisides.* 2. CER. foliis lanceolato-linearibus hispidis, seminibus quaternis distinctis. *Linn. sp. pl.* 137.

Anchusa lutea minor & major. Bauh. pin. 255.

Symphytum echii folio angustiore, radice rubra, flore luteo. Tour. 138. & folio latiore *Ibid.*

Symphytum foliis ligulatis hispidis, floribus, &c. Sauv. 62.

Anchusa lutea & parva. Lob. Icon. 578.

- ρ. *Buglossum annuum luteum minimum. Tour.* 136.

Echium luteum minimum hispanicum. Barr. Icon. 1254.

HABITAT Monspelii circa *la Colombiere & Selleneuve au-delà de Camelles*, sed rarior; vulgatiore ad *Montislupi lævam & à l'Esperou*; annua.

B O R R A G O.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 137.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. herbacea teres hispida ramosa. Fol. hirsuta simplex integerima alterna (in una specie caulina alterna ramea opposita) inferior petiolata, superior sessilis. Flor. pedunculata, pedunculis solitariis, nunc simplicibus laterifoliis, nunc ramosis axillaribus vel terminalibus. *Fulcr.* nulla.

- Officinalis.* 1. BOR. foliis omnibus alternis, calycibus parentibus. *Linn. sp. pl. pag.* 137.

Borrago floribus cæruleis. Tour. 133.

La Bourrache, vernaculè boarracha.

HABITAT Monspelii in oleribus, perennis, florens fere toto anno. Pedunculi terminales multiflori.

- Indica.* 2. BOR. foliis ramificationum oppositis, calycinis foliolis sagittatis. *Linn. sp. pl.* 137.

HOSPITATUR in hybernaculo. Annua. Folia oblonga

PENTANDRIA MONOGYNIA. 85

amplexicaulia, minus hirsuta quam in priori; rami axillares solitarii, foliis oppositis. Pedunculi alii è caule, alii axillares, alii oppositifolii, solitarii, uniflori, foliis duplo breviores.

37. BOR. calycibus tubo corollæ brevioribus. *Linn. sp. Orientalis. pl. 138.*

Borrigo Constantinopolitana, flore reflexo caruleo, calyce vesicario. *Tour. cor. 6.*

HOSPITATUR sub dio & in frigidario; perennis. Folia radicalia cordata bipalmaria petiolata; petiolo foliis longiore pedali, canaliculato, inferne dilatato amplexicauli; caulis rubens hirsutus sesquipedalis, erectus. Folia caulina ovata subsessilia. Pedunculi axillares solitarii, multiflori, longitudine foliorum. Corollæ calycibus duplo majores, tubo albicante longitudine calycis. Lacinie quinque revolutæ cærulescentes hirsutæ. Pili calycis & corollæ, albi. Longiores quam in caule & foliis; semina maturans.

A S P E R. U G O.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 140.*

Char. secund. *Rad. ramosa. Caul. herbacea ramosa, hirsuta fruticosa subangulata. Fol. sessilis alterna simplex integerrima hirsuta. Flor. axillaris subsolitaria subsessilis. Fulcr. nulla.*

ASP. calycibus fructiferis reflexis cauli adpressis. *Procumbens.*

Asperugo. *Linn. sp. pl. 138. Sauv. 64. & 101.*

Buglossum sylvestre caulibus procumbentibus. *Bot. Monf. 41.*

Asperugo vulgaris. *Tour. 134.*

Alyssum germanicum echinoides. *Lob. Icon. 803.*

HABITAT Monspelii; luxuriat in horto regio. Annua; varians foliis oppositis, ternis vel quaternis, serratis vel crenatis.

L Y C O P S I S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 138.* Adde folia calycis inæqualia.

Char. secund. *Rad. ramosa. Caul. herbacea teres hirsuta ramosa. Fol. alterna sessilis simplex in-*

36 PENTANDRIA MONOGYNIA.

tegerrima hispida. *Flor.* solitaria caulina pedunculata. *Fulcr.* nulla.

Vesicaria. 1. *LYC.* foliis integerrimis, calycibus fructiferis inflatis pendulis. *Linn. sp. pl.* 138.

Pulmonaria orientalis foliis echii, calyce vesicario. *Tour. cor.* 6.

HOSPITATUR sub dio; annua.

HABITAT à la Taillade de Gignac, à Salason à droite.

Arvensis. 2. *LYC.* foliis lanceolatis hispidis, calycibus florescentibus erectis. *Linn. sp. pl.* 139.

Lycopsis foliis lingulatis sinuatis cæruleo flore. *Sauv.* 62.

Buglossum sylvestre minus. *Bot. Monsf.* 40. *Tour.* 134.

HABITAT Mospelii ultra pontem Castrinovi ad lævam & in colle *Ferran.* Annua. Corollæ tubus albicans squamulis salbidis, limbo cærulescente, calyces supra axillares solitarii; folia quandoque decurrunt in caulem sinuato-dentata vel integerrima.

E C H I U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 139. adde foliola calycis inæqualia.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* teres herbacea hirsuta, simplex vel ramosa. *Fol.* alterna sessilis simplex integerrima hirsuta. *Flor.* spicata subaxillaris. *Fulcr.* nulla.

Italicum. 1. *ECH.* corollis vix calycem excedentibus margine villosis. *Linn. sp. pl.* 139.

Echium majus & asperius, flore albo. *Bot. Monsf.* 88. *Tour.* 135.

Echium majus & asperius flore dilute purpureo. *Bot. Monsf.* 88. *Tour.* 135.

Echium caule erecto asperrimum, flore minore. *Sauv.* 61.

HABITAT Mospelii circa Molendinas; annuum, diffusum; ramis sæpius in conum digestis.

Vulgare. 2. *ECH.* caule simplici erecto, foliis caulinis lanceolatis hispidis, floribus spicatis lateralibus. *Linn. sp. pl.* 139.

Echium foliis lingulatis hispidis, ex singulis alis spicatum. *Sauv.* 61.

Echium vulgare. *Bot. Monsf.* 88. *Tour.* 135.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 87

2. *Echium sylvestre hirsutum maculatum. Bot. Monf.*
88. *Sauv.* 61.

La Viperine.

HABITAT Monspelii in satorum marginibus.

3. *ECH. calycibus fructiferis distantibus, caule procumbente. Linn. sp. pl.* 139. *Creticum.*

Echium creticum angustifolium rubrum. Sauv. 62.

Tour. 136. & latifolium. 135.

HABITAT ubique Monspelii. Annuum.

A N D R O S A C E.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 143.

Char. sec. *Rad.* tenuis simplex. *Caul.* scaposa.

Fol. radicalis sessilis simplex integra vel integerrima. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulc.*

bractæ lineares involucriformes plurimæ.

1. *AND. perianthiis maximis. Linn. sp. pl.* 141. *Maxima.*

Androsace calycibus fructuum maximis. Sauv. 16.

Androsace vulgaris latifolia annua. Tour. 123.

HABITAT Monspelii in maritimis circa *Miraval*,

Frontignan. Palmarem non attingens altitudinem;

folia ovalia vel lanceolata denticulata, glabra. In-

volucrium foliis quinque vel sex ovalibus integris.

Flores minimi albi intra calicem maximum; pedun-

culi involucri subæquales; laciniæ calycis sæpe

ferrulatæ. Annuæ.

2. *AND. foliis lanceolatis dentatis glabris, perianthiis angulatis corolla brevioribus. Linn. sp. pl.* 142. *Septentrionalia.*

Alpine minor & verna. Bauh. prodr. pag. 118, n^o.

V. & VI.

HABITAT in monte *l'Esperon.* Annuæ. Folia glaber-

rima lanceolata apice denticulata. Scapi plures pil-

mares teretes; foliola involucri brevissima; corol-

læ calycibus majores; florens Martio, Aprili & Maio.

Abundat entre *Lamalou & la Montagne de l'Es-*

pinouse.

3. *AND. foliis linearibus glabris; umbella involucri multoties longiore. Linn. sp. pl.* 142. *Lallemand.*

Androsace alpina perennis angustifolia, flore singu-

lari. Tour. 123. *Seg. ver. Tom.* 3. *pag.* 110.

HABITAT frequens à *Lamalou & in umbrosis circa*

88 PENTANDRIA MONOGYNIA.

Villemagne. Scapus 1 florus vel ad summum triflorus; pedunculi sesquiunciales.

Carnia. 4. **AND.** foliis subulatis glabris, umbella involucris brevior. *Linn. sp. pl.* 132.

Androsace alpina angustifolia perennis glabra & multiflora. *Tour.* 123.

HABITAT cum priori. Scapus vix biuncialis; folia lineas 6 longa; pedunculi lineam unam duasve longi; corol. & calycibus paulo majores.

Obs. Per stolones fit propagatio.

PRIMULA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 144.

Char. secund. *Rad.* tenuis simplex vel fibrosa. *Caul.* scaposa. *Fol.* radicalis sessilis simplex integra vel integerrima. *F. or.* terminalis umbellata. *Fult.* bractæ involucrifformes plurimæ.

Officinalis. 1. **PRIM.** foliis dentatis, rugosis. *Linn. sp. pl.* 149. *Sauv.* 13. *Primula veris* odorata, flore luteo simplici. *Tour.* 124.

Elatior. 2. *Primula veris* caul. fera pallido flore inodoro aut vix odoro. *Bor. Monf.* 213.

Acaulis. 3. *Primula veris* floribus ex singularibus pediculis pallidis majoribus simplicibus. *Tour.* 125.

La Primevère.

Auricula. 4. **PRIM.** foliis serratis glabris. *Linn. sp. pl.* 143. *Sauv.* 13. *Auricula ursi.* *Tour.* 143. 1-16.

L'Oreille d'ours; vernaculè, *l'Aureille d'ours.*

HOSPITATUR sub dio. Perennis. Foliorum basis dilatata; foliola involucri ovata; unicum sæpius longius spathulatum umbellam superans; pedunculi omnes incani & veluti farinosi.

Hujus varietates innumeras vide in Tournefortio. **Culturæ effectus.** In hortis luxurians, plena, multiplicata, frondosa.

Farinosa. 5. **PRIM.** foliis crenatis glabris. *Sauv.* 143. *Florum limbo plano.* *Linn. sp. pl.* 143.

Primula veris rubro flore. *Tour.* 124.

Sanicula alpina minor, sive media. *Lob. Icon.* 571.

HABITAT in umbrosis; à *Lamalon*, au *Pouget*; ubi floret etiam autumnus.

HOSPITATUR in frigidario. Priore multò minor.

4. PRIM. foliis linearibus integerrimis, floribus sessilibus. *Vitaliana*.
Linn. sp. pl. 143.
Aretia foliis linearibus glabris, caule paucifloro. *Hall.*
hel. 486.
 HABITAT cum priori in locis musco oblitis. Folia vix
 lineas duas longa. Radicula lignosa plurimæ hori-
 zontales squamosæ; umbella biflora triflorave in
 medio foliorum subsessilis.
5. PRIM. foliis integerrimis, glabris oblongis, calycibus *Integrifolia*.
 tubulosis obrutis. *Linn. sp. pl. 144.*
Auricula urfi carnei coloris, foliis minimè serratis.
J. B. Tour. 120.
 HABITAT cum priore. Scapus sesquiuncialis, sub-tri-
 florus. Flores maximi; foliola involucri terna vel
 quaterna linearia inæqualia.
 Ob. Stolonibus multiplicantur. Variat numerus sta-
 minum vel laciniarum corollæ, in toto genere.

CYCLAMEN.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 193.*

Char. secund. *Rad.* tuberosa *Caul.* scaposa, scapo
 unifloro spirali, dum floret, erecto stricto,
 dum fructificat, procumbente. *Fol.* radicalis pe-
 tiolata simplex integra. *Flor.* terminalis cernua
 solitaria. *Fulc.* nulla.

1. CYC. corolla retroflexa. *Linn. sp. pl. 145. Tour. 154. Europæum.*
Seg. Flor. ver. Tom. I. pag. 274. Sauv. 28.
Cyclamen. Lob. Icon. 604. & 605.
Cyclamen Byzantinum. Bot. Monf. 81.
Le Pain de pourceau.

HABITAT *Monspeli*; au *Château Bon*, dans les murail-
 les; à *St. Guillin le désert*, & aux *Capouladoux*, &c.
 Variat foliis cordatis, orbiculatis, reniformibus, ma-
 culatis, floribusque purpureis, carneis, albis vel
 variegatis.

HOSPITATUR sub dio in umbrosis & humidis. Florens
 februario & martio, semina non maturans.

MENIANTHES.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 147.*

Char. secund. *Rad.* horizontalis articulata sarmen-

90 PENTANDRIA MONOGYNIA.

toſa. *Caul.* ſcapoſa axillaris teres. *Fol.* radicalis petiolata vaginans ternato - dignitata, foliolis integerrimis. *Fior.* terminalis racemofa. *Fulc.* bractæ monophyllæ integerrimæ amplexicaules.

Trifoliata. 1. MEN. folius ternatis. *Linn. ſp. pl.* 145.

Trifolium baluſtre. Dod. pempt. 570.

Meniſtriſes 1. & 2. *Tour.* 154.

Le Trefle d'eau.

HABITAT in aquis; à l'Esperon. Foliola ovata æqualia.

Flores ſolitarii ex axillis bractearum. Corollæ intus barbata; calicibus triplo majores. Florens aprilis.

Semina non maturat.

HOSPITATUR ſub dio, in aquario lacuſtri. Perennis.

LYSIMACHIA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 149.

Char. ſecund. *Rad.* horizontalis, radiculis perpendicularibus *Caul.* herbacea ramoſa teres vel tetragona, repens vel erecta. *Fol.* ſimplex integerrima ſubſeſſilis, oppoſita vel verticillata. *Fior.* pedunculata terminalis, paniculata vel ſpicata, nunc axillaris ſimpliciſſima & ſolitaria. *Fulc.* nulla.

* *Floribus terminalibus.*

Vulgaris. 1. LYS. paniculata racemis terminalibus. *Linn. ſp. pl.* 147.

Lysimachia lutea major. Bot. Monſ. 172. *Tour.* 141.

Lysimachia (verticillata) foliis ovato-lanceolatis, floribus ad ſummos ramos ſpicatis. *H. Sauv.* 165. & 130. (oppoſitis.)

Lysimachia lutea ſive ſalicaria. Lob. Icon. 142.

La Corneille.

HABITAT Monſpeli ubique ad aquas. Tripedalis. Folia terna vel quaternaria acuminata. Ramis axillaribus. Flores lutei; folia ramorum ſæpius oppoſita; foli cujuſque nervi omnes propè ipſius margines anastoſiſim ineunt.

Ephemenum. 2. LYS. racemis ſimplicibus terminalibus, petalis obtuſis.

staminibus corolla brevioribus. *Linn. sp. pl.* 146.

Ephemerum Mathioli. *Dod.* 203.

H. SPITATUR sub dio. Annua.

3. LYS. spicis terminalibus patulis lanceolatis, staminibus corolla longioribus. *Linn. sp. pl.* 147. *Atropurpurea.*

Lysimachia orientalis angustifolia, flore purpureo.

Tour. cor. 7.

H. SPITATUR sub dio. Radix perennis (apud nos.)

* *Floribus axillaribus.*

4. LYS. foliis subulatis, pedunculis folio brevioribus, caule erecto ramulifimo. *Linum foliatum.*

Lysimachia calycibus corollam superantibus, caule, &c.

Sauv. 130. *Linn. sp. pl.* 148.

Linum minus stellatum. Bor. Monf. pag. 163. *Lon.* 162.

Lysimachia annua minima polygonifolia. Tour. 142.

HABITAT Monspeli; à Castelnau, Gramont, à Caune les. Annua; vix sesquiuncialis.

5. LYS. foliis orbiculatis, acuminatis, sessilibus; pedunculis folio duplo longioribus, caule procumbente. *Nemorum.*

Lysimachia foliis ovatis acutis, floribus solitariis, caule procumbente. Linn. sp. pl. 148.

Anagallis lutea. Lob. Icon. 466.

Lysimachia humifusa, folio rotundiore acuminato, flore luteo. Tour. 142.

HABITAT Monspeli, au-delà des Mateles & de Rouquet ad lœvam juxta rivulos; radix perennis. Caulis sæpè radices agit fibrosas.

6. LYS. foliis orbiculatis obtusis subpetiolatis, pedunculis longitudine foliorum, caule repente. . . *Nummularia*

Lysimachia foliis subcordatis, floribus solitariis, caule repente. Linn. sp. pl. 148. *Sauv.* 134.

Nummularia major lutea. Bor. Monf. 187.

Lysimachia humifusa folio rotundiore, flore luteo. Tour. 141.

L'herbe aux écus ou la nummulaire.

HABITAT Monspeli, à Castelnau, le long du Lès, à Latres. Radix perennis.

7. LYS. foliis ovatis acutiusculis, pedunculis folio longioribus, caule repente. *Tinella.*

Lysimachia foliis orbiculatis planis, floribus solitariis rubellis. Sauv. 135.

92 PENTANDRIA MONOGYNIA.

Nummularia minor purpurascens flore. *Bot. Monf.* 187.

Lysimachia humifusa rotundiore folio, flore purpurascens. *Tour.* 141.

HABITAT Monspeii cum priori; folia vix pisi latitudinem adæquant. Radix perennis.

A N A G A L L I S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 150.

Char. secund. Rad. fibrosa. Caul. herbacea ramosa tetragona. Fol. opposita sessilis simplex integerrima. Flor. axillaris solitaria pedunculata. Fulcr. nulla.

Arvensis. 1. **ANAG.** foliis indivisis, caule procumbente. Linn. sp. pl. 148. *Sauv.* 135.

Anagallis phæniceo flore. *Bot. Monf.* 17. *Tour.* 142.

β. *Anagallis cæruleo* flore. *Bot. Monf.* 17. *Tour.* 142.

Le Mouron; vernaculè *Mourillous*.

HABITAT Monspelii ubique, præsertim in agris circa lucum Gramuntium. Annua. Pedunculi foliis subæquales. Petala crenulata. Filamenta villosa; foliola calycis carinata.

P L U M B A G O.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 176.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. herbacea teres striata ramosa. Fol. alterna simplex integerrima amplexicaulis. Flor. terminalis spicata vel congesta. Fulcr. glandulæ pedicellatæ suprâ calyces.

Europæa. 1. **PLUM.** foliis ovatis ciliatis, floribus congestis, staminibus exclusis.

Plumbago foliis amplexicaulibus. Linn. sp. pl. 151. *Sauv.* 63.

Lepidium dentillaria dictum. *Bot. Monf.* 153.

Plumbago. *Tour.* 140.

La dentelaire ou malherbe.

HABITAT Monspelii ubique; altitudo bicubitalis; folia quandoque obverse-ovata; stamina extrâ tubum; radix perennis.

2. PLUM. foliis ovato-lanceolatis glabris basi attenuatis, floribus spicatis, staminibus inclusis. *Zeylanica.*

Plumbago foliis lanceolatis. *Linn. sp. pl.* 151.

HOSPITATUR sub dio; semper virens & semper florens; & etiam hyeme in hybernaculo & caldario; semina maturans; pedalis diffusa, folia subrus pulverulenta.

CONVOLVULUS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. plant.* 157.

Char. secund. *Rad.* tenuis fibrosa vel ramosa.

Caul. teres herbacea stricta. *Fol.* simplex integra vel pinnata. *Flor.* axillaris, pedunculata, pedunculis uni vel multifloris. *Fulcr.* sæpius nulla; in quibusdam bractæ binæ infrà calyces.

* *Caule volubili.*

1. CONV. foliis sagittatis utrinque acutis, pedunculis unifloris. *Linn. sp. pl.* 153. *Sauv.* 100. *Arvensis.*

Convolvulus minor arvensis. *Bot. Monsf.* 74. *Tour.* 83.

Le petit liseron; vernaculè de *Campaneres.*

HABITAT Monspelii ubique; foliorum petioli breves; pedunculi foliis subæquales.

2. CONV. foliis sagittatis postice truncatis, pedunculis unifloris. *Linn. sp. pl.* 153. *Sepium.*

Convolvulus major albus. *Bot. Monsf.* 73. *Tour.* 81.

HABITAT Monspelii, à *Castelnau*, *Lattes*, aux prés d'*Arene*; scandens & late se extendens suprà arbores; pedunculi longitudine petiolorum; bractæ geminæ cordatæ calycibus majores.

3. CONV. calycibus tuberculatis pilosis. *Linn. sp. pl.* 154. *Hederaceus.*

4. CONV. ceruleus hederaceo, angusto folio. *Tour.* 84.

HOSPITATUR sub dio; folia sæpius globa, lobo intermedio majore acuminato; pedunculi petiolis duplo fere breviores; bractæ subulatæ.

4. CONV. foliis palmatis cordatis sericeis: lobis repandis, pedunculis bifloris. *Linn. sp. pl.* 156. *Alchacoides.*

Convolvulus foliis cordato-digitatis sericeis, foliolis linearibus, intermediis. *Sauv.* 202.

Convolvulus peregrinus pulcher folio betonicæ. *Bot. Monsf.* 74. *Tour.* 85.

94 PENTANDRIA MONOGYNIA.

Convolvulus betonicæ folio argenteus, &c. *Barr. Icon.* 312.

HABITAT ultra montem Cetium in loco dicto *le Nazareth*; ibi florentem Aprili & Maio vidimus & versus *Meze*.

* *Caule prostrato nec volubili.*

Cucurnm. 5. CONV. foliis lanceolatis obtusis sericeis. *Linn. sp. pl.* 157. *Sauv.* 56.

Convolvulus argenteus umbellatus erectus. *Tour.* 84.

β. *Convolvulus spicæfolius argenteus repens.* *Tour.* 84.

Convolvulus minor argenteus repens acaulis ferme. *Tour.* 84.

Convolvulus minor spicæfolius hispanicus. *Barr. Icon.* 311.

HABITAT Monspelii ubique in sterilibus, à *Sellenenue*, *Montferrier*, *Castelnau*. Flores subcapitati.

Cantabrica. 6. CONV. foliis lineari lanceolatis acutis, caule ramoso recto, pedunculis bifloris. *Sauv.* 156. *Linn. sp. pl.* 158.

Convolvulus linariæ folio. *Tour.* 84.

Convolvulus minimus spicæfolius, vel *stachadi citrinæ* aut *linariæ folio.* *Bot. Monf.* 741.

HABITAT Monspelii, passim-priori vulgatio; pedunculi foliis quadruplo longiores; altitudinem sesquipedalem attingit.

Tricolor. 7. CONV. foliis lanceolato-ovatis glabris, caule declinato, floribus solitariis. *Linn. sp. pl.* 158.

Convolvulus lusitanicus flore cyaneo. *Tour.* 83. *Sauv.* 65.

Convolvulus azureus longifolius, niveo umbilico. *Bocc. mus.* 76. *Barr. Icon.* 321. & 322.

HOSPITATUR sub dio; annuus; caulis interdum rubens uti & nervi foliorum subtus, pedunculi foliis longiores.

8. CONV. foliis reniformibus, pedunculis unifloris. *Linn. sp. pl.* 159.

Convolvulus maritimus nostras rotundi-folius. *Tour.* 83.

Soldanella sive *brassica marina.* *Lob. Icon.* 602.

HABITAT Monspelii in maritimis; bractæ calycibus majores cordatæ binæ.

I P O M E A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 158.

Char. secund. *Rad.* ramosa teres. *Caul.* herbacea volubilis striata angulata. *Fol.* alterna petiolata simplex integerrima integra, vel incisa. *Flor.* axillaris pedunculata, pedunculis uni vel multifloris. *Fulcr.* nulla.

1. IPOM. foliis pinnatifidis linearibus, floribus solitariis. *Quamoclit.*
Linn. sp. pl. 159.

Convolvulus pennatus exoticus rarior. *Bauh. Pin.* 398.

Convolvulus pennato folio gelsemini flore quamoclit foliis tenuiter incisus & pennatis. *Tour.* 116.

HOSPITATUR in caldario; annua; variat pedunculis multifloris.

2. IPOM. foliis cordatis acuminatis basi angulatis, pedunculis multifloris. *Linn. sp. pl.* 160. *Coccinea.*

Ipomea foliis cordatis integerrimis, limbo floris quinquefido. *Sauv.* 114.

Quamoclit americana foliis amplissimis angulatis. *Tour.* 116.

HOSPITATUR sub dio; pedunculi foliis multo longiores.

3. IPOM. foliis cordatis integerrimis, floribus confertis, corollis indivisis. *Sauv.* 114. *Linn. sp. pl.* 161.

Quamoclit foliis amplissimis cordiformibus. *Tour.* 116.

HOSPITATUR sub dio; in hortis apud nos colitur; facta indigena.

4. IPOM. foliis trilobis cordatis, pedunculis trifloris. *Triloba.*
Linn. sp. pl. 161.

HOSPITATUR sub dio; annua.

P O L E M O N I U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 159. Adde filamenta duo longiora, tria breviora.

Char. sec. *Rad.* fibrosa. *Caul.* herbacea striata erecta simplex. *Fol.* alterna sessilis imparipinnata, foliolis integerrimis. *Flor.* terminalis ramosa racemosa. *Fulcr.* nulla.

1. POL. calycibus corollæ tubo longioribus. *Linn. sp. Caruleum.*
pl. 162.

Polemonium vulgare cæruleum. Tour. 146. & album polemonium folus ensiformibus. Sauv. 220. La Valeriane grecque.

HOSPITATUR sub dio & in caldario. Perenne. Caulis æqui-pedalis. Pedunculi plurimi terminales, multiflori, alterni; pistillum staminibus longius; stamina longitudine corollæ; florens Maio & Junio.

CAMPANULA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 161.

Char. sec. Rad. fusiformis. Caul. herbacea, teres vel angulata, nunc simplex aut ramosa aut dichotoma. Fol. simplex integerrima, alterna vel opposita, petiolata aut sessilis; vel etiam inferior petiolata; superior sessilis. Flor. terminalis spicata racemosa paniculata vel axillaris conglomerata. Fuler. glandulæ ad margines foliorum; bractæ ad basim pedunculorum solitariae.

* *Foliis lævioribus angustioribus.*

- Rotundifolia.* 1. CAMP. foliis radicalibus reniformibus, caulinis linearibus. Linn. sp. pl. 163.
Campanula foliis linearibus integerrimis, floribus terminalibus, caule erecto simplici. Sauv. 65.
Campanula alpina linifolia cærulea. Bot. Monsf. 47. Icon. 46. Tom. III.
Campanula minor rotundifolia vulgaris. Tour. 111. & alpina. 112.
 HABITAT Monspeli, au Mont St. Loup, à l'Esperou. Folia omnia alterna.
- Rapunculus.* 2. CAMP. foliis undulatis radicalibus lanceolato-ovalibus panicula coarctata. Linn. sp. pl. 164.
Campanula foliis radicalibus lanceolato-ovalibus, caulibus reflexis. Sauv. 65.
Rapunculus esculentus. Bot. Monsf. 220.
Campanula radice esculenta, flore cæruleo. Tour. 111. vernaculè de Repouinchous.
 HABITAT Monspeli ubique circa Bontouner, Castelnaud.
- Perfoliata.* 3. CAMP. foliis radicalibus obovatis, caulinis lanceolato-

lato-linearibus subserratis sessilibus remotis. *Linn. sp. pl. p. 164.*

Campanula foliis linearibus serratis, floribus distitis longe petiolatis. *Sauv. 56.*

Rapunculus persicifolius magno flore. *Bot. Monsf. 220.*

Campanula persicifolia. *Tour. 111.*

HOSPITATUR sub dio; perennis; in hortis colitur.

Floret æstate. Folia omnia alterna.

4. CAMP. foliis ovatis glabris subserratis, caule erecto *Pyramidalis.*
paniculato, ramulis brevibus. *Linn. sp. pl. p. 164.*
Sauv. 106. n°. 156.

Campanula pyramidalis altissima. *Tour. 109.*

Campanula lactescens fetidior. *Clus. Hist. CLXXII.*

La Pyramidale, vernaculè *la Pyramidala.*

HOSPITATUR in hybernaculo; altitudo humana, & altior. Folia radicalia ovata vel cordata petiolata, inferiora ovata vel ovato-lanceolata subsessilia. Florens autumnò & hyeme.

* * *Foliis scabris latioribus.*

5. CAMP. caule angulato foliis petiolatis, calycibus *Trachelium.*
ciliatis, pedunculistrifidis. *Linn. sp. pl. 166.*

Cervicaria major. *Dod. Pempt. 164.*

Campanula vulgatio foliis urticæ, vel major & asperior. *Bot. Monsf. 45. Tour. 109.*

HABITAT Monspelii à l'Esperou, à St. Guillin le Desert, au Capouladou. Folia alterna petiolata.

HOSPITATUR in frigidario.

6. CAMP. caule angulato simplici, floribus sessilibus *Glomerata.*
capitulo terminali. *Linn. sp. pl. p. 166.*

Campanula pratensis flore conglomerato. *Bot. Monsf. 45. Tour. 110.*

Rapunculus calyculatus. *Barr. Icon. 523. n°. 3.*

HABITAT Monspelii, au Bois de Valene & à Prades. Ipsam vidi à Lamalou variantem caule tereti, foliis omnibus cordatis obtusis; floribusque solitariis axillaribus sessilibus, capitulo terminali. In horto culta, folia caulina, inferiora petiolata, summa sessilia, acuminata vel obtusa.

HOSPITATUR in frigidario.

7. CAMP. capitulis quinque locularibus tectis, calycis sinubus reflexis. *Linn. sp. pl. 167.* *Medium.*

98 PENTANDRIA MONOGYNIA.

Campanula calycibus à tergo lamellis quinque notatis. *Sauv.* 65.

Campanula foliis obtusis serratis hispida, floribus in fauce lanuginosis. *Sauv.* 64.

Campanula floribus echii, floribus villosis. *Bot. Monf.* 45. *Tour.* 110.

HABITAT cum priori.

HOSPITATUR in frigidario.

* *Caule sub-diviso.*

Canariensis. 8. CAMP. foliis hastatis dentatis oppositis petiolatis, capsulis quinquelocularibus. *Linn. sp. pl.* 168.

Campanula Canariensis atriplicis folio, tuberosa radice. *Tour.* 109.

HOSPITATUR in caldario; *caulis* fistulosus glaucus teres brachiatus; *folia* denticulis alternis minoribus. *Petioles* foliis dimidio breviores. *Rami* axillares patentés. *Flores* ex dichotomia, solitarii pedunculo brevi. *Corollarum* laciniae denticulatae; *stamina* pistillis breviora. *Pistillum* longitudine corollae; autumno germinat plantis vicinis intricata; *florens* hyeme. *Folia* omnia primo vere decidunt. *Radix* perennis. Variat staminibus sex, corollis calycibusque sexfidis.

Speculum. 9. CAMP. caule diffuso ramosissimo, foliis oblongis subcrenatis; calycibus solitariis, corolla longioribus. *Linn. sp. pl.* 168. Capsulis prismaticis.

Campanula arvensis erecta. *Tour.* 112.

Onobrychis arvensis, seu Campanula arvensis erecta. *Bot. Monf.* 45.

HABITAT ubique Monspeli. *Radix* teres; *caulis* semipedalis; *flores* saepius terni, rami terminales; *folia* omnia alterna sessilia.

Erinn. 10. CAMP. caule dichotomo, foliis sessilibus utrinque dentatis *Linn. sp. pl.* p. 169.

Campanula minor foliis incis, annua. *Tour.* 112.

Rupunculus minor foliis incis. *Bot. Monf.* 220.

HABITAT Monspeli ubique in satis.

Perfoliata. 11. CAMP. caule simplici, foliis cordatis amplexi-caulibus dentatis, floribus aggregatis sessilibus. *Linn. sp. pl.* p. 169.

Campanula pentagonia perfoliata. *Tour.* 112.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 99

Rapunculum minimum rotundifolium verticillatum
flore purpuro-violaceo. *Barr. icon.* 1133.

HOSPITATUR in caldario. Annua.

Obs. Species nullæ apud nos semina maturant, ex-
ceptis 9^a. & 10^a.

PHYTEUMA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 162.

Char. sec. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea sim-
plex teres. *Fol.* alterna sessilis simplex integer-
rima vel integra, vel inferior petiolata, su-
perior sessilis. *Flor.* terminalis, capitata vel
spicata. *Fulc.* glandulæ ad margines foliorum.

Nota. Facie propriâ solo tubo corollæ longissimo
à campanulis dignoscitur.

1. PHYT. capitulo sub rotundo, foliis linearibus inte- *Hemispharica*
gerrimis. *Linn. sp. pl.* p. 170.

Phyteuma foliis linearibus, floribus capitatis. *Sauv.* 50.

Rapunculus montanus gramineus corniculatus, *Barr.*
Icon. 523. n^o. 3.

Rapuntium folio gramineo. *Tour.* 113.

HABITAT à l'Esperou.

HOSPITATUR in frigidario.

2. PHYT. capitulo sub-rotundo, foliis serratis, radica- *Orbicularis,*
libus cordatis. *Linn. sp. pl.* 170.

Rapunculus folio oblongo, spica orbiculari. *Tour.* 113.

Phyteuma foliis linearibus, floribus capitatis. *Sauv.* 51.

Rapunculus corniculatus cæruleus minor. *Barr. Icon.*
524. & 525.

HABITAT cum priori. Vidi prope *Villemagne & Val-*
magne variantem folus caulinis inferioribus, cor-
datis, petiolatis, profunde incis, superioribus
sessilibus ovatis sessilibus.

3. PHYT. spica oblonga, capsulis bilocularibus, foliis *Spicata,*
radicalibus cordatis. *Linn. sp. pl.* 171.

Rapunculus spicatus sive *comosus cæruleus.* *Bot. Monf.*
220. *Tour.* 113. & albus.

Rapunculum alopecurum flore albo italicum. *Barr.*
Icon. 892.

La Raiponce.

HABITAT Monspelii cum prioribus, & à St. Guillin
le Desert. G ij

100 PENTANDRIA MONOGYNIA.

- Comosa.* 4. PHYT. fasciculo terminali sessili, foliis dentatis, radicalibus cordatis. *Linn. sp. pl. p. 171.*
Rapunculus alpinus corniculatus. Tour. 113.
Trachelium minus petraeum ponæ. Barr. Icon. 889.
 HABITAT copiosè in declivibus, circa *Villemagne & Fougere.*

TRACHELIUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 163.*

Char. sec. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea teres simplex. *Fol.* alterna petiolata simplex integra. *Flor.* paniculato-corymbosa terminalis. *Fulc.* nulla.

- Azureum.* 1. TRA. foliis ovatis serratis, corymbis compositis. *Linn. virid. Clus. 17.*
Trachelium azureum. Linn. sp. pl. p. 171. Tour. 130. Sauv. 173.
Valeriana caerulea urticifolia. Barr. Icon. 683.
 HOSPITATUR sub dio. Perennis; semina maturans.

SAMOLUS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 172.*

Char. sec. *Rad.* fibrosa. *Caul.* herbacea teres simplex. *Fol.* alterna sessilis simplex integerrima. *Flor.* terminalis racemosa. *Fulc.* nulla.

- Valerandi.* 1. SAM. *Linn. sp. pl. pag. 171. Sauv. 65. Tour. 143.*
Anagallis aquatica folio rotundo non crenato. Bor. Monf. 18.
Anagallis aquatica tertia. Lob. Icon. 466.
Le Mouron d'eau; vernaculè, lou Pansfourmen.
 HABITAT *Monspeli, à Lattes, à Castelnau, à Sellenue* ad aquas. Pedunculi laterales folium unicum gerunt ovatum; terminalis nudus; variat radice simplici tenuiori.

COFFEA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 169.*

Char. sec. *Rad.* lignosa. *Caul.* arborea. *Fol.* opposita sessilis simplex integerrima. *Flor.*
Fulc.

- Aralica.* 1. COF. *Linn. sp. pl. pag. 172.*

Le Caffé ; vernaculè *lou Caffé*.

HOSPITATUR in caldario ; semper virens. Nondum floruit.

L O N I C E R A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 174.

Char. sec. *Rad.* lignosa. *Caul.* fruticosa volubilis vel erecta. *Fol.* opposita, sessilis simplex integerrima. *Flor.* axillaris vel terminalis, capitata vel verticillata, pedunculata vel sessilis. *Fulc.* nulla.

* *Periclymena caule volubili.*

1. LON. floribus verticillatis terminalibus sessilibus, foliis summis connato-perfoliatis. *Linn. sp. pl. pag. 173. Sauv. 139.* *Caprifolium.*

Periclymenum perfoliatum. Bot. Mons. 201.

Caprifolium italicum. Tour. 608.

Chevre-feuille.

HABITAT Monspelii ubique, à *Castelnau, Gramont, &c.*

2. LON. capitulis ovatis imbricatis terminalibus, foliis omnibus distinctis. *Linn. pag. 173. Sauv. 139.* *Periclymenum.*

Periclymenum non perfoliatum germanicum. Bot. Mons. 200.

Caprifolium germanicum. Tour. 608.

Vernaculè utraque, *Herbe de Pantacouste.*

HABITAT cum priori.

* *Chamæcerasa pedunculis bifloris.*

3. LON. pedunculis bifloris, baccis distinctis, foliis integerrimis pubescentibus. *Linn. sp. pl. pag. 174. Sauv. 140.* *Xylosteum.*

Chamæcerasus dumetorum fructu gemino rubro. Tour. 609.

Caprifolium erectum minus xylostei Dodonæi species. Barr. Icon. 511.

HOSPITATUR sub dio.

HABITAT à l'*Esperou*, à *Villemagne*, à *Fongeres*, à *Meyrucis*. Folia serrulata. Variat folus ramorum alternis.

4. LON. pedunculis bifloris, baccis coadunatis didymis. *Linn. sp. pl. p. 174.* *Alpigena.*

102 PENTANDRIA MONOGYNIA.

Chamaecerasus alpigena. Lob. Icon. 173.

Lonicera pedunculis b. floris, foliis ovatis acutis integris. Sauv. 140.

Chamaecerasus alpina, fructu rubro gemino punctis duobus notato. Tour. 609.

HABITAT cum priori.

M I R A B I L I S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 175.

Char. sec. *Rad. carnosae rapacea. Caul. herbacea dichotoma teres. Fol. opposita simplex integerrima, inferior petiolata, floralis sessilis. Flor. axillaris aggregata. Fulc. nulla.*

Jalappa. 1. MIRAB. corollarum laciniis obtusis emarginatis tubis brevibus.

Mirabilis. Linn. sp. pl. p. 177.

Jalappa. Tour. 130.

La Belle de nuit; vernaculè Belle de nuit.

2. Mirabilis corollarum laciniis acuminatis bifidis tubis longissimis.

Jalappa fructu rugoso. Tour. 178.

Le vrai Jalap.

HOSPITATUR sub dio. Radix perennis.

C O R I S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 183.

Char. secund. *Rad. lignosa ramosa. Caul. subfruticosa. Fol. sparsa sessilis simplex, integerrima. Flor. terminalis spicata. Fr. aculei supra calyces; 2. glandulae infra denticulos calycis.*

Monspeliensis. 1. CORIS.

Coris. Linn. sp. pl. 177. Sauv. 46.

Coris caerulea maritima. Bor. Monf. 78. Tour. 652.

HABITAT Monpelii ad mare à Selleneuve & auprès de Monferrier, à droite, au Martinet de Mr. Boulet, ibi in pinetis.

HOSPITATUR sub dio. Plantula palmaris fruticosa perennis; folia linearia ciliata. Vidi annuam circa la Verune à droite.

V E R B A S C U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 182.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea teres vel angulata, simplex vel ramosa. *Fol.* sparsa simplex integra sessilis, nunc inferior petiolata, superior sessilis, nunc decurrens aut amplexicaulis. *Flor.* terminalis spicata vel axillaris sessilis. *Fulcr.* bractæ in spicis foliaceæ.

1. VERB. foliis decurrentibus utrinque tomentosis. Linn. *Thapsus*, sp. pl. 177. Spica indivisa. Sauv. 65.
Verbascum flore luteo magno; folio maximo. Bot. *Monf.* 174.
Verbascum maslatifolium luteum. Tour. 146.
Le Bouillon blanc, vernaculè.
HABITAT Monspeli, à Lattes, Castelnau.
2. VERB. foliis cuneiformibus oblongis. Linn. sp. pl. *Lychnis*, 177.
Verbascum pulverulentum flore luteo parvo. Bot. *Monf.* 274. Tour. 147.
Verbascum foliis lanceolatis crispis crenatis incanis racemo terminali. Sauv. 66. & 105.
HABITAT Monspeli, au-delà de Selleneuve & à Lattes.
3. VERB. foliis cordato-oblongis petiolatis. Linn. sp. *Nigra*, pl. 178.
Verbascum foliis ovatis crenatis subtus tomentosis caule angulato. L. Sauv. 65. & 104.
Verbascum nigrum flore ex luteo purpurascens. Bot. *Monf.* 178. Tour. 147.
HABITAT Monspeli circa Rouquet, Valene. Caulis rubens.
4. VERB. foliis amplexicaulibus oblongis glabris, pedunculis axillaribus solitariis. Linn. sp. pl. 178. *Blattaria*.
Blattaria lutea folio longo laciniato. Bot. *Monf.* 38. Tour. 147.
Verbascum foliis glabris serrato-dentatis radicalibus sinuatis. Sauv. 105.
HABITAT Monspeli circa la Peiffine; ad basim foliorum linearum duarum elevarum decurrunt in caulem.
5. VERB. foliis radicalibus oblongis sinuatis undulatis *Sinuatum*.

tomentosis, caulinis cordatis amplexicaulibus nudiusculis. *Linn. sp. pl.* 178.

Verbascum foliis pinnato-sinuatis hirsutis subtus tomentosis. *Sauv.* 276.

Verbascum nigrum folio papaveris corniculati. *Bor. Monf.* 274. *Tour.* 147.

Verbascum foliis radicalibus pinnatifido-repandis tomentosis, caulinis ramis primis oppositis amplexicaulibus. *Linn. Syst. nat. pag.* 931.

HABITAT Monspel i ubique.

D A T U R A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 177.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. herbacea angulata. Fol. geminata petiolata simplex integra. Flor. solitaria pedunculata interfoliacea. Fulcr. spinæ supra capsulas.

Stramonium. 1. DAT. pericarpis spinosis erectis ovatis. *Linn. sp. pl.* 179. *Sauv.* 100. & 274.

Solanum fructum, pomo spinoso oblongo, flore albo. *Bor. Monf.* 243.

Stramonium sativum pomo spinoso oblongo & violaceo. *Tour.* 118.

L'endormie; vernaculè l'herbe de las raoupas.

HABITAT Monspel i versùs Viols, Grabels, Vic, Rouzagues, corollæ longiores quam in omnibus.

Ferox. 2. DAT. pericarpis spinosis erectis: spinis summis marginibus conniventibus. *Linn. Syst. nat.* 932. A. *Anait. acad. tom.* III. pag. 473.

Stramonium longioribus aculeis. *Barr. Icon.* 1112.

Stramonium ferox. *Bucc. Sicil.* 50. *Tour.* 119.

La pomme épineuse.

HOSPITATUR sub dio; pedunculus calyx & corolla vix biuncialem obtinent longitudinem.

Metel. 3. DAT. pericarpis spinosis nutantibus globosis. *Linn. sp.* 179. *Sauv.* 100. & 275.

Stramonium pomo spinoso rotundo, longo flore albo simplici. *Tour.* 118.

Stramonium peregrinum. *Lob. Icon.* 164.

HOSPITATUR sub dio.

HABITAT cum priori.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 105

Obf. in fingulis fpeciebus prodeunt pedunculi plurimi è divifione caulis & ramorum.

HYOSCYAMUS.

Char. prim. vid. Linn. gen. pl. 178.

Char. fecund. *Rad.* napiformis. *Caul.* herbacea teres fimplex. *Fol.* alterna patens fimplex integerrima, feffilis aut petiolata *Flor.* axillaris folitaria fecunda, feffilis vel petiolata. *Fulc.* ..

1. HYOS. foliis amplexicaulibus. Linn. *fp. pl.* 179. *Niger.*
Hyofcyamus vulgaris & niger. *Bot. Monf.* 134. *Tour.* 118.

La jufquiame, vernaculè *la careillade*, fèd improprie.

HABITAT Monfpeli à *Lattes*, à *Castelnau*.

2. HYOS. foliis petiolatis floribus feffilibus. Linn. 180. *Albus.*
Sauv. 275.

Hyofcyamus albus major. *Bot. Monf.* 134. *Tour.* 118.

Vernaculè *la careillade*.

HABITAT ubique; priori frequentior; folia attenuata ad bafim in petiolum. Calyces ftriis elevatis.

3. HYOS. foliis petiolatis, floribus pedunculatis. Linn. *Aureus.*
fp. pl. 180.

Hyofcyamus creticus luteus major. *Bot. Monf.* 134. *Tour.* 118.

HABITAT Monfpelii, *au-delà de Boutounet & de Castelnau*, rara hodie apud nos.

NICOTIANA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 179. Adde lacinia una calycis fæpius longior.

Char. fecund. *Rad.* ramofa. *Caul.* herbacea teres. *Fol.* alterna fimplex integerrima decurrens vel petiolata. *Flor.* terminalis fimplex, racemofa vel paniculata. *Fulc.* nulla.

1. NIC. foliis decurrentibus, lanceolatis. *Tabacum.*
Sana fancta Indorum. *Lob. Icon.* 584.
Nicotiana major latifolia. *Tour* 117.
Nicotiana foliis lanceolatis. Linn. *fp. pl.* 180. *Sauv.* 104.


Le tabac; vernaculè *lou tabac*.

HOSPITATUR fub dio; annua. Folia ferè omnia am-

- plexicaulia; altitudo humana. Corollæ roseæ.
Ruffica. 2. NIC. foliis ovatis petiolatis floribus sub-capitatis.
 Nicotiana foliis ovatis. *Linn. sp.* 180. *Sauv.* 100.
 Sana sancta minima. *Lob. Icon.* 584.
 Nicotiana minor. *Tour.* 117.
La priapée.
 HOSPITATUR sub dio. Annua. Vix pedalis. Corolla
 viridis vel flavescent; tubo calycibus duplo longiore.
Paniculata. 3. NIC. foliis cordatis floribus paniculatis, tubis clavatis.
Linn. sp. pl. 180.
 HOSPITATUR sub dio. Annua. Bipedalis. Folia petio-
 lata. Corollæ virides; tubo longissimo.
Glutinosa. 4. NIC. foliis cordatis petiolatis, floribus racemosis se-
 cundis.
 Nicotiana foliis cordatis, corollis racemosis subrin-
 gentibus; calycibus inæqualibus. *Linn. sp. pl.* 181.
 Tabacum sive herba sancta minor. *Lob. Icon.* 584.
 HOSPITATUR sub dio. Annua, altitudo nicotianæ
 primæ. Corollæ roseæ.

A T R O P A.

- Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 180. & 181.
 Char. secund. *Rad.* fibrosa vel napiformis, sim-
 plex aut geminata. *Caul.* herbacea foliosa aut
 scaposa, teres aut angulata. *Fil.* petiolata sim-
 plex integra vel integerrima; nunc radicalis,
 nunc caulina alterna solitaria, vel geminata inæ-
 qualis. *Flor.* solitaria pedunculata, nunc radi-
 calis, nunc caulina interfoliacea aut laterifolia.
Fulcr. nulla.
Humifusa. 1. ATROPA foliis geminatis, calycibus polycarpis caule
 humifuso.
 HOSPITATUR sub dio; semper virens & florens toto
 anno; hyeme in caldario apricatur.
 Humifusa valde ramosa; folia geminata (altero bre-
 viore) per petiolum decurrentia ciliata carnosæ
 integerrima; pedunculi uniflori interfoliacei. *Calix*
 quinquangularis, quinquefidus, laciniis duabus
 tribulve sæpius coalitis. *Corolla* campanulata nec
 lobata cinerea venis cæruleis picta. *Stamina*
 cæruleiscentia villosissima. Baccæ tres quatuor vel





PENTANDRIA MONOGYNIA. 107

quinque monospermæ, in quolibet calice. *Pedunculi* fructiferi folio majore longiores, floriferi ipso met folio breviores... Cuinam ipsa debeatur nescimus. Missa fuerat pro *atropa physalode*.

2. ATR. foliis ovatis radicalibus, scapis unifloris. *Mandragora*.

Mandragora. Linn. *sp. pl.* p. 181. *Sauv.* 14

Atropa acaulis. Linn. *Syst. nat.* pag. 933.

Mandragora fructu rotundo. Tour. 76.

La Mandragore.

HOSPITATUR sub dio. Radix perennis. Folia semipedalia in petiolum decurrentia.

3. ATR. folis geminatis, calycibus monocarpis, caule erecto. *Belladonna*.

Atropa caule herbaceo, foliis ovatis integris. Linn. *sp. p.* 181. *Sauv.* 104.

Solanum lethale. Bor. *Monf.* 243.

Belladonna majoribus foliis & floribus. Tour. 77.

La Belladone.

HABITAT Monspelii. Au Puy de St. Loup, au Capouladou. Corollæ ferrugineæ. Folia integerrima ovata. Caulis & rami teretes.

4. ATR. foliis solitariis. *Physalodes*.

Atropa foliis sinuato-angularis, calycibus clausis acutangulis. Linn. *sp. pl.* p. 181.

HOSPITATUR sub dio. Annua. Vide egregiam Linnæi descriptionem sub suo nomine *sp. pl.* 181. Apud nos ad altitudinem humanam excrescit.

PHYSALIS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 197.

Char. sec. Rad. ramosa. Caul. herbacea teres vel angulata. Fol. geminata inæqualis petiolata, simplex integra vel integerrima Flor. interfoliacea solitaria vel aggregata, sessilis vel pedunculata. Fulc. nulla.

* Perennes.

4. PHYS. caule fruticoso, ramis rectis, floribus confertis. Linn. pag. 182. *Somnifera*.

Physalis caule fruticoso tereti, foliis ovatis integerrimis, floribus confertis Sauv. 104.

Alkekengi fructu parvo verticillato. Tour. 151.

108 PENTANDRIA MONOGYNIA.

Solanum majus vesicarium coralloides. *Barr. Icon.* 149.
HOSPITATUR sub dio. Corollæ viridescentes vix calice majores. Caulis tomento cinereo tectus. Folia apud nos geminata; flores subsessiles.

- Alkekengi.* 2. PHYS. floribus solitariis pedunculatis.
Physalis foliis geminis. *Linn. sp. pl.* p. 180. *Sauv.* 104.
Solanum vesicarium. *Bot. Monf.* 243.
Alkekengi officinarum. *Tour.* 131.
L'Alkekengi ou Coqueret.

HABITAT Monspelu, à Frontignan, Miraval. Vidi ipsam inter aquas Bellilucanas & Bouzigues secus stagnum. Calix quinquedentatus.

* *Annua.*

- Pubescens.* 3. PHYS. ramosissima, foliis villosis-viscosis, pedunculis nutantibus. *Linn. sp. pl.* p. 183.
Alkekengi virginianum fructu luteo. *Tour.* 131.
Solanum annuum vesicarium procumbens. *Barr. Icon.* 152.
HOSPITATUR sub dio.

SOLANUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 196.

Char. secund. *Rad.* simplex tenuis, ramosa, tuberosa vel fibrosa. *Caul.* herbacea, flexuosa vel fruticosa. *Fol.* alterna petiolata solitaria aut geminata, nunc simplex integra, nunc impari pinnata, foliolis æqualibus & integerrimis, vel inæqualibus & incis. *Flor.* oppositifolia pedunculata, cymosa, racemosa, aut solitaria. *Fulc.* aculei in plurimis supra caulem folia & calyces.

* *Inermia.*

- Pseudo-cap. sicum.* 1. SOL. caule inermi fruticoso, foliis lanceolatis, umbellulis sessilibus. *Linn.* 184. *Sauv.* 58. Floribus solitariis.
Solanum fruticosum bacciferum. *Tour.* 149.
HOSPITATUR sub dio. Caulis perennis glaber; folia (quandoque geminata) integerrima; flores albi; bacca ovo passerino major rubra.
- Dulcamera.* 2. SOL. caule inermi frutescente flexuoso, foliis superioribus hastatis, racemis cymosis. *Linn. sp. pl.* 185.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 109

Solanum caule inermi, &c. *Sauv.* 103. 174.

Solanum scandens seu dulcamara. *Bot. Mons.* 243. *Tour.* 149.

La Douce amere, ou Vigne de Judée; vernaculè, *la Loque.*

HABITAT *Monspeli* passim. Radix perennis.

3. SOL. caule inermi frutescente flexuoso, foliis oblongis lateribus sinuatis; racemis cymosis. *Linn. sp. pl.* 185. *Quercifolium.*

HOSPITATUR in hybernaculo.

4. SOL. caule frutescente subinermi, foliis cuneiformibus sinuato-repandis. *Linn. sp. pl.* 185. *Bomariensa.*

Solanum Americanum arboreescens amygdalifolio undulato, magno flore albo, fructu rubro. *Tour.* 150.

HOSPITATUR in hybernaculo; nunquam semina maturans.

5. SOL. foliis pinnatis, foliolis integerrimis: impari maximo. *Tuberosum.*

Solanum caule inermi herbaceo, foliis pinnatis integerrimis. *Linn. sp. pl.* 185. *Sauv.* 220.

Solanum tuberosum esculentum. *Tour.* 149.

Les Taupinambours; vernaculè, *Taupinambour.*

HABITAT *Monspeli* in hortis. Sponte provenit à l'Esperon, à *Villemagne*, &c. Altitudo pedalis vel sesquipedalis. Folia pinnata, foliolis 5. vel septem; petioli decurrunt in caulem. Annuum.

6. SOL. foliis interrupte-pinnatis, foliolis subæqualibus incisis. *Lycopersicon.*

Solanum caule inermi herbaceo, foliis pinnatis integris, racemis simplicibus. *Linn. sp. pl.* 185.

Lycopersicon Galei. *Tour.* 150.

Solanum caule inermi, &c. *Sauv.* 246.

Les Pommes d'amour.

HOSPITATUR sub dio. Annuum.

7. SOL. caule inermi herbaceo, foliis ovatis dentato-angulatis, umbellis nutantibus. *Linn. sp. pl.* 186. *Nigrum.*

Sauv. 103.

Solanum officinarum baccis rubris, *Bot. Mons.* 243. & nigris. *Ibid.* 148.

La Morelle; vernaculè, *la Mourela.*

HABITAT *Monspeli* ubique. Folia geminata; variat foliis solitariis, pedunculisque unifloris.

** *Spinosa.*

- Melongenæ.* 8. SOL. caule inermi herbaceo, foliis ovatis, tomentosis, nigris; calycibus spinosis. *Linn. sp. pl.* 186. *Sauv.* 103. Et fructu pendulo. *Linn. Syst. nat.* 934.
Melongenæ. Tour. 151.
 Melanzana seu Metongenæ. *Barr. Icon.* n^o. 9.
 9. *Malum Æthiopicum* fructu luteo. *Barr. Icon.* 30.
La Mayenne, ou Aubergine; vernaculè, Aoubergina, ou Viennese.
 HABITAT in hortis. Apricatur.
- Mammosum.* 9. SOL. caule aculeato herbaceo, foliis cordatis quinquelobis utrinque villosis aculeatis. *Linn. sp. pl.* 187. Foliis angulato-lobatis utrinque villosis, sparse aculeatis. *Linn. Syst. nat.* 934.
Solanum Americanum molle, foliorum margine & aculeis flavescentibus, fructu mammoso. *Tour.* 149.
 HOSPITATUR sub dio.
- Indicum.* 10. SOL. caule aculeato fruticoso, foliis angulatis tomentosis integerrimis, aculeis utrinque rectis, calycibus inermibus. *Linn. sp. pl.* 187.
Solanum Indicum spinosum, flore borraginis. *Tour.* 148.
Solanum caule & foliis cuneiformibus, angularis, subvillosis, integerrimis, aculeis, &c. *Linn. Syst. nat.* 935.
 HOSPITATUR in caldario, sempervirens.
- Sodomeum.* 11. SOL. caule aculeis recurvis, foliis sinuatis, subtus tomentosis, utrinque aculeatis, pedunculis aculeatis. *Linn. sp. pl.* 188.
Solanum pomiferum frutescens, Africanum, spinosum, nigricans; borraginis flore, foliis profundè laciniatis. *Tour. inst.* 149.
Solanum caule aculeato fruticoso, foliis obovatis, pinnatifido-sinuatis, obtusis, &c. *Linn. Syst. nat.* 935.
 HOSPITATUR in caldario. Frutex sempervirens.
- Tomentosum.* 12. SOL. caule aculeato fruticoso, foliis villosis cordatis, margine crenatis, calycibus inermibus. *Linn. sp. pl.* 188.
Solanum (pulverulentum) caule aculeato fruticoso, aculeis acerosis, foliis cordatis, inermibus, subrepandis; tenellis purpureo-pulverulentis. *Linn. Syst. nat.* 935.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 112

HOSPITATUR in caldario. Sempervirens, frutex.

53. SOL. caule aculeato fruticoso, foliis lanceolatis angulato-dentatis. *Linn. sp. pl.* 188. *Bahamense.*

Solanum spiniferum frutescens, spinis igneis Americanum. *P. Tour.* 149.

Solanum, &c. foliis lanceolatis subangulatis, costa spinosis. *Linn. Syst. nat.* 935.

HOSPITATUR in caldario. Frutex.

CAPSICUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 195.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea. vel fruticosa angulata. *Fol.* alterna, geminata, petiolata, simplex, integerrima. *Flor.* oppositifolia, pedunculata, solitaria. *Fulc.* nulla.

1. CAPS. caule herbaceo. *Linn. sp. pl.* 188. Pedunculis solitariis. *Linn. Syst. nat.* 935. *Annuum.*

Capsicum siliquis recurvis propendentibus. *Tour.* 152.

Capsicum caule herbaceo. *Sauv.* 103.

Le Corail des jardins, ou Poivre de Guinée; vernaculé de Courals.

HABITAT Mompelii ubique in hortis. Pedunculi sæpius bini.

2. CAPS. caule fruticoso. *Linn. sp. pl.* 189. *Sauv.* 104. *Frutescens.*
Pedunculis geminis. *Linn. Syst. nat.* 935.

HOSPITATUR in caldario. Sempervirens. Folia duplo minora quam in priori; folia quandoque solitaria; pedunculi solitarii vel bini.

Obs. Genera solanorum, atropæ, physalidum & capsici multum affinia & à facie propria difficile distinguenda tum ob obliquam foliorum circumscriptionem, vel etiam firum pedunculorum ad latus foliorum, vel ipsis oppositionem.

LYCIUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 187.

Char. secund. *Rad.* lignosa. *Caul.* fruticosa. *Fol.* sessilis alterna simplex integerrima. *Flor.* axillaris, solitaria. *Fulc.* aculei axillares.

1. LYC. foliis cuneiformibus. *Linn. sp. pl.* 192. *Sauv.* 56. *Europæum.*
Rhamnus cortice albo Mompeliensis. Bot. Mons. 221.

512 PENTANDRIA MONOGYNIA.

Vernaculè, *lous Arnives*; *la Granete d'Avignon*.
 HABITAT Monspeli ad margines satorum & vinearum.
 Floret etiam autumnno.

RHAMNUS.

Char. prim. Vid Linn. gen pl. 184.

Char. secund. Rad. lignosa. Caul. fruticosa. Fol.
 alterna petiolata simplex integra vel integer-
 rima. Tor. axillaris solitaria pedunculata; pe-
 dunculis uni vel multifloris. Fulc. nulla; vel acu-
 lei, vel spinæ laterifoliæ simplices vel termi-
 nales.

* *Inermes.*

Frangula. 1. RHAM. floribus monogynis hermaphroditis, foliis
 integerrimis. Linn. sp. pl. 193.

Alnus nigra baccifera. Bot. Monf. 290.

Frangula. Tour. 612.

HABITAT Monspeli in sylvâ *Valene*, ubi variat foliis
 minutissimè serratis.

** *Spinosi.*

Alaternus. 2. RHAM. spinis geminis deciduis, foliis lanceolatis ser-
 rato-spinosis.

Rhamnus inermis, floribus dioicis, stigmate triplici.
 Linn. sp. pl. 193. Sauv. 95.

Phytica elatior. Bot. Monf. 203.

Alaternus. Tour. 595.

L'Alaterne, *Bourgespine*; vernaculè, *l'Alader*.

HABITAT Monspeli ad mare, in luco Gramuntio, &
 à *Valene*. Spinæ duæ æquales minimæ nigrae utrin-
 que ad latus foliorum erectæ, autumnno deciduæ.

Catharticus. 3. RHAM. spinis terminalibus, floribus quadrifidis dioi-
 cis. Linn. sp. pl. 193.

Rhamnus catharticus. Bot. Monf. 222. Tour. 593.

Le N-rprun.

HABITAT Monspeli ad dextram & ad lavam secus
 amnem, à *Salaz on*, & ultra lucum Gramuntium.

*** *Aculeati.*

Paliurus. 4. RHAM. aculeis geminis inæqualibus, foliis trinerviis
 subserratis, pedunculis tomentosis, fructibus margine
 membranaceo, clypeiformibus.

Rhamnus

PENTANDRIA MONOGYNIA. 113

Rhamnus aculeis geminatis, inferiore reflexo, floribus trigynis. Linn. sp. pl. 194. Sauv. 306.

Rhamnus five paliurus folio jujubino. Bot. Monf. 221. Paliurus. Tour. 616.

Le Paliure; vernacule fructus dicuntur lous Ca, elers.

HABITAT Monspeli, à la Mouson, Sellenewoe, Gramont, &c.

5. RHAM. aculeis geminis subæqualibus, foliis oblique ovatis trinerviis serratis, pedunculis confertis, fructibus ovatis. *Zizyphus.*

Rhamnus aculeis geminatis rectis, floribus digynis, foliis ovato-oblongis. Linn. sp. pl. 194. Sauv. 39.

Zizypha sylvestris & sativa. Bot. Monf. 283.

Zizyphus. Tour. 617.

Le Jujubier; vernaculè, lou Guindouf. cr.

HABITAT Monspeli ubique in hortis & agris.

EVONYMUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl.

Char. secund. Rad. lignosa. Caul. arborea. Fol. opposita petiolata simplex integra. Flor. axillaris multiplex pedunculata sub-dichotoma. Fruct. nulla.

1. EVON. foliis obtuse serratis, capsularum angulis obtusis. *Europæus.*

Evonymus floribus plerisque quadrifidis. Linn. sp. 197.

Evonymus vulgaris, gravis rubentibus. Bot. Monf. 23. Tenuifolius. Tour. 617.

2. Evonymus foliis acute & argute serratis, capsularum angulis acutis membranaceis. *Latifolius.*

3. Evonymus latifolius. *Tour. 617.*

Le Fusain, ou Bonnet de Prêtre.

HABITAT Monspeli, frequens juxta Ledum amnem.

Obs. Tenuifolii pedunculi multiflori virides; folia sæpè integerrima; latifolii pedunculi biflori triflori, rubentes longissimi; capsulæ duplo majores quàm in priori.

DIOSMA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 206.

Char. secund. Rad. lignosa. Caul. fruticosa. Fol. ... Flor. ... Fruct. ...

114 PENTANDRIA MONOGYNIA.

Rubra. 1. DIOS. foliis linearibus acutis glabris, subtus bifariam punctatis. *Linn. sp. pl.* 198.

Diosma foliis linearibus mucronatis glabris carinatis, &c. *Linn. Syst. nat.* 930.

HOSPITATUR in caldario. Fruticosa sempervirens. Hanc elegantissimam plantulam ex horro Parisino attulerat Franciscus Imbert, Universitatis Cancellarius. Perijt primo anno.

R I B E S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 202.

Char. secund. Rad. lignosa. Caul. fruticosa. Fol. alterna petiolata simplex lobata. Flor. racemosa axillaris, vel solitaria. Fulc. aculei in caule, bracteæ infra flores.

* *Ribesia intermedia.*

Rubrum. 1. RIB. inerme racemis glabris pendulis, floribus planiusculis. *Linn. sp. pl. p.* 200.

Ribes inerme, floribus planiusculis, racemis pendulis. *L. Sauv.* 200.

Grossularia multiplici acino, seu non spinosa hortensis, sive Ribes Officinarum. *Tour.* 639.

Le Groselier; vernaculè le Groselier.

HOSPITATUR sub dio. In hortis colitur.

Alpinum. 2. RIB. inerme racemis erectis, bracteis flore longioribus. *Linn. sp. pl. p.* 200.

Ribes inerme floribus planiusculis racemis erectis. *Sauv.* 210.

Grossularia non spinosa. *Bot. Monf.* 123.

Grossularia vulgaris fructu dulci. *Tour.* 640.

HABITAT Montpelii, au nord du mont St. Loup.

Nigrum. 3. RIB. inerme racemis pilosis, floribus oblongis. *Linn. sp. pl. p.* 201. *Sauv.* 210.

Ribes inerme floribus oblongis monogynis. *Sauv.* 210.

Grossularia non spinosa fructu nigro. *Tour.* 640.

Le Cassier ou Cassis; vernaculè le Cassi.

HABITAT Montpelii, à Prades ad dexteram, & à Meyrueis.

* * *Grossularia aculeata.*

Vua crispata. 4. RIB. racemis aculeatis, baccis glabris, petioli bractea monophylla. *Linn. sp. pl. p.* 201.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 115

Ribes ramis aculeatis erectis, fructu glabro. *Sauv.* 210.

Grossularia simplici acino, vel spinosa sylvestris. *Bot.*

Monf. 123. *Tour.* 639.

Le Bluet.

HABITAT Monspelii ubique. Aculei tres longi ad basim petiolorum; bractea infra calycem simplex; caulis undique aculeatus, folia triloba vel quinqueloba; flores sæpe bini.

H E D E R A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 200.

Char. sec. *Rad.* lignosa horizontalis. *Caul.* volubilis fruticosa. *Fol.* alterna petiolata, nunc simplex integerrima, nunc digitato-quinata. *Flor.* terminalis glomerato-racemosa. *Ful.* cirrus oppositifolius ramosus.

1. **HED.** foliis ovatis lobatisque. *Linn. sp. pl. p.* 202.

Helix.

Hedera arborea. Tour. 613.

Hedera corymbosa communis. Bot. Monf. 124.

Le Lierre ordinaire; vernaculè, l'Évre.

HABITAT ubique; arboribus & parietibus adhærens, semper-virens.

2. **HED.** foliis quinatis ovatis serratis. *Linn. sp. pl. p.* 202. *Quinquefolia*

Vitis quinquefolia Canadensis scandens. Tour. 613.

Hedera quinquefolia virginiana. Barr. Icon. 227.

La Vigne vierge, ou Vigne de Canada.

HOSPITATUR sub dio. Hyeme cooperta plantis demortuis; foliola inæqualia, inferiora minora.

V I T I S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 201.

Char. sec. *Rad.* lignosa. *Caul.* fruticosa flexuosa.

Fol. alterna petiolata simplex lobata digitato-quinata. *Flor.* oppositifolia racemosa. *Ful.* cirrus peduncularis.

1. **VIT.** foliis lobatis sinuatis nudis. *Linn. sp. pl. p.* 202. *Vinifera;*

Vitis vinifera. Bot. Monf. 179. *Tour.* 613.

2. *Vitis Corinthiaca alba. Barr. Icon.* 720.

3. *Vitis Labrusca. Bot. Monf.* 181.

La Vigne ordinaire.

4. *Le Raisin de Corinthe.*

116 PENTANDRIA MONOGYNIA.

HABITAT ubique Monspelii; cujus innumerae varietates.

Laciniosa. 2. VIT. foliis quinatis, foliolis multifidis. *Linn. sp. pl.* p. 203. *Sauv.* 180.

Vitis laciniatis foliis. *Tour.* 612.

Vitis Cretica alba laciniatis foliis. *Barr. Icon.* 701.

HOSPITATUR sub dio.

L A G O E C I A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 207.

Char. sec. *Rad.* napiformis. *Caul.* teres herbacea.

Fol. alterna basi dilatata vaginans impari-pinnata. *Flor.* axillaris pedunculata umbellato-capitata. *Fulc.* spinæ supra denticulos foliolorum & involucrorum.

Cuminoides. 1. LAG. *Linn. sp. pl.* p. 203. *Sauv.* 227.

Cuminum sylvestre. *Lob. Icon.* 743.

Cuminoides vulgare. *Tour.* 301.

Le Nil de Lievre.

HOSPITATUR sub dio. Annua. Foliola quandoque omnia tridentata vel in summo caule tantum, denticuli omnes foliorum & radiorum involucri terminantur seta rigidula; folia ad basim latiora denticuloque longiori stipulæformi instructa.

A C H Y R A N T H E S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 211.

Char. sec. *Rad.* lignosa. *Caul.* fruticosa tetragona articulata. *Fol.* opposita petiolata simplex integerrima. *Flor.* terminalis spicata. *Fulcr.* bractæ herbacæ subulatæ tres circa quemlibet calycem, instar calycis.

Apera. 1. ACHYR. calycibus floriferis erectis, fructiferis reflexis spicæ adpressis.

Achyrantes caule erecto, calycibus spicæ adpressis. *Linn. sp. pl.* 205.

Amaranthus Sicularis spicatus. *Tour.* 235.

HOSPITATUR sub dio. Hyeme in caldario; semper florens; altitudinem humanam superans. Ramis patentibus, spicis pedalis.

Obs. Sequenti multum affinis ita ut solo charactere capsularum seu numero feminum differant.

CELOSIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. *Adde* calix coloratus 5phyllus, corolla nulla.

Char. sec. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea striata. *Fol.* alterna petiolata simplex integerrima. *Flor.* spicata, spicis terminalibus axillaribusque. *Falc.* bractæ coloratæ tres circa quemlibet calycem, instar calycis.

1. CEL. foliis lanceolatis, pedunculis angulatis, spica *Argentea*
ovato-oblonga. *Linn. sp. pl. p. 205.*

Amaranthus spicis carneis interfusa flavedine micantibus. *Tour. 235.*

HOSPITATUR sub dio. Sesquipedalis; folia glabra, basi attenuato-petiolata. Spicæ pars florifera carnea, fructifera pallescens. Annua.

2. CEL. foliis oblongo-ovatis, pedunculis teretibus substriatis, spica oblonga. *Linn. sp. pl. p. 205.* *Grissea*

Amaranthus panicula incurva. *Tour. 235.*

HOSPITATUR sub dio. Priori minor, minus striata. Annua.

ILLECEBRUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 219.

Char. sec. *Rad.* teres. *Caul.* herbacea teres ramossissima articulata. *Fol.* opposita sessilis simplex integerrima. *Flor.* verticillata, vel terminalis cymosa, vel capitata. *Falc.* nulla, vel stipula gemina subulata membranacea, pellucida. 2°. bractea ovata membranacea pellucida; vel nulla.

1. ILLEC. floribus verticillatis nudis, caulibus procumbentibus. *Verticillatum*
Linn. sp. pl. p. 206.

Polygala repens nivea. *Lob. Icon. 416.*

Paronychia palustris humifusa orientalis. *Tour. Cor. 38.*

Illecebrum caulibus procumbentibus. *Sauv. 126.*

HABITAT Montpelii, au-delà de St. George ad dexteram. Facies hernariæ.

- Cymosum.* 2. ILLEC. spicis cymosis secundis, caule diffuso. *Linn. sp. pl. p. 206.*
 HABITAT cum priori, & à la source du Lés derrière la montagne; articuli triplo remotiores quam in præcedenti.
- Paronychia.* 3. ILLEC. floribus bracteis nitidis obvallatis, caulibus procumbentibus. *Linn. sp. pl. p. 206.*
 Herniaria squamis nitidis flores superantibus. *Sauv. 119.*
Paronychia hispanica. Tour. 607.
Polygonum minus candicans supinum. Bot. Monf. 209.
Polygonum montanum niveum minus. Barr. Icon. 726.
 HABITAT Montpelii ad mare ultra montem Cctium, & à l'Esperou.
4. ILLEC. floribus bracteis nitidis occultatis, capitulis terminalibus, caule erecto. *Linn. sp. pl. 207.*
 Herniaria erecta, squamis nitidis flores occultantibus. *Sauv. 129.*
Polygonum minus candicans, capitulis surrectis. Bot. Monf. 209.
Paronychia Narbonensis erecta. Tour. 508.
 HABITAT Montpelii, au-delà de Selleneuve, & au-delà de Cauncelles.

T H E S I U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen pl. 212.*

Char secund. *Rad.* simplex tenuis *Caul.* teres simplex *Fol.* alterna sessilis simplex integerrima. *Flor.* terminalis paniculato-racemosa. *Ful.* bractæ tres, patentes, foliaceæ, ad basim floris singuli, persistentes, involucriformes.

- Linophyllum.* 1. THES. calyce bracteis longiore, foliorum nervis decurrentibus.
Thesium panicula foliata, foliis linearibus. Linn. sp. 207.
Thesium floribus sparsis. Sauv. 48.
Linaria montana flosculis albicantibus. Bot. Monf. 159.
Alcimilla linariæ folio, florum calyce albo. Tour. 509.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 119

HABITAT Mompelii; à la Colombiere, la Valette & in sterilibus circa Prades & Montferrier.

Altitudo sesquipedalis. Calix extus viridis, intus albicans, bractea una, cæteris paulò major, calyci subæqualis, rarò longior.

N E R I U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 218.

Char. secund. *Rad.* lignosa. *Caul.* fruticosa. *Fol.* simplex integerrima petiolata terna, vel inferior terna, superior opposita. *Flor.* terminalis racemosa. *Fulc.* nulla.

1. NER. foliis lineari-lanceolatis ternis. Linn. sp. 209. *Oleander.*

Nerium foliis lineari-lanceolatis. Sauv. 169.

Nerion floribus rubescentibus. Tour. 605.

Oleander. Lob. Icon. 364.

Le laurier-rose, vernaculè, *lou laurier-rose*.

HOSPITATUR in hybernaculo; & sub dio apricatur. Sempervirens. Semina (apud nos) nunquam maturant; variat foliis omnibus oppositis vel ternis, vel etiam inferioribus ternis, superioribus oppositis. Ramis in terram delapsis multiplicatur proles.

V I N C A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 217.

Char. sec. *Rad.* fibrosa vel lignosa. *Caul.* ramosa fruticosa, repens vel erecta. *Fol.* opposita petiolata simplex integerrima. *Flor.* axillaris, solitaria pedunculata, vel aggregata sessilis. *Fulc.* nulla.

1. VINCA floribus pedunculatis solitariis, nectariis globosis. *Majon.*

Vinca caule erecto, foliis ovatis. Linn. sp. pag. 209.

Pervinca vulgaris latifolia flore cæruleo. Tour. 120.

Clematis daphnoïdes major. Bot. Monf. 70.

La pervanche; vernaculè, *de pervinque au prouvinque*.

HABITAT Mompelii ubique. Pedunculi longitudine internodiorum. Ad basim germinis nectaria duo globosa.

2. VINCA floribus sessilibus, inferioribus solitariis, cæteris aggregatis, nectariis subulatis. *Roset.*

Vinca (rosea) caule frutescente erecto rigido, foliis ovatis. *Linn. Syst. nat. p. 944. Mill. fig. 186.*

La prévanche de Madagascar.

HOSPITATUR sub dio, in hybernaculo & caldario. Fruticulosa, rubens. Folia sæpe emarginata. Flores rosei coloris. Corollarum tubi longissimi, apice parum ampliati. Flores inferiores solitarii; cæteri bini, quaterni, octoni & sic deinceps, ita ut in summo caule innumeri.

DIGYNIA.

CYNANCHUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 226.*

Char. sec. *Rad.* fusiformis vel ramosa. *Caul.* herbacea teres ramosa, volubilis vel erecta. *Fol.* opposita petiolata simplex integerrima. *Flor.* laterifolia alterna cymosa. *Falc.* nulla.

Monspeliaca. 1. CYN. caule volubili herbaceo, foliis reniformi-cordatis acutis. *Linn. sp. pag. 212. Sauv. pag. 133.*

Scammonea Monspeliaca foliis rotundioribus. Bot. Monf. 232.

Periploca Monspeliaca foliis rotundioribus. Tour. 93. La scammonée de Montpellier.

HABITAT Monspeli ad mare.

Erectum. 2. CYN. caule erecto divaricato, foliis cordatis glabris. *Linn. sp. pag. 213. Sauv. 133.*

Apocynum folio subrotundo. Tour. 92.

HOSPITATUR sub dio. Radix perennis. Folia summi in utrâque specie sæpe alterna.

APOCYNUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 227.*

Char. sec. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea erecta a-mosa. *Fol.* opposita simplex integerrima. *Fbr.* cymosa axillaris alterna (terminalis in inâ specie) *Falc.* nulla.

Androsami-folium. 1. APOC. caule rectiusculo herbaceo, foliis ovatis utrinque glabris, cymis terminalibus. *Linn. sp. pl. pag. 213.*

Apocynum caule erecto annuo foliis ovatis. *Sauv.* 133.

Apocynum Canadense, foliis androsæmi majoris, flore lilii convallii suave-rubentis. *Tour. inst. pag.* 91.

L'Onette; vernaculè *l'Onate*.

HOSPITATUR in hybernaculo.

2. APOC. caule rectiusculo herbaceo, foliis ovato-lanceolatis. *Linn. sp. pag.* 213. *Venetum.*

Apocynum caule erecto annuo, foliis ovato-lanceolatis. *Sauv.* 133.

Apocynum maritimum venetum salicis folio, flore purpureo. *Tour.* 92.

HOSPITATUR sub dio.

ASCLEPIAS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 224.

Char. sec. *Rad.* ramosa sæpius horizontalis. *Caul.* ramosa, herbacea vel fruticosa. *Fol.* simplex opposita integerrima, petiolata vel sessilis, nunc plana, nunc revoluta. *Flor.* umbellata laterifolia pedunculata in unâ specie sessilis, in altera terminalis. *Ful.* nulla.

* *Foliis planis.*

2. ASCL. foliis ovalibus subtus tomentosis, caule simplicissimo, umbellis nutantibus. *Linn. sp.* 214. *Syriaca.*

Apocynum erectum, latifolium, incanum syriacum, flore parvo obsolete purpurascens. *Tour.* 91.

HOSPITATUR in hybernaculo. Apud nos bicubitalis.

2. ASCL. foliis lanceolatis, glabris, caule simplici, umbellis erectis lateralibus solitariis. *Linn. sp. pag.* 215. *Niven.*

Apocynum Americanum foliis amygdali longioribus. *Tour.* 92.

HOSPITATUR in hybernaculo.

3. ASCL. foliis lanceolatis, caule supernè diviso, umbellis terminalibus congestis. *Linn. sp. pag.* 215. *Incarnata.*

Apocynum minus, rectum canadense angustifolium. *Tour.* 91.

Apocynum minus erectum canadense. *Barr. Icon.* 72.

HOSPITATUR in hybernaculo; umbellæ sæpius quaternæ.

4. ASCL. foliis lanceolatis petiolatis glabris, caule simplici. *Chrassazii.*

plici, umbellis erectis solitariis. *Linn. sp. pag. 215.*
Apocynum curassavicum fibrosâ radice, floribus aurantius, chamænerii foliis latioribus & angustioribus. *Tour. 92.*

HOSPITATUR in hybernaculo.

Vincetoxi- cum. 5. ASCL. foliis ovatis basi barbatis, caule erecto, umbellis proliferis. *Linn. sp. pag. 216.*

Asclepias albo flore. Bot. Monf. 29. Tour. 94.

Asclepias caule erecto annuo, foliis ovato-lanceolatis, floribus confertis. *Sauv. 133.*

Le dompte-vénin.

HABITAT Monspelii, à Gramont, Castelnau, Montferrier, &c. Radix perennis.

Nigra. 6. ASCL. foliis ovatis, basi barbatis, caule superne subvolubili. *Linn. sp. pag. 216.*

Asclepias nigro flore. Bot. Monf. 30. Tour. 34.

Asclepias caule subvolubili herbaceo, floribus patentissimis. *Sauv. 133.*

HABITAT cum priori. Radix perennis.

* *Foliis latere revolutis.*

Fruticosa. 7. ASCL. foliis revolutis lanceolatis, caule fruticoso. *Linn. sp. pag. 216.*

Apocynum erectum, africanum, villosa fructu, salicis folio. Tour. 92.

HOSPITATUR in caldario. Altitudinem humanam excedit. Folia sæpè terrena.

Pedunculus umbellæ foliis duplo brevior. Corollæ albæ.

STAPELIA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 223.*

Char. sec. Rad. fibrosa. Caul. angulata articulata ramosa succulenta denticulata; denticulis oppositis. Fol. nulla Flor. in axillis denticulorum, pedunculata solitaria. Fr. nulla.

Variegata. 1. STAP. denticulis ramorum patentibus. *Linn. sp. pag. 217.*

Asclepias Africana aizooïdes. Tour. 94.

La Crapandine.

HOSPITATUR sub dio & in caldario. Flores grisei,

rugosi, punctis purpureis picti.
 Floret autumn. Varians corollis calycibus, nectariis-
 que 6fidis, staminibusque sex. Rami abscissi in ter-
 ram delapsi novam matrem præbent.

HERNIARIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 218.

Char. sec. Rad. tenuis vix ramosa. Caul. articu-
 lata herbacea ramosissima procumbens. Fol.
 opposita sessilis simplex integerrima. Flor. axil-
 laris glomerata sessilis. Fulc. stipulæ minimæ
 membranaceæ, oppositæ interfoliaceæ.

1. HERN. glabra. Linn. sp. pag. 218. Tour. 507. *Glabra.*
 Polygonum minus sive millegrana major. Bot. Mons.
 210.

HABITAT Monspelii ubique in arenosis. Annuæ.

2. HERN. hirsuta. Linn. sp. pag. 218. Tour. 507. *Hirsuta.*
 Herniaria hirsuta. Bauh. Pin. 282.

Anthyllis valentina Clusii, Lob. Icon. 421.

Huic similis aut eadem est Anthyllis valentina Clusii.
 Bauh. Pin. 282.

La Turquette ou herniaire; vernaculè la turquette.

HABITAT Monspelii cum priori & vulgator.

CHENOPODIUM

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 230.

Char. sec. Rad. ramosa. Caul. herbacea ramosa
 striata, teres vel angulata. Fol. alterna simplex
 incisa integra, vel integerrima, sessilis vel
 petiolata. Flor. glomerato-racemosa axillaris &
 terminalis, nuda vel foliosa. Fulc. nulla.

* Foliis angulosis.

1. CHEN. foliis triangulari-sagittatis integerrimis. Linn. *Bonus Henri-*
 sp. pag. 218. Sauv. 100. *cus.*

Chenopodium folio triangulo. Tour. 506.

Le bon Henri.

HABITAT Monspelii, à l'Esperou, au mont Saint Loup
 ad lævam & au Vigan. Folia palmaria longe petio-
 lata, petiolo basi dilatato amplexicauli.

2. CHEN. foliis cordato-triangularibus obtusiusculis *Rubrum.*

dentatis, racemis erectis compositis subnudis caule brevioribus. *Linn. sp. pag. 218. Sauv. 273.*

Chenopodium pesanferinus primus. Tour. 506.

Atriplex sylvestris latifolia. Bot. Monf. 34.

Chenopodium foliis subtus farinosis rhomboïdeis multis & minoribus dentibus serratis. Sauv. 99.

HABITAT Monspelii ad lævam ultra *Salazon* juxta fluvium.

- Album.* 3. *CHEN.* foliis rhomboïdeo-triangularibus erosis postice integris, summis oblongis, racemis erectis. *Linn. sp. pag. 219. Sauv. 273.*

Atriplex sylvestris. Bot. Monf. 34.

Chenopodium folio sinuato candicante. Tour. 506. Bauh. Pin. 119.

Chenopodium foliis inferioribus ovatis acutis antrorsum dentatis, summis lineari-lanceolatis. Sauv. 99.

HABITAT Monspelii, à *Lattes* & circà hortos.

- Viride.* 4. *CHEN.* foliis rhomboïdeis dentato-sinuatis, racemis ramosis subnudis. *Linn. sp. pag. 219.*

HABITAT ubique Monspelii.

- Hybridum.* 5. *CHEN.* foliis subcordatis angulato-acuminatis, racemis ramosis nudis. *Linn. sp. pag. 219.*

Atriplex daturæ folio Mag. hort. Monf. 29. anguloso folio. Barr. Icon. 540.

Atriplex sylvestris latifolia, acutior folio. Bot. Monf. 35.

Chenopodium pesanferinus secundus. Tour. 506.

Chenopodium folio lævi paucis & amplissimis dentibus inciso, racemis florigeris laxis & ramosis. Sauv. 273.

HABITAT Monspelii ubique in oleribus.

- Botrys.* 6. *CHEN.* foliis oblongis sinuatis, racemis nudis multifidis. *Linn. sp. pag. 219. Sauv. 273.*

Chenopodium ambrosioides folio sinuato. Tour. 504.

Botrys ambrosioides vulgaris. Bot. Monf. 34.

Le Piment.

HABITAT Monspelii, à *Lattes*, à *Salazon*.

- Ambrosioides* 7. *CHEN.* foliis lanceolatis dentatis, racemis foliatis simplicibus. *Linn. sp. pag. 219.*

Chenopodium ambrosioides maximum. Tour. 506.

Botrys bætica atriplexis sylvestris facie, vulgò botrys maxima. Barr. Icon. 1185.

L'Ambroisie ou thé du Mexique.

HOSPITATUR sub dio. Annuum. Luxuriat in horto regio.

* *Foliis integris.*

3. CHEN. foliis integerrimis rhombeo-ovatis, floribus *Pulvaria*. conglomeratis. *Linn. sp. p. 220.*
Chenopodium foliis triangulari-ovatis. Sauv. 102.
Chenopodium fatidum. Tour. 506.
Attriplex fatida. Bot. Monsf. 35.
 HABITAT Monspeli in agris & hortis. Annuum.
9. CHEN. foliis integerrimis ovatis, caule decumbente, *Polypernum*. cymis dichotomis. *Linn. sp. pag. 220.*
Chenopodium betæ folio. Tour. 506.
Blitum erectius sive terrium Tragi. Bot. Monsf. 38.
 HABITAT Monspeli in oleribus. Annuum.
10. CHEN. foliis lineari-lanceolatis planis integerrimis. *Scoparium*. *Linn. sp. pag. 221. Sauv. 53.*
Chenopodium lini folio villosa. Tour. 506.
Le Belveder.
 HOSPITATUR sub dio. Humanam superans altitudinem. Caulis glaberrimus, albicans.
11. CHEN. foliis subulatis semi-cylindricis. *Linn. sp. pag. Maritimum*. 221.
Chenopodium herbaceum, foliis semi-cylindricis acutis alternis. Sauv. 7.
Kali minus album, semine splendente. Bot. Monsf. 141.
La Blanchete. Vernaculè Blanquette.
 HABITAT Monspeli ad mare.
12. CHEN. foliis linearibus teretibus carnosiss, caule *Fruticosum*. fruticoso. *Sauv. 7. Linn. sp. pag. 221.*
Vernaculè l'Engane.
 HABITAT ad mare secus cetium.
13. CHEN. foliis obtusis teretibus tomentosis alternis, *Birsutum*. caule herbaceo. *Sauv. 7. Linn. 221.*
Kali minus villosum. Bot. Monsf. 146.
 HABITAT Monspeli ad mare.

B E T A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl.

Char. sec. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea angulata sulcata. *Fol.* alterna petiolata simplex integerrima. *Flor.* glomerato-ramosa axillaris & terminalis. *Fulc.* nulla.

Vulgaris.

1. BETA Linn. *sp. pag.* 222.

Beta rubra vulgaris. *Tour.*

La Bette-rave. Vernaculè *Blatta rava.*

β. Beta pallide virens major. *Tour.*

Beta communis viridis. *Bot. Monf.* 37.

La Poirée blanche. Vernaculè *l'Orte la Blède.*

HABITAT Monspelii in hortis. Folia subcordata in petiolum decurrentia.

S A L S O L A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 132.

Char. sec. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea ramosa. *Fol.* sessilis simplex integerrima succulenta, alterna vel opposita. *Flor.* axillaris solitaria. *Fulc.* nulla (aculei ad apicem foliorum in una specie.)

Kali.

1. SAL. herbacea, foliis subulatis mucronatis, calycibus ovatis axillaribus. Linn. *sp. pag.* 222. *Sauv.* 7. & 147.

Kali spinosum cochlearum. *Bot. Monf.* 146.

Kali spinosum foliis longioribus & angustioribus. *Tour.* 247.

HABITAT Monspelii ultra Castrum novum ad lavam in agris, & ad mare.

Seda.

2. SAL. herbacea, foliis inermibus. Linn. *sp. pag.* 223. *Sauv.* 7. & 147.

Kali majus cochleato semine. *Bot. Monf.* 146. *Tour.* 247.

La Soude.

HABITAT Monspelii ad mare.

C R E S S A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 1046.

Char. sec. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea humifusa

ramosissima. *Fol.* alterna sessilis simplex integerrima. *Flor.* glomerato-racemosa terminalis. *Fulc.* nulla.

1. CRESSA, Linn. *sp. pag.* 223. *Sauv.* 92.

Crotica,

Quamoclit minima humifusa palustris herniarie folio.

Tour. Cor. 4.

Anthyllis. Bot. Monf. app. 290.

HABITAT Monspelii ad lævam, à *Perols* in fossis: folia ovata minima.

G O M P H R E N A.

Char. prim. Vid. Linn. *gen. pl.* 233.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea erecta teres ramosa *Fol.* opposita petiolata simplex integerrima. *Flor.* pedunculata terminalis capitata. *Fulcr.* bractæ binæ oppositæ foliaceæ ovatæ integerrimæ, infra capitulum.

1. GOMPH. foliis ovatis, pedunculis pubescentibus...

Glabosa.

Gomphrena caule erecto, foliis ovato-lanceolatis, capitulis solitariis, pedunculis diphyllis. Linn. *sp. pag.* 224. *Sauv.*

Amaranthoides lychnidis folio, capitulis argenteis purpureis, &c. *Tour.* 654.

L'Immortelle rouge des Jardiniers.

HOSPITATUR sub dio. Annua.

U L M U S.

Char. prim. Vid. Linn. *gen. pl.* 239.

Char. sec. *Rad.* lignosa. *Caul.* arborea. *Fol.* alterna petiolata simplex integra. *Flor.* axillaris pedunculata, pedunculis subquaternis. *Fulc.* stipulæ deciduæ.

1. ULM foliis duplicato-ferratis, basi inæqualibus. *Campestris.*

Linn. *sp. pag.* 225. *Sauv.* 98.

Ulmus campestris & Theophrasti. *Bot. Monf.* 281.

Tour. 611.

L'Ormeau ou Orme; vernaculè l'Ourme.

HABITAT Monspelii, à Castelnau, Lattes, Canelles, &c.

H E U C H E R A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 235.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* scaposa. *Fol.* radicalis petiolata simplex lobata. *Flor.* racemosa terminalis. *Fulc.* bractea solitaria tridentata, denticulo intermedio longiore, ad basim pedunculorum partialium racemi.

Americana. 1. HÉUCH. Linn. sp. pag. 226. Sauv.

Mitella Americana florum petalis integris. Tour. 242.

HOSPITATUR sub dio. Perennis; scapus sesquipedalis; racemus ramosus; rami dichotomi alterni; bractea ad basim suffulti; interdum folium unicum parvum lobatum scapo adnectitur. Semina abortiunt.

G E N T I A N A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 236.

Char. secund. *Rad.* subhorizontalis teres simplex.

Caul. herbacea articulata, simplex vel ramosa, teres vel tetragona. *Fol.* opposita sessilis simplex integerrima, perfoliata vel connato-vaginans. *Flor.* axillaris sessilis conferta vel terminalis dichotoma aut verticillata. *Fulc.* nulla.

* *Corollulis quinquefidis sub-campaniformibus.*

Lutea. 1. GENT. corollis quinquefidis rotatis verticillatis, calycibus spathaceis. Linn. sp. pag. 227.

Gentiana major lutea. Tour. 80. Seg. Ver. tom. 1. p. 144.

2. Gentiana major vulgaris, pallido & parvo flore. Barr. Icon. 63.

La grande Gentiane.

HABITAT à l'Esperou. Flores pedunculati.

Asclepiaden. 2. GENT. corollulis quinquefidis campanulatis oppositis sessilibus, foliis amplexicaulibus. Linn. sp. p. 227.

Gentiana asclepiadis folio. Tour. 80. Seg. Ver. tom. 1. pag. 145.

Gentiana asclepiadis folio. Barr. Icon. 70.

HABITAT in humidis, à Villemagne, Lamalou, l'Esperou.

* *Corollis*

* *Corollis quinquefidis infundibuliformibus.*

3. GENT. corollis quinquefidis infundibuliformibus, *Centaureum*.
caule dichotomo. *Linn. sp. pag. 229.*

Gentiana foliis trinerviis ovatis, floribus umbellatis, tubo strictissimo. Sauv. 132.

Centaureum minus. Bot. Monf. 57. Tour. 122. Seg. Ver. tom. 1. p. 200.

4. *Centaureum minus. Barr. Icon. 424. & 1242.*

La petite Centaurée; vernaculè lou Trescalau.

HABITAT Montpelii, aux prés d'Arene.

* *Corollis quadrifidis.*

4. GENT. corollis quadrifidis fauce barbatis. *Linn. sp. Campesfris.*
pag. 231.

Gentiana purpurea minima. Barr. Icon. 97. fig. 2.

Gentiana alpina pumila verna minor. Tour. 81.

HABITAT à l'Esperou. Tubi ampliati. Folia floralia ovata lata.

5. GENT. corollis quadrifidis imberbibus verticillatis *Cruciata.*
sessilibus. *Linn. sp. pag. 231.*

Gentiana cruciata. Barr. Icon. 65. Tour. 81. Major. Seguiet Ver. tom. 1. p. 146.

HABITAT à l'Esperou. Folia sæpius trinervia, basi connata vaginantia; corollæ cæruleæ; calix tubulatus quadridentatus.

6. GENT. corollis octofidis, foliis perfoliatis. *Linn. sp. Perfoliata.*
pag. 232. Sauv. 136.

Centaureum luteum perfoliatum. Bot. Monf. 57. Tour. 123.

Centaureum minus perfoliatum luteum, &c. Barr. Icon. 515. & 516.

HABITAT Montpelii circa Selleneneuve, Castelnau. Frequens aux prairies d'Arene.

Obs. In hoc genere variat numerus staminum cum numero laciniarum corollæ; idem calyx eandem servans cum corolla & staminibus proportionem, seu denticulorum numerum.

P H Y L L I S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 242.*

Char. secund. *Rad.* lignosa. *Caul.* fruticosa articulata. *Fol.* terna petiolata simplex integerrima.

Flor. paniculato-trichotoma. *Fulc.* stipulæ soli-

tarizæ dentatæ, foliis interjectæ; bractææ integerrimæ ad quamlibet divisionem pedunculorum.

- Nobla.* 1. PHYL. stipulis dentatis. *Linn. sp. pag. 232.*
 Hospitatur sub dio. Hyeme in caldario. Semper virens, semina maturans. Pedunculi uniflori ex dichotomia.

ERYNGIUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 241.*

Char. sec. *Rad.* ramosa subhorizontalis. *Caul.* herbacea striata subsimplex. *Fol.* alterna, radicalis petiolata simplex integra incisa vel pinnata, caulina, amplexicaulis, pinnato-pinnatifida. *Flor.* terminalis capitata pedunculata sub-dichotoma. *Fulc.* aculei ad margines foliorum & radiorum involucri.

- Maritimum.* 1. ERYNG. involucri foliaceis ovatis, longitudine capituli.

Eryngium foliis radicalibus subrotundis plicatis spinosis, capitulis peduncularis. *Linn. sp. pl. pag. 233.*

Eryngium maritimum. *Bot. Mons. 92. Tour. 327.*

Le Panicaut de mer.

HABITAT Monspelii ad mare. Involucrum radiis tribus vel quinque.

- Campestre.* 1. ERYNG. involucri subulatis capitulo longioribus.

Eryngium foliis radicalibus pinnatis tripartitis. *Linn. sp. pag. 233.*

Eryngium vulgare. *Bot. Mons. 93. Tour. 327.*

Le Panicaut, ou Chardon ro'and.

HABITAT ubique Monspelii. Radii involucri denticulo unico sæpius ad basim.

- Amethystinum.* 3. ERYNG. involucri lanceolatis capitulo longioribus.

Eryngium foliis radicalibus digitato-multifidis. *Linn. sp. pag. 233.*

Eryngium totum caeruleum. *Tour. 327.*

Hospitatur sub dio. Radix perennis.

HYDROCOTYLE.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 243.*

Char. sec. *Rad.* horizontalis, nodosa stoloni-

PENTANDRIA DIGYNIA. 131

fera, radiculis perpendicularibus. *Caul.* scaposa. *Fol.* radicalis solitaria alterna petiolata simplex peltata integra. *Flor.* pedunculata umbellata radicalis. *Fulc.* nulla.

1. HYDR. foliis peltatis, umbellis quinquefloris. *Linn.* *Vulgaris.*
sp. pag. 234.

Ranunculus aquaticus coryledonis folio. *Bot. Monf.* 218.

Hydrocotyle vulgaris. *Tour.* 381.

Hydrocotyle foliis peltatis undique emarginatis. *Sauv.* 39.

L'Ecuelle d'eau.

HABITAT Monspelii ad dexteram Castrinovi in Ledo amne. Folia orbiculata. *A Castelnau pres des moulins.*

SANICULA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 244.

Char. sec. *Rad.* napiformis. *Caul.* herbacea subnuda, simplex. *Fol.* simplex incisa, lobata, radicalis petiolata, caulina subsessilis sæpius solitaria. *Flor.* terminalis umbellata, umbellula subcapitata. *Fulc.* nulla.

1. SAN. foliis palmato-digitatis, foliolis quinque incisis ovali-lanceolatis. *Sauv.* 209. *Off. inalis.*

Sanicula foliis radicalibus simplicibus, flosculis omnibus sessilibus. *Linn. sp. pag.* 235.

Sanicula officinarum. *Bot. Monf.* 229. *Tour.* 326.

La Sanicle; vernaculè de Sanicle.

HABITAT Monspelii; à l'Esperon, au Capouladou, & au bois de Salvons.

HOSPITATUR in frigidario. Folium unicum (sæpius) in summo caule folium feminale subcuneiforme, vel ovarum.

ASTRANTIA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 215.

Char. sec. *Rad.* fusiformis, radiculis fusiformibus parallelis. *Caul.* herbacea striata simplex. *Fol.* simplex incisa lobata, radicalis petiolata, caulina sessilis. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulc.* nulla.

Major. 1. ASTR. foliis quinquelobis; lobis trifidis. *Linn. sp. pag. 235.*

Altrantia major, corona floris purpurascens & albida. *Tour. 314.*

HOSPITATUR in frigidario. Vix semipedalis. Folia sæpius in caule bina, involucri radius umbella longioribus, serraturæ foliorum setis rigidis terminatæ.

BUPLEURUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 272.*

Char. sec. *Rad.* tenuis, simplex vel ramosa. *Caul.* herbacea vel fruticosa, simplex vel ramosa. *Fol.* simplex integerrima amplexicaulis aut perfoliata, inferior attenuato-petiolata, superior sessilis. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulc.* nulla.

* *Herbacea.*

Rotundifolium. 1. BUPL. involucris universalibus nullis, foliis perfoliatis. *Linn. sp. pag. 236.*

Perfoliata vulgaris arvensis. *Bot. Monf. 200.*

Bupleurum perfoliatum rotundifolium annuum. *Tour. 310.*

2. Perfoliata minor folio acuto. *Barr. Icon. 1128.*

HABITAT Monspelii, circa Montferrier ad lavam. Foliola involucrorum quinque-ovata, tria acuminata majora, duo obtusa minora.

Odontites. 2. BUPL. involucellis pentaphyllis acutis; universali triphylo, flosculo centrali altiore, ramis divaricatis. *Linn. sp. pag. 237.*

Perfoliata minor angustifolia bupleuri folio. *Bot. Monf. 200.*

Bupleurum annuum minimum angustifolium. *Hort. Monf. Tour. 310.*

Bupleurum foliis gramineis, calyce peculiari, quinque-folio aristato rigido. *L. Sauv. 49.*

3. Bupleurum foliis linearibus petiolatis, floralibus lanceolatis. *Sauv. 50.*

Bupleurum annuum angustifolium. *Bot. Monf. 42. Tour. 309.*

HABITAT Monspelii in saxosis, circa la Valette, Montferrier, Castelnau. Plantula vix palmaris. Foliola involucris inæqualia lanceolata umbellis longiora.

3. BUPL. caule dichotomo subnudo, involucris minimis *Rigidum.*
acutis. *Linn. sp. pag. 238.*

Bupleurum foliis lanceolatis rigidis; radicalibus obru-
lis, caulinis acutis. *Sauv. 76.*

Bupleurum folio rigido. *Bot. Monf. 42. Tour. 309.*
L'Oreille de lièvre.

HABITAT Monspeli in luco Gramuntio. Altitudo
bipedalis.

4. BUPL. umbellis simplicibus alternis pentaphyllis subtri- *Tenuissi-*
floris. *Linn. sp. pag. 238.* *mus.*

Bupleurum angustissimo folio. *Bot. Monf. 42. Tour. 310.*

Bupleurum tertium minimum Fabii Columnæ. *Barn.*
Icon. 1248.

Bupleurum gramineo folio; umbellis & calycibus om-
nium minimis. *Sauv. 49.*

HABITAT cum prioribus. Altitudo sesquipedalis.

* *Frutescentia.*

5. BUPL. frutescens, foliis obovatis integerrimis. *Linn. Fruticosum.*
sp. pag. 238.

Seseli Æthiopicum salicis folio. *Bot. Monf. 240.*

Bupleurum arborescens salicis folio. *Tour. 310.*

Luxuriat in horto regio. Sempervirens. Folia glaber-
rima obverse ovata sessilia.

ECHINOPHORA.

Char. prim. Vid: *Linn. gen. pl. 1017.*

Char. sec. *Rad. fusiformis. Caul. striata ramosa-*
herbacea. *Fol. alterna pinnata, pinnulis fessi-*
libus oppositis sæpius 4dentatis. *Flor. termina-*
lis umbellata. *Falc. aculei ad apices foliolorum.*

2. ECHIN. foliolis subulato-spinosis integerrimis. *Linn. Spinosa.*
sp. pag. 239.

Caucalis caule lignoso, foliolis subulato-spinosis inte-
gerrimis. *Sauv. 258.*

Chritum maritimum spinosum. *Bot. Monf. 80.*

Echinophora maritima spinosa. *Tour. 656.*

HABITAT Monspeli ad mare.

TORDYLIUM.

Char. prim. Vid: *Linn. gen. pl. 247.*

Char. sec. *Rad. fusiformis. Caul. herbacea striata*

subsimplex. *Fol.* alterna amplexicaulis, pinnata, pinnulis incis. *Flor.* umbellata terminalis (lateralis sessilis in unâ specie.) *Fulcr.* nulla; aculei supra semina (in unâ specie.)

- Syriacum.* 1. TORD. foliolo terminali maximo; involucris umbella longioribus. *Linn. sp.* 239.
Tordylium limbo granulato *Syriacum minus*. *Tour.* 329.
Gargidium primum. *Dod.* 690.
 HOSPIRATUR sub dio. Foliola involucris lanceolata vel spathulata.
- Officinale.* 2. TORD. involucris partialibus longitudine petalorum, foliis ovatis, laciniatis. *Linn.* 239.
Tordylium Narbonense minus. *Tour.* 320.
Se'eli creticum minus. *Bot. Monf.* 239.
Le Sefeli de Crete.
 HABITAT Mons'peli versus *la Valette*, *la Colombiere*, *Castelnau*, &c.
- Maximum.* 3. TORD. umbella conferta radiata, foliolis lanceolatis inciso-ferratis. *Sauv.* 230. & 259.
Se'eli Creticum majus. *Bot. Monf.* 240.
Tordylium maximum. *Tour.* 320.
Sphondylium minus *Syriacum*. *Barr. Icon.* 349.
 HABITAT Mons'peli cum priori.
- Latifolium.* 4. TORD. umbella conferta nudiuscula, foliis pinnatis, foliolis lanceolatis inciso-ferratis. *Linn. sp.* 240.
Cucalis umbella universali trifida, partialibus pentaspermis, foliis pinnatis ferratis. *Sauv.* 236.
Caucalis arvensis echinata latifolia. *Bot. Monf.* 55. & *Tour.* 323.
Lampula Canaria latifolia. *Bauh. hist.* 2. p. 80.
 HABITAT Mons'peli cum prioribus.
- Anthriscus.* 5. TORD. umbella conferta, foliolis ovato-lanceolatis pinnatifidis. *Linn.* 240.
Caucalis semine aspero, flosculis rubentibus. *Bot. Monf.* 56.
Daucus annuus minor floribus rubentibus. *Tour.* 308.
 HABITAT Mons'peli in arvis.
- Nodosum.* 6. TORD. umbellis simplicibus sessilibus, seminibus exterioribus hispidis. *Linn. sp.* 240.
Daucus annuus ad nodos floridus. *Tour.* 308.
Caucalis nodosa echinato semine. *Bot.* 56.

HABITAT ubique.

CAUCALIS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 248.

Char. sec. *Rad.* fusiformis. *Caul.* striata herba-
cea ramosa. *Fol.* alterna amplexicaulis, pin-
nata, pinnulis pinnato-multifidis. *Flor.* um-
bellata terminalis. *Falc.* aculei supra semina.

1. CAUC. umbella bifida, umbellulis dispermis, invo- *Maritima*
lucris semine brevioribus linearibus.
Caucalis pumila maritima. *Bauh. pin.* 153. *Tour.*
323.
Lappula Canaria five caucalis maritima. *Bauh. hist.* 3.
part. 2. 87.
Caucalis umbellis trifidis dispermis, caule prostrato.
Linn. Syst. nat. p. 955.
HABITAT ad mare. Vix palmaris. Petioli valde hir-
suti; pedunculus longitudine petiolorum. Rami axil-
lares, unde pedunculi oppositifolii apparent. Umbella
sepius bifida. Radii involucri diphylli, seminibus
breviores. Accedit raro umbella trifida, & tunc
umbellulæ duæ dispermæ, altera monosperma.
2. CAUC. involucris singulis pentaphyllis, petalo unico *Grandiflora*.
duplo majore. *Linn. sp.* 240.
Caucalis arvensis echinato magno fructu. *Tour.* 323.
Bot. Mons. 56.
Caucalis *Dod.* 700.
HABITAT Monspelii ubique. Foliola involucri mar-
gine membranacea.
3. CAUC. involucro universalis longitudine umbellæ lan- *Daucides*.
ceolato. *Linn. sp.* 241.
Caucalis dauci sylvestris folio, echinato magno fructu,
Mag. Bot. app. 293. *Tour.* 323.
HABITAT Monspelii; à *Castelnau* ad lævam, à *Gra-*
mont. Altitudo prioris. Radii involucrorum margine
membranacei.
4. CAUC. umbella trifida, umbellulis trispermis, involu- *Platyarthra*
cris triphyllis. *Linn.* 241. *Sauv.* 258.
Caucalis Monspeliaca echinato magno fructu. *Bot.*
Mons. 56. *Tour.* 323.
HABITAT frequens, à *la Garrigue du Terrail*.

- Leptophylla*. 5. CAUC. seminum aculeis triglochidibus uncinatis: pilis verticillatis hispidis. *Linn. sp. pag.* 242.
 Caucalis arvensis echinata parvo flore & fructu. *Bot. Monf.* 56. *Tour.* 323.
 Caucalis involucrio universali sæpè nullo, laciniis foliorum perangustis. *Sauv.* 258.
 HABITAT cum priori. Rarior.

D A U C U S.

- Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 250.
 Char. sec. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea striata ramosa. *Fol.* alterna amplexicaulis pinnata, pinnulis pinnato-multifidis. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulc.* nulla, pili rigidi in caule (& seminibus in unâ specie.)
- Carota*. 1. DAUC. seminibus hispidis. *Linn. sp. pag.* 242.
 Pastinaca tenuifolia sylvestris Dioscoridis. *Bot. Monf.* 199.
 Daucus sativus. *Tour.* 307. Radice rubra & lutea.
La Carote.
 HABITAT Monspeli in oleribus.
- Visnaga*. 2. DAUC. seminibus nudis. *Linn. sp.* 242. *Sauv.* 257.
 Gingidium umbella oblonga. *Bot. Monf.* 109.
 Feeniculum annuum umbella contracta oblonga. *Tour.* 311.
 HABITAT Monspeli frequens in monte Cetio versùs mare, in loco dicto *le Nazareth*, & alibi versùs Villam novam.
- Gingidium*. 3. DAUC. involucri radiis planis; laciniis recurvis. *Linn. sp.* 242.
 Daucus maritimus lucidus. *Tour.* 307.
 Pastinaca tenuifolia marina foliis obscure virentibus. *Bot. Monf.* 199.
 HABITAT Monspeli cum priori, sed rarior. Bis vidi secus stagnum, à *Bouzigues*.

A M M I.

- Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 251.
 Char. sec. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea simplex. *Fol.* alterna amplexicaulis, inferior bipinnata simplex integra, superior simplex li-

neari-multifida. *Flor.* terminalis umbellata.
Fulc. nulla.

1. AMMI foliis inferioribus pinnatis lanceolatis serratis, *Majus.*
superioribus linearibus multifidis. *Linn. sp. pag.* 243.
Ammi laciniis foliorum caulis lanceolatis. *Sauv.* 232.
Ammi majus. *Bot. Monf.* 16. *Tour.* 104.
L'Ammi.

HABITAT Monspeliî circa Gramuntium lucum ad dexteram. Rarum hodie apud nos; nec unquam ubi notat Magnol ultra portam Laterensem reperire licuit.

BUN I U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 252.

Char. sec. *Rad.* bulbosa solida. *Caul.* herbacea.
Fol. alterna amplexicaulis pinnata pinnulis linear-multifidis. *Flor.* umbellata terminalis.
Fulc. nulla.

1. BUN. *Linn. sp. pag.* 243. *Sauv.* 256. *Bulbocasta-*
Bulbocastanum majus folio api. *Bot. Monf.* 41. *Tour. num.*
307.
Bulbocastanum alterum, caule firmiore. *Barr. Icon.*
244.

Terrenoix.

HABITAT Monspeliî; au Capouladou, à la Serane, à l'Esperou.

CON I U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 253.

Char. sec. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea ramosa striata. *Fol.* alterna amplexicaulis, pinnata pinnulis folii cujuslibet inferioribus pinnatis, superioribus pinnatifidis; foliolis omnibus pinnatifidis. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulcr.* nulla.

1. CON. seminibus striatis. *Linn. sp.* 243. *Sauv.* 259. *Maculatum.*
Cicuta major. *Tour.* 306.
La grande Cigue; vernaculè, Jauvertasse.
HABITAT Monspeliî; sous le Perou, in loco dicto Lasagarelles.

ATHAMANTA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 255.

Char. secund. Rad. fusiformis. Caul. herbacea, simplex vel ramosa striata. Fol. alterna amplexicaulis pinnata, pinnulis pinnatis vel pinnato-multifidis. Flor. terminalis umbellata. Fulcr. nulla.

Libanotis. 1. ATH. foliolis bipinnatis planis, umbella hemisphærica, seminibus hirsutis. Linn. sp. pag. 244.

Daucus montanus apii folio major. Baub. Pin. 150.
Bot. Monf. 84.

Oreoselinum apii folio majus. Tour. 318.

Le Persil de montagne.

HOSPITATUR sub dio.

Oreoselinum. 2. ATH. foliolis divaricatis. Linn. sp. pag. 244.

Apium montanum nigrum. Baub. Pin. 153.

Apium montanum folio ampliore. Baub. Pin. ibid.

Oreoselinum apii folio minus. Tour. 318.

HOSPITATUR sub dio.

Cretensis. 3. ATH. foliolis linearibus planis hirsutis, petalis bipartitis, seminibus oblongis hispidis. Linn. sp. p. 245.

Myrrhis annua semine striato incano. Tour. 315.

Daucus alpinus multifido longoque folio, sive montanus, umbella candida. Baub. Pin. 150.

HABITAT à l'Esperou. Plantula palmaris elegantissima simplex.

Meum. 4. ATH. foliolis capillaribus, seminibus glabris striatis. Linn. sp. pag. 245.

Meum foliis anethi. Tour. 312.

HABITAT cum priori.

PEUCEDANUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 256.

Char. secund. Rad. fusiformis. Caul. herbacea ramosa striata. Fol. alterna amplexicaulis pinnata, pinnulis pinnatis vel pinnatifidis. Flor. umbellata terminalis. Fulcr. nulla.

Officinale. 1. PEUCED. foliis quinquies tripartitis filiformibus linearibus. Linn. sp. p. 245.

Peucedanum Germanicum. Bot. Monf. 201. Tour. 318.

2. Peucedanum italicum longioribus foliis. Barr. Icon. 78.

Le Fenouil de porc.

HABITAT Monspelii. Frequens in luco & ultra lucum Graminum.

1. PEUCED. foliolis pinnatifidis. laciniis oppositis. *Linn. Silaus.*
sp. pag. 246.

Seseli pratense Monspeliensium. *Bot. Monsf. 239.*

Angelica pratensis apii folio. *Tour. 313.*

HABITAT Monspelii cum priori, & versus Castrum-novum, & à Salazon. Folia longe petiolata; foliola pinnularum sæpius trifida vel quinquefida.

CRITHMUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 257.*

Char. sec. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea ramosa striata. *Fol.* alterna amplexicaulis, bipinnata succulenta. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulcr.* nulla.

1. CRIT. foliolis lanceolatis carnosis. *Sauv. 258. Linn. Maritimum.*
sp. pag. 247.

Crithmum seu fœniculum maritimum minus. *Bot. Monsf. So. Tour. 317.*

Le Fenouil de mer, Perce-pierre ou Criste marine.

HABITAT ubique ad mare.

CACHRY S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 258.*

Char. sec. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea ramosa striata. *Fol.* alterna amplexicaulis pinnata, pinnulis multifidis. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulc.* nulla.

1. CAC. foliis pinnatis, foliolis acutis multifidis. *Linn. Libanotis.*
sp. p. 246.

Libanotis cachryophoros quibusdam flore luteo. *Bot. Monsf. 154.*

Cachrys semine fungoso plano majori, foliis peucedani angustis. *Tour. 325.*

L'Armarinte.

HABITAT Monspelii, secus fluvium *Lamonson* versus villam novam, & prope pagum *Fabregues* in rupibus ad lavam. *Les Rochers de Mijoulan.*

FERULA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 259.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea ramosa striata. *Fol.* alterna amplexicaulis bipinnata. *Flor.* umbellata terminalis. *Fulcr.* nulla.

- Communis.** 1. FER. foliolis linearibus longissimis simplicibus. Linn. *sp. pag.* 246. *Sauv.* 257.
Ferula femina Plinu. *Bot. Monf.* 97. *Tour.* 321.
La Ferule.

HABITAT Monspelii ad mare & stagna. Altitudinem humanam excedit.

LASERPITIUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 260.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea striata. *Fol.* alterna amplexicaulis, bipinnata vel tripinnata, foliolis integris. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulc.* nulla.

- Gallicum.** 2. LASERP. foliolis cuneiformibus furcatis. Linn. *sp.* p. 248.
Laserpitium foliolis ramosis sessilibus. *Sauv.* 261.
Laserpitium gallicum. *Bot. Monf.* 300. *Tour.* 324.
Le Laser.

HOSPITATUR in frigidario.

HABITAT à St. Guillin le Désert, à la Serane. Copiosius à Lamatou.

- Siler.** 3. LASERP. foliolis lanceolatis integerrimis petiolatis. Linn. *sp. p.* 249.

Siler montanum officinarum. *Bot. Monf.* 241.

Ligusticum quod *Seseli* officinum. *Tour.* 323.

L'iveche ou le *Seseli* de montagne.

HABITAT Monspelii cum priori, & à Capouladou.

HOSPITATUR in frigidario.

- Chironium.** 3. LASERP. foliolis oblique cordatis, petiolis hirsutis. Linn. *sp. pag.* 249.

Panax costinum. *Bot. Monf.* 197.

HABITAT Monspelii, aux rochers de Mijoulan, ubi *Cachrys.* Vide supra.

Obs. Hanc speciem pro panace costino *Bauhini* male habuerat *Magnolius.*

PENTANDRIA DIGYNIA. 141

HERACLEUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 277.

Char. sec. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea ramosa striata. *Fol.* alterna amplexicaulis, simplex, integra vel pinnata pinnulis pinnatifidis. *Flor.* umbellata terminalis. *Fulcr.* nulla.

1. HERACL. foliolis pinnatifidis. Linn. sp. pag. 249. *Sphondylium*, Sauv. 230.

Sphondylium vulgare hirsutum. Tour 320.

2. *Sphondylium*. Barr. Icon. 56. & 371.

La Berce.

HABITAT Montpelii à l'Esperou, la Serane, au Capouladou, &c.

HOSPITATUR in frigidario. Frequens in horto regio.

2. HERACL. foliis simplicibus integris, floribus radiatis. Linn. sp. 250. *Alpinum*.

Sphondylium alpinum glabrum. Tour. 320.

HOSPITATUR sub dio. Planta vix pedalis, perennis; folia radicalia cordata dentata sublobata glaberrima, petiolo caulem inferne amplectente ruberrimo sulcato; folia summa sub-cuneiformia, serrata, petiolo breviori.

LIGUSTICUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 261.

Char. sec. *Rad.* fusiformis ramosa. *Caul.* herbacea. *Fol.* alterna amplexicaulis bipinnata, foliolis oppositis, sessilibus simplicibus incis. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulcr.* nulla.

1. LIGUST. foliis multiplicibus, foliolis superne incis, *Ligusticum*. Linn. sp. 250. Sauv. 261.

Angelica montana perennis paludarii folio. Tour. 313.

L'iveche ou ache de montagne.

HABITAT à l'Esperou la louzere.

HOSPITATUR in frigidario.

ANGELICA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 262.

Char. sec. *Rad.* fusiformis. *Caul.* fistulosa ramosa

742 . PENTANDRIA DIGYNIA,

herbacea. *Fol.* alternâ amplexicaulis bipinnata;
foliolis oppositis sessilibus simplicibus integris.
Flor. umbellata terminalis. *Fulcr.* nulla.

- Archangelica* 1. ANGEL. foliorum impari lobato. *Linn. sp. pag.* 250,
Sauv. 261.
Imperatoria sativa. *Tour.* 317.
L'Angélique, vernaculè *l'angélique*.
HOSPITATUR in fugidario. Radix perennis.

S I U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 163.
Char. sec. *Rad.* tuberosa fibrosa fusiformis. *Caul.*
herbacea striata. *Fol.* alterna, amplexicaulis
pinnata, foliolis simplicibus integris. *Flor.* ter-
minalis vel axillaris, nunc pedunculata nunc
sessilis. *Fulcr.* nulla.

- Latifolium.* 1. SIUM foliis pinnatis, umbellâ terminali. *Linn. sp.*
251. *Sauv.* 231.
Sium latifolium. *Tour.* 308.
La Berle.
HABITAT Monspelii in aquis juxtâ *Castelnau & La-*
verune, &c.
Notiflorum. 2. SIUM foliis pinnatis, umbellis axillaribus sessilibus.
Linn. sp. 251.
Sium aquaticum procumbens, ad alas floridum. *Tour.*
308.
HABITAT in aquis ubique, *au Verdanson*. Umbellæ
aliæ oppositifoliæ.
Sisarum. 3. SIUM foliis pinnatis, floralibus ternatis. *Linn. sp.* 251.
Sisarum Germanorum. *Tour.* 308.
Le Chervi.
HOSPITATUR sub dio. Foliolum terminale (æpius)
cordatum. Radix tuberosa.

S I S O N.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 165.
Char. sec. *Rad.* tenuis fusiformis. *Caul.* simplex
herbacea striata. *Fol.* alterna amplexicaulis pin-
nata, pinnulis simplicibus integris aut indivis,
oppositis vel verticillatis. *Flor.* terminalis um-
bellata. *Fulcr.* nulla.

1. SISON foliis pinnatis; umbellis erectis. *Linn. sp. Amomum.*
pag. 252. Sauv. 252.
Silba amomum officinis nostris. Bot. Monf. 242.
Sison aromaticum live sison officinarum. Tour. 308.
HABITAT Monspeli in ledo amne, à *Grammont*, à
Salazon ad Levam in rivulo.
2. SISON foliolis caulibus subcapillaribus. *Linn. sp. pag. Ammi.*
252.
Fœniculum annum odore origani. Tour. 312.
Ammi perpusillum. Lob. Icon. 725.
HOSPITATUR sub dio. Umbella universalis (apud
nos an semper) umbilicata; umbellulæ omnes in-
vulcello quinquephyllo, foliolis duobus cæteris
longioribus, apice dilatis, ovatis, acuminatis.
3. SISON foliolis verticillatis capillaribus. *Linn. sp. pag. Verticillatum*
253.
Bunium bulbis oblongis. Sauv. 256.
Carum foliolis seraceis verticillatis, radice napiformi.
Sauv. 168.
Carvi foliis tenuissimis asphodeli radice. Tour. 306.
HABITAT à l'Esperon, Saint Guillen le Désert.
HOSPITATUR sub dio.

BUBON.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 164.*

Char. sec. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea ramosa
striata. *Fol.* alterna amplexicaulis, inferior bi-
pinnata, summa pinnata, foliolis inferioribus
pinnularum petiolatis; omnibus simplicibus in-
cisis. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulcr.* nulla.

1. BUB. foliolis rhombeo-ovatis crenatis, umbellis nu- *Macedonicum*
merosissimis. *Linn. sp. 253. Sauv. 260.*
Apium Macedonicum. Tour. 305.
Le persil de Macedoine.
HOSPITATUR sub dio. Folia tenera tomento incana,
caulis summus item albicans.

OENANTHE.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 167.*

Char. sec. *Rad.* nunc perpendicularis bulbosa,
nunc horizontalis fibrosa. *Caul.* herbacea striata,

nunc solida, nunc stipulosa. *Fol.* alterna amplexicaulis bipinnata, foliolis simplicibus incis; vel inferior bipinnata, superior pinnata. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulc.* nulla.

- Fistulosa.* 1. OENANT. stolonifera, foliis caulinis pinnatis filiformibus fistulosis. *Linn. sp.* 254.
Oenanthe aquatica. *Tour.* 313. *Bot. Monf.* 189.
Oenanthe sive *filipendula aquatica.*
HABITAT Monspelii in aquis laterensibus. *Altitudo* pedalis & sesquipedalis. *Foliola* inferiora bipinnata, foliolis pinnularum ovatis profunde incis. *Umbellulæ* convexæ. *Radix* quandoque bulbiformis globosa, radiculis fibrosis lateralibus.
- Crocata.* 2. OENANT. foliis omnibus multifidis obtusis subæqualibus. *Linn. sp.* 254.
Oenanthe charophylli foliis. *Tour.* 313.
Oenanthe cicutæ facie succo viroso croceo. *Lob. Icon.* 730.
HOSPITATUR in frigidario. *Succus* venenatus.
- Pimpinellæ.* 3. OENANT. foliolis radicalibus ovatis incis, caulinis integris linearibus longissimis simplicioribus. *Linn. sp. pag.* 255.
Oenanthe pastinacæ sylvestris folio, semine attriplicis. *Bot. Monf.* 189.
Oenanthe apiifolio. *Tour.* 313.
HOSPITATUR sub dio. Rara in agro Monspelienfi. Bistantum vidi ultra *Prades*, ad lævam versùs Montem lupum.
- Charophyllæ.* 4. OENANT. foliis bipinnatis, foliolis lanceolatis, seminibus muticis.
Oenanthe charophylli foliis. *Sauv.* 260. *Magn. her.* 146. *Tour.* 313.
Ferula alpina humilis, foliorum pinnis angustissimis, trifariam, quinquefariamve divis. *Seg. ver. tom.* II. p. 37.
Seseli Massiliense nuperorum, folio aliquatenus simili visnagæ. *J. B.* 3. p. 2. 33.
Seseli nuperorum. *Lob. Icon.* 785. *Icon bona.*
HOSPITATUR sub dio. An revera sui generis nondum examinare licuit. Semina hujusce ex horto Parisino habuerat juvenis Chycoyneau sub nomine *Oenant.*
Charoph.

PENTANDRIA DIGYNIA. 145

Charoph. fol. hort. Mons. ipsa tamen involucri
neque seminum figuram sui generis præ se fert.

PHELLANDRIUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 268.

Char. sec. *Rad.* fusiformis. *Caul.* ramosa striata
herbacea. *Fol.* alterna amplexicaulis, inferior
tripinnata, superior bipinnatafoliolis simpli-
cibus pinnatifidis. *Flor.* umbellata terminalis.
Fulcr. nulla.

1. PHELLAND. foliorum ramificationibus divaricatis. *Aquaticum.*
Linn. sp. 255.

Cicutaria palustris tenuifolia. Bot. Mons. 293.

Phellandrium. Tour. 306.

La Cigue d'eau.

HABITAT propè Monspelium, à Nîmes dans le Vistre.

HOSPITATUR in aquario palustri.

ÆTHUSA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 271.

Char. sec. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea ramosa
striata. *Fol.* alterna amplexicaulis bipinnatafo-
liolis sessilibus simplicibus multifidis. *Flor.* ter-
minalis umbellata. *Fulcr.* nulla.

1. ÆTHUSA. *Linn. sp.* 256.

Cynapium.

Cicuta minor petroselino simili. Tour. 306.

La petite Cigue.

HOSPITATUR sub dio.

CORIANDRUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 170.

Char. sec. *Rad.* tenuis fusiformis. *Caul.* herbacea
striata. *Fol.* alterna amplexicaulis pinnatafo-
liolis simplicibus multifidis. *Flor.* terminalis
umbellata. *Fulcr.* nulla.

1. CORIAND. fructibus globosis. *Linn. sp. pag.* 256. *Majus.*
Sauv. 260. *Tour.* 316.

Le Coriandre.

HOSPITATUR sub dio. Annuum.

S C A N D I X.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 273.

Char. sec. *Rad.* fusiformis tenuis. *Caul.* herbacea striata. *Fol.* alterna amplexicaulis pinnata vel bipinnata, foliolis incisis. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulcr.* nulla.

- Odorata.* 1. SCAND. feminibus fulcatis angulatis. Linn. sp. 256. Sauv. 260.
Myrrhis major seu cicutaria odorata. Tour. 315.
Le Cerfeuil musqué.
HABITATUR sub dio.
- Pellen vena.* 2. SCAND. feminibus lævibus rostro longioribus. Linn. sp. 256.
Scandix semine rostrato, vulgaris. Bot. Monf. 232. Tour. 326.
Le peigne de Venus. Vernaculè *las aguietas*, sed improprie.
HABITAT ubique Monspelii.
- Cerofolium.* 3. SCAND. feminibus nitidis ovato-subulatis. Linn. sp. pag. 257.
Cherophyllum sativum. Tour. 314.
Le Cerfeuil, vernaculè *de Cerfeuil*.
HABITAT Monspelii in oleribus.
- Australis.* 4. SCAND. feminibus rostratis parulis pedunculo longioribus. Sauv. 260.
Scandix feminibus rostratis subulatis hispidis, floribus radiatis, caulibus lævibus. Linn. sp. 257.
Scandix cretica minor. Bot. Monf. 232. Tour. 326.
HABITAT Monspelii ad lævam circà *Boutonet*; vix semipedalis rigida nec striata, simplicissima vel quandoque ramo uno aut altero à basi caulis. Umbellæ sæpius terminales duæ; foliola capillaria.

C H Æ R O P H Y L L U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 174.

Char. sec. *Rad.* fusiformis (in unâ specie globosa.) *Caul.* herbacea striata. *Fol.* alterna amplexicaulis bipinnata, foliolis simplicibus incisis. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulc.* nulla.

* *Floribus omnibus hermaphroditis.*

1. CHÆR. flosculis omnibus hermaphroditis, caule *Sylvestre;*
æquali. *Linn. sp. 258.*

Myrrhis sylvestris seminibus lævibus. *Bot. Monf. 181.*

Chærophyllo sylvestre perenne cicuræ folio. *Tour. 114.*

Chærophyllo seminibus lævibus nudis, petiolis ramiferis simplicibus. *Sauv. 258.*

HABITAT Monspelii, à la Verune dans le Parc.

HOSPITATUR sub dio.

* *Floribus d'œci masculis.*

2. CHÆR. caule scabro, geniculis tumidis. *Linn. sp. 258. Temulum.*
Chærophyllo caule maculato, geniculis tumidis.
Sauv. 262.

Myrrhis annua semine striato lævi. *Tour. 315.*

HABITAT à l'Esperou.

HOSPITATUR in frigidario. Foliola extima in petiolum decurrentia seu basi coadunata, ut apex pinnularum videatur tantum pinnatifidus. Caulis fistulosus.

3. CHÆR. caule æquali, foliolis incisacutis. *Linn. sp. 258. Hirsutum;*
Chærophyllo foliolis dissectis, petiolis ramiferis
universalibus, utrinque membrana auctis. *Sauv. 262.*
Myrrhis palustris latifolia alba. Tour. 315.

HABITAT cum priori.

HOSPITATUR sub dio. Puncta albida supra serraturas;
an glandulæ? foliola omnia exteriora latiora & longiora.

S E S E L I.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 275.*

Char. sec. *Rad.* tenuis fusiformis. *Caul.* herbacea
ramosa striata. *Fol.* alterna amplexicaulis, bipinnata vel tripinnata, foliolis simplicibus linearibus. *Flor.* umbellata terminalis. *Fulc.* nulla.

1. SES. petiolis ramiferis membranaceis oblongis integris, *Montanum.*
foliis caulinis angustissimis. *Linn. sp. 260. Sauv. 256.*
Foeniculum sylvestre perenne ferulæ folio breviori.
Tour. 311.

Meum alterum Italicum quibusdam. *J. Bauh. 3. part. 2. 15.*

HOSPITATUR sub dio.

2. SES. petiolis ramiferis membranaceis oblongis integris, *Glaucum.*
foliolis singularibus biatisque. *Linn. sp. 260.*

Daucus glauco folio similis fœniculo tortuoso. *Bot. Mons.* 85.

Fœniculum sylvestre glauco folio. *Tour.* 311.

Peucedanum minus. *Bauh. pin.* 149.

Le Sefeli.

HABITAT Monspelii circa la Valette, la Colombiere, Monferrier.

Tortuosum. 3. *SES.* caule alto rigido, foliolis linearibus fasciculatis. *Linn. sp.* 260.

Oenanthe striata rigida. *Sauv.* 257.

Sefeli Massiliense fœniculi folio crassiore. *Bot. Mons.* 239.

Fœniculum tortuosum. *Tour.* 311.

Le Sefeli de Marseille, ou Fenouil tortu.

HABITAT Monspelii, frequens circa Gramuntium.

Annuum. 4. *SES.* petiolis rameis membranaceis ventricosis emarginatis. *Sauv.* 256. *Linn. sp. pag.* 260.

HABITAT Monspelii cum les. glauco, sed rariùs.

THAPSIA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 278.

Char. sec. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea ramosa striata. *Fol.* alterna amplexicaulis bipinnata foliolis simplicibus pinnatifidis. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulcr.* nulla.

Villosa. 1. *THAP.* foliolis dentatis basi coadunatis. *Linn. sp.* 261. *Thapsia* quorundam hirsuta & aspera cicutæ folio, flore luteo, semine lato. *Bot. Mons.* 249.

Thapsia latifolia villosa. *Tour.* 322.

Malherbe.

HABITAT Monspelii ad mare.

Fœtida. 2. *THAP.* foliolis multifidis basi angustatis. *Linn. sp.* 261.

Thapsia carottæ folio. *Bauh. pin.* 149.

HOSPITATUR sub dio.

Asclepium. 3. *THAP.* foliolis multifidis setaceis. *Linn. sp.* 261.

Thapsia foliolis pinnatifidis linearibus ad petiolum communem radiatis. *Sauv.* 258.

Thapsia tenuiore folio. *Tour.* 322.

Thapsia sive turbiti garganicum. *Tour.* 322.

Thapsia thalictri folio. *Bot. Mons.* 287. *Icon.* 286.

La Thapsie, ou Turbiti bâtard.

HABITAT Monspelii; près de l'Esperou, dans le bois de Saluos.

PASTINACA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 279.

Char. sec. Rad. fusiformis. Caul. herbacea ramosa striata. Fol. alterna amplexicaulis, pinnata, bipinnata, foliolis simplicibus, latis incis. Flor. terminalis umbellata. Fulc. nulla.

1. PAST. foliis pinnatis simpliciter. Linn. sp. 262. Sativa.
Pastinaca sylvestris latifolia. Tour. 319. Bot. Monf. 199. & *sativa.* Tour. ibid.
Le Panais, ou Pastenade; vernaculè, Pastenague.
 HABITAT Monspelii ubi que. Pinnulæ oblique ovatæ, incisæ oppositæ (pastinacæ sativæ,) subciliæ; in pastinaca sylvestri, pinnulæ petiolatæ, duplo majores, hirsutæ lobatæ.
2. PAST. foliis decompositis pinnatis. Linn. sp. 262. Opoponax.
Panax costinum. Bot. Monf. 197.
Pastinaca sylvestris altissima. Tour. 319.
 HABITAT Monspelii versùs Villam novam secus fluvium.

SMYRNIUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 280.

Char. sec. Rad. rapacea. Caul. herbacea ramosa striata. Fol. alterna amplexicaulis biternata, foliolis simplicibus incis. latiusculis. Flor. terminalis umbellata. Fulcr. nulla.

1. SMYR. foliis caulinis ternatis petiolatis serratis. Sauv. (Olivetrum. 262. Linn. 262.
Smyrnum Dioscoridis. Bot. Monf. 242.
Smyrnum Mathioli. Tour. 316.
Le Maceron.
 HABITAT Monspelii versùs Villam novam; à St. Paul, à Monteil, ad dexteram.

ANETHUM

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 281.

Char. sec. Rad. teretifusiformis. Caul. herbacea striata. Fol. alterna amplexicaulis bipinnata, foliolis simplicibus pinnatifidis, filiformibus vel

150 PENTANDRIA DIGYNIA.

linearibus, planiusculis, *Flor.* terminalis umbellata. *Fulcr.* nulla.

Gravolens. 1. ANETH. fructibus compressis. *Linn. sp.* 263. *Sauv.* 255.

Anethum hortense. *Tour.* 318.

Anethum. *Lob. Icon.* 776.

L'Anet.

HOSPITATUR sub dio. Annuum. Vix pedalem superans altitudinem. Foliola omnia linearia planiuscula.

Feniculum. 2. ANETH. fructibus ovatis. *Linn. sp.* 263. *Sauv.* 255.

Foeniculum vulgare acriori & nigriori semine. *Bot. Monf.* 98.

Foeniculum dulce majore & albo semine. *Tour.* 311.

Le Fenon'le; vernaculè, *lou Fenoul.*

HABITAT ubique *Montpelii.* Foliola linearia teretiuscula. *Altitudo humana.*

C A R U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 282.

Char. sec. Rad. fusiformis. *Caul.* herbacea. *Fol.* alterna amplexicaulis, bipinnata, foliolis simplicibus incis. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulc.* nulla.

Carvi. 1. CAR. *Linn. sp.* 263. *Lob. Icon.* 724. *Tour.* 306. *Sauv.* 257.

Le Carvi.

HABITAT *Montpelii*; à l'Esperou.

HOSPITATUR sub dio.

P I M P I N E L L A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 283.

Char. sec. Rad. fusiformis. *Caul.* herbacea simplex striata. *Fol.* alterna amplexicaulis pinnata, foliolis latiusculis simplicibus incis. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulc.* nulla.

Saxifraga. 1. PIMPIN. foliis pinnatis, foliolis radicalibus subrotundis, summis linearibus. *Linn. sp. pag.* 263.

Pimpinella saxifraga minor. *Bot. Monf.* 204. & major. *It. d.*

Tragofelinum umbella rubente. *Tour.* 309.

4. Pimpinella foliolis trifidis lobo medio tripartito, lobulis quadrifidis. *Sauv.* 231.

La Bouquetine.

5. Pimpinella pinnis semi-lobatis circumferratis. *Sauv.* 231.

Tragofelinum umbella candida. *Tour.* 309.

La Pimprenelle blanche.

7. Pimpinella foliolis subrotundis. *Sauv.* 231. & pinnis laciniatis superioribus tenuissimis. *Sauv.* 231.

Tragofelinum alterum majus. *Tour.* 309. & minus. *Ibid.*

Le Boucage.

HABITAT Monspelii; au Capouladou, à l'Esperou. β. au nord du mont St. Lo sp.

2. PIMPIN. foliis radicalibus trifidis incis. *Linn.* 264.

Anisum.

Anisum foliis radicalibus simplicibus. *Sauv.* 231.

L'Anis, vernaculè *l'Anis*.

HOSPITATUR sub dio. Annuum. Altitudo anethi.

A P I U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 285.

Char. sec. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea striata sulcata. *Fol.* alterna amplexicaulis bipinnata, foliolis simplicibus. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulc.* nulla.

1. APIUM foliolis caulinis linearibus. *Linn.* 264.

Petroselinum.

Apium hortense. *Tour.* 305. vulgè petroselinum.

Le Persil, vernaculè *Jambert*.

HABITAT Monspelii in hortis. Folia summa pinnata, foliolis tribus vel quinque integerrimis; foliolum unicum simplex (sæpius) involucriforme ad basim umbellæ universalis.

2. APIUM foliolis caulinis cuneiformibus. *Linn. sp.* 264. *Gravolent.*

subtrifidis.

Apium palustre seu officinarum. *Bot. Mons.* 24. *Tour.* 305.

Le Celeri, vernaculè *l'Api*.

HABITAT Monspelii cum priori. Caulis sulcatus. Foliola inferiora opposita petiolata trifida, superiora subsessilia. Puncta albida supra ferraturas.

ÆGOPodium.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 284.

Char. sec. *Rad.* horizontalis. *Caul.* herbacea striata. *Fol.* alterna amplexicaulis, inferior bi-ternata, foliolis sessilibus, superior ternata foliolis petiolatis, omnibus simplicibus integris. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulcr.* nulla.

Podagraria. 1. ÆGOP. foliis caulinis summis ternatis. Linn. 265. Sauv. 182.

Angelica sylvestris minor seu erratica. Tour. 313.

Podagraria Germanica. Lob. Icon. 700.

L'Herbe à Gérard, ou Pied de chèvre.

HABITAT Monspeli; à l'Esperou. Luxuriat in labyrintho horti regii.

Foliola obversè ovata acuta serrata.

TRIGYNIA.

RHUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 287.

Char. sec. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* fruticosa arborea. *Fol.* simplex integerrima alterna petiolata, nunc ternata, aut impari-pinnata, foliolis simplicibus integris. *Flor.* axillaris terminalis racemosa. *Fulc.* nulla.

Coriaria. 1. RHUS foliis pinnatis obtusiuscule serratis ovalibus, tubris villosis. Linn. sp. 265.

Rhus folio ulmi. Bot. Mnf. 222. Tour. 611.

Rhus corariorum. Lob. Icon. 98.

Rhus live sumac. J. Bauh. 1. 555.

Le Sumac.

HABITAT Monspeli; à Castelnau, Lamousson, &c. A. bor. Folia pinnata, foliolis 13. vel 15. sessilibus oppositis ad apicem serratis, basi integerrimis. Florens juuo.

Toxicodendron. 2. RHUS foliis ternatis, foliolis petiolatis angularis pubescentibus. Linn. 266.

Toxicodendrum triphyllum, folio sinuato candicante. Tou. 611.

PENTANDRIA TRIGYNIA. 153

Rhus foliis ternatis, foliolis petiolatis, &c. *Sauv.* 172.

Hedera trifolia racemosa *Canadensis.* *Barr. Icon.* 288.

HOSPITATUR in frigidario. Radix horizontalis. Frutex.

3. RHUS foliis simplicibus obovatis. *Linn. sp.* 267. *Cotinus.*

Cotinus coriaria. *Tour.* 611.

Coccygia Theophrasti. *Lob. Icon.* 99. *Barr. Icon.* 528.

Le Fuſet.

HOSPITATUR in frigidario. Frutex.

VIBURNUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 292.

Char. sec. Rad. lignosa ramosa. Caul. arborea.

Fol. opposita petiolata, simplex integra integerrima. Flor. terminalis cymosa vel capitata.

Fulcr. nulla; glandulæ (in unâ specie) supra petiolum.

1. VIBUR. foliis integerrimis ovatis, ramificationibus *Tinus.*

subtus villoſo-glanduloſis. *Linn. sp. pag.* 267.

Viburnum foliis ovatis integerrimis. *Sauv.* 136.

Laurus ſylveſtris, corni feminæ folio hirsuto. *Bot.*

Monſ. 152.

Tinus prior. *Tour.* 607.

Le Laurier-tin, vernacu'è *Laurietin.*

HABITAT *Monſpelii*; à *Valene.* Arbor ſempervirens.

2. VIBUR. foliis cordatis ferratis venoſis ſubtus tomentoſis. *Linn. sp.* 268. *Sauv.* 136. *Lantana.*

Viburnum vulgè. *Bot. Monſ.* 275. *Tour.* 607.

La Viorne.

HABITAT *Monſpelii*, à *Valene* & à *St. Martin.*

Arbuſcula.

3. VIBUR. foliis lobatis, petiolis glanduloſis. *Linn.* 268. *Opulus.*

Opulus. *Tour.* 607. *Sauv.* 202.

L'Obier.

HOSPITATUR ſub dio. Arbuſcula. Corymbi globoſi.

SAMBUCUS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 294.

Char. sec. Rad. lignota ramosa. Caul. herbacea

vel arborea. Fol. opposita impari pinnata, fo-

liolis ſimplicibus integris petiolatis. Flor. cy-

moſa vel racemoſa, terminalis pedunculata.

Fulcr. ſtipulæ.

154 PENTANDRIA TRIGYNIA.

- Ebulus.** 1. SAMB. cymis tripartitis, stipulis foliaceis. *Linn. sp. pag. 269.*
Sambucus humilis sive *ebulus*. *Bot. Monf. 229. Tour. 606.*
L'Hyble; vernaculè, *lous Ebous*.
 HABITAT Monspe'ii secus amnem.
- Nigra.** 2. SAMB. cymis quinquepartitis, caule arboreo. *Linn. sp. pag. 269.*
Sambucus fructu in umbella nigro. *Bot. Monf. 229. Tour. 606.*
Sambucus caule arboreo floribus umbellatis. *Sauv. 222. Le Sureau*; vernaculè, *lou Sambuc*.
 HABITAT ubique ad margines agrorum.
- Racemosa.** 3. SAMB. racemis compositis ovatis, caule arboreo. *Linn. sp. p. 270.*
Sambucus caule arboreo ramoso, floribus racemosis. *Sauv. 222.*
Sambucus racemosa. *Tour. 606.*
 HOSPITATUR sub dio.

STAPHYLEA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 296.*
 Char. secund. *Rad. lignosa. Caul. arborea. Fol. opposita, impari-pinnata, foliolis simplicibus integris sessilibus. Flor. laxa racemosa axillaris & terminalis. Fulcr. stipulæ binæ lanceolatæ membranaceæ.*

- Pinnata.** 1. STAPH. foliis pinnatis. *Linn. sp. pag. 270.*
Staphylodendron. Tour. 616.
Le Nés coupé.
 HOSPITATUR in frigidario. Arbor. Semina maturans.
 Folia pinnata foliolis quinque vel septem argutè serratis. Stipulæ flavescentes. Racemi longitudine foliorum.

TAMARIX.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 295.*
 Char. sec. *Rad. lignosa ramosa. Caul. arborea. Fol. minima alterna imbricata simplicissima integerrima. Flor. racemosa terminalis. Fulcr. stipula solitaria subulata minima, ad basim ramificationum.*

1. TAM. floribus pentandris. *Linn. sp. p. 270. Sauv. 45. Gallica.*
Tamariscus Narbonensis. Bot. Mons. 248. Tour. 661.
Le Tamarisc ; vernaculè, de Tamaris.
 HABITAT Monspelu ad mare, & à Montferrier.

T U R N E R A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 297.

Char. secund. *Rad.* lignosa. *Caul.* fruticosa. *Fol.* alterna subpetiolata simplex integra. *For.* axillaris solitaria subsessilis petiolaris. *Fulc.* bractæ binæ ad latera calycis lanceolatæ ; glandula solitaria petiolaris.

1. TURN. bracteis serratis calyci æqualibus. *Ulmifolia.*
Turnera foliis serratis, petiolis floriferis. Linn. sp. p. 271.
 HOSPITATUR sub dio. Folia ovato-lanceolata inæqualiter serrata, petiolo nullo vel brevissimo. Flores lutei in medio petiolo. Calycis denticuli acuminati. Difficile sæpius distinguitur utrum reverà flos sit petiolaris vel axillaris, idque petioli brevitatis causa.

T E L E P H I U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 298.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea angulata procumbens. *Fol.* alterna sessilis simplex integerrima. *Flor.* cymosa terminalis. *Fulc.* nulla.

1. TELEPH. foliis obverse ovatis. *Imperati.*
Telephium. Linn. sp. p. 271. Tour. 249.
Telephium foliis orbiculatis humifusis pinnatis. Sauv. 227.
 HOSPITATUR sub dio. Nervi foliorum decurrunt in caulem.

C O R R I G I O L A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 299.

Char. sec. *Rad.* tenuissima. *Caul.* herbacea ramosa teres. *Fol.* alterna sessilis simplex integerrima. *Flor.* fasciculata terminalis. *Fulcr.* nulla.

1. CORRIG. foliis lanceolatis. *Littoralis.*
Corrigiola. Linn. sp. p. 271. Sauv. 53.

156 PENTANDRIA TETRAGYNIA.

Polygonifolia per terram sparsa flore scorpioïdes.
Bot. Monf. 210.

HABITAT Montpelii, au mont St. Loup, & à la source du Lés ad lævam pone montem; glomeruli quidam florum interdum axillares. Plantula vix palmaris.

A L S I N E.

Char. prim. Vid. Linn. Syst. pl. 342.

Char. sec. *Rad.* fibrosa. *Caul.* herbacea teres articulata. *Fol.* opposita petiolata simplex integerrima. *Flor.* axillaris pedunculata, solitaria. *Fulc.* nulla.

Medic. 1. ALS. petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis. Linn. *sp. p.* 272.

Alfene media. Tour. 243.

Alfene vulgaris sive morsus gallinæ. *Bot. Monf.* 12.
La Morgerine; vernaculè, de *Mouillous*.

HABITAT Montpelu passim.

B A S E L L A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 1047.

Char. sec. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea teres volubilis. *Fol.* petiolata simplex integerrima succulenta. *Flor.* axillaris racemosa pedunculata. *Fulc.* nulla.

Rubra. 1. BAS. foliis planis. Linn. *sp. p.* 272.

HOSPITATUR sub dio. Annua (apud nos) Caulis dextrorsum volubilis, ruber. Folia ovalia, petiolo ipsis multo brevioribus; corollæ albæ crassæ, apice purpurascens.

TETRAGYNIA.

P A R N A S S I A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 302.

Char. sec. *Rad.* subfusiformis radiculis fibrosis involuta. *Caul.* herbacea monophylla teres simplicissima. *Fol.* simplex integerrima, radicalis petiolata, caulina solitaria amplexicaulis sessilis. *Flor.* terminalis solitaria. *Fulc.* nulla.

1. PARN. foliis omnibus cordatis. *Palustris.*
Parnassia. Linn. sp. p. 273. Sauv.
Parnassia palustris & vulgaris. Tour. 246. Seg. ver.
tom. I. pag. 441.
 HABITAT Montipeli, à l'Esperon, à Joyeuse.
 HOSPIATUR in frigidario; altitudo æquæ-palmaris
 vel minor.

PENTAGYNIA.

STATICE.

- Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 305.
 Char. sec. Rad. setacea tenuis. Caul. scaposa
 ramosissima. Fol. radicata sessilis simplex integerrima. Flor. terminalis capitata vel laxè paniculata. Fulc. bractea (in paniculatis) subulata rigida ad basim cujuslibet calycis.
1. STAT. caule nudo simplici capitato. *Linn. 274. Armeria.*
Sauv. 27.
Statice Lugdunensium. Tour. 341.
Caryophyllus montanus major flore globoso. Bot.
Mons. 54. & minor. Ibid.
Le Gazon d'Espagne ou d'Olimpe.
 HABITAT Montipeli, à l'Esperon.
 HOSPIATUR sub dio. Perennis. Folia oblonga rigida.
 In horto culta foliis linearibus mollibus variat.
2. STAT. caule nudo paniculato tereti, foliis lævibus. *Limonium.*
Linn. sp. p. 274.
 Statice caule ramoso nudo, foliis lanceolato-ovalibus glabris. *Sauv. 28.*
Limonium maritimum majus. Bot. Mons. 155. Tour.
341.
3. STAT. foliis obverse ovatis glabris, caule nudo. *Sauv. 15.*
Limonium parvum, bellidis minoris folio. Bot. Mons.
155. Tour. 341.
 HABITAT Montipeli ad mare, ad stagna. Florens
 Augusto.
 HOSPIATUR sub dio. Perennis.
3. STAT. caule nudo paniculato tereti, foliis tuberculatis. *Echioides.*
Linn. sp. p. 275.

158 PENTANDRIA PENTAGYNIA.

Limonium minus annuum, bullatis foliis. *Bot. Monsf.* 157. *Tab.* 156. *Tour.* 342.

HABITAT Monspeliū ultra pontem Sallenovæ ad dexteram in olivetis; vide superius ubi de avenâ bromoide & tillæâ rubrâ.

HOSPITATUR sub dio. Annua; palmaris.

L I N U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 306.

Char. sec. *Rad.* tenuis setacea. *Caul.* herbacea teres. *Fol.* simplex sessilis integerrima, alterna vel opposita, vel inferior opposita, superior alterna. *Flor.* terminalis laxè paniculata. *Fulc.* nulla.

* *Foliis alternis.*

Usitatissimum. 1. **LINUM** calycibus capsulisque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule subsolitario. *Linn. sp. p.* 277.

Linum ramis foliisque alternis, radice annua. *Sauv.* 53.

Linum angustifolium. *Bot. Monsf.* 160.

Linum arvense. *Tour.* 339. & sativum. *Ibid.*

Le Lin d'usage; vernaculè *le lin*.

HABITAT Monspeliū in agris.

Perenne. 2. **LINUM** calycibus, capsulisque obrusis, foliis alternis lanceolatis integerrimis. *Linn.* 277.

Linum perenne ramis, foliisque alternis lineari-lanceolatis. *Sauv.* 53.

Linum perenne majus cæruleum, capitulo majore. *Tour.* 339.

HOSPITATUR sub dio.

Narbonense. 3. **LINUM** calycibus acuminatis, foliis lanceolatis sparsis strictis scabris acuminatis, caule tereti basi ramoso. *Linn. sp.* 278.

Linum sylvestre cæruleum, folio acuto. *Tour.* 340. & *Barr. Jon.* 100. *Sauv.* 92.

Linum sylvestre cæruleo amplo flore, angustifolium. *Sauv.* 54. *Bot. Monsf.* 161.

HABITAT Monspeliū, circâ *Caunelles*, *Castelnau*.

Tenuifolium. 4. **LINUM** calycibus acuminatis; foliis sparsis lineari-bus setaceis retrorsum scabris. *Linn.* 278.

Linum perenne foliis angustioribus, calyce aristato. *Sauv.* 49.

PENTANDRIA PENTAGYNIA. 159

- β. *Linum sylvestre angustifolium* floribus dilutè purpureis vel carneis. *Bot. Monsf.* 160. *Tour.* 340.
HABITAT cum priori mirè varians.
5. **LINUM** calycibus acutis, foliis lineari-lanceolatis *Trigynum.*
alternis, paniculæ ramis bifloris. *Linn. sp. pag.* 279.
Linum sylvestre annuum luteum, folio angustiore.
Tour. 340.
Linum sylvestre minus flore luteo. *Bot. Monsf.* 160.
Linum folius lineari-lanceolatis, pedunculis bifidis,
flore luteo. *Sauv.* 53.
HABITAT *Monspeli*, à *la Valette*, au *Terrail*. Variat
quandoque floribus pentagynis.
6. **LINUM** calycibus subserrato scabris lanceolatis sub- *Flavum.*
sessilibus, panicula ramis dichotomis. *Linn. sp.* 279.
Linum sylvestre latifolium luteum. *Tour.* 340.
HABITAT *Monspeli*, au *Mont Saint Loup*.
7. **LINUM** calycibus, foliisque lanceolatis strictis mu- *Strictum.*
cronatis: margine scabris. *Linn.* 279.
Linum foliis asperis umbellatum luteum. *Bot. Monsf.*
164. *Tour.* 340. *Sauv.* 53.
Lithospermum linariæ folio Monspeliacum. *Bot.*
Monsf. 164.
HABITAT *Monspeli* frequens. Copiosum circà *Lavanet* & *Boutonet*: vix semipedale. Folia cauli ad-
pressa; nervo & margine scabris. Panicula con-
glomerata.
8. **LINUM** foliorum basi utrinque puncto glanduloso. *Campanula.*
Linn. sp. 280. *lun.*
Linum foliis imis spathulatis, floribus luteis. *Sauv.* 76.
Campanula montis Lupi. *Lob. Icon.* 414. *Barr.*
Icon. 810. insufficiens.
Linum sylvestre luteum foliis subrotundis. *Bot.*
Monsf. 163. *Tour.* 340.
HABITAT *Monspeli*, au *mont Saint Loup*.
9. **LINUM** calycibus ovatis acutis muticis, foliis lan- *Maritimum.*
ceolatis: inferioribus oppositis. *Linn. sp. pag.* 280.
Linum caule simplici, ramis, foliisque inferioribus
oppositis. *Sauv.* 147.
Linum maritimum luteum. *Bot. Monsf.* 160. *Tour.*
340.
HABITAT *Monspeli* ad mare & stagna. Occurrit
quandoque in pratis laterensibus. Florens Augusto.

160 PENTANDRIA PENTAGYNIA.

* *Foliis oppositis.*

- Catharticum** 10. LINUM foliis oppositis ovato-lanceolaris, caule dichotomo, corollis acutis. *Linn. sp.* 281.
 Linum maritimum vel alpine glabra flosculis albis.
Bot. Monf. 161.
 Linum pratense flosculis exiguis. *Tour.* 340. *Barr.*
Icon. 1165. n^o. 1.
 Linum caule dichotomo, foliis, &c. *Sauv.* 147.
 HABITAT Montpel i propè Molendinas secùs ledum
 Amnem. *A. Sauret.*

DROSER A.

- Char. prim. Vid. *Linn. gen. plant.* 307.
 Char. sec. *Rad.* tenuissima filiformis. *Caul.* scaposa multiflora. *Fol.* radicalis simplex petiolata integerrima. *Flor.* terminalis racemosa simplex.
Fulcr. glandulæ petiolatæ glutinosæ confertæ suprà folia.

- Rotundifolia.** 1. DROS. scapis radicatis, foliis orbiculatis. *Linn. sp.* 281. *Sauv.* 15.
 Rosfolis folio rotundo. *Tour.* 245. *Barr. Icon.* 251.
Le Rosfolis.
 HABITAT in humidis. à l'Esperou.
 HOSPITATUR sub dio. In frigidario & labyrintho horti regi; annuum.

C R A S S U L A.

- Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 308.
 Char. sec. *Rad.* fibrosa, funiformis. *Caul.* herbacea articulata succulenta. *Fol.* opposita sessilis simplex integerrima succulenta. *Flor.* axillaris folitaria pedunculata. *Fulcr.* nulla.

- Perfoliata.** 1. CRAS. foliis lanceolato-subulatis sessilibus connatis canaliculatis; subtus convexis. *Linn. sp.* 282.
 HOSPITATUR in Caldario.
Tetragona. 2. CRAS. folius subulatis obsolete tetragonis. *Linn. sp.* 283. *Sauv.* 7.
 HOSPITATUR in Caldario.

POLYGYNIA.

POLYGYNIA.

MYOSURUS.

Char. prim. Vid. Linn gen. pl. 311.

Char. secund. *Rad.* tenuis simplex. *Caul.* teres
scaposa uniflora. *Fol.* radicalis linearis simplex
sessilis integerrima. *Flor.* terminalis solitaria.
Fulc. nulla.

Obs. Cave ne receptaculum elongatum pro spicula
sumas.

1. MYOS. Linn. sp. 284. Sauv. 26.

Minimus.

Ranunculus gramineo folio, flore caudato in capi-
tulum spicatum congestis. Tour. 293.

Myosurus sive cauda muris. Lob. Icon. 440.

Holosteio affinis cauda muris. Bot. Mons. 132.

La queue de rat.

HABITAT Monspeli in humidis, à l'entrée du bois de
Gramont; scapus vix triuncialis. Folia plana;
variat floribus dodecandris.



Classis VI.

HEXANDRIA
MONOGYNIA.

BROMELIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 312.

Char. secund. *Rad.* funiformis. *Caul.* nulla. *Fol.* radicalis sessilis simplex integra. *Flor.* radicalis sessilis spicata conica strobiliformis. *Fulcr.* bractæ ad basim calycis, ovatæ, folitariæ. Bractæ foliaceæ magnæ terminales steriles. Spinæ ad margines foliorum.

Ananas, 1. BROM. foliis ciliato-spinosis mucronatis, spica comosa. *Linn. sp.* 285.

Ananas fructu pyramidato carne albida. *Tour.* 653.
& carne aurea. *Ibid.*

L'Ananas ou le pain de sucre.

HOSPITATUR in caldario. Semper virens.

TRADESCANTIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 316.

Char. secund. *Rad.* carnosæ. *Caul.* herbacea. *Fol.* alterna, subulata vaginans simplex integerrima, basi connata. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulcr.* bractæ binæ involucri-formes ad basim umbellæ, foliaceæ subulatæ.

Virginiana, 1. TRAD. bracteis umbella longioribus, pedunculis apice incrassatis.

Tradescantia. *Linn. sp.* 288.

Ephemerum virginianum flore cæruleo minori. *Tour.* 368.

HOSPITATUR sub dio. Pedunculi inæquales. Calix villosus magnitudine ferè floris.

GALANTHUS.

Char. prim. vid. Linn. gen. pl. 317.

Char. secund. *Rad.* bulbosa. *Caul.* scaposa uniflora. *Fol.* radicalis sessilis linearis simplex integerrima. *Flor.* terminalis solitaria. *Fulcr.* nulla.

1. GAL. Linn. sp. 288. *Sauv.*

Narcisso-leucojum trifolium minus. *Tour.* 387. *Seg. ver. T. II. p. 72.*

HOSPITATUR in frigidario. Spatha longitudine floris vel paulo brevior spathulata.

LEUCOJUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 318.

Char. secund. *Rad.* bulbosa. *Caul.* scaposa multiflora. *Fol.* radicalis linearis sessilis simplex integerrima. *Flor.* terminalis aggregata. *Fulcr.* nulla.

2. LEUC. spatha multiflora, stilo filiformi. Linn. sp. 289. *Autumnale.*

Leucojum bulbosum majus. *Bot. Monf.* 153.

Narcisso-leucojum pratense multiflorum. *Tour.* 383. *Le perre-neige.*

HABITAT Monspelii in pratis Laterensibus. Floret apud nos primo vere; scapus pedalis; pedunculi inæquales; spatha oblonga.

NARCISSE.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 319. Adde stamina tria longiora, tria breviora intrà tubum.

Char. secund. *Rad.* bulbosa. *Caul.* scaposa. *Fol.* radicalis sessilis simplex integerrima. *Flor.* terminalis. *Fulcr.* nulla.

Obs. Utrum revera tubus (intrà corollam) sit corollæ, vel nectarii pars, non adeo perspicuum; lineæ enim suprà petala excurrentes pari passu in tubum descendant, undè ad corollam pertinere potius crederem.

1. NARC. spatha uniflora, nectarii limbo rotato brevissimo. Linn. sp. 289. *Poeticus.*

Narcissus foliis ensiformibus, floris nectario rotato brevissimo. *Sauv.* 17.

Narcissus albus circulo purpureo. *Bot. Monf.* 181. *Tour.* 353.

HABITAT Monspeli; prata laterensia una cum orchide militari pulchre ornat.

Pseudo Nar- 2. NARC. spatha uniflora, nectarii limbo campanulato
issus. erecto petalo æquale. *Linn. sp.* 289.

Narcissus foliis ensiformibus, florum nectario longitudine petalorum. *Sauv.* 17.

Narcissus sylvestris pallidus calyce luteo. *Tour.* 356.

HOSPITATUR sub dio. Scapus subanceps. Nectarium sæpius crenatum.

Jonquilla. 3. NARC. spatha multiflora, nectario campanulato brevi, foliis subulatis. *Linn. sp.* 291.

Narcissus foliis subulatis florum nectariis brevissimis. *Sauv.* 19.

Narcissus juncifolius luteus minor. *Bot. Monf.* 181. *Tour.* 355.

La Jonquille; vernaculè *jonquille*.

HABITAT Monspeli, au Capouladou, à Saint Guilen le Désert.

Tazetta. 4. NARC. spatha multiflora, nectario campanulato, foliis planis. *Linn. sp.* 290.

Narcissus foliis ensiformibus, nectario campanulato, petalis longe brevioribus. *Sauv.* 18.

Narcissus medio-luteus, copioso flore, odore gravi. *Bot. Monf.* 181. *Tour.* 354. *Barr. Icon.* 925.

Le Narcisse; vernaculè *Pissanliech*.

HABITAT Monspeli, passim in pratis; folia plana disticha, pedunculi partiales subtriquetri. Tubus corollæ viridis.

PANCRACTIUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 320.

Char. secund. Rad. bulbosa. Caul. scaposa anteps multiflora. Fol. radicalis sessilis simplex integerrima. Flor. terminalis. Fulcr. nulla.

Obs. Germina omnia sessilia in medio spathæ. Tubi florum longissimi, quibus nos ab omnibus distinguatur.

1. PANCRAAT. spatha multiflora, petalis planis, foliis *Maritimum*,
lingulatis. *Linn. sp.* 291.

Narcissus maritimus. *Bot. Monf.* 181. *Tour.* 357.

Le Narcisse de mer.

HABITAT Monspeliū ad mare. Florens in fine Augusti. Nectarium bifidum, lacinulis emarginatis; stamina in ipsismet fissuris nectarii inserta.

AMARYLLIS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 321.

Char. secund. *Rad.* bulbosa. *Caul.* scaposa angulata sub-anceps. *Fol.* radicalis plana simplex integerrima disticha. *Flor.* terminalis. *Fulcr.* nulla.

1. AMARYLLIS spatha uniflora, corolla æquali, genitalibus strictis. *Lutea.*

Amaryllis spatha uniflora, corolla æquali, staminibus declinatis. *Linn. sp.* 292.

Lilio-narcissus luteus autumnalis major. *Tour.* 386.

L' Amaryllis jaune.

HOSPITATUR sub dio; luxuriat in horro regio; stamina alterna breviora.

2. AMARYLLIS spatha uniflora, corolla inæquali, genitalibus declinatis. *Linn.* 293.

Lilio-narcissus jacobæus indicus latifolius, rubro flore.

Tour. 385. *Barr. Icon.* 1035.

La belle Amaryllis.

HOSPITATUR sub dio. Sempervirens.

3. AMARYLLIS spatha uniflora, corollis revolutis, genitalibus strictis. *Linn. sp.* 293.

Lilio-narcissus Japonicus rutilo flore. *Tour.* 386.

Lilio-narcissus Indicus polyanthos. *Barr. Icon.* 126.

La Guernesienne.

HOSPITATUR in hybernaculo.

APHYLLANTHES.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 348.

Char. secund. *Rad.* fibrosa. *Caul.* teres scaposa.

Fol. nulla. *Flor.* terminalis geminata sessilis.

Fulcr. nulla.

1. APHYLL. *Linn. sp.* 294. *Sauv.* 8. *Tour.* 657.

Monspeliensis

Caryophyllus cæruleus Monspeliensium. *Bot. Monf.* 53.
Vernaculè *Bragalou*.

HABITAT in sterilibus circa *Castellau*, *Sellencurve*.

ALLIUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 326.

Char. secund. *Rad.* bulbosa. *Caul.* herbacea foliosa, nunc scaposa. *Fol.* sessilis simplex integerrima, radicalis aut caulina vaginans solida, vel fistulosa. *Flor.* terminalis umbellata *Fu. fr.* nulla.

* *Folius caulinis planis, umbellis capsuliferis, staminibus trifidis.*

Ampeloprasum. 1. ALLIUM caule planifolio, umbellifero, umbella globosa, staminibus tricuspidatis, radice laterali. *Linn. sp.* 294.

Allium ipharico capite, folio latiore seu scorodoprasum alterum. *Tour.* 383.

HOSPITATUR sub dio.

Porrum. 2. ALLIUM planifolio caule umbellifero, staminibus tricuspidatis, radice tunicata. *Linn. sp. pag.* 295.
Porrum commune capitatum. *Tour.* 382. & lativum latifolium. *Ibid.*

Porrum radice ambiente tunicata oblonga solitaria. *Sauv.* 43.

Le Porreau; vernaculè, *des Porres*.

HABITAT Monspeli in hortis & arvis.

Victorialis. 3. ALLIUM caule planifolio umbellifero, umbella globosa, staminibus lanceolatis, corolla longioribus. *Linn. sp. p.* 295.

Allium folis caulinis lanceolatis, floribus umbellatis. *Sauv.* 42.

Allium montanum latifolium maculatum. *Tour.* 383.

HOSPITATUR sub dio.

Subhirsutum. 4. ALLIUM caule planifolio umbellifero, foliis inferioribus natis, staminibus subulatis. *Linn. sp. p.* 295.

Allium angustifolium umbellatum, flore albo. *Tour.* 385.

Allium sylvestre sive moly angustifolium umbellatum. *Bot. Monf.* 9.

HABITAT Monspeli in maritimis.

Rosum. 5. ALLIUM caule planifolio umbellifero, umbella fastigiata, staminibus corollam æquantibus, foliis lævibus. *Linn. sp. p.* 296.

Allium foliis ensiformibus, radice bulbillis stipata, floribus amplis umbellatis. *Sauv.* 42.

Allium sylvestre seu moly rosco amplo flore. *Bot. Monsf.* 11. tab. 10. *Tour.* 385.

HABITAT Monspelii, Copiosissimum à la Colombiere, Mommau, Lavalette. Altitudo pedalis. Flores 6-18.

* *Foliis caulinis planis, staminibus trifidis, umbellis bulbiferis.*

6. ALLIUM caule planifolio bulbifero, radice composita, staminibus tricuspidatis. *Linn. sp. p.* 296. *Sativum.*

Allium sativum. *Tour.* 383.

L'Ail; vernaculè, *l'Al.*

HABITAT Monspelii in hortis.

7. ALLIUM caule planifolio bulbifero, foliis crenulatis, vaginis ancipitibus, staminibus tricuspidatis. *Linn. sp. p.* 297. *Scorodoprasum.*

Porrum capitulo bulboso erecto, foliis planis subcrenatis, vaginis ancipitibus. *Sauv.* 43.

Porrum radice laterali cordata solida, pedunculo revoluta, capitulo bulbifero. *Sauv.* 43.

Allium sativum alterum seu allioprasum caulis summo circumvoluto. *Tour.* 383.

La Rocambole.

HABITAT Monspelii in oleribus.

* *Foliis caulinis teretibus, staminibus trifidis, umbellis capsuliferis.*

8. ALLIUM caule teretifolio umbellifero, foliis semiteretibus, staminibus tricuspidatis corolla longioribus. *Linn. sp. p.* 297. *Sphaerophallum.*

Allium montanum capite rotundo. *Tour.* 382.

Allium sive moly montanum quintum. *Bot. Monsf.* 9.

Porrum capite sphaerico absque bulbis, staminibus alternatim trifidis. *Sauv.* 11.

HABITAT Monspelii, à Castelnau, Mommau, Montferrier.

9. ALLIUM caule teretifolio subnudo umbellifero, umbella fastigiata, petalis truncatis, staminibus tricuspidatis. *Linn. sp.* 298. *Moschatum.*

Allium moschatum capillaceo folio. *Bot. Monsf.* 11. *Sauv.* 10.

Allium sylvestre perpusillum juncifolium moschatum. Tour. 385.

HABITAT Monspelii circa *Monferrier, la Colombiere.*

Flavum. 10. ALLIUM caule teretifolio umbellifero, umbella globosa, staminibus subulatis. Linn. sp. p. 298.

Allium sylvestre luteum juncifolium bicornè. Bot.

Monf. 9. Sauv. 10. Tour. 385.

HABITAT Monspelii, à *Boutonet.*

* *Foliis caulinis teretibus, staminibus trifidis, umbellis bulbiferis.*

Vineale. 11. ALLIUM caule teretifolio bulbifero, staminibus tricuspidatis. Linn. sp. p. 299.

Allium sylvestre vinearum. Bot. *Monf. 212. Tour. 382.*

Porum radice conoidea, bulbillis innixa, foliis planis. Sauv. 43.

HABITAT Monspelii circa *Castelnau & Gramont.* Altitudo sesquipedalis.

Oleraceum. 12. ALLIUM caule teretifolio bulbifero, foliis scabris semiteretibus subrus fulcatis. Linn. pag. 299.

Allium montanum bicornè flore obsoletere. Bot.

Monf. 9. Tour. 382. Sauv. 10.

HABITAT Monspelii ad lævam à *Selleneuve*, & in sterilibus circa *Monferrier* ad dextram.

* *Foliis radicalibus scapo nudo.*

Angulosum. 13. ALLIUM scapo nudo ancipiti, foliis linearibus canaliculatis subtus subangulatis, umbella fastigiata. Linn. sp. p. 300.

Allium petraeum umbelliferum. Bot. *Monf. 289. Tour. 384.*

Allium radice senescente lignosa transversa, umbella erecta. Sauv. 42.

HABITAT Monspelii in rupibus circa *Rouquet*, & pagum dictum *les Matelles*; ad lævam circa sylvam *Valene.*

Ascalenicum 14. ALLIUM scapo nudo tereti, foliis subulatis, umbella globosa, staminibus tricuspidatis. Linn. Syst. nat. pag. 979.

Cepa radice ovata tunicata foeta, bulbillis ovato-acuminatis hinc planis. Sauv. 10.

Cepa sterilis. Baub. pin. 72.

Cepa ascalonica. Tour. 382.

Les Echallottes; vernaculè, la Chalotte.

HABITAT Monspeli cum oleribus.

15. ALLIUM scapo nudo semi-cylindrico, foliis lanceo-
latis petiolatis, umbella fastigiata. *Linn. sp. p. 300.* *Ursinum.*

Allium foliis lanceolatis, scapo nudo semi-cylindra-
ceo, bulbo setis obvallato. *Sauv. 16.*

Allium sylvestre latifolium. *Tour. 383.*

HABITAT Monspeli, au Capouladou, à Lesperou.

Folia palmaria.

16. ALLIUM scapo nudo infernè ventricoso longiore,
foliis teretibus. *Linn. sp. p. 300.* *Cepa.*

Cepa vulgaris. Tour. 382.

*Cepa scapo ventricoso foliis longiore, radice de-
pressa. Sauv. 10.*

L'Oignon; vernaculè, la Sébe.

17. ALLIUM scapo nudo folia adæquante, foliis tere-
tibus ventricosis. *Linn. sp. p. 301.* *Fistulosum.*

Cepa oblonga. Tour. 382.

*Cepa scapo nudo longitudine foliorum, foliis ven-
tricosis. Sauv. 10.*

La Ciboule; vernaculè, la Ciboule.

HABITAT in hortis oleraceis.

18. ALLIUM scapo nudo adæquante folia teretia su-
bulato-filiformia. *Linn. sp. p. 301.* *Schanoprasum.*

Cepa sterilis juncifolia perennis. Tour. 382.

*Cepa scapo longitudine figuraque foliorum, foliis
subulatis teretibus, &c. Sauv. 10.*

Multis etiam *Ciboule.*

HABITAT in hortis; scapus vix palmaris. Folia fistulosa.

L I L I U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 329.*

Char. sec. *Rad.* bulbosa squamosa. *Caul.* herba-
cea foliosa simplicissima. *Fol.* sessilis simplex
integerrima, sparsa vel verticillata. *Flor.* ter-
minalis racemosa. *Fulc.* stipula unica, vel bina
ad basim singuli pedicelli.

1. LILIUM foliis sparsis, corollis campanulatis intus
glabris. *Linn. sp. p. 302.* *Candidum.*

Lilium vulgare album. *Tour. 369.* flore erecto, &
floribus dependentibus. *Ibid.*

170 HEXANDRIA MONOGYNIA.

Le Lys ; vernaculè , l'Ely.

HOSPITATUR sub dio.

Chalcedoni. 2. LIL. foliis sparsis lanceolatis, floribus reflexis, corollis revolutis. *Linn. sp. p. 302.*

Lilium Byzantinum miniatum. Tour. 371.

Lilium foliis verticillatis denis, corollis revolutis. Sauv. 165.

Le Lys de St. Bruno, ou la Calcedoine.

HOSPITATUR sub dio.

Datur apud nos caule unifloro, foliis imbricatis, margine sub-cartilagineo albicante, petalorum unguibus valde pilosis, foliisque (summis) quinis, senis, octonis, denis & subverticillatis.

Martagon. 3. LIL. foliis verticillatis, floribus reflexis, corollis revolutis. *Linn. sp. p. 303.*

Lilium flore nutante ferrugineo. Bot. Monf. 155.

Lilium floribus reflexis, latifolium. Tour. 371.

Le Martagon ; vernaculè, leu Martagoun.

HABITAT Monspelii, à Lesperou. Pulchrè varians ; petala intus canaliculata ; stamina longitudine pistilli ; bractæ geminæ ad basim cujuslibet pedunculi ; alterâ minore ; ita servato ordine, ut in inferioribus floribus bractea major ad sinistram, in superioribus verò ad dexteram pedicelli sita sit.

F R I T I L L A R I A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 330.*

Char. sec. *Rad.* bulbosa duplicata. *Caul.* herbacea foliosa simplicissima. *Fol.* sessilis simplex integerrima subspiraliter digesta. *Flor.* terminalis racemosa. *Fulc.* bractæ aliæ ad basim pedicellorum ; aliæ ad apicem racemi steriles.

Imperialis. 1. FRITIL. racemo comoso infernè nudo, foliis integerrimis. *Linn. sp. p. 303.*

Corona Imperialis. Tour. 373.

La Couronne Impériale.

HOSPITATUR sub dio. Caulis pedalis supernè coloratus, ad basim nudus, in medio foliosus. Folia decurrentia. Corollæ subcapitulatæ ; petala basi nigricantia ; cavitæ nectarifera alba ; stamina alterna longiora ; radiculi horizontales ; florens Martio. Bractæ terminales magnæ.

HEXANDRIA MONOGYNIA. 171

2. FRITIL. racemo mediufculo, foliis obliquis. *Linn. Persica.*

pag. 304.

Fritillaria maxima flore obsoleto purpureo. *Tour. 377.*

Lilium Persicum. Dodon. 120.

La Fritillaire.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo bipedalis; corollæ coloris violacei, vel purpurei obsoleti, vix avellanâ majores; stamina tria breviora; glandula nectarifera viridis; eodem tempore florens. Bractæ terminales nullæ.

TULIPA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 331.*

Char. secund. *Rad.* bulbosa solida. *Caul.* scaposa uniflora. *Fol.* radicalis simplex integerrima.

Flor. solitaria terminalis. *Fulc.* nulla.

1. TULIPA flore subnutante, foliis lanceolatis. *Linn. sp. Sylvestris.*

pag. 305.

Tulipa minor lutea Narbonensis. Bot. Monsf. 172.

Tour. 372. Sauv. 306.

La Tulipe; vernaculè, la Tulipe.

HABITAT Monspelii, à Jouvignac, ad lævam Sellanovæ, & à Caravettes.

2. TULIPA flore erecto, foliis ovato-lanceolatis. *Linn. Gesneriana.*

sp. p. 306.

Tulipa. Tour. 372. cujus varietates innumeræ.

La Tulipe des Jardiniers.

HABITAT in hortis.

ORNITHOGALUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 338.*

Char. sec. *Rad.* bulbosa. *Caul.* scaposa. *Fol.* radicalis simplex integerrima. *Flor.* terminalis

racemosa corymbosa. *Fulc.* bractæ ad basim pedicellorum.

* *Staminibus omnibus subulatis.*

1. ORNITH. scapo angulato, bracteis binis, umbella longioribus, pedunculis simplicissimis. *Luteum.*

Ornithogalum scapo angulato diphylo, pedunculis umbellatis simplicibus. Linn. sp. p. 306. Sauv. 20.

- *Ornithogalum luteum. Tour. 379.*

L'Ornithogale jaune.

HABITAT Monspelii circa pagum *St. Jean de Vedas*, la *Garrigue du terrail*.

Minimum. 2. ORNITH. scapo angulato, bracteis binis ternisve umbella longioribus, pedunculis ramosis.

Ornithogalum scapo angulato diphylo, vel triphylo, pedunculis ramosis. *Sauv.* 20. *Linn. sp. pag.* 306.

Ornithogalum luteum minus. *Tour.* 379.

HABITAT Monspelii; à la *Croix du Capitaine* ad lævam, à *Monteils* in arvis. Palmare sæpius videt, raro altius.

Pyrenaicum. 3. ORNITH. racemo longissimo, filamentis lanceolatis, pedunculis floriferis patentibus æqualibus, fructiferis scapo approximatis. *Linn. sp.* 306.

Ornithogalum spica longissima, filamentis triangularibus. *Sauv.* 19.

Ornithogalum angustifolium majus, floribus ex albo virescentibus. *Tour.* 379.

HABITAT Monspelii; à la *Garrigue du terrail*, & à la *Verune*, in arvis; aux *prés d'Areves*.

* *Staminibus alternis emarginatis.*

Arabicum. 4. ORNITH. floribus corymbosis, pedunculis scapo humilioribus, filamentis emarginatis. *Linn. sp. pag.* 307.

Ornithogalum umbellatum maximum. *Tour.* 378.

Lilium Alexandrinum Neotericorum, seu ornithogalum majus. *Lob. Icon.* 148.

HOSPITATUR sub dio. Scapus pedalis. Bractearum magnarum cordatarum amplexicaules.

Umbellatum. 5. ORNITH. floribus corymbosis, pedunculis scapo altioribus, filamentis emarginatis. *Linn. sp. pag.* 307.

Ornithogalum pedunculis imis summos superantibus. *Sauv.* 20.

Ornithogalum umbellatum medium angustifolium. *Bot. Mons.* 194. *Tour.* 378.

L'Ornithogale ordinaire.

HABITAT Monspelii in arvis.

Narbonense. 6. ORNITH. racemo oblongo, filamentis lanceolatis membranaceis, pedunculis, floribusque patentibus.

Linn. Syst. 981. *Cent.* 2. *pag.* 15.

Ornithogalum majus spicatum flore albo. *Tour.* 379.

Ornithogalum spicatum Monspelienſe lacteo flore. *Bot. Mons.* 194.

HABITAT cum priori.

SCILLA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 337.

Char. secund. Rad. bulbosa solida, vel tunicata. Caul. scaposa. Fol. radicalis sessilis simplex integerrima. Flor. terminalis corymbosa, sub-racemosa. Fulc. bractæ solitariae vel binæ ad basim cujuslibet pedicelli, (in unâ specie nullæ.)

1. SCIL. radice tunicata. Linn. sp. 308. Sauv. 18. Maritima.
 Ornithogalum maritimum, sive scilla radice rubrâ. Tour. 381.
 La Squille, vernaculè la Squille.
 HOSPITATUR sub dio. Florens extra terram.
2. SCIL. radice solidâ, corymbo conferto hemisphærico, Italica.
 bracteis geminis inæqualibus. Linn. sp. 308.
 Scilla radice solidâ, floribus patentibus confertis corymbosis. Sauv. 18.
 Ornithogalum sp. catum cinereum. Tour. 380.
 HOSPITATUR sub d.o. Scapus pedalis. Folia latiora. Filamenta lanceolata fistulosa. Bractæe concolores duæ subulatæ; altera pedicello æqualis, altera longior.
3. SCIL. radice solidâ, corymbo conferto conico. Linn. Peruviana.
 sp. 309.
 Scilla latè umbellifera. Sauv. 18.
 Ornithogalum cæruleum Lusitanicum latifolium. Tour. 381.
 Ornithogalum eriophorum Peruvianum. Tour. ibid.
 HOSPITATUR sub dio. Scapus vix semipedalis. Stamina fistulosa; corollæ minores quàm in priori.
4. SCILLA radice solidâ, floribus alternis lateralibus Amæna.
 subnutantibus. Linn. sp. 309.
 Hyacinthus serotinus elegantissimus. J. Baub. hist. 2. 582.
 Ornithogalum cæruleum Byzantinum. Tour. 380.
 Scilla radice solidâ, floribus nutantibus alternis. Sauv. 8.
 HOSPITATUR in frigidario. Scapus palmaris vel semipedalis, angulatus sub-biflorus. Petala tria intus apice callosa; omnibus ad basim punctis albidis, notatis. Bractea minima membranacea. Folia lata scapo subæqualia.

- Autumnalis.* 5. SCILLA radice solida, foliis filiformibus linearibus, floribus corymbosis, pedunculis nudis adscendenti-bus longitudine floris. *Linn. sp.* 309.
 Scilla radice solidâ, scapo multifloro, floribus capi-tatis. *Sauv.* 19.
 Ornithogalum autumnale floribus dilutè purpureis. *Tour.* 381. & floribus cæruleis. *Ibid.*
 Hyacinthus autumnalis minor. *Bot. Monf.* 134.
 Hyacinthus stellaris autumnalis minor. *B. Pin.* 47. Flos cæruleus purpuræ dilutionis.
 HABITAT in pratulis Gramuntianis, & ad lavam in sterilibus, à Montferrier, vis-à-vis la Valette. Sca-pus palmaris teretiusculus; corollæ vix pîso majores. Pedicelli longitudine florum. Bractææ nullæ.
- Bifolia.* 6. SCILLA radice solidâ, floribus erectioribus pauciori-bus. *Linn. sp.* 309. *Sauv.* 18.
 Ornithogalum Germanicum. *Tour.* 380. Species tres.
 HABITAT à Lesperou.

ASPHODELUS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 335.

Char. secund. Rad. tuberosa fasciculata. *Caul.* nunc scaposa nunc foliosa. *Fol.* sessilis simplex integerrima, nunc radicalis subulata, nunc caulina triquetra; utraque fistulosa (in unâ specie) solida. *Flor.* terminalis racemosa. *Fulc.* bractea ad basim pedicellorum.

- Luteus.* 1. ASPHOD. caule folioso, foliis triquetris fistulosis. *Linn. sp.* 309. & foliis striatis. *Linn. Syst.* 982.

Asphodelus caule simplici folioso, foliis trigonis fistu-
 losis. *Sauv.* 43.

Asphodelus luteus flore & radice. *Tour.* 343.

L'Asphodele jaune.

HOSPITATUR sub dio.

- Fistulosus.* 2. ASPHOD. scapo nudo, foliis strictis subulatis striatis
 subfistulosis. *Linn. sp.* 309. *Hort. Ups.* 83.

Asphodelus foliis fistulosis. *Tour.* 344.

Asphodelus caule nudo, foliis strictis. *Sauv.* 20.

HOSPITATUR sub dio & in frigidario. Folia sæpiùs
 semiteretia seu latere altero plano, altero lineis lon-
 gitudinalibus scabro. Petala ovata albida; filamenta
 apice ingrossata & dilatata.

3. ASPHOD. scapo nudo, foliis ensiformibus carinatis *Ramosus*
 lævibus. *Linn. sp. 310.*

Asphodelus caule nudo, foliis laxi. *Sauv. 20.*

Asphodelus albus ramosus mas. *Bot. Monsf. 31. Tour.*
 343. & non ramosus.

HABITAT ad mare, vers Frontignan & Cette.

ANTHERICUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 336.*

Char. secund. Rad. funiculiformis. Caul. scaposa
 simplex vel ramosa. Fol. radicalis graminea
 canaliculata subulata vel succulenta. Flor. ter-
 minalis racemosa, racemis simplicibus aut ra-
 mosis. Fulc. bractea ad basim pedicellorum.

* Phalangium foliis canaliculatis.

1. ANTHER. foliis planis, scapo ramoso, corollis pla- *Ramosum.*
 nis. *Linn. sp. 310. deciduis. Sauv. 19.*

Phalangium parvo flore ramosum. *Tour. 368. Seg.*
ver. 2. p. 61.

HOSPITATUR sub dio.

2. ANTHER. foliis planis, scapo simplicissimo. *Linn. Lilinge.*
sp. 310.

Phalangium parvo flore non ramosum. *Tour. 368.*

Phalangium non ramosum. *Bot. Monsf. 201.*

HABITAT à Lesperou, & au bois de Valene.

* Bulbine foliis carnosiss.

3. ANTHER. foliis carnosiss teretibus, caule fruticoso. *Frutescent.*
Linn. sp. 310.

Bulbine caulescens. *Linn. hort. cliff. 122.*

HOSPITATUR in caldario. Bractæ ovatæ membrana-
 cæ magnæ.

* Narthecium foliis ensiformibus.

4. ANTHER. foliis ensiformibus, perianthiis trilobis, *Calycul-*
 filamentis glabris. *Linn. sp. 311. Sauv. 19.* *tum.*

Phalangium alpinum palustre iridis folio. *Tour. 368.*

Seg. ver. Tom. II. p. 61. tab. XIV. Icon optima.

HABITAT à Lesperou. Folium quandoque unicum in
 caule. Flores subspicati. Scapus simplicissimus.

ASPARAGUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 339.

Char. secund. *Rad.* funiformis *Caul.* ramosissima herbacea aut fruticulosa. *Fol.* sessilis linearis simplex integerrima, solitaria, terna aut fasciculata *Fulc.* stipulæ membranaceæ minimæ ad basim ramorum & foliorum.

Officinalis. 1. ASPAR. caule erecto herbaceo, foliis setaceis, stipulis paribus. Linn. sp. 313.

Asparagus. Sauv. 44. n°. 150. & pag. 45. n°. 151. & 152.

Maritimus. α. Asparagus maritimus crassiore folio. Tour. 300. Bot. Monf. 30.

Sativus. β. Asparagus sylvestris folio tenuissimo. Tour. 300. Bot. Monf. 30.

L'Asperge ordinaire, vernaculè lous *Espargous*.

HABITAT in hortis. α. ad mare.

Acutifolius. 2. ASPAR. caule inermi fruticoso, foliis aciformibus perennantibus mucronatis ternis æqualibus. Linn. sp. 314.

Asparagus foliis aciformibus pungentibus, &c. Sauv. 45.

Asparagus foliis acutis. Bot. Monf. 31. Tour. 300.

L'Asperge sauvage, vernaculè *Espargou sauvage*, rom-mecounil.

HABITAT ad margines agrorum.

CONVALLARIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 341.

Char. secund. *Rad.* horizontalis nodosa. *Caul.* scaposa vel foliosa: *Fol.* simplex integerrima, nunc sessilis radicalis basi angustata vaginans, nunc caulina semiamplexicaulis vel petiolata, alterna aut verticillata. *Flor.* nunc terminalis racemosa, nunc axillaris pedunculis uni vel multifloris. *Ful.* bractæ (in racemosis) minimæ, (in axillaribus) nullæ.

* *Floribus racemosis.*

Majalis. 1. CONVALL. scapo nudo, corollis campanulatis.

Convallaria scapo nudo. Linn. sp. 314. Sauv. 16.

Lilium

Lilium convallium. *Dod. pempt.* 205.

Lilium convallium album. *Tour.* 77. & *latifolium.* *Ibid.*

Le Lys des vallées.

HOSPITATUR sub dio. Folia sæpiùs bina lato-lanceolata vel ovata. Racemus secundus pauciflorus.

2. CONVALL. caule folioso, corollis rotatis, foliis *Bifolia.*
cordatis alternis petiolatis.

Convallaria foliis cordatis. *Sauv.* 113. *Linn. sp.* 316.

Lilium convallium minus. *Barr. Icon.* 1212.

Smilax unifolia humillima. *Tour.* 654.

HABITAT à *Lesperou.* Corollæ sæpiùs quadrifidæ. Caulis palmaris.

- HOSPITATUR in frigidario.

* *Floribus axillaribus.*

3. CONVALL. foliis verticillatis. *Linn. sp.* 315. *Sauv.* *Verticillata.*
164.

Polygonatum angustifolium non ramosum. *Tour.* 78.
& *ramosum.*

HOSPITATUR in frigidario.

HABITAT à *St. Guillin le Désert.*

4. CONVALL. foliis alternis amplexicaulibus, caule *Polygona.*
ancipiti, pedunculis axillaribus unifloris. *Linn. sp.* *sum.*
315. *Sauv.* 42. n°. 133.

Polygonatum vulgare latifolium. *Tour.* 78.

Polygonatum floribus ex singulis pedunculis. *Barr.*
Icon. 711.

Le Sceau de Salomon.

HABITAT cum prioribus, & au bois de Salvons, près
de *Lesperou.* Pedunculi quandoque biflori triflorive.

5. CONVALL. foliis amplexicaulibus, caule tereti, pe- *Multiflora.*
dunculis axillaribus multifloris. *Linn. sp.* 315.

Polygonatum latifolium maximum. *Lob. Icon.* 637.
Tour. 78.

Convallaria foliis alternis, pedunculis multifloris pen-
dulis. *Sauv.* 42.

HABITAT cum prioribus.

Obs. Utraque datur apud nos, caule tereti vel ancipiti, foliis latis aut angustis, pedunculis unifloris multiflorisve. An rite satis distinctæ? non pater.

POLIANTHES.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 323.

Char. secund. *Rad.* tuberosa. *Caul.* herbacea simplicissima. *Fol.* sessilis simplex integerrima alterna subulata. *Flor.* terminalis alterna sessilis. *Fule.* bractea ad basim floris singuli.

Tuberosa. 1. POLIANTH. Linn. sp. 316. Sauv. 41.

Hyacinthus Indicus tuberosus, flore Narcissi. *Bauh. pin.* 47. *Barr. Icon.* 1217.

Hyacinthus Indicus tuberosus, flore hyacinthi orientalis. *Tour.* 347.

La Tubereuse, vernaculè *la Tuberuse*.

HOSPITATUR sub dio.

HYACINTHUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 342.

Char. secund. *Rad.* bulbosa. *Caul.* scaposa. *Fol.* radicalis simplex integerrima linearis hinc sulcata vel utrinque plana. *Flor.* terminalis racemosa. *Fule.* nulla.

Serotinus. 1. HYACINTH. corollarum exterioribus petalis distinctis, interioribus coadunatis. Linn. sp. 317.

Hyacinthus obsoleto flore. *Tour.* 345.

HOSPITATUR sub dio.

Orientalis. 2. HYACINTH. corollis infundibuliformibus semisextidis basi ventricosis. Linn. sp. 317. Sauv. 17.

Hyacinthus orientalis. *Tour.* 345. Innumerae varietates.

Hyacinthe ou Jacinthe, *Muguet*; vernaculè *lou Muguet*.

HOSPITATUR sub dio.

Muscari. 3. HYACINTH. corollis ovatis. Linn. sp. 317. Sauv. 17.

Hyacinthus racemosus moschatus. *Tour.* 348.

HABITAT ad lœvam, au-delà de la Peissine; frequentior à Nîmes.

Comosus. 4. HYACINTH. corollis angulato-cylindricis, summis sterilibus longius pedicellatis. Linn. sp. 318.

Hyacinthus corollis globosis, summis pedunculatis, foliis ensiformibus. Sauv. 17.

Muscari arvense latifolium purpurascens. *Tour.* 347.

Hyacinthus maximus botryoides. *Bar. Monf.* 133.

Vernaculè, *lou Congrou*.

HEXANDRIA MONOGYNIA. 179

HABITAT in arvis circà urbem; & à Selleneuve, la Verune, &c.

5. HYACINTH. corollis globosis uniformibus, foliis *Botryoides,*
canaliculato-cylindricis, *Linn. sp. 318.*

Hyacinthus corollis globosis, foliis in cylindrum convolutis. *Sauv. 19.*

Muscari arvense, unci folium cæruleum minus. *Tour. 348.*

Hyacinthus verus Botryoides cæruleus minor angustioribus foliis, odoratus, *Bot. Monf. 133.*

Vernaculè etiam, *Ion Congnon,*

HABITAT ubique cum priori.

Y U C C A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 344.*

Char. secund. *Rad.* funiformis, *Caul.* scaposa, *Fol.* radicalis sessilis subulata succulenta simplex integerrima aut integra. *Flor.* racemosa axillaris, *Fulc.* aculei ad apicem foliorum solitarii. Bractea ad basim cujuslibet pedicelli.

1. YUCCA foliis integerrimis, *Linn. sp. 319.*

Yucca Indica foliis aloë. *Barr. Icon. 1194.*

Cordylinc foliis pungentibus integerrimis. *Sauv. 41.*

L'Yucca.

HOSPITATUR sub dio. Foliis abscissis, radix elevatur supra terram instar trunci.

2. YUCCA foliis crenatis nutantibus, *Linn. sp. 319.*

HOSPITATUR sub dio. Utraque species semina maturans.

Gloriosa.

Draconis.

A L O E.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 343.*

Char. secund. *Rad.* funiformis, *Caul.* scaposa, *Fol.* succulenta radicalis simplex integerrima sessilis vel amplexicaulis, *Flor.* axillaris solitaria racemosa aut spicata. *Fulc.* aculei innumeri epiphylli (in plurimis) bractea solitaria ad basim floris cujuslibet.

1. ALOE floribus pedunculatis cernuis corymbosis subcylindricis, *Linn. sp. 319.*

Aloë foliis caulinis dentatis amplexicaulibus. *Sauv. 41.*

Perfoliata.

- α. Aloë Africana caulescens, foliis spinosis, maculis ab utraque parte albicantibus notatis. *Linn. sp. 320.*
 β. Aloë Africana caulescens, foliis glaucis amplexantibus. *Linn. sp. 320.*
 γ. Aloë Africana foliis glaucis; margine & dorso superiore parte spinosis, flore rubro. *Linn. sp. 320.*
 Humilis. δ. Aloë foliis erectis subulatis radicatis undique inerme spinosis. *Linn. sp. 320. Sauv. 6.*
 Aloë Americana minor, foliis per margines frequentissimis & mollibus spinis. *Tour. 366.*
L'Aloes à dent de Brochet.
 Vera. ε. Aloë foliis spinosis confertis dentatis vaginantibus planis maculatis. *Linn. sp. 320. Sauv. 41.*
 Aloë vulgaris. *Tour. 366.*
L'Aloes succotrin.
 HOSPITATUR in hybernaculo & sub dio.
 Variegata. ζ. ALOE floribus pedunculatis cernuis racemosis prismaticis, ore patulo æquali. *Linn. sp. 321.*
 Aloë Americana sobolifera foliis eleganter variegatis. *Tour. 367.*
 Aloë foliis canaliculatis trifariam imbricatis. *Sauv. 40.*
L'Aloes Perroquet.
 HOSPITATUR sub dio & in hybernaculo.
 Disticha. η. ALOE floribus pedunculatis, pedunculis ovato-cylindricis curvis. *Linn. sp. 321.*
 Aloë foliis linguiformibus patulis distichis. *Sauv. 19.*
 θ. Aloë Africana flore rubro, folio triangulari & verrucis albicantibus ab utraque parte notato. *Linn. sp. 321.*
L'Aloes à bec de canne.
 HOSPITATUR in hybernaculo. Folia (in α.) non exactè triangularia, sed margo alter est bimarginatus.
 Spiralis. ι. ALOE floribus sessilibus ovatis crenatis, segmentis interioribus conniventibus. *Linn. sp. 322.*
L'Aloes en épi.
 HOSPITATUR cum prioribus.
 Rotunda. κ. ALOE floribus sessilibus triquetris bilabiatis, labio inferiore revoluta. *Linn. sp. 322.*
 Aloë foliis rhomboïdalibus ventricosis obliquè resectis triquetris. *Sauv. 6.*
L'Aloes à pouce écrasé.
 HOSPITATUR cum congeneribus.
 viscosa. λ. ALOE floribus sessilibus infundibuliformibus bilabiatis,

HEXANDRIA MONOGYNIA. 181

lacinis quinque revolutis ; summa erecta. *Linn. sp.*
322.

Aloë foliis canaliculatis trifariam imbricatis , caulinis
apice reflexo-patulis. *Sauv. 41.*

L'Aloës en échutiere.

HOSPITATUR cum antecedentibus.

7. ALOE floribus sessilibus bilabiatibus : labio superiore *Pumila*,
erecto : inferiore patente. *Linn. sp. 322.*

Aloë foliis ovato-subularis acuminatis tuberculis car-
tulinagineis undique adspersis. *Linn. sp. hort. Cliff.*
131. *Sauv. 6.*

- a. Aloë margaritifera major.

*Margaritife-
ra.*

- β. Aloë margaritifera minor.

- γ. Aloë margaritifera minima. *Dill. Elth. 19. & 20.*

- δ. Aloë foliis ovato lanceolatis carnosissimis apice trique-
tris : angulis inerme dentatis, *Linn. sp. 323. Sauv. dea.*
17.

L'Aloës perlé. & l'Aloës à patte d'araignée.

HOSPITATUR in caldario. Folia interdum disticha.

A G A V E.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 1080.*

Char. secund. *Rad.* funiformis. *Caul.* scaposa.

Fol. radicalis sessilis simplex integerrima. *Flor.*
racemosa axillaris. *Fulc.* bractea ad basim pe-
dunculorum. Spinæ epiphyllæ marginales.

1. AGAVE foliis dentato-spinosis , scapo ramoso. *Linn. Americana.*
sp. 323.

Aloë foliis lanceolatis dentatis spinâ terminatis. *Sauv.*

17.

Aloë folio in longum mucronem abeunte. *Tour. 366.*

L'Aloës en arbre.

HOSPITATUR sub dio & in hybernaculo.

HEMEROCALLIS.

Char. prim. Vid. *Lin. gen. pl. 345.*

Char. secund. *Rad.* tuberosa fasciculata. *Caul.* sca-
posa fistulosa. *Fol.* radicalis subulata sessilis sim-
plex integerrima. *Flor.* terminalis ramosa. *Fulc.*
bractea solitaria ad basim floris singuli.

181 HEXANDRIA MONOGYNIA.

Lilio-asphodelus. 1. **HEMEROCALLIS** scapo ramofo, corollis monopetalis. *Linn. sp. 324.*

Lilio-asphodelus luteo flore. Tour. 344.

Le Lys asfodelle, ou la belle de jour.

HOSPITATUR sub dio. Scapus subbipedalis subanceps
Bractææ ovatae.

A C O R U S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 346.*

Char. secund. *Rad.* horizontalis articulata teres,
Caul. scaposa apice foliaceo. *Fol.* radicalis vaginans simplex integerrima. *Flor.* spicata lateralis clavata sessilis solitaria. *Fule.* nulla.

Calamus. 1. **ACORUS.** *Linn. sp. 324.*

Acorus seu calamus officinalis aromaticus. Baub. pin. 34.

Le Jonc odorant.

HOSPITATUR in aquario lacustri. Scapus infra apicem subtriqueter; supra ipsum anceps foliaceus; hinc acutus, illinc canaliculatus. Spica à latere canaliculato biuncialis.

J U N C U S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 349.*

Char. secund. *Rad.* fibrosa. *Caul.* culmosa teres solida nuda vel foliosa. *Fol.* (graminea) vaginans simplex integerrima, (in una specie) articulata; nunc radicalis aut caulina, nunc linearis aut subulata. *Flor.* terminalis vel lateralis; spicata paniculata vel glomerato-paniculata. *Fule* bractea solitaria involucriformis, universalis & partialis; (in una specie) bractea duplex aculeata.

* *Culmis nudis.*

Artem. 1. **JUNCUS** culmo subnudo tereti mucronato, panicula terminali, bractea duplici spinosa.

Juncus culmo. . . . involucrio diphylo. Linn. sp. 325.

Juncus culmo pungente, panicula ex foliis solitariis axillâ. Sauv. 9.

Juncus acutus capitulis sorghi. Bot. Mons. 143. Tour. 246. & Baub. pin. 11. prodr. 21.

Juncus maritimus sorghi panicula. Barr. Icon. 203, n^o. 2. Le Junc ordinaire; vernaculè tous Jouns.

HABITAT in fossis humidis.

2. JUNCUS culmo nudo stricto, capitulo laterali. Linn. *Conglomeratus.* sp. 326.

Juncus lævis panicula non sparsa. Bot. Mons. 142. Tour. 246.

HABITAT ubique, à Lattes, Castelnau.

3. JUNCUS culmo nudo stricto, panicula laterali. *Effusus.* Linn. sp. 326.

4. Juncus lævis panicula sparsa major. Bot. Mons. 142. Tour. 246.

HABITAT cum priori & à Montferrier.

4. JUNCUS culmo nudo: apice membranaceo incurvo, *Inflexus.* panicula laterali. Linn. sp. 326.

Juncus culmo nudo paniculam arcuatim regente. Sauv. 9.

Juncus acumine reflexo major. Bot. Mons. 142. Tour. 246.

HABITAT dans le Lés, à Castelnau & à Caunelles, Lattes.

5. JUNCUS culmo nudo, foliis seraceis, capitulis glo- *Squarrosus.* meratis aphyllis. Linn. sp. 327.

Juncus parvus pericarpus rotundis. Bot. Mons. Bath. hist. Tour. 247.

Gramen junceum foliis & spica junci. Bot. Mons. 119.

Juncus foliis duris carinatis, caule nudo, floribus cartilagineis nitentibus in raram paniculam congestis. Hall. Sauv. 22.

HABITAT dans le Lés, à Montferrier, Lavalette.

* *Culmis foliosis.*

6. JUNCUS foliis nodoso-articulatis. Linn. sp. 327. *Articulatus.*

Juncus foliis articulatis, floribus umbellatis. Tour. 247.

Gramen junceum, folio articulato aquaticum. Bot. Mons. 119.

HABITAT in aquis, à Lattes, Caunelles. Articuli foliorum in exsiccatis tantum conspicui.

184 HEXANDRIA MONOGYNIA.

- Bufonius.* 7. JUNCUS culmo dichotomo, foliis angulatis, floribus solitariis sessilibus. *Linn. sp.* 328.
Juncus palustris humilior erectus. *Tour.* 246. *Barr. Icon.* 263. & 264.
Gramen nemorosum calyculis paleaceis. *Bot. Mons.* 118.
HABITAT in fossis humidis, à la Peissine, Caunelles, & circà Urbem.
- Campestris.* 8. JUNCUS foliis planis subpilosis, spicis sessilibus, pedunculatisque. *Linn. sp.* 329. *Sauv.* 25.
Gramen exile hirsutum cyperoides. *Bot. Mons.* 118.
Juncus pilosus capitulis ptylli. *Tour.* 246.
8. Juncus foliis planis, culmo paniculato, spicis ovatis. *Sauv.* 25.
HABITAT dans le Lés & à la Mer.
- Pilosus.* 9. JUNCUS foliis planis pilosis, corymbo ramoso. *Linn. sp.* 329. *Sauv.* 25.
Juncus nemorosus latifolius major. *Tour.* 247.
9. Juncus. *Sauv.* 26. n°. 136-140.
Gramen hirsutum angustifolium minus, paniculis albis. *Bot. Mons.* 118.
Juncus angustifolius villosus, floribus albis paniculatis. *Tour.* 247.
HABITAT à Lesperou, ubi mire variat. 9. Ad mare & stagna.
- Spicatus.* 10. JUNCUS foliis planis, spica racemosa nutante. *Linn. sp.* 330.
Juncus alpinus panicula racemosa nigricante pendula. *Mich. Nov. gen.* 42.
HABITAT cum superiori. Vix sesquipalmaris.

B E R B E R I S.

- Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 351.
Char. secund. Rad. lignosa. Caul. fruticosa. Fol. alterna petiolata simplex integra. Fior. axillaris racemosa. Fulc. spina tricuspis ad basim ramij cujusque. Spinulæ ad margines foliorum.
- Vulgaris.* 1. BERB. pedunculis racemosis. *Linn. sp.* 330.
Berberis dumetorum. *Tour.* 614.
L'Épine vinette.
HOSPITATUR sub dio.

HEXANDRIA MONOGYNIA. 185

HABITAT à Valene. Folia obversè ovata. Flores plurimi ad basim racemorum verticillati. Olenit sperma virile.

FRANKENIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 423.

Char. secund. Rad. ramosa lignosa. Caul. teres herbacea rigescens. Fol. opposita petiolata simplex integerrima. Flor. axillaris solitaria sessilis. Fulcr. nulla.

1. FRANK. foliis linearibus basi ciliatis. Linn. sp. 331. Lavin.
Frankenia foliis aciformibus congestis. Sauv. 46.
Polygonum alterum pusillo vermiculato folio. Bot. Monf. 210.
Alsine maritima supina foliis quasi vermiculatis. Tour. 245.
HABITAT au-delà des prés de Lattes vers la mer, & au port de Cette.
2. FRANK. foliis obovatis retusis subtus pulverulentis. Pulverulent.
Linn. 332.
Frankenia foliis ovalibus. Sauv. 168.
Anthyllis marina Narbonensium altera. Bot. Monf. 22.
Alsine maritima supina foliis chamæsyces. Tour. 244.
HABITAT cum priori. Utraque procumbens.

DIGYNIA.

VELEZIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. . .

Char. secund. Rad. lignosa simplex tenuis. Caul. herbacea rigida articulata subdichotoma. Fol. opposita connata subulata simplex integerrima. Flor. axillaris solitaria sessilis. Fulcr. nulla.

1. VELEZIA. Linn. sp. 332. Rigida.
Silene foliis subulatis cauli appressis, calycibus rigidis internodio longioribus. Sauv. 145.
Lychnis minima rigida Cherler. Bot. Monf. 171. Barr. Icon. 1017.
HABITAT à Boutonnet, Castelnau au-delà de la rivière vers Gramont; altitudo sesquipalmaris. Caule, calycibusque striatis.

TRIGYNIA.

RUMEX.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 357.

Char. secund. *Rad.* ramosa vel tuberosa. *Caul.* striata herbacea vel fruticosa. *Fol.* alterna vaginans petiolata simplex integra aut integerima. *Flor.* racemosa axillaris vel terminalis, aut utraque simul. *Fut.* nulla.

Obs. in quibusdam petioli ad basim aucti membrana vaginante tenuissima.

* *Hermaphroditi* : *valvulis granulo notatis.*

- Patensia.* 1. RUMEX floribus hermaphroditis : valvulis integerimis : unica granifera, foliis cordatis. *Linn. sp.* 333. cordato-lanceolatis. *Syst. nat.* 990.

Lapathum hortense folio oblongo. Tour. 504.

La Patience.

HABITAT in hortis oleraceis.

- Sanguineus.* 2. RUMEX floribus hermaphroditis : valvulis integerimis, unica granifera, foliis cordato-lanceolatis. *Linn. sp.* 334.

Lapathum folio acuto rubente. Tour. 504.

Le Sang-dragon.

HOSPITATUR in frigidario. Altitudo bicubitalis. Folia inferiora maxima venis insignita sanguineis; superiora oblique cordata.

- Crispus.* 3. RUMEX floribus hermaphroditis, valvulis integerimis graniferis, foliis acutis lanceolatis undulatis. *Linn. sp.* 335.

- β. Rumex floribus hermaphroditis, valvulis dentatis, foliis obtusis crispis. *Sauv.* 70.

Lapathum folio acuto crispo. Tour. 504.

HABITAT in fossis udis. *A Gramont, Caunelles, Lavurue.*

- Acutus.* 4. RUMEX floribus hermaphroditis : valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis. *Linn. Syst.* 990. acuminatis.

Lapathum folio acuto plano. Tour. 504.

Lapathum vulgare ramosum. Bot. Monf. 199.

Lapathum acutum sive oxylapathum. *Bot. Monf.* 149.
 Vernaculè *lou Rénebre*.

HABITAT cum priori; & à la riviere.

5. RUMEX floribus hermaphroditis, valvulis dentatis *Pulcher.*
 graniferis, foliis radicalibus lyratis. *Linn. Syst.* 990.

Rumex floribus hermaphroditis, valvulis granulo
 destitutis, foliis lyratis. *Linn. sp.* 336.

Lapathum pulchrum Bononiense sinuatum. *Bot.*
Monf. 300.

Rumex floribus hermaphroditis, valvulis dentatis,
 foliis supra petiolum emarginatis. *Sauv.* 69 & 272.

Le Violon.

HABITAT in humidis. A Latres & à la mer.

* *Hermaphroditi: valvulis granulo destitutis.*

6. RUMEX floribus hermaphroditis, valvulis dentatis *Bucephalo-*
 nudis, pedicellis planis reflexis. *Linn. sp. p.* 336. *phorus.*

Acetosa ocymifolia Neapolitana. *Tour.* 503. *Bot.*
Monf. 311.

HABITAT ad lævam; à la Verune. Vix palmaris,
 ramosus.

7. RUMEX floribus hermaphroditis, valvulis inte- *Aquaticus.*
 getrimis nudis, foliis cordatis. *Linn. sp. p.* 336.

Sauv. 69. n°. 336.

Lapathum aquaticum folio cubitali. *Bot. Monf.* 149.
Tour. 504.

Lapathum . . . foliis cordatis glabris acutis. *Linn.*
Syst. 990.

HABITAT. Au-delà de Mauguio, & à Aiguemortes.

8. RUMEX floribus hermaphroditis, valvulis lævibus, *Lunaria.*
 caule arboreo, foliis subcordatis. *Linn. sp. p.* 336.

Acetosa arborescens folio subrotundo. *Tour.* 503.

HOSPITATUR in hybernaculo. Sempervirens. Folia
 succulenta.

9. RUMEX floribus hermaphroditis geminatis, valvu- *Vesicarius.*
 larum abs maximis membranaceis reflexis, foliis
 indivisis. *Linn. sp. p.* 337. *Sauv.* 101.

Oxis seu acetosa Americana. *Barr. Icon.* 1112.

Acetosa Americana foliis longissimis pediculis do-
 natis. *Tour.* 503.

HOSPITATUR sub dio.

10. RUMEX floribus hermaphroditis distinctis, valvu- *Rosens.*

188 HEXANDRIA TRIGYNIA.

larum alis maximis membranaceis, foliis erosis.
Linn. sp. p. 337.

Rumex floribus... geminatis, valvulæ unius ala maxima membranacea denticulata, foliis erosis. *Linn. Syst. 990.*

HOSPITATUR sub dio. Annuus, uti prior.

Scentatus. 11. RUMEX floribus hermaphroditis, foliis cordato-hastatis. *Linn. sp. p. 337.*

Acetosa rotundifolia hortensis. Bot. Monsf 4. Tour. 503. L'Oseille; vernaculè l'Oseille ou Agrette.

HABITAT in hortis oleraceis.

* *Floribus declinis.*

Spinosus. 12. RUMEX floribus androgynis, calycibus femineis monophyllis, valvulis exterioribus reflexo-uncinatis. *Linn. sp. p. 337.*

Rumex floribus androgynis, calycibus fructus uncinatis, foliis ovatis. Sauv. 101.

Spinacia Cretica, capsula seminis aculeata. Torr. 533. L'Epinar de Crète.

HOSPITATUR sub dio. Procumbens.

Acetosa. 13. RUMEX floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis. *Linn. sp. p. 337. Sauv. 70.*

Acetosa pratensis. Tour. 502.

L'Oseille des prés.

HABITAT à Lœtes, Selleneuve, Castelnau.

Acetofella. 14. RUMEX floribus dioicis, foliis lanceolato-hastatis. *Linn. sp. p. 338.*

Acetosa arvensis lanceolata. Bot. Monsf. 3. Tour. 503.

β. *Acetosa lanceolata angustifolia. Bot. Monsf. 3. Tour. 503.*

Rumex floribus dioicis, foliis linearibus hastatis.

Sauv. 70. & foliis lanceolatis. Sauv. ibid.

Vernaculè l'Agrette Sauvage.

HABITAT ad lævam, à Castelnau, Montferrier, & à la Verune.

TRIGLOCHIN.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 359.*

Char. secund. Rad. fibrosa. Caul. scaposa. Fol. (graminea) radicalis subulata vaginans simplex integerrima. Flor. terminalis racemosa. Fulc. nulla.

2. TRIGLOCHIN capsulis trilocularibus sublinearibus. *Palustr.*

Linn. sp. p. 338.

Gramen junceum spicatum seu triglochin. *Bot. Monf.*
119.

Juncago palustris & vulgaris. *Tour. 266.*

HABITAT in aquis, à *Lattes vers les étangs*. Scapus
sesquipalmaris à latere radicis. Flores alterni sæ-
pius scapo appressi.

MENISPERMUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 362.*

Char. sec. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* fruticulosa
volubilis. *Fol.* alterna petiolata simplex integra
peltata. *Flor.* *Fulcr.*

1. MENISPERMUM foliis cordatis peltatis lobatis. *Linn. Virginicum.*

sp. p. 340.

HOSPITATUR in caldario. Sempervirens.

COLCHICUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 360.*

Char. sec. *Rad.* tuberosa. *Caul.* nulla. *Fol.* radi-
calis simplex integerrima. *Flor.* solitaria radi-
calis ad latera tuberis. *Fulc.* nulla.

1. COLCHICUM foliis planis lanceolatis erectis. *Linn. Autumnale.*

sp. p. 341. Sauv. 18.

Colchicum commune. *Bot. Monf. 71. Tour. 348.*

Le Tue-chien.

HABITAT in pratis & arvis. A *Lattes, Sembrés, Cas-
selbau; aux prairies d'Arene.* Tubus corollæ longus
immediate prodeit à latere tuberis.

POLYGYNIA.

ALISMA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 365.*

Char. sec. *Rad.* fibrosa. *Caul.* scaposa. *Fol.* radi-
calis petiolata vaginans simplex integerrima.
Flor. terminalis verticillato-paniculata. *Fulc.*
bractea membranacea ad basum ramorum. Acu-
lei (in una specie) supra capsulas.

190 HEXANDRIA POLYGYNIA.

- Plantago.* 1. ALISMA foliis ovatis acutis, fructibus obtusè trigonis. *Linn. sp. p.* 342.
Alisma fructu obtuso trigono. Sauv. 14.
Ranunculus palustris plantaginis folio ampliore. Tour. 292.
Plantago aquatica latifolia. Bot. Monsf. 206.
Le Plaintain d'eau.
HABITAT in aquis circa Urbem. *Au Verdanson.* Rami verticillorum inferiorum umbelliferi.
- Damaſonium* 2. ALISMA foliis cordato-oblongis, floribus hexagynis. *Linn. sp. p.* 342. *Sauv. 14.*
Plantago aquatica stellata. Bot. Monsf. 206.
Damaſonium stellarum. Tour. 257.
HABITAT in aquis versus stagna. Rarius hodiè dans le Verdanson sous la Citadelle.
- Ranunculoïdes.* 3. ALISMA foliis lineari-lanceolatis, fructibus globoso-squarrosis. *Linn. sp. pag.* 342.
Alisma fructu globoso undique echinato. Sauv. 14.
Plantago aquatica angustifolia. Bot. Monsf. 206. Baub. pin. 190.
Ranunculus palustris plantaginis folio angustiore. Tour. 292.
HABITAT in amne. *Au-delà de Lavalette, &c. in rivulo ad lævam circà Nemausum, à Lunel & à Nîmes.*



Classis VII.

HEPTANDRIA
MONOGYNIA.

ÆSCULUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 367.

Char. secund. Rad. lignosa. Caul. arborea. Fol.
opposita petiolata digitata, foliolis integris.
Flor. ramea terminalis racemosa. Fulc. aculei
supra capsulas.

c. ÆSCULUS floribus heptandris. Linn. sp. 344.

Hippocastanum. Tour. 611.

Hippocasta-
num.

Le Marronier d'Inde.

HOSPITATUR sub dio.



Classis VIII.

OCTANDRIA
MONOGYNIA.

TROPÆOLUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 369.

Char. secund. *Rad.* fibrosa. *Caul.* flexuosa herbacea. *Fol.* alterna petiolata peltata simplex subintegerrima. *Flor.* solitaria pedunculata. *Fulc.* nulla.

- Minus.* 1. TROPÆOL. foliis quinquelobis petalis obtusis. *Linn. sp.* 345.
Cardaminum ampliori folio & majori flore. *Tour.* 430.
La Capucine.
 HOSPITATUR sub dio. Annuum. In hortis colitur pro acetariis.

OENOTHERA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 376.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* teres herbacea vel fruticosa. *Fol.* alterna simplex subintegerrima sessilis vel petiolata, vel inferior petiolata, superior sessilis. *Flor.* axillaris solitaria sessilis, vel terminalis paniculata. *Fulc.* nulla.

- Bismis.* 1. OENOTH. foliis ovato-lanceolatis, floribus axillaribus, caule fistuloso.
Oenothera foliis ovato-lanceolatis planis. *Linn. sp.* 347. *Caule* scabro. *Linn. Syst.* 998.
Onagra latifolia. *Tour.* 302.
L'Herbe aux ânes.
 HOSPITATUR sub dio. Altitudo humana. Folia subdenticulata radicalia petiolata in petiolum decurrentia. Flores lutei. Nervi foliorum decurrunt in caulem.
- Mollissima.* 2. OENOTH. foliis lineari-lanceolatis, floribus axillaribus.

Oenothera

Oenothera foliis lanceolatis undulatis. *Linn. sp.* 347.
Sauv. 74.

HOSPITATUR sub dio. Capsulæ longiores quàm in
priori tomento albido obiectæ. Folia denticulis raris
remotis.

3. OENOTH. foliis lanceolatis, floribus terminalibus *Fruticosa.*
paniculatis.

Oenothera foliis lanceolatis sub lentatis, capsulis pedi-
cellatis acutangulis. *Syst. nat.* 9, 8.

Oenothera foliis lanceolatis, capsulis acutangulis.
Linn. sp. 346. & *Sauv.* 74.

Onagra angustifolia, caule rubro, flore minore.
Tour. 302.

HOSPITATUR sub dio. Flores albi parvi. Stamina petal-
is opposita.

EPILOBIUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 377.

Char. secund. Rad. simplex tenuis aut lignosa
ramosa. Cuius herbacea teres aut tetragona re-
pens vel erecta. Fol. simplex integra, nunc
alterna vel opposita, nunc sessilis aut petiolata,
Flor. axillaris solitaria pedunculata. Ful. nulla.

* *Staminibus declinatis.*

1. EPILOB. foliis sparsis linear lanceolatis. *Linn. sp.* 347. *Angustifo-*
Lysimachia chamænerion dicta angustifolia. *Bauh. pin.* *lum.*
245.

Chamænerion angustifolium alpinum flore purpureo.
Tour. 303. & *Seg. ver. Tom. I. p.* 402.

Chamænerion vulgare latifolium. *Tour.* 303. & alpi-
num. *Ibid.*

Epilobium foliis difformibus, pistillo declinato. *Sauv.* 74.

HABITAT au Vigan, Ganges.

* *Staminibus erectis, petalis bifidis.*

2. EPILOB. foliis oppositis lanceolatis serratis. *Linn. sp.* *Hirsutum.*
347. *Sauv.* 74.

Chamænerion villosum magno flore violaceo. *Tour.*
303. *Seg. Tom. I.* 402.

Lysimachia filiquosa hirsuta magno flore violaceo. *Bot.*
Monf. 172.

HABITAT cum priori. Folia sessilia.

- Montanum.* 3. EPILOB. foliis oppositis ovatis dentatis. *Linn. sp.* 348. *Sauv.* 106.

Chamænerion glabrum majus. Tour. 303. *Seg. Tom. I.* 402.

HABITAT frequens in umbrosis rupibus; à *Montferrier*, juxta amnem; à *la source du Lés*, au mont *St. Loup*. Vix sesquipalmare simplicissimum. Folia summa quandoque oblonga, omnibus petiolatis.

- Tetragonum.* 4. EPILOB. foliis lanceolato-linearibus denticulatis, imis oppositis, caule tetragono. *Linn. sp.* 348. *Sauv.* 75. *Lythymachia filiquosa glabra minor. Bot. Monsf.* 172.

Chamænerion glabrum minus. Tour. 303.

HABITAT à *la Verune*, *Caunelles*, *Castelnaud*. Folia sessilia.

VACCINIUM.

Ch. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 384.

Char. secund. Rad. lignosa. *Caul.* fruticosa angulata. *Fol.* alterna petiolata simplex integra. *Flor.* axillaris solitaria pedunculata. *Fulcr.* nulla.

- Myrtillus.* 1. VACCIN. pedunculis unifloris, foliis serratis ovatis deciduis, caule angulato. *Linn. sp.* 349. *Sauv.* 95.

Vitis idæa foliis oblongis crenatis, fructu nigricante. *Tour.* 608. & *Seg. ver. 2.* 228.

L'Airelle, ou *Myrtille*.

HABITAT à *Lesperon*, la *Seranne*. Frutex.

ERICA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 378.

Char. secund. Rad. lignosa. *Caul.* fruticulosa aut arborea. *Fol.* sessilis simplex integerrima opposita terna vel quaterna. *Flor.* pedunculata, nunc solitaria axillaris, nunc racemosa terminalis. *Fulcr.* nulla vel bractæ duæ (in quibusdam) oppositæ minimæ in medio pedunculorum.

* *Antheris bicornibus.*

- Vulgaris.* 1. ERICA antheris bicornibus inclusis, corollis inæqualibus campanulatis mediocribus, foliis oppositis sagittatis. *Linn. sp.* 352.

Erica vulgaris glabra. Bot. Monsf. 90. *Tour.* 602. *Seg. ver. 2.* 279.

La Bruyere.

HABITAT à Valene.

2. ERICA antheris bicornibus inclusis, corollis campanulatis longioribus, foliis ternis patentibus, ramis tomentosis. *Linn. sp. 353.* *Scoparia.*

Erica erecta, foliis ternis, floribus ad alas sessilibus verticillatis. *Sauv. 170.*

Erica scoparia foliis deciduis. *Tour. 602.*

Erica scoparia floribus herbaceis. *Sauv. 46. Bot. Monsf. 90.*

Vernaculé, *lon Bruc.*

HABITAT au bois de Gramont.

3. ERICA antheris bicornibus inclusis, corollis ovatis longioribus, racemis corymbosis secundis, foliis ternis. *Linn. sp. 353.* *viridi purpurea.*

Erica foliis lanceolatis oppositis imbricatis, floribus uno versu racemosis. *Sauv. 170.*

Erica major, floribus ex herbaceo-purpureis. *Bot. Monsf. 90. Tour. 602.*

HABITAT à Valene, Rouquet, Gramont.

4. ERICA antheris bicornibus inclusis, corollis ovatis racemosis, foliis ternis glabris linearibus. *Linn. sp. 352.* *Cinerea.*

Erica ramulis foliisque ternis, ramis apice floriferis. *Sauv. 169.*

Erica cortice cinereo, arbuti flore. *Tour. 602.*

Erica ternis per intervalla ramulis. *Bot. Monsf. 91. Tour. 602.*

Erica arborescens Monspeliensis flore purpurascente. *B. Hist. 1. 357.*

HABITAT cum priori.

5. ERICA antheris bicornibus inclusis, corollis campanulatis longioribus, foliis quaternis patentissimis, caule subarboreo tomentoso. *Linn. sp. 353.* *Arborea.*

Erica foliis quaternis, floribus spicato-racemosis. *Sauv. 170. & 46.*

Erica alba maxima. *Bot. Monsf. 90. Tour. 602.*

HABITAT cum prioribus.

* *Antheris simplicibus obtusis emarginatis.*

6. ERICA antheris bifidis simplicibus exsertis, corollis campanulatis longioribus, foliis quinis linearibus patentibus. *Linn. sp. 355.* *Multiflora.*

Erica foliis corios multiflora. Tour. 601.

Erica juniperifolia dense fruticans Narbonensis. Bot. Monsf. 90. Sauv. 46.

HABITAT à Valene, Merviel, à Villemagne.

D A P H N E.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 379.

Char. secund. Rad. lignosa. Caul. fruticosa. Fol. sparsa conferta sessilis simplex integerrima. Flor. axillaris caulina, vel terminalis pedunculata, vel sessilis aggregata racemosa aut paniculata. Fulcr. nulla.

* Floribus lateralibus.

Maxeremo. 1. DAPHNE floribus sessilibus ternis caulinis, foliis lanceolatis deciduis. Linn. sp. 356.

Thymelæa folio deciduo. Tour. 595.

Le Bois gentil.

HABITAT à Lesperon.

Thymelæa. 2. DAPHNE floribus sessilibus axillaribus, foliis lanceolatis, caulibus simplicissimis. Linn. sp. 356.

Thymelæa foliis polygalæ glabris. Bot. Monsf. 305.

HABITAT à la Taillade de Gignac.

Laureola. 3. DAPHNE racemis axillaribus, foliis lanceolatis glabris. Linn. sp. 357.

Daphne racemis lateralibus, foliis integris. Sauv. 57.

Thymelæa laurifolia sempervirens; seu laureola mas. Tour. 595.

Laureola sempervirens, flore viridi, seu mas. Bot. Monsf. 152.

La Laureole mâle.

HABITAT au Capouladou; à la Serane, St. Guillin le Désert.

* Floribus terminalibus.

Gnidium. 4. DAPHNE panicula terminali, foliis lineari-lanceolatis acuminatis. Linn. sp. 357.

Daphne foliis lanceolatis basi angustioribus, racemo terminali nudo. Sauv. 56.

Thymelæa Monspeliaca. Bot. Monsf. 252.

Thymelæa foliis lini. Tour. 594.

Vernaculé, la Trintanele, Cante-perdâris, Garou.

HABITAT à Gramont, St. George.

STELLERA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 1053.

Char. secund. *Rad.* tenuis simplex lignosa. *Caul.* herbacea simplex rigescens. *Fol.* alterna sessilis simplex integerrima. *Flor.* axillaris sessilis sub-
solitaria. *Fulcr.* nulla.

1. STELL. foliis linearibus, floribus quadrifidis. Linn. *Passerina*.
sp. 559. *Sauv.* 69.

Thymelæa linariæ folio, vulgaris. *Tour.* 594.

Sanamunda annua, *Magnol. Char.* 150. *Linariæ folio*.
Hort. 178.

HABITAT in sabulosis ultra amnem. *A Sauret, Salicate,*
& à Montferrier. Altitudo sesquipalmaris.

DIGYNIA.

MOEHRINGIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 386.

Char. secund. *Rad.* tenuis subsimplex. *Caul.* herbacea debilis. *Fol.* opposita subconnata sessilis subulata simplex integerrima. *Flor.* axillaris pedunculata solitaria. *Fulc.* nulla, vel quandoque bractæ minimæ in medio pedunculi, oppositæ.

1. MOEHRINGIA. Linn. *sp.* 359.

Alfine tenuifolia muscosa. *Bot. Monf.* 13. *Seg. Ver.* 1.
418. *tab. V. fig.* 1.

Muscosa.

HABITAT au bois de Gramont. Inter Bryum & Mnium.

TRIGYNIA.

POLYGONUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 391.

Char. secund. *Rad.* horizontalis nodosa. *Caul.* herbacea vel fruticulosa. *Fol.* alterna simplex integerrima sessilis aut petiolata, vel inferior petiolata, superior sessilis. *Flor.* axillaris aggregata petiolata aut terminalis spicata. *Fulc.* stipula

solitaria vaginans adnata. Bractæe membranaceæ infra flores.

* *Bistorta spica unica.*

Bistorta. 1. POLYG. caule simplicissimo monostachyo, foliis ovatis in petiolum decurrentibus. *Linn. sp. 360.*

Bistorta major, radice magis intorta. *Tour. 511.*

La Bistorte.

HABITAT à *Lesperou*, *Lamalon*. Folia summa sessilia amplexicaulia.

* *Perficaria pistillo bifido.*

Virginianum. 2. POLYG. floribus pentandris digynis, corollis quadrifidis, foliis ovatis. *Linn. sp. pag. 360.*

Perficaria frutescens virginiana maculosa, flore albo. *Tour. 510.*

HOSPITATOR sub dio.

Amphibium. 3. POLYG. floribus pentandris semi-digynis, staminibus corolla longioribus. *Linn. sp. pag. 361.*

Perficaria salicis folio, *potamogeton angustifolium dicta.* *Tour. 509.*

Potamogeton salicis folio. *Bot. Mons. 213.*

HABITAT in aquis, à *Lattes*, *Castelnau*.

Maritimum. 4. POLYG. floribus pentandris trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, caule stipulis obtecto fruticoso. *Linn. sp. pag. 361.*

Polygonum maritimum latifolium. *Bot. Mons. 209.*

Tour. 510. Sauv. 53. utrumque.

La Renouée de mer.

HABITAT ad mare & stagna. Flores terni quaterni axillares.

Hydropiper. 5. POLYG. floribus hexandris semi-digynis, foliis lanceolatis, stipulis submuticis. *Linn. sp. pag. 361.*

Perficaria urens seu hydropiper. *Bot. Mons. 201. Tour. 509.*

Le Poivre d'eau ou Curage.

HABITAT à *Lattes*, *Cannelles*.

Perficaria. 6. POLYG. floribus hexandris digynis, spicis ovatis oblongis, foliis lanceolatis, stipulis ciliatis. *Linn. sp. pag. 361.*

Perficaria mitis maculosa & non. *Bot. Mons. 201. Tour. 509.*

La Persicaire.

HABITAT in fossis udis, à la Verune, la Peissine,
& circa Urbem.

7. POLYG. floribus hexandris digynis, foliis ovatis, *Orientalis.*
caule erecto, stipulis hirtis. *Linn. sp. pag. 362.*
Persicaria orientalis nicotianæ folio, calyce florum
purpureo. Tour. cor. 38.

Le Monte-au-ciel.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo humana.

* *Polygonum foliis indivisis, floribus octandris.*

8. POLYG. floribus octandris trigynis axillaribus, fo- *Aviculare.*
liis lanceolatis, caule herbaceo procumbente. *Linn.*
sp. pag. 362.

Polygonum latifolium. Bot. Monf. 209. Tour. 510. &
angustifolium. Bot. Monf. 209.

La Renouée ou Trenasse.

HABITAT ad margines viarum & in ambulacris.

9. POLYG. foliis cordato-sagittatis, caule erecto sim- *Tataricum.*
plici, seminibus subdentatis. *Linn. sp. pag. 364.*

HOSPITATUR sub dio. Apricatur. Altitudo cubitalis.

Caulis à latere folii cujuslibet canaliculatus. Pe-
tioli sulcati.

10. POLYG. foliis cordato-sagittatis, caule erectiusculo *Fagopyrum.*
inermi, seminibus angulis æqualibus. *Linn. sp. p. 364.*

Fagopyrum erectum. Tour. 511.

Helxine caule erecto inermi, foliis cordato-sagitta-
tis. Sauv. 114.

Le Bled noir ou Sarrafin.

HABITAT à Lesperou, Lamalou.

CARDIOSPERMUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 394.*

Char. sec. *Rad. tenuis subsimplex. Caul. herbacea*
fstriata angulata volubilis. Fol. alterna petio-
lata biternata, foliolis simplicibus incis. Flor.
pedunculata laterifolia corymbosa. Fulc. cir-
rus geminus peduncularis infra corymbum.

1. CARDIOSPERMUM. *Linn. sp. pag. 367.*

Corindum ampliori folio, fructu maximo. Tour. 431.

Le pois de merveille.

Halimolobos.

HOSPITATUR sub dio. Apricatur. Foliola incisa ovata. Pedunculi foliis longiores teretes. Calyx minimus viridis, foliolis 2 majoribus, & duobus minoribus, alternis.

TETRAGYNIA.

P A R I S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 396.

Char. sec. *Rad.* horizontalis articulata nodosa.

Caul. teres simplicissima tetraphylla herbacea.

Fol. sessilis simplex integerrima verticillata.

Flor. terminalis pedunculata solitaria. *Fulc.* nulla.

Quadrifolia. 1. PARIS Linn. sp. p. 367. Sauv. 167.

Herba Paris. Tour. 233.

Le Raifin de r. nard.

HABITAT à Lesperou.

HOSPITATUR in frigidario. Sesquipalmaris. Folia interdum quina.

A D O X A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 397.

Char. sec. *Rad.* horizontalis nodosa. *Caul.* simplicissima pauciflora diphylla herbacea teres.

Fol. opposita petiolata simplex digitato-pinna-

tifida. *Flor.* terminalis pedunculata subcapitata.

Fulc. nulla.

Moschatel. 1. ADOXA. Linn. sp. 367. Sauv. 174.

luna.

Moschatellina foliis fumaræ bulbo æ. Tour. 156.

Ranunculus minimus septentrionalium. Lob. Hon. 674.

La Moscatell ne.

HABITAT cum priori. Frequens à Lessinouse près de Lamalou.

HOSPITATUR in frigidario, dans le Labyrinthe. Palmaris; florens April.



Classis IX.

ENNEANDRIA
MONOGYNIA.

LAURUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 400.

Char. sec. *Rad.* lignosa. *Caul.* arborea teres glabra. *Fol.* alterna petiolata simplex integerrima. *Flor.* axillaris pedunculata, pedunculis solitariis bifidis multifloris. *Fulcr.* nulla.

1. LAURUS foliis lanceolatis venosis perennantibus, *Nobilis.*
floribus dioicis quadrifidis. *Linn. sp. p.* 369.

Laurus vulgaris. *Bot. Monf.* 152. *Tour.* 597.

Le Laurier; vernaculè *lou Laourié.*

HABITAT in hortis. Semper-virens. Florens martio, semina maturans autumnio.

TRIGYNIA.

RHEUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 401.

Char. sec. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea simplex. *Fol.* alterna vaginans, simplex integra sinuata crispa, inferior petiolata, floralis sessilis, petiolis basi vaginantibus. *Flor.* terminalis paniculato-racemosa. *Fulcr.* nulla.

1. RHEUM foliis glabris, petiolis subsulcatis. *Linn. sp. Rhaponticum*
pag. 371.

Rhabarbarum Dioscoridis. *Tour.* 89.

Le Rapontic.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo cubitalis.

2. RHEUM foliis subvillosis, petiolis æqualibus. *Linn. Rhabarbarum.*
sp. p. 372.

Rhabarbarum foliis subvillosis. *Linn. amæn. acad.* 3.
p. 213. *tab.* IV.

202 ENNEANDRIA HEXAGYNIA.

La Rhubarbe.

HOSPITATUR sub dio. Folia duplo minora. Caulis humilior.

HEXAGYNIA.

BUTOMUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 403.

Char. sec. *Rad* fibrosa. *Caul.* scaposa multiflora.

Fol. radicalis subulata simplex integerrima vaginans. *Flor.* terminalis umbellata. *Fulc.* nulla.

Umbellatus, 1. BUTOMUS. Linn. sp. p. 372.

Juncus cyperoides paludosus floridus. Bot. Mens. 145.

Butomus flore roseo. Tour. 271.

Le Junc fleuri.

HABITAT in aquis. *A Lactes.*



Classis X.

DECANDRIA
MONOGYNIA.

ANAGYRIS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 700.

Char. sec. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* suffruticosa.
Fol. alterna petiolata ternata foliolis integerrimis sessilibus. *Flor.* axillaris pedunculata, pedunculis multifloris. *Fulcr.* stipula oppositifolia bifida acuminata.

1. ANAGYRIS. Linn. sp. pag. 374.
Anagyris foetida. Tour. 647. Barr. Icon. 569.
Le Bois puant.
HABITAT à Montbasin, St. Guillin le Desert.

Foetida.

CERCIS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 405.

Char. secund. *Rad.* lignosa. *Caul.* arborea. *Fol.* alterna petiolata simplex integerrima. *Flor.* axillaris racemosa. *Fulc.* stipulae binæ deciduae.
Obs. Pedunculi plures in caule vagi uniflori biflorive.
Mera luxuriatio.

1. CERCIS foliis cordato-orbiculatis glabris. Linn. sp. *Siliquastrum*
pag. 374.
Siliquastrum. Tour. 646.
L'Arbre de Judas ou Guainier.
HABITAT à la Verune, Gramont, Chateaubon, Sellenue, Castelnau.

CASSIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 408.

Char. sec. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea teres ramosa. *Fol.* alterna abruptè-pinnata foliolis subsessilibus integerrimis. *Flor.* axillaris racemosa.
Fulcr. stipulae binæ parvæ.

Obs. In hoc genere, pinnulæ inferiores cujuslibet folii minores, superiores majores sunt. In quibusdam speciebus adest glandula supra petiolum.

* *Senna*.

Senna. 1. CASSIA foliolis trijugatis quadrijugatisque subovatis. *Linn. sp. pag. 377.*

Senna Alexandrina foliis acutis. *Tour. 619.*

2. *Senna Italica* foliis obtusis. *Tour. 619.*

Le Senné.

HOSPITATUR sub dio. Apricatur. Annua. Pinnulæ subæquales.

Occidentalis. 2. CASSIA foliolis quinquejugatis ovato-lanceolatis margine scabris, exterioribus in juncibus, glandula baseos petiolorum. *Linn. sp. pag. 377.*

Cassia Americana fecunda, foliis oblongis glabris. *Tour. 619.*

HOSPITATUR in caldario. Pinnulæ inferiores superioribus triplo minores, omnes acuminatæ.

Planisiliqua. 3. CASSIA foliolis quinquejugatis ovatis, vel ovato-lanceolatis glabris, glandula baseos petiolorum. *Linn. sp. pag. 377.*

Cassia siliquis planis. *Tour. 619.*

HOSPITATUR in caldario.

POINCIANA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 409.*

Char. sec. *Rad. lignosa. Caul. fruticulosa. Fol. alterna abruptè bipinnata foliolis petiolatis simplicibus integerrimis, superioribus majoribus, cæteris decrefcentibus. Flor. . . : Fulc. aculei gemini ad basim petiolorum. Filum ad basim cujuslibet folioli.*

Pulcherrima. 1. POINCIANA aculeis geminis. *Linn. sp. p. 380.*

Poinciana flore pulcherrimo. *Tour. 619.*

La Poincillade ou Poinciane.

HOSPITATUR sub dio & in hybernaculo. Foliola obversè-ovata.

GUILANDINA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 997.*

Char. sec. *Rad. lignosa. Caul. arborea. Fol. alterna*

abruptè bipinnata, foliolis petiolatis integerrimis alternis. *Flor.*... *Fulcr.* aculei in caule & supra capsulas.

1. **GUILANDINA** aculeata, foliolis ovalibus acuminatis. *Linn. sp. p.* 381. *Bonduc.*
Fructus peregrinus primus. Clus. exot. lib. 2. 30.
Le Bonduc, Oeil de chat, ou pois nud.
HOSPITATUR sub dio & in caldario.

DICTAMNUS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 412.
Char. sec. *Rad.* horizontalis funiformis. *Caul.* teres herbacea simplex. *Fol.* alterna imparipinnata foliolis oppositis sessilibus integris. *Flor.* terminalis racemosa. *Fulc.* pili hispidi attri in caule & pedunculis glandulæ supra stamina confertæ. Filum in medio pedicellorum. Bractea ad basim singuli.

1. **DICTAMNUS.** *Linn. sp. p.* 383. *Sauv.* 232. *Albus.*
Fraxinella. Bot. Monsf. 99. Tour. 430.
Dictamnus albus seu fraxinella. Barr. Icon. 1318.
Le Dictame blanc ou la Fraxinelle.
HABITAT au bois de Candiac vers Nîmes.
HOSPITATUR in frigidario. Altitudo pedalis. Foliola serrata, impari majori subcordato. Pedicelli inferiores bifidi biflorique.

RUTA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 374.
Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* fruticulosa glaberrima teres. *Fol.* alterna impari-subtripinnata foliolis integerrimis subcarnosis. *Flor.* terminalis cymosa. *Ful.* nulla

1. **RUTA** foliis decompositis. *Linn. sp.* 383. *Graveolens.*
Ruta sylvestris major. Bot. Monsf. 227. Tour. 257.
La Rue; vernaculè de Ruds.
HABITAT à Castelnau, la Colombière, au Terrail.

M E L I A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 418.

Char. secund. *Rad.* lignosa. *Caul.* arborea. *Fol.* alterna petiolata impari-bipinnata, foliolis petiolatis integris. *Flor.* axillaris pedunculata racemosa. *Fulc.* nulla.

Azedarach. 1. MELIA foliis bipinnatis. Linn. sp. 384.

Azedarach. Tour. 616.

Le faux Sycomore; vernaculè *Lou pater noster*.

HABITAT in ambulacris, au plan de Loune, dans le jardin des Pénitens Blancs. Nectarium tubularum erectum atro-purpureum, longitudine petalorum. Stamina limbo nectarii affixa.

Z Y G O P H Y L L U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 415.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea teres ramosa articulata diffusa. *Fol.* opposita petiolata carnosæ binata, foliolis æqualibus integerrimis. *Flor.* interfoliacea alterna geminata pedunculata, pedunculis unifloris. *Fulc.* stipula integerrima utrinque bina interfoliacea, singula ad basim singuli pedunculi.

Fabago. 1. ZYGOPH. capsulis prismatico-pentaëdris. Linn. sp. 385.

Fabago Belgarum seu *peplus Parisiensium*. Tour. 259.
HOSPITATUR sub dio. Caulis diffusus.

F A G O N I A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 421.

Char. secund. *Rad.* ramosa, radiculis fibrosis. *Caul.* herbacea ramosa articulata tetragona. *Fol.* opposita petiolata ternata, foliolis æqualibus sessilibus integerrimis. *Flor.* axillaris solitaria pedunculata. *Fulc.* stipulæ binæ setaceæ. Spinæ ad apicem foliolorum & stipularum.

Cretica. 1. FAGON. spinosa, foliolis lanceolatis planis lævibus. Linn. sp. 386.

Fagonia spinosa. Tour. 265. Sauv. 178.

La Fagon ou Trefle épineux.

HOSPITATUR sub dio. Capsulæ ciliatæ. Stamina quinque intra petala, quinque inter ipsa. Stylus longitudine staminum.

TRIBULUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 419.

Char. secund. Rad. tenuis fibrosa. Caul. procumbens herbacea ramosa. Fol. opposita abrupte pinnata foliolis sessilibus integerrimis, alternatim trijugis & sexjugis. Flor. axillaris solitaria pedunculata. Fulc. stipulæ binæ integerrimæ, aculei suprà capsulas.

1. TRIB. foliolis sexjugatis subæqualibus. Linn. sp. 387. *Terrestris.*
Sauv. 227.

Tribulus terrestris. Bot. Mons. 260. Tour. 266.
Le Tribule.

HABITAT sous le Perou, à l'Hôpital général, à Montferrier. Caulis procumbit, villosus, rubens. Foliola ciliata, subtus villosa, oblique lanceolata. Pedunculi foliis duplo longiores.

MONOTROPA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 414.

Char. secund. Rad. nulla. Caul. scaposa simplicissima multiflora parasitica. Fol. nulla. Flor. spicata terminalis. Fulc. squamæ in scapo & ad basim floris cujuslibet, amplexicaules.

1. MONOT. floribus lateralibus octandris, terminali *Hypopithys.*
decandro. Linn. sp. 387.

HABITAT à Lesperou. Palmaris vel humilior. Suprà radices & ad basim trunci pini.

ARBUTUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 427.

Char. secund. Rad. lignosa. Caul. fruticosa. Fol. alterna petiolata simplex integra aut integerrima. Flor. terminalis racemosa. Fulc. bractea parva ad basim floris singuli.

1. ARBUT. caule erecto, foliis glabris serratis, baccis *Unedo.*

polypermis. *Linn. sp.* 395. *Sauv.* 59. & 96.

Arbutus folio serrato. Bot. Monf. 26. *Tour.* 598. *Barr.*
Icon. 69.

L'Arbousier; vernacule *Lous Arbouffés.*

HABITAT à Valenc, Rouquet, Lafignarede.

Uva ursi. 2. ARBUT. caulibus procumbentibus, foliis integerrimis. *Linn. sp.* 395.

Vitis idæa foliis carnosiss & veluti punctatis. Bauh.
Pin. 470.

Uva urli. Tour. 599.

La Boufferoie ou Buxeroie.

HABITAT à Lesperou. Folia obversè ovata, quandoque emarginata.

PYROLA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 425.

Char. secund. *Rad.* horizontalis funiformis. *Caul.* scaposa. *Fol.* radicalis petiolata simplex integerrima. *Flor.* terminalis racemosa. *Fu c* squamæ vagæ in scapo. Bractea ad basim singuli pedicelli.

Rotundifolia. 1. PYROLA staminibus adscendentibus, pistillo declinato. *Linn. sp.* 396.

Pyrola foliis integerrimis. Sauv. app. 305.

Pyrola rotundifolia. Tour. 256.

La Pyrole.

HABITAT à Lesperou, à la Serane.

DIGYNIA.

CHRYSOSPLENIUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 387.

Char. secund. *Rad.* fibrosa. *Caul.* herbacea ramosa. *Fol.* opposita petiolata simplex integra. *Flor.* axillaris solitaria pedunculata. *Fu c* nulla.

Oppositifolium. 1. CHRYSOSP. foliis oppositis. *Sauv.* 128. *Linn. sp.* 398.

Chrysosplenium foliis amplioribus auriculatis. Tour. 146. *Seg.* 1. 241.

La Saxifrage d'or.

HABITAT à Lesperou.

SAXIFRAGA.

SAXIFRAGA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 434.

Char. secund. *Rad.* tenuis incerta, simplex vel ramosa bulbosa aut granulata, aut fibrosa horizontalis. *Caul.* teres herbacea simplex vel ramosa, erecta vel humifusa, subnuda aut foliosa. *Fol.* alterna simplex incisa integra aut integerrima, petiolata vel sessilis, vel inferior petiolata, superior sessilis. *Flor.* terminalis subpaniculata, aut axillaris, pedunculis solitariis multifloris. *Falc.* nulla.

* *Foliis indivisis, caule subnudo.*

1. SAXIF. foliis radicatis aggregatis lingulatis cartilagineo-ferratis, caule paniculato. *Linn. sp.* 398.
Saxifraga foliorum margibus cartilagineo-ferratis. Sauv. 52. & 116.
Saxifraga sedi folio angustiore serrato. Tour. 252.
Seg. ver. rom. l. 448. *tab.* 9. *fig.* 1.
2. *Saxifraga sedi folio flore albo, multiflora. Tour. ibid.*
Sedum montanum. Barr. Icon. 1309. 1310. 1311.
 1312. 373. 392.
La Saxifrage.
HABITAT à Lesperon.
2. SAXIF. foliis cordato-ovalibus retusis cartilagineo-crenatis, caule nudo paniculato. *Linn. sp.* 401.
Geum rotundifolium minus. Tour. 251.
HOSPITATUR in frigidario.

* *Foliis indivisis, caule nudo.*

3. SAXIF. foliis caulinis lineari-subulatis sparsis nudis inermibus, caulibus decumbentibus. *Linn. sp.* 403.
Sedum alpinum flore pallido. Bot. Monf. 235. *Tour.* 263.
HABITAT à Lesperon, au Capouladou.
4. SAXIF. foliis caulinis reniformibus dentatis petiolatis. *Rotundifolia. Linn. sp.* 403.
Geum rotundifolium majus. Tour. 251.
HABITAT cum priori.

* *Foliis lobatis, caule erecto.*

- Granulata*. 5. SAXIF. foliis caulinis reniformibus lobatis, caule ramoso, radice granulata. *Linn. sp.* 403.
Saxifraga rotundifolia alba. *Tour.* 252.
 HABITAT cum congeneribus. Caulis villosus pallide rubens. Petioli foliis paulò longiores, basi dilatati. Calyx profundè quinquefidus. Radix granulis imbricatis.
- Tridactylites*. 6. SAXIF. foliis caulinis cuneiformibus trifidis alternis, caule erecto ramoso. *Linn. sp.* 404.
Saxifraga foliis trifidis basi angustatis, caule erecto. *Sauv.* 208.
Sedum tridactylites tectorum. *Bot. Monf.* 238.
Saxifraga verna annua humilior. *Seg. ver.* 1. 448. *Tour.* 252.
 HABITAT à *Caunelles*, *Gramont*, *Castelnau* cum globularia vulgari. Variat foliis caulinis integerrimis ovatis.
- Cespitosa*. 7. SAXIF. foliis radicatis aggregatis linearibus integris trifidisque, caule erecto subnudo subbifloro. *Linn. sp.* 404.
Saxifraga tridactylites alpina minor & villosa. *Tour.* 252.
Sedum tridactylites alpinum minus. *Bot. Monf.* 238.
Saxifraga foliis integris partim trifidis. *Seg. ver.* 451. *Tab.* 9. fig. 4.
 HABITAT au *Mont Saint Loup* & à *Lesperou*.

* *Foliis lobatis, caulibus procumbentibus.*

- Hypnoides*. 8. SAXIF. foliis caulinis linearibus integris trifidisque, stolonibus procumbentibus, caule erecto nudiusculo. *Linn. sp.* 405.
Saxifraga procumbens, foliis linearibus integris trifidisque. *Sauv.* 208. & quinquefidis. 208. n°. 90. 91. & 92.
Saxifraga muscosa trifido folio. *Tour.* 252.
 HABITAT à *Lesperou*.
- Ascendens*. 9. SAXIF. foliis caulinis cuneiformibus apice dentatis, caule ascendente subvillosa. *Linn. sp.* 405.
Sedum tridactylites alpinum majus. *Baub. Pin. prod.* 131. n°. 3.

HABITAT cum prioribus. Altitudo saxifragæ rotundifoliae.

SCLERANTHUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 432.

Char. secund. *Rad.* tenuis simplex rigida. *Caul.* rigida articulata procumbens. *Fol.* opposita subconnata sessilis simplex integerrima subulata. *Flor.* terminalis fastigiata. *Fulc.* nulla.

1. SCLER. calycibus fructus patulis. Linn. sp. 406. *Annone.*
Sauv. 124.

Polygonum acuto angusto & gramineo folio minus repens. Bot. 111.

Alchimilla supina gramineo folio, flore minore. Tour. 508.

Knavel. *Seg. ver.* 1. p. 96.

HABITAT à Gramont, & à Montferrier.

GYPSOPHILA.

Char. prim. Vid. Linn. Syst. pl. 498.

Char. secund. *Rad.* tenuis simplex vel ramosa. *Caul.* articulata herbacea teres ramosa rigida. *Fol.* opposita sessilis subconnata simplex integerrima. *Flor.* terminalis aggregata vel fastigiata. *Fulc.* nulla.

1. GYPSOPH. foliis mucronatis recurvatis, floribus *Aggregata.*
aggregatis. Linn. sp. 406.

Caryophyllus saxatilis ericæ folio, umbellatis corymbis. Bot. Mons. 53. Tab. 5.

Rubiola montana. Barr. Icon. 595.

HABITAT au Vigan après avoir passé le Pont, sur la montagne qui est vis-à-vis, & au Capouladon. Palmaris.

2. GYPSOPH. foliis lanceolato-linearibus obsolète tri- *Fastigiata.*
quetris lævibus obtusis secundis. Linn. sp. 407.

Saponaria calycibus pentaphyllis, corymbis fastigiatis, foliis linearibus, caule adscendente. Sauv. 145.

HABITAT à Villemagne & Fongeres.

3. GYPSOPH. folius lineari-lanceolatis planis, caule di- *Rigida.*
chotomo, pedunculis bifloris, petalis emarginatis. Linn. sp. 408.

Saponaria caule brachiato, capillaceo folio, calyce campanulato, floribus sparsis. *Sauv.* 145.

HABITAT à la Salle.

- Saxifraga.* 4. GYPSOPH. foliis linearibus, calycibus angulatis, squamis (sæpius) duabus, corollis crenatis. *Linn. Syst.* 1028.

Dianthus calycibus quinquangularibus, squamis calycinis lanceolatis æqualibus, foliis subulatis. *Linn. sp.* 413.

Lychnis minor saxifraga. *Tour.* 338.

HOSPITATUR sub dio. Squamæ ad calyces interdum quatuor. Semper florens.

SAPONARIA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 431.

Char secund. Rad. simplex tenuis. Caul. herba-cea articulata teres ramosa. Fol. opposita subconnata sessilis simplex integerrima. Flor. pedunculata pedunculis axillaribus, terminalibusque multifloris (interdum pedunculi uniflori in divisione ramorum.) *Fulc.* nulla.

- Officinalis.* 1. SAPON. calycibus cylindricis, foliis ovato-lanceolatis. *Linn. sp.* 408.

Saponaria major lævis. *Bot. Monf.* 119. *Barr. Icon.* 91.

Lychnis quæ saponaria vulgo. *Tour.* 336.

La Savonaire.

HABITAT circà Melendinas & ad agrorum margines.

- Vaccaria.* 2. SAPON. calycibus pyramidatis quinquangularibus, foliis ovatis acuminatis sessilibus. *Linn. sp.* 409. *Sauv.* 153.

Lychnis segetum rubra foliis perfoliatæ. *Bot. Monf.* 169. *Tour.* 335.

HABITAT in arvis. Calyx angulis quinque viridibus, dentibus quinque rufescentibus.

- Ocymoides.* 3. SAPON. calycibus cylindricis villosis, caulibus dichotomis procumbentibus. *Linn. sp.* 409.

Lychnis vel ocymoides repens montanum. *Bot. Monf.* 172. *Tour.* 337.

Saponaria humifusa hirsuta, calyce tubuloso. *Sauv.* 144.

HABITAT à Valene, Rouquet, Saint Gelly.

DIANTHUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 430.

Char. secund. Rad. simplex tenuis vel ramosa.

Caul. herbacea simplex articulata. Fol. opposita sessilis subconnata simplex integerrima subulata. Flor. terminalis solitaria aut aggregata. Fulc. nulla.

* Flores aggregati.

1. DIANTHUS floribus aggregatis fasciculatis, squamis calycinis ovato-subulatis tubum æquantibus, foliis lanceolatis. Linn. sp. 409. Sauv. 144. Barbatus.
Caryophyllus hortensis barbatus latifolius. Tour. 332. & angustifolius. Ibid.
HABITAT in sterilibus. A St. George. Folia trinervia villosa. Petala apice ferrulata.
2. DIANTHUS floribus subaggregatis, squamis calycinis ovaris aristatis tubum subæquantibus, foliis linearibus. Linn. sp. p. 409. Carrhusianum.
Caryophyllus sylvestris vulgaris latifolius. Tour. 333.
Caryophyllus barbatus angustifolius. Seg. ver. 1. p. 438.
Le Bouquet parfait.
HOSPITATUR sub dio. Colitur in hortis.
3. DIANTHUS floribus aggregatis fasciculatis, squamis calycinis lanceolatis villosis tubum æquantibus. Linn. sp. 410. & Sauv. 144. Armeria.
Caryophyllus sylvestris barbatus. Bot. Monf. 52. Tour. 335.
HABITAT à Montferrier, Castelnau.
4. DIANTHUS floribus aggregatis capitatis, squamis calycinis ovaris obtusis muticis tubum superantibus. Linn. sp. p. 410. Prolifer.
Dianthus floribus aggregatis, capitulo magno, squamis calycinis obtusis magnis. Sauv. 144.
Caryophyllus sylvestris prolifer. Bot. Monf. 52. Tour. 332.
HABITAT à Lavalette, Cannelles; circa urbem & cum priori.

* *Flores solitarii, plures in eodem caule.*

- Caryophyllus.** 5. **DIANTHUS** floribus solitariis, squamis calycinis subovatis brevissimis, corollis crenatus. *Linn. sp. p. 410. Sauv. 143.*
Caryophyllus hortensis. Tour. 332. & varietates.
L'Oeillet; vernaculè la Giroflade.
 HABITAT cum prioribus; mire varians in hortis florum elegantia.
- Deltoides.** 6. **DIANTHUS** floribus solitariis, squamis calycinis lanceolatis binis, corollis crenatis. *Linn. sp. p. 411.*
Caryophyllus sylvestris vulgarissimus. Bot. Mons. 52. Tour. 333.
Vernaculè l'Oeillet sauvage.
 HABITAT cum prioribus. Caulis simplicissimus pauciflorus.
- Chinensis.** 7. **DIANTHUS** floribus solitariis, squamis calycinis subulatis parulis tubum æquantibus, corollis crenatis. *Linn. sp. 411.*
Dianthus floribus solitariis, squamis calycinis longitudine tubi. Sauv. 144.
La Magnohette.
 HOSPITATUR sub dio. Folia ad margines aspera. Flores variegati.
- Plumarius.** 8. **DIANTHUS** floribus solitariis, squamis calycinis subovatis brevissimis, corollis multifidis fauce pubescentibus. *Linn. sp. 411.*
Dianthus floribus solitariis, petalis multifidis basi canaliculatis. Sauv. 143.
Caryophyllus flore tenuissimè dissecto. Bot. Mons. 52. Tour. 331. Seg. ver. 1. p. 437. si te odoratissimo.
L'Oeillet à plume.
 HABITAT à Lesperon, à la Salle, au Vigan.
- Arenarius.** 9. **DIANTHUS** caulibus unifloris, squamis calycinis ovatis, corollis multifidis, foliis linearibus. *Linn. sp. 412.*
Dianthus foliis brevibus, squamis muticis, caule unifloro. Sauv. 143.
Caryophyllus sylvestris humilis flore unico. Tour. 333.
 HABITAT à Lesperon; frequentior à Lamalou, Fougere.

TRIGYNIA.

CUCUBALUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 443.

Char. secund. Rad. simplex tenuis. Caut. herbacea teres ramosa. Fol. opposita subconnata sessilibus simplex integerrima. Flor. pedunculata axillaris aut terminalis, solitaria paniculata, spicata aut verticillata. Fulcr. nulla.

1. CUCUB. calycibus campanulatis, petalis distantibus, fructu colorato, ramis divaricatis. *Linn. sp. 414.* *Baccifer.*
Alfene scandens baccifera. Bot. Monsf. 15.
Cucubalus Plinii. Tour. 339.
HABITAT à Lattes, la Verune. Pedunculi uniflori axillares.
2. CUCUB. calycibus subglobosis glabris reticulato-venosis, capsulis trilocularibus, corollis subnudis. *Bezen.*
Linn. sp. 414. Sauv. 151.
Lychnis sylvestris quæ behen album vulgo. Bot. Monsf. 168. Tour. 335.
Le Behen blanc; vernaculè lous Caoulichous.
HABITAT in arvis. Pedunculi dichotomi terminales.
3. CUCUB. pedunculis axillaribus unifloris, floribus secundis, foliis scabris. *Tataricus.*
Linn.
Cucubalus petalis bipartitis, floribus secundis decumbentibus, pedunculis oppositis solitariis erectis, caule simplicissimo. Linn. sp. 415.
HOSPITATUR sub dio. Folia oblonga retrorsum scabra.
4. CUCUB. petalis bipartitis, floribus paniculatis, staminibus longis, foliis lanceolato-ovatis. *Catholicus.*
Linn. sp. 415.
HOSPITATUR sub dio.
5. CUCUB. floribus dioicis verticillatis, petalis setaceis indivisis. *Oritas.*
Linn. sp. 415.
Lychnis viscosa flore muscoso. Bot. Monsf. 168. Tour. 336.
Silene floribus dioicis, petalis simplicissimis setaceis. Sauv. 145.
HABITAT à Castelnau, Lavalette.
6. CUCUB. floribus spicatis alternis secundis subsessilibus, corollis obtusis nudis. *Reflexus.*
Linn. sp. 416.

Lychnis sylvestris alba, spica reflexa. *Bot. Monf.* 171.
Icon. 170. *Barr. Icon.* 1027. n°. 1. & 2. *Tour.* 338.
 HABITAT à Bouzonet & cum prioribus.

S I L E N E.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 444.

Char. sec. *Rad.* simplex tenuis. *Caul.* herbacea vel fruticosa, simplex vel ramosa. *Fol.* opposita subconnata simplex integerrima. *Flor.* pedunculata axillaris solitaria vel conferta, aut terminalis paniculato-dichotoma vel spicata. *Fuler.* nulla.

* *Floribus lateralibus solitariis.*

- Quinquem. umbra.* 1. SILENE petalis integerrimis subrotundis, fructibus erectis alternis. *Linn. sp.* 416.
Silene spica incurva uno versu florida, foliis imis spathulatis. *Sauv.* 146.
 HABITAT à la Verune, Gramont.

* *Floribus lateralibus confertis.*

- Nutans.* 2. SILENE petalis bifidis, floribus lateralibus secundis cernuis, caule recurvato. *Linn. sp.* 417.
Lychnis montana viscosa alba latifolia. *Bot. Monf.* 168. *Tour.* 335.
Silene foliis lanceolatis, caule paniculato, floribus nutantibus, calyce striato, corolla involuta. *Sauv.* 145.
 HABITAT à Castelnau.
Fruticosa. 3. SILENE petalis bifidis, caule fruticoso, foliis lanceolatis, panícula trichotoma. *Linn. sp.* 417.
Lychnis sylvestris frutescens myrsifolia behen albo similis. *Tour.* 335.
 HOSPIATUR sub dio.

* *Floribus ex dichotomia caulis.*

- Conoidea.* 4. SILENE calycibus fructus globosis acuminatis, striis triginta, foliis glabris. *Linn. sp.* 418. *Sauv.* 146.
Cucubalus calycibus globosis acuminatis. *Sauv.* 146.
Lychnis sylvestris latifolia, calycibus turgidis striatis. *Bot. Monf.* 169. *Tour.* 337.
 HABITAT à gauche du pont de Castelnau, cum globularia vulgari.

5. *SILENE* calycibus fructus conicis, striis triginta, *Conica*.
 foliis mollibus. *Linn. sp.* 418.
Lychnis sylvestris angustifolia, calycibus turgidis
 striatis. *Tour.* 337. *Barr. Icon.* 1027.
Cucubalus calycibus fructus conicis. *Sauv.* 146.
 Hospitatur sub dio.
6. *SILENE* calycibus ovaris glabris venoso-reticulatis, *Behen*.
 capsulis trilocularibus. *Linn. sp.* 418.
Lychnis cretica vesicaria, parvo flore purpurascente.
Tour. cor. 24.
 HABITAT à Gramont, & à St. George.
7. *SILENE* petalis bifidis, caule dichotomo, floribus *Muscipula*.
 axillaribus sessilibus, foliis glabris. *Linn. sp.* 420.
Lychnis sylvestris viscosa rubra altera. *Bot. Monf.*
 169. *Tour.* 337.
 HABITAT à la Verune, Caunelles & Lamousson.
8. *SILENE* floribus fasciculatis fastigiatis, foliis super- *Armeria*.
 prioribus cordatis glabris. *Linn. sp.* 420.
Lychnis viscosa purpurea latifolia lævis. *Bot. Monf.*
 169. *Tour.* 335.
 HABITAT cum prioribus.
9. *SILENE* floribus erectis, petalis emarginatis, caly- *Rupifraga*.
 cibus teretibus, foliis lanceolatis. *Linn. sp.* 421.
Myosotis foliis perangustis flore calycem excedente.
Seg. ver. tom. 3. p. 184.
Caryophylli minima species flore albo. *Bot. Monf.* 54.
Lychnis saxatilis alpina glabra pumila. *Tour.* 338.
 HABITAT cum gypsophila aggregata. Pedunculi in-
 ternodiis æquales. Caulis palmaris. Folia sæpè ovata.
10. *SILENE* caulibus unifloris, pedunculis longitudine *Saxifraga*.
 caulis. *Linn. sp.* 421.
Lychnis minor saxifraga. *Tour.* 338. *Seg. ver. pag.*
 431. *tab. VI. fig.* 1.
 HABITAT cum priori. Abundat à Fougères. Vix biun-
 cialis aut sesquiuncialis.

S T E L L A R I A.

Char. prim. Vid. *Linn. syst. pl.* 504.

Char. sec. *Rad.* tenuis funiculiformis subhori-
 zontalis. *Caul.* herbacea ramosa. *Fol.* opposita
 simplex integerrima sessilis aut petiolata. *Fior.*
 axillaris & terminalis, pedunculis ramosis vel
 simplicibus. *Futor.* nulla.

218 DECANDRIA TRIGYNIA.

- Nemorum.* 1. STELL. foliis cordatis petiolatis, pedunculis ramosis.
Linn. sp. 421.
 Alfine altissima nemorum. *Tour. 243.*
 Alfine foliis ovato-cordatis, floribus trigynis. *Sauv. 152.*
 HABITAT à *Lesperou*. Petioli longissimi. Folia summa sessilia.
- Dichotoma.* 2. STELL. foliis ovatis sessilibus, caule dichotomo, floribus solitariis, pedunculis fructiferis reflexis. *Linn. sp. 421.*
 HABITAT cum priori, & à *Lamalon*.
- Graminea.* 3. STELL. foliis linearibus integerrimis, floribus paniculatis. *Linn. sp. 422.*
 Cerastrum caule hirsuto, foliis linearibus glabris, corolla calycem excedente. *Sauv. 143.*
 Alfine pratensis gramineo folio angustiore. *Tour. 243.*
 HABITAT in eisdem locis.

ARENARIA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 446.*

Char. secund. *Rad.* tenuis simplex. *Caul.* herbaceæ ramosa. *Fol.* opposita sessilis simplex integerrima. *Flor.* axillaris & terminalis, pedunculis uni vel multifloris *Fulc.* (nulla in una specie) stipulæ foliis interjectæ oppositæ membranaceæ.

- Trinervia.* 1. AREN. foliis ovatis acutis nervosis petiolatis. *Linn. sp. 423. & Sauv. 153.*
 Alfine plantaginis folio. *Tour. 242. Bot. Monsf. 13.*
 HABITAT à *la Verune, Villeneuve.*
- Serpillifolia.* 2. AREN. foliis subovatis acutis sessilibus, corollis calyce brevioribus. *Linn. sp. 423.*
 Alfine minor multicaulis. *Bot. Monsf. 13. Tour. 243.*
 Alfine foliis subovatis acutis sessilibus. *Sauv. 153.*
 HABITAT juxta muros hortorum, & ad agrorum margines.
- Rubra.* 3. AREN. foliis filiformibus, stipulis membranaceis vaginantibus. *Linn. sp. 423.*
- Campestris.* α. Alfine spergulæ facie, minor, seu spergula minor flore subcauleo. *Bot. Monsf. 13. Tour. 245.*
 Arenaria foliis linearibus vaginantibus, internodiis longioribus. *Sauv. 153.*
- Marina.* β. Alfine spergulæ facie mediâ. *Bot. Monsf. 14. Tour. 244.*

Arenaria foliis linearibus longitudine internodiorum.

Sauv. 141.

HABITAT in ambulacris. β . Procumbens foliis carnosiss; ad mare.

4. **AREN.** foliis subulatis, caulibus paniculatis, calycum *saxatilis.*
foliolis ovatis. *Linn. sp.* 424.

Spergula foliis aciformibus densis, ramis ramosis subnudis. Sauv. 45.

Alfene saxatilis laricis folio minor, & minori flore.

Hort. Monf. Ic. 11. *Tour.* 244.

HABITAT au delà du pont de Sellenneuve, à Montferrier, à la source du Lés.

5. **AREN.** foliis subulatis, caule paniculato, pedunculis simplicibus, capsulis erectis, petalis calyce brevioribus. *Linn. sp.* 424. *Tenuifolia.*

Alfene tenuifolia. Bot. Monf. 13. *Tour.* 243.

HABITAT cum arenaria serpyllifolia.

6. **AREN.** foliis setaceis, caule superne nudiusculo, calycibus subhirsutis. *Linn. sp.* 424. *Laricifolia.*

Alfene alpina junceo folio. Tour. 243.

HABITAT à la source du Lés, ponè montem; & à Lesperon.

7. **AREN.** foliis ovatis ciliatis acutis. *Linn. sp.* 425. *Ciliata.*

Arenaria serpyllifolia multicaulis & multiflora. Seg. Tom. I. p. 421. *tab. V. fig.* 2.

Alfene foliis lanceolatis, petalis integris, calyce majoribus. Sauv. 153.

HABITAT cum priori, & à Merviel; copiosior à Lamalou, Villemagne.

GARIDELLA.

Char. prim. *Vid. Linn. gen. pl.* 440.

Char. secund. *Rad.* tenuis fibrosa. *Caul.* herbacea ramosa. *Fol.* alterna sessilis simplex lineari-multifida. *Flor.* pedunculata, pedunculis axillaribus terminalibusque unifloris. *Fulc.* nulla.

1. **GARIDELLA.** *Linn. sp.* 425. *Sauv.* 252. *Nigellastrum.*

Nigellastrum raris & fœniculaceis foliis. Hort. Monf. Ic. 143. *Tour.* 655. *Barr. Icon.* 1240.

La Garidel.

HOSPITATUR sub dio. *Annua.*

PENTAGYNIA.

COTYLEDON.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 454.

Char. secund. *Rad.* bulbosa vel funiculiformis.

Caul. herbacea succulenta ramosa teres. *Fol.* succulenta sessilis vel petiolata, opposita vel alterna. *Flor.* terminalis cymosa vel racemosa. *Fulcr.* nulla.

Orbiculata. 1. COTYL. foliis subrotundis planis integerrimis. *Linn. sp.* 429. *Sauv.* 134.

Cotyledon Africanum frutescens, orbiculatis foliis, limbo purpureo cinctis. *Tour.* 90.

HOSPITATUR in hybernaculo & caldario. Rami abscissi in terram delapsi radices agunt.

Hemisphaerica. 2. COTYL. foliis semi-globosis. *Linn. sp.* 429.

HOSPITATUR cum priori. Rami novam prolem præbent, ut in priori.

Umbilicus. 3. COTYL. foliis cucullatis serrato-dentatis alternis, caule ramoso, floribus erectis. *Linn. sp.* 429.

Cotyledon major. *Bot. Monf.* 80. *Tour.* 90.

Le Nombril de Venus; vernaculè, *de Coucoumelle*.

HABITAT in parietibus humidis.

Laciniata. 4. COTYL. foliis oppositis laciniatis, floribus calycibusque quadrifidis. *Linn. sp.* 430.

HOSPITATUR cum prioribus. Corollæ tubus tetragonus inferne amplior. Folia caulina inferiora cuneiformia trifida, summa integra oblonga.

SEDUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 455.

Char. secund. *Rad.* fibrosa vel tenuis simplex.

Caul. herbacea succulenta. *Fol.* succulenta sessilis simplex integra aut integerrima, opposita vel sparsa. *Flor.* terminalis cymosa vel corymbosa. *Fulcr.* nulla.

* Planifolia.

Telephium. 1. SEDUM foliis planiusculis serratis, corymbo folioso, caule erecto. *Linn. sp.* 430.

Anacampseros prima. Tour. 264. Barr. Icon. 837.

1. SEDUM foliis ovalibus serratis, umbella ex alis foliorum. Sauv. 116. & 120.

L'Orpin, ou Reprise.

HABITAT à Lesperou.

HOSPITATUR sub dio. Florens absque fructu.

2. SEDUM foliis cuneiformibus integerrimis, caulibus decumbentibus, floribus corymbosis. Linn. sp. 430. var. Anacampse.

Sedum foliis spathulatis indivisis, umbella terminali.

Sauv. 77.

Anacampseros minor rotundiore folio, sempervirens.

Tour. 264.

HOSPITATUR sub dio.

3. SEDUM foliis planis, caule ramoso, floribus paniculatis. Linn. sp. 431. Sauv. 76. Cepæa.

Sedum cepæa dictum. Tour. 263.

HABITAT au Vigan, & à Lesperou.

* Teretifolia.

4. SEDUM foliis oppositis ovatis obrutis carnosiss, caule infirmo, floribus sparsis. Linn. sp. 431. Dasysphyllum.

Sedum minus folio circinnato. Bot. Monsf. 236. Tour. 263.

Sedum foliis cordato-ovatis compressis, sæpius oppositis, floribus sparsis. Sauv. 8.

HABITAT in Saxosis humidis; à Castelnau, Selleneuve.

5. SEDUM foliis subulatis confertis, basi membranacea solutis, floribus cymosis. Linn. sp. p. 431. Sauv. 7. Rupestre.

Sedum minus luteum folio acuto. Bot. Monsf. 235.

Tour. 263.

6. Sedum minus luteum flore se circumflectente. Bot. Monsf. 235. Tour. 263.

Sedum foliis teretibus, umbella semi circulari. Sauv. 7.

Le Triquemadame; vernaculè, lou Ris sauvage.

HABITAT à Bouronnet, Lavanet, Selleneuve, Cannelles.

6. SEDUM foliis oblongis obtusis teretiusculis sessilibus patentibus, cyma ramosa. Linn. sp. 432. Sauv. 8. Album.

Sedum minus teretifolium album. Bot. Monsf. 236.

Tour. 262.

HABITAT cum priori & circa urbem.

7. SEDUM foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis alternis, cyma trifida. Linn. sp. 432. Sauv. Acro.

7. Racemo trifido triphci.

222 DECANDRIA PENTAGYNIA.

Sedum parvum acre flore luteo. *Bot. Monf.* 236. *Tour.* 263.

HABITAT cum congeneribus.

Sexangulare. 8. *SEDUM* foliis subovatis adnato-fessilibus gibbis crec-
tusculis sexfariam imbricatis. *Linn. sp.* 432.

Sedum luteum minimum non acre. *Bot. Monf.* 236.
Tour. 263.

HABITAT in iisdem locis.

O X A L I S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. plant.* 453.

Char. secund. *Rad.* fibrosa horizontalis stoloni-
fera. *Caul.* herbacea ramosa repens. *Fol.* al-
terna petiolata ternata, foliolis integris corda-
tis fessilibus. *Flor.* pedunculata axillaris subum-
bellata. *Fulcr.* bractæ lineares involucrisformes.

Corniculata. 1. *OXALIS* caule ramoso diffuso, pedunculis umbellife-
ris. *Linn. sp.* 435. *Sauv.* 173.

Oxys flore flavo. *Tour.* 88.

Trifolium acetosum corniculatum. *Bot. Monf.* 271.

L'Alleluia, ou Pain à coucou.

HABITAT circa *St. George, Pignan.* Luxuriat in horto
regio.

A G R O S T E M M A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 449.

Char. secund. *Rad.* tenuis simplex. *Caul.* herba-
cea articulata teres ramosa. *Fol.* opposita fessi-
lis simplex integerrima. *Flor.* terminalis solitaria
pedunculata. *Fulcr.* nulla.

Githago. 1. *AGROST.* hirsuta, calycibus corollam æquantibus,
petalis nudis integris. *Linn. sp.* 435. *Sauv.* 146.

Lychnis segetum major. *Bot. Monf.* 169. *Tour.* 335.
La Nielle des bleds.

HABITAT in arvis. Apud nos datur calycibus corollas
longè superantibus.

Coronaria. 2. *AGROST.* tomentosa, foliis ovato-lanceolatis, pet-
alis integris coronatis. *Linn. sp.* 436. *Sauv.* 146. Co-
ronaria.

Lychnis coronaria Dioscoridis. *Tour.* 334. *Barr. Icon.*
1006.

La Coquelourde.

DECANDRIA PENTAGYNIA. 223

HOSPITATUR sub dio. Pedunculi uniflori. Calyces angulus decem; alternis quinque minoribus.

LYCHNIS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 451.

Char. secund. Rad. tenuis simplex. Caul. herbacea teres articulata. Fol. opposita sessilis subconnata simplex integerrima. Flor. terminalis fastigiata vel subdichotoma. Fulcr. nulla.

1. LYCHN. floribus fasciculatis fastigiatis. Linn. sp. 436. *Chalcedonica.*
Lychnis hirsuta flore coccineo. Tour. 334.
La Croix de Malthe.

HOSPITATUR sub dio. Caulis hirsutus bipedalis vel sesquipedalis. Folia ovato-lanceolata.

2. LYCHN. petalis quadrisfidis, fructu subrotundo. Linn. *Flos cuculi.*
sp. 436. Sauv. 146.
Caryophyllus pratensis, flore laciniato simplici. Bot. Monf. 53.

Lychnis pratensis flore laciniato simplici. Tour. 334.

HABITAT à Gramont, la Verune. Caulis pubescens. Folia superiora lineari-lanceolata glabra. Calyx striis decem viridibus, subcampanulatus. Petali cujuslibet laciniae intermediae latiores & longiores.

3. LYCHN. floribus dioicis. Linn. sp. 437. *Dioica.*
Lychnis sylvestris alba simplex. Bot. Monf. 168. Tour. 334.

HABITAT in arvis, cum agrostemma.

CERASTIUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 448.

Char. secund. Rad. tenuis simplex. Caul. herbacea teres articulata. Fol. opposita sessilis simplex integerrima. Flor. terminalis pedunculata pedunculis unifloris, multiflorisve subdichotomis. Fulcr. nulla.

* Capsulis oblongis.

1. CERAST. erectum viloso-viscosum. Linn. sp. 437. *Viscosum.*
Sauv. 153.
Myosotis hirsuta altera viscosa. Tour. 245.
Alfene hirsuta altera viscosa. Bot. Monf. 15.

224 DECANDRIA PENTAGYNIA.

Cerastium foliis ex ovato-acuminatis, flore calyci æquale. *Sauv.* 152.

HABITAT ad agrorum margines.

Arvense. 2. CERAST. foliis lineari-lanceolatis obtusis glabris, corollis calyce majoribus. *Linn. sp.* 438.

Cerastium foliis, calycibusque hirsutis. *Sauv.* 142.

Myosotis arvensis hirsuta flore majore. *Tour.* 245.

HABITAT cum priori.

* *Capsulis subrotundis.*

Repens. 3. CERAST. foliis lanceolatis, pedunculis ramosis, capsulis subrotundis. *Linn. sp.* 439.

Cerastium caule perenni procumbente, foliis lanceolatis. *Sauv.* 142.

Myosotis incana repens. *Tour.* 245.

L'Oreille de Souris.

HOSPITATUR sub dio.

Tomentosum. 4. CERAST. foliis oblongis tomentosis, pedunculis ramosis, capsulis globosis. *Linn. sp.* 440.

Myosotis tomentosa latifolia. *Tour.* 245.

β. *Myosotis tomentosa* linariæ folio angustiore. *Tour. ibid.*

Caryophyllus holosteus tomentosus angustifolius. *Bot.*

Monf. 54.

HABITAT au Vigan, au Capouladou.

Latifolium. 5. CERAST. foliis ovatis subtomentosis, ramis unifloris, capsulis globosis. *Linn. sp.* 439.

Cerastium corolla calycem superante. *Sauv.* 152.

Myosotis alpina latifolia. *Tour.* 244.

HABITAT à Saint George, à la source du Lés.

S P E R G U L A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 447.

Char. secund. *Rad.* tenuis simplex. *caul.* herbaea ramosa. *Fol.* sessilis simplex integerrima opposita aut verticillata. *Fior.* terminalis subdichotoma. *Fulc.* nulla.

Pentandra. 1. SPERG. foliis verticillatis, floribus pentandris. *Linn. sp.* 440.

Alpine *spergulæ* facie minima, seminibus marginatis. *Tour.* 244.

Alpine *spergulæ* facie minima. *Bot. Monf.* 14.

HABITAT

DECANDRIA DECAGYNIA. 225

HABITAT à Gramont, Selleneuve, Laverune, & in ambulactis.

2. SPERG. foliis oppositis subulatis lævibus, caulibus *Nodosa* simplicibus. *Linn. sp. 440.*

Alfene nodosa Germanica. *Bauh. prodr. 118.*

HABITAT cum priori.

3. SPERG. foliis oppositis linearibus lævibus, pedunculis *Saginoides* solitariis longissimis, caule repente. *Linn. sp. 441.*

Alfene caryophylloides glabra, florum pediculis longissimis. *Seg. tom. III. Tab. IV. fig. 2.*

HABITAT au Mont Saint Loup, Rouquet, Valene, à la source du Lés.

DECAGYNIA.

PHYTOLACCA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 459:*

Char. secund. *Rad. fusiformis. Caul. herbacea* teres. *Fol. alterna petiolata simplex integerrima. Flor. racemosa oppositifolia pedunculata solitaria. Fult. nulla.*

1. PHYTOLACCA foliis integerrimis. *Linn. sp. 441. Americana.*

Phytolacca Americana majori fructu. *Tour. 299.*

Solanum Americanum. Barr. Icon. 150.

HOSPITATUR sub dio. Radix perennis : altitudinem humanam superat.



Classis XI.

DODECANDRIA
MONOGYNIA.

A S A R U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 461.

Char. secund. *Rad.* horizontalis nodosa vel nulla.
Caul. herbacea simplicissima radicata vel parasitica. *Fol.* simplex integerrima, sessilis vel petiolata, opposita vel sparsa. *Flor.* pedunculata terminalis. *Fulc.* nulla.*Europæum*. 1. ASARUM foliis reniformibus obtusis binis. Linn. sp. 442.

Asarum. Tour. 501.

L'Oreille d'homme ou Cabaret.

HOSPITATUR in frigidario. Primo vere è gemmis membranaceis atro-purpureis vel nigricantibus prodeunt folia duo sessilia. Pedunculus ex eorum medio, uniflorus, brevissimus. Absolutâ florentiâ, petioli foliorum elongantur; pedunculi recurvantur, nec longiores evadunt.

Hypocistis. 2. ASARUM foliis sessilibus imbricatis, floribus quadrifidis. Linn. sp. 442.

Hypocistis. Tour. Cor. 46. Bot. Monsf. 135.

Asarum aphyllum squamosum. Sauv. 4.

L'Hypociste.

HABITAT à Gramont, Monsferrier, Lavalette; ad basim cisti Monspelienâs & ladaniferæ, vel etiam suprâ illarum radices.

P E G A N U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 520. *Add.* folia calycis inæqualia.Char. secund. *Rad.* subsimplex fusiformis. *Caul.* striata herbacea ramosa. *Fol.* alterna sessilis simplex lineari-multifida, succulenta. *Flor.* pedunculata solitaria oppositifolia. *Fulc.* nulla.

DODECANDRIA MONOGYNIA. 227

1. PEGAN. foliis multifidis. *Linn. sp. 444. Sauv. 208. Hermala.*
Hirmala. Tour. 235.

La Rue sauvage.

HOSPITATUR sub dio. Corollæ calycibus minores.
 Pedunculi foliis subæquales. Foliola calycina linearia; tria longiora.

P O R T U L A C C A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 523.*

Char. secund. *Rad.* tenuis simplex. *Caul.* herbacea succulenta ramosa. *Fol.* alterna sessilis simplex integerrima succulenta. *Flor.* axillaris solitaria sessilis. *Fulc.* nulla.

1. PORT. foliis cuneiformibus, floribus sessilibus. *Linn. Oleracea. sp. 445. & Sauv. 168.*

Portulacca angustifolia sylvestris. Bot. Mons. 212. Tour. 236.

Le Pourpier; vernaculè las Bourtoulaigues.

HABITAT in hortis & arvis.

2. PORT. foliis subulatis alternis, axillis pilosis, floribus sessilibus. *Linn. sp. 445.*

Portulacca curassavica angusto longo, lucidoque folio, procumbens. Tour. 236.

Portulacca. flore dilutius rubente. Tour. ibid. Le Pourpier de Curaçao.

HOSPITATUR sub dio. Luxuriat in horto regio.

L Y T H R U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 463.*

Char. secund. *Rad.* ramosa perpendicularis vel horizontalis fibrosa. *Caul.* herbacea tetragona ramosa. *Fol.* sessilis simplex integerrima opposita vel alterna. *Flor.* terminalis spicata aut axillaris solitaria sessilis. *Fulc.* nulla, (in spicatis, bractæ ovatæ sparsæ.)

1. LYTH. foliis oppositis cordato-lanceolatis, floribus salicaria. spicatis dodecangris. *Linn. sp. 446.*

Salicaria vulgaris purpurea foliis oblongis. Tour. 253.

Lythmachia purpurea vulgaris spicata. Bot. Mons. 172.

La Salicaire.

HABITAT circa Molendinas. Altitudo tripedalis. Bractee calycibus longiores. Calyx striatus cylindricus, denticulis alternis minimis introflexis. Stamina 6. vel septem petalis breviora; reliqua pistillo etiam breviora intra tubum calycis recondita. Nervorum anastomoses ad foliorum margines ut in *lysimachia* vulgari.

Hyssopifolium 2. **LYTH.** foliis alternis linearibus, floribus hexandris. *Linn. sp. 447.*

Salicaria hyssopifolio latiore. Tour. 253.

Grotiola minor sive hyssopifolia. Bot. Monsf. 123.

Lythrum foliis alternis. Sauv. 53.

Polygonum aquaticum majus. Barr. Icon. 773. n^o. 1.

HABITAT in fossis udis à *Selleneuve, la Peissine, Gramont.* Caulis vix semipedalis. Folia obtusa; inferioribus saepe oppositis.

Thymifolium 3. **LYTH.** foliis alternis linearibus, floribus tetrapetalis diandris. *Linn. sp. 447.*

Gratiola minima vel hyssopifolia minor. Bot. Monsf. 123.

Salicaria minima tenuifolia. Tour. 254.

HABITAT in pratulo ad lavam, à *Gramont.* Priori humilius.

B O C C O N I A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 500. Addit corolla nulla.*

Char. secund. *Rad.* ramosa lignosa. *Caul.* fruticulosa. *Fol.* alterna petiolata simplex incisa. *Flor.* paniculato-racemosa axillaris & terminalis. *Fulc.* nulla. . . lactescentia crocea.

Frutefans. 1. **BOCCONIA.** *Linn. sp. 505. polyandria.*

La Boccon.

HOSPITATOR in hybernaculo. Sempervirens. Folia ovato-serrata subtus tomentosa.

D I G Y N I A.

A G R I M O N I A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 464.*

Char. secund. *Rad.* horizontalis ramosa. *Caul.* herbacea teres ramosa. *Fol.* alterna sessilis im-

pari & interrupte-pinnata foliolis sessilibus incis. *Flor.* terminalis racemosa. *Fulc.* stipulæ binæ foliaceæ incisæ amplexicaules semicordatæ. Hami rigidi suprà capsulas.

1. AGRIM. foliis caulinis pinnatis, fructibus hispida. *Eupatoria*, Linn. sp. 448.

Agrimonia officinalis. Tour. 301.

Eupatorium veterum seu agrimonia. Bot. Monf. 93.

2. Agrimonia foliolis basi integerrimis.

Agrimonia orientalis humilis, radice crassissima repente. Tour. cor. 21.

L'Aigremoine.

HABITAT in arvis & in fossis. 2. Foliola duplo majora. Tota planta villosior. Racemus compactior.

TRIGYNIA.

RESEDA.

Char. prim. Vid. Linn gen. pl. 534.

Char. secund. Rad. simplex tenuis. Caul. herba-cea ramosa teres. Fol. sessilis alterna simplex integerrima aut integra aut incisa, nunc impari-pinnata; vel utraque simul. Flor. terminalis racemosa. Fulc. bractea solitaria linearis ad basim floris singuli.

1. RESEDA foliis lanceolatis integris, calycibus quadrididis. Linn. sp. 448.

Luteola herba salicis folio. Bot. Monf. 168. Tour. 423.

La Gaude ou herbe jaune.

HABITAT in arvis au-delà du Pont de Castelnaud.

2. RESEDA foliis lanceolatis integris, fructibus stellatis. *Sesamoides*, Linn. sp. 449.

Reseda linariæ folio. Bauh. prod. 42. Sauv. 48.

Sesamoides fructu stellato. Tour. 424.

HABITAT à Lesperou; au Mont Saint Loup, in humidis rupium fissuris. Flores subsessiles. Cauliculi palmares.

3. RESEDA foliis pinnatis, floribus tetragynis. Linn. Albo sp. 449.

Reseda foliis calcitrapæ, flore albo. Bot. Monf. 221.

Tour. 423.

P iiij

230 DODECANDRIA TRIGYNIA.

- HABITAT juxta amnem à Lamousson & à la Mer.
- Lutea.* 4. RESEDA foliis omnibus trifidis, inferioribus pinnatis. *Linn. sp.* 449.
 Reseda vulgaris. *Bot. Monf.* 221. *Tour.* 423.
 Reseda foliis trifidis infimis laciniatis. *Sauv.* 194.
 HABITAT in arvis, à Bouronnet, Montferrier.
- Phytanma.* 5. RESEDA foliis integris, trilobisque, calycibus maximis. *Linn. sp.* 449.
 Reseda foliis integris trilobisque, calycibus maximis hexaphyllis. *Sauv.* 194.
 Reseda minor vulgaris. *Tour.* 423.
 Resedæ affinis phytanma. *Bot. Monf.* 221.
 HABITAT cum priori & in hortis. Laciniae petalorum intermediæ breviores.
- Oleracea.* 6. RESEDA foliis integris, trilobisque, calycibus florem æquantibus. *Linn. Syst. nat.* 2. p. 1046.
 Reseda foliis aliis integris, aliis trilobis, calycibus exiguis. *Sauv.* 194.
 HOSPIRATUR sub dio. Ægyptiaca. Sempervirens & semperflorens. Petalorum laciniae laterales intermediis breviores.

EUPHORBIA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 517.

Char. sec. *Rad.* fibrosa vel funiculiformis vel simplex tenuis. *Caul.* herbacea ramosa vel fruticosa articulata succulenta, nuda vel foliosa, teres vel angulata. *Fol.* vel nulla, vel simplex integra aut integerrima, sparsa vel opposita, sessilis aut petiolata. *Flor.* terminalis umbellata dichotoma, trichotoma, &c. vel axillaris solitaria pedunculata. *Falt.* vel nulla, vel aculei supra angulos caulis, geminati (in una specie) supra capsulas. Lactescentia (in omnibus speciebus) alba.

* *Fruticosa aculeata.*

- Canariensis.* 1. EUPH. aculeata nuda subquingularis, aculeis geminatis. *Linn. sp.* 450.
 HOSPIRATUR sub dio & in caldario.
- Officinarum.* 2. EUPH. aculeata nuda multangularis, aculei geminatis. *Linn. sp.* 451.

L'Euphorbe.

HOSPITATUR in hybernaculo.

3. EUPH. aculeata semi-nuda, angulis oblique tubercu- *Neriifolia.*
latis. *Linn. sp. 451.*

Tithymaloides frutescens, foliis nerii. *Tour. 654.*

HOSPITATUR in caldario.

* *Fruticosa inermes.*

4. EUPH. inermis nuda fruticosa filiformis (funiformis) *Viminalis.*
volubilis, cicatricibus oppositis. *Linn. sp. 452.*
Sauv. 6.

HOSPITATUR in caldario.

5. EUPH. inermis semi-nuda fruticosa filiformis flac- *Mauritanica.*
cida, foliis alternis. *Linn. sp. 452. Sauv. 6.*

HOSPITATUR in caldario.

6. EUPH. inermis subnuda fruticosa filiformis (funiformis) erecta, ramis patulis determinatè confertis. *Tirucalli.*
Linn. sp. 452. Sauv. 6.

La Discipline.

HOSPITATUR cum prioribus.

7. EUPH. inermis imbricata tuberculis foliolo lineari *Cyper*
instructis. *Linn. sp. 452. Medusae.*

La Tête de Meduse.

HOSPITATUR cum congeneribus.

* *Dichotomæ, umbella bifida aut nulla.*

8. EUPH. dichotoma, foliis serratis oblongis pilosis, *Maculata.*
floribus axillaribus solitariis, ramis patulis. *Linn.*
sp. 455.

HOSPITATUR sub dio.

9. EUPH. dichotoma, foliis crenulatis subrotundis, *Chamaesyce.*
floribus solitariis axillaribus, caulibus procumben-
tibus. *Linn. sp. 455.*

Tithymalus exiguus glaber nummulariæ folio. *Tour. 87.*

Chamaesyce. *Bot. Monsf. 62.*

HABITAT in arvis & hortis.

10. EUPH. dichotoma, foliis integerrimis semi-corda- *Peplis.*
tis, floribus solitariis axillaribus, caulibus procum-
bentibus. *Linn. sp. 455.*

Peplus minor. *Bot. Monsf. 200.*

Peplus maritima folio rubro & albo. *Bot. Monsf. 200.*

Tithymalus maritimus folio obtuso aurito, rubro & viridi. *Tour.* 87.

HABITAT ad mare & stagna.

* *Umbella trifida.*

Peplus. 11. **EUPH.** umbella trifida, dichotoma, involucellis ovatis, foliis integerrimis obovatis petiolatis. *Linn. sp.* 456.

Tithymalus foliis subrotundis non crenatis. *Tour.* 87.

Peplus sive *esula* rotunda. *Bot. Monf.* 200.

HABITAT in arvis.

Exigua. 12. **EUPH.** umbella trifida, dichotoma, involucellis lanceolatis, foliis linearibus. *Linn. sp.* 456.

Acuta. *Tithymalus* seu *esula* exigua. *Bot. Monf.* 306. *Tour.* 86.

Retusa. 13. *Tithymalus* exiguus saxatilis. *Bot. Monf.* 259. tab. 258. *Tour.* 86.

Tithymalus inermis foliis ad caulem linearibus, ad umbellas ternis, quinis, &c. *Sauv.* 47.

HABITAT in sterilibus; à *Boutonet*, *Montferrier*, *Cunelles*, *la Valette*.

* *Umbella quadrifida.*

Lathyrus. 13. **EUPH.** umbella quadrifida, dichotoma, foliis oppositis integerrimis. *Linn. sp.* 457.

Tithymalus cataputta dictus. *Tour.* 86.

L'Epurge; vernaculè, *la Catapuce*, ou *Lach de pute*.

HABITAT au *Vigan*. Humanam superat altitudinem. Involucra omnia cordato-ovata. Variat foliis ramorum omnium, oblongis alternis, involucellis lanceolatis.

* *Umbella quinquefida.*

Spinosa. 14. **EUPH.** umbella subquinquefida simplici, involucellis ovatis; primariis triphyllis, foliis oblongis integerrimis, caule fruticoso. *Linn. sp.* 457.

Tithymalus maritimus spinosus. *Tour.* 87.

H SPITATUR sub dio.

Dulcis. 15. **EUPH.** umbella quinquefida; bifida, involucellis subovatis, foliis lanceolatis obtusis integerrimis. *Linn. sp.* 457.

Tithymalus montanus non acris. *Bot. Monf.* 306. *Tour.* 86.

DODECANDRIA TRIGYNIA. 233

Tithymalus dulcis tuberosa radice. *Barr. Icon.* 909.

HABITAT au Capouladon ; à St. Guillin le Désert. Radix nodosa.

16. EUPH. umbella quinquefida ; bifida , involucellis ovatis mucronatis , foliis lanceolatis. *Linn. sp.* 458. *Tithymalus* foliis brevibus aculeatis. *Seg. Tom. I.* p. 154.

HOSPITATUR sub dio.

17. EUPH. umbella subquinquefida ; bifida , involucellis cordato-reniformibus , foliis sursum imbricatis. *Linn. sp.* 458. *Tithymalus maritimus.* *Bot. Mons.* 255. *Tour.* 87. *Barr. Ic.* 886.

HABITAT ad mare & stagna.

18. EUPH. umbella quinquefida ; dichotoma , involucellis cordatis acutis , foliis lineari-lanceolatis , ramis floriferis. *Linn. sp.* 458. *Tithymalus amygdaloides angustifolius.* *Bot. Mons.* 256. *Tour.* 86.

Tithymalus lini folio acuto. *Bot. Mons. Tour.* 86.

HABITAT in segetibus , ad mare.

19. EUPH. umbella quinquefida ; trifida ; dichotoma , involucellis obovatis , foliis cuneiformibus serratis. *Linn. sp.* 459. *Tithymalus helioscopius.* *Bot. Mons.* 256. *Tour.* 87. *Barr. Ic.* 212.

HABITAT à Castelnau , Lattes , Selleneuve.

20. EUPH. umbella quinquefida ; trifida , dichotoma , involucellis diphyllis reniformibus , foliis amplexicaulibus cordatis serratis. *Linn. sp.* 459. *Tithymalus characias folio serrato.* *Bot. Mons.* 254. *Tour.* 87.

HABITAT cum priori.

21. EUPH. umbella quinquefida ; trifida ; dichotoma , involucellis subovatis , foliis lanceolatis serratis , capsulis verrucosis. *Linn.* 459. *Tithymalus myrsinites* , fructu verrucæ simili. *Bot. Mons.* 255. *Tour.* 86.

HABITAT à la Peissine , la Verune.

22. EUPH. umbella quinquefida , subquadrifida ; dichotoma , involucellis primariis tetraphyllis , foliis lanceolatis serratis sessilibus. *Linn. sp.* 460.

234 DODECANDRIA TRIGYNIA.

Tithymalus arvensis latifolius Germanicus. Bot. Monsf.
256. *Tour.* 86.

HABITAT in maritimis.

- Pilosus.* 23. EUPH. umbella quinquefida; trifida; bifida, involu-
lucris ovatis, petalis integris, foliis lanceolatis
subpilosis ap. ce ferrularis. *Linn. sp.* 460.

Tithymalus incanus hirsutus. Tour. 86.

Tithymalus characias pratensis incanus. Bot. Monsf.
255.

HABITAT à gauche du pont de Salason, à Lattes, à la
source du Lés.

* *Umbellâ multifidâ.*

- Esula.* 24. EUPH. umbella multifida; dichotoma, involucellis
subcordatis, petalis subbicornibus, ramis sterili-
bus, foliis uniformibus. *Linn. sp.* 461.

Tithymalus foliis pini forte Dioscoridis. Bot. Monsf.
256. *Tour.* 86. *B. Pin.* 192.

HABITAT à Montferrier.

- Cyparissias.* 25. EUPH. umbella multifida; dichotoma, involucellis
subcordatis, ramis sterilibus, foliis setaceis, cau-
linis lanceolatis. *Linn. sp.* 461.

Tithymalus cyparissias. Bot. Monsf. 256. *Tour.* 86.

HABITAT cum prioribus.

- Myrsinites.* 26. EUPH. umbella suboctofida; bifida, involucellis
subovatis, foliis spathulatis patentibus carnosus
mucronatis margine scabris. *Linn. sp.* 461.

Tithymalus myrsinites latifolius. Tour. 86. *Barr. Ic.*
1200.

HABITAT à Mauguio, Lattes, Villeneuve.

- Amygdaloides.* 27. EUPH. umbella multifida; dichotoma, involucellis
petiolatis orbiculatis, foliis obtusis. *Linn. sp.* 463.

Tithymalus characias amygdaloides. Bot. Monsf. 254.

HABITAT cum priori, & à Sellenueve; ad lœvram
secus amnem.

- Sylvatica.* 28. EUPH. umbella multifida; dichotoma, involucellis
perfoliatis subcordatis, foliis lanceolatis integerri-
mis. *Linn. sp.* 463.

Tithymalus sylvaticus lunato flore. Tour. 85.

HABITAT à St. George, Courpouiran, Cannelles, Ville-
neuve.

- Characias.* 29. EUPH. umbella multifida; bifida, involucellis per-

DODECANDRIA DODECAGYNIA. 231

foliatis emarginatis, foliis integerrimis, caule frutescente. *Linn. sp.* 463.

Tithymalus characias rubens peregrinus. Bot. Monf. 254. *Tour.* 85.

HABITAT ad lævam à Sembrés, Salafon, & à la mer.

DODECAGYNIA.

SEMPERVIVUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 465.

Char. secund. Rad. rapacea vel ramosa. Caul. herbacea vel fruticosa. Fol. sessilis simplex integerrima conferta (sæpiùs radicata) succulenta. Flor. terminalis subcorymbosa. Fulcr. nulla.

1. SEMPERV. caule arborecente lævi ramoso. *Linn. sp.* *Arboreum.* 464.

Sedum majus arborecens, flosculis candidis, Tour. 262. *La Joubarbe en arbre.*

HOSPITATUR in hybernaculo.

2. SEMPERV. foliis ciliatis, propaginibus patentibus. *Tellorum.* *Linn. sp.* 464.

Sedum majus vulgare. Tour. 262.

La Joubarbe ; vernaculè, las Carbofes, l'Herbe des agaciffes.

HOSPITATUR sub dio. Folia lingulata acuminata.

3. SEMPERV. foliis pilis intertextis, propaginibus globosis. *Linn. sp.* 465. *Arachnoidum.*

Sedum montanum tomentosum. Tour. 262. *Barr. Ic.* 391. n^o. 1. 393.

HOSPITATUR sub dio. Folia oblonga, latere altero plano, altero convexo. Caulis vix biuncialis. Radix crassa napiformis.



Classis XII.

ICOSANDRIA

MONOGYNIA.

C A C T U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 466.

Char. secund. Rad. funiculiformis. Caul. succulenta articulato-prolifer, nunc angulata vel compressa, nunc repens vel erecta, nunc radicans. Fol. nulla. Flor. solitaria sessilis supra angulos caulis vel ad margines articulorum. Fulc. tubercula ad margines & supra angulos articulorum. Spinæ supra tubercula & fructum. Lactescencia in paucis.

* Echino-melocacti subrotundi.

Mammil-
laris.

1. CACTUS subrotundus rectus tuberculis ovatis barbatis. Linn. sp. pag. 466.

Melocactus Americanus, ex plurimis globulis opuntiarum modo nescientibus, conflatus. Tour. 653.

Le Melon épineux.

HOSPITATUR sub dio. Hyeme in caldario. Lactescens.

* Cerei erecti stantes per se.

- Peruvians. 2. CACTUS erectus longus suboctangularis; angulis obtusis. Linn. sp. pag. 467.

Cactus novemangularis longus erectus. Sauv. 5.

Le Cierge du Pérou.

HOSPITATUR sub dio. Florens quolibet anno absque fructu.

* Cerei repentes radiculis lateralibus.

- Grandiflorus. 3. CACTUS repens subquingularis. Linn. sp. 467.

Cactus scandens angulis quinque vel pluribus obtusis.

Sauv. 5.

Le Cierge rampant.

HOSPITATUR sub dio & in caldario.

4. CACTUS repens decemangularis. *Linn. sp. 467.* *Decem-ang-*
Autre Cierge rampant. *laris.*

HOSPITATUR cum priori.

5. CACTUS repens triangularis. *Linn. sp. 468.* *Triangularis.*
 Cactus scandens triangularis articulatus. *Sauv. 5.*
Le Cierge grimant.

HOSPITATUR in caldario cujus parietes scandit.

* *Opuntia compressæ articulis proliferis.*

6. CACTUS articulato-prolifer laxus, articulis ovatis, *Opuntia.*
 spinis setaceis. *Linn. sp. 468.*

Opuntia vulgo herbariorum. Tour. 239.

La Raquette.

HOSPITATUR sub dio. Solus inter congenes fructum maturans.

7. CACTUS articulato-prolifer, articulis ovato-oblongis; spinis setaceis. *Linn. sp. 468. Sauv. 5.* *Ficus Indica.*

Opuntia maxima folio spinoso latissimo & longissimo. Tour. 240.

Le Figuier d'Inde, ou Cardasse.

HOSPITATUR sub dio & in hybernaculo.

8. CACTUS articulato-prolifer; articulis ovato-oblongis, spinis subulatis. *Linn. sp. 468.* *Tuna.*

HOSPITATUR cum congenibus.

9. CACTUS articulato-prolifer; articulis ovato-oblongis subinermibus. *Linn. sp. 468.* *Cochenille-*
fer.

La Cochenille.

HOSPITATUR in caldario. Rarè florens.

10. CACTUS articulato-prolifer, articulis cylindricoventricosis compressis. *Linn. sp. 469.* *Citrassari-*
ens.

Cactus compressus articulatus ramosus, articulis ovatis, spinis solitariis. *Sauv. 5.*

Opuntia Americana minima spinis creberrimis tenuissimis. Tour. 240.

Le Figuier de Curaçao.

HOSPITATUR sub dio & in hybernaculo. Articuli vix unciales.

PHILADELPHUS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 479.*

Char. secund. *Rad. lignosa ramosa. Caul. fruti-*

238 ICOSANDRIA MONOGYNIA.

cosa. *Fol.* opposita petiolata simplex subintegerrima. *Flor.* terminalis pedunculata subcorymbosa. *Fulc.* nulla.

- Carmarins.* 1. PHILAD. foliis subdentatis. *Linn. sp.* 470.
Syringa alba sive philadelphus. *Tour.* 617.
Le Siringa; vernaculè *lou Siringua*.
 HOSPITATUR sub dio.

MYRTUS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 471.
Char. sec. Rad. lignosa. *Caul.* fruticosa. *Fol.* opposita subsessilis simplex integerrima. *Flor.* axillaris pedunculata solitaria. *Fulcr.* bractæ involucriformes binæ.

- Communis.* 1. MYRTUS floribus solitariis, involucro diphylo.
Linn. sp. 471.
Myrtus communis Italica. *Tour.* 640.
 2. *Myrtus Romana latifolia.* *Tour.* 640.
Le Myrte; vernaculè, *de Murtra* ou *herba daou lagui*.
 HOSPITATUR sub dio. Variat foliis ternis. Folia (in communi) perforata seu punctis pertusa, ut in hyperico.

PUNICA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 469.
Char. secund. Rad. lignosa. *Caul.* arborea. *Fol.* alterna petiolata simplex integerrima. *Flor.* sessilis terminalis subsolitaria. *Fulc.* nulla.

- Grenatum.* 1. PUNICA. *Linn. sp.* 472.
Malus punica sylvestris. *Bot. Mons.* 173. *Tour.* 636.
Le Grenadier; vernaculè *lou Mougramé*.
 HABITAT ad margines agrorum. Sepes majores constituens.

AMYGDALUS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 473.
Char. secund. Rad. lignosa. *Caul.* arborea. *Fol.* alterna simplex integra, petiolata aut sessilis. *Flor.* axillaris pedunculata conferta. *Fulcr.* stipulæ binæ deciduæ. Glandulæ supra ferraturas foliorum (in unâ specie.)

1. AMYGD. foliorum serraturis omnibus acutis. *Linn. Persica*,
sp. 472.
Persica molli carne & vulgaris. Tour. 624.
Le Pêcher; vernaculè leu Peché, las Aouberges.
 HOSPITATUR sub dio.
2. AMYGD. foliis petiolatis, serraturis infimis glandu- *Communis.*
losis. Linn. sp. 473.
Amygdalus sativa. Tour. 627.
L'Amandier; vernaculè l'Amellie.
 HABITAT in arvis & vineis. *A Castelnau, la Verune.*
3. AMYGD. foliis petiolatis basi attenuatis. *Linn. sp. 473. Nana.*
Amygdalus indica nana. Tour. 627.
L'Amandier nain.
 HOSPITATUR sub dio.

P R U N U S:

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 474.*

Char. secund. *Rad. lignosa. Caul. arborea. Fol.*
alterna petiolata simplex integra vel integer-
rima. Flor. pedunculata, solitaria aut racemo-
sa, axillaris aut ramea terminalis. Fulcr. nulla.
(in una specie) aculei sparsi; glandulæ (in
paucis) supra petiolum, aut in paginâ folio-
rum inferiori.

1. PRUNUS floribus racemosis, foliis deciduis basi sub- *Padus.*
tus biglandulosis. Linn. sp. 473.
Cerasus ramosa sylvestris, fructu non eduli. Tour. 626.
Le Bois de Ste. Lucie.
 HOSPITATUR sub dio. Folia utrinque sæpius glandu-
dulosa. Petioli glandulosi. Racemi ramei terminales.
 Fructum maturans.
2. PRUNUS floribus racemosis, foliis sempervirentibus *Lusitanica.*
è glandulosis. Linn. sp. 473.
Laurocerasus Lusitanica minor. Tour. 628.
 HOSPITATUR sub dio. Racemi axillares foliis longiores.
3. PRUNUS floribus racemosis, foliis sempervirentibus *Laurocerasus*
dorso biglandulosis. Linn. sp. 474.
Laurocerasus. Tour. 628. Barr. Icon. 873.
Le Laurier-cerise.
 HOSPITATUR sub dio. Racemi axillares foliis breviores. *Mahaleb.*
4. PRUNUS floribus corymbosis, foliis ovatis. *Linn.*
sp. 474.

Cerasus sylvestris amara. Bot. Monf. 58.

Cerasus mahaleb putata. Tour. 627.

Le Malaguel; vernaculè l'Amarel.

HABITAT au bois de Valene. Corymbi ramulos terminant.

- Armeniaca. 5. PRUNUS floribus sessilibus, foliis subcordatis. Linn. sp. 474.*

Armeniaca fructu majore. Tour. 623.

L'Abricotier; vernaculè l'Aaoubricotie.

HABITAT in hortis sub dio. Apricatur.

- Cerasus. 6. PRUNUS pedunculis simplicibus, foliis ovato-lanceolatis conduplicatis. Linn. sp. 474.*

Cerasus sativa. Tour. 625. Bot. Monf. 58. acida.

Le Cerisier; vernaculè las Cericiras, las Agriotes.

HABITAT ad lævam juxta amnem. A Castelnau, Montferrier.

- Domestica. 7. PRUNUS pedunculis simplicibus, foliis lanceolato-ovatis convolutis. Linn. sp. 475.*

Prunus domestica. Tour. 622. innumeræ varietates.

Le Prunier; vernaculè lou Prunié.

HABITAT cum priori.

- Spinosa. 8. PRUNUS spinosa, foliis lanceolatis. Linn. sp. 475.*

Prunus sylvestris. Bot. Monf. 213. Tour. 623.

Le Prunellier; vernaculè, las Agrunelas.

HABITAT ad agrorum margines. Sepes mediocres constituit.

D I G Y N I A.

C R A T Æ G U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 477.

Char. sec. Rad. lignosa. Caul. arborea. Fol. alternata petiolata simplex integra aut incisa. Flor. corymbosa ræmea axillaris & terminalis. Fulcr. stipulæ binæ deciduæ. Spinæ sparsæ.

- Aria. 1. CRATÆGUS foliis ovatis inæqualiter serratis subtus tomentosis. Linn. sp. 475.*

Cratægus folio subrotundo serrato subtus incano. Tour. 633.

Le Drouillier, Drullier.

HABITAT

HABITAT à Alais, Fongeres.

2. CRATÆGUS foliis cordatis septangulis, lobis infimis divaricatis. *Linn. sp. 476. Terminalis.*

Cratægus folio laciniato. *Tour. 633.*

Mespilus apii folio sylvestris, non spinosa, sive forbus terminalis. *Bot. Mons. 176.*

HABITAT à Valene, Viols.

3. CRATÆGUS foliis obtusis bitrifidis serratis. *Linn. Oxyacantha. sp. 477.*

Mespilus apii folio sylvestris spinosa seu oxyacantha.

Bot. Mons. 177. & Tour. 642.

L'Aubepin; vernaculè las Poumetas.

HABITAT ad margines agrorum. Sæpius datur floribus monogynis.

4. CRATÆGUS foliis obtusis bitrifidis subdentatis. *Azorelus. Linn. sp. 477.*

Mespilus apii folio laciniato. *Bot. Mons. 176. Tour. 641.*

L'Azorelier; vernaculè, las Poumetas de doux cloffés.

HABITAT in arvis & vineis. A Castelnau, Montferrier.

TRIGYNIA.

SORBUS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 478.*

Char. secund. Rad. lignosa. Caul. arborea. Fol. alterna impari-pinnata, foliolis oppositis sessilibus integris. Flor. ramea terminalis subcorymbosa. *Falc. nulla.*

1. SORBUS foliis utrinque glabris. *Linn. sp. 477. Aucuparia.*

Sorbus aucuparia. *Tour. 634.*

Le Sorbier sauvage.

HABITAT à Valene, Lesperou.

2. SORBUS foliis subtus tomentosis. *Linn. sp. 477. Domestica.*

Sorbus fativa. *Bot. Mons. 245. Tour. 633.*

Le Cormier ou Sorbier; vernaculè lou Sourbié.

HABITAT cum prunis, amygdalis, punicâ. A Montferrier, Gramont, Selleneuve.

PENTAGYNIA.

MESPIUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 480.

Char. secund. Rad. lignosa. Caul. arborea. Fol. alterna petiolata simplex integra aut integerrima. Flor. axillaris vel ramea terminalis, solitaria vel corymbosa. Fuler. nulla. Aculei in paucissimis.

- Germanica*. 1. MESPIUS inermis foliis lanceolatis integerrimis subtus tomentosis, calycibus acuminatis. Linn. sp. 478.
 Mespilus Germanica folio laurino non serrato. Tour. 641.
Le Neflier; vernaculè *las Mespoules*.
 HABITAT à Valene, Lamalou.
- Pyracantha*. 2. MESPIUS spinosa, foliis lanceolato-ovatis crenatis, calycibus fructus obtusis. Linn. sp. 478.
 Mespilus aculeata amygdali folio. Tour. 642.
 Pyracantha sempervirens. Barr. Icon. 874.
Le Buïsson ardent.
 HOSPITATUR sub dio.
- Amelanchier*. 3. MESPIUS inermis, foliis ovalibus serratis, cauliculis hirsutis. Linn. sp. 478.
 Mespilus folio rotundifolii, fructu nigro subdulci. Tour. 642.
 Alni effigie lanato folio minor. Bot. Mons. 12.
L'Amelanchier.
 HABITAT Monspelii, à Valene, St. Guillin le Désert.
- Cornusifer*. 4. MESPIUS foliis ovatis integerrimis. Linn. sp. 479.
 Mespilus folio si brotundo, fructu rubro. Tour. 633.
 HOSPITATUR sub dio.

PYRUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 481.

Char. secund. Rad. lignosa. Caul. arborea. Fol. alterna petiolata simplex integra. Flor. terminalis cymosa vel umbellata vel solitaria. Fuler. nulla.

- Communis*. 1. PYRUS foliis serratis, pomis basi productis. Linn. sp. 479.
 Pyrus foliis serratis, floribus corymbosis. Linn. Syst. nat. rom. II. p. 1058.

ICOSANDRIA PENTAGYNIA. 243

Pyrus sylvestris. Bot. Monf. 215. Tour. 632. & varietates.

Le Poirier; vernaculè *lou Poiré*, *las Peruffes*.

HABITAT à *Caunelles*, *la Verune*.

2. PYRUS foliis serratis, pomis basi concavis. Linn. sp. Malus. 479.

Pyrus foliis serratis, umbellis sessilibus. Linn. Syst. pag. 1058.

Malus sylvestris. Tour. 634. & varietates.

Le Pommier; vernaculè *lou Pommé*.

HABITAT à *Fougeres*, *Lamatou*, *la Salle*.

3. PYRUS foliis integerrimis, floribus solitariis. Syst. Cydonia. nat. p. 1058.

Cydonia vulgaris. Tour. 632.

Malus cotonea sylvestris. Bot. Monf. 173.

Le Coignassier; vernaculè *lou Condoulié*.

HABITAT ad margines agrorum. Sepes majores constituens.

MESEMBRYANTHEMUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 540.

Char. secund. Rad. funiculiformis. Caul. herbacea succulenta, teres vel angulata. Fol. simplex sessilis subconnata succulenta, teres vel angulata, alterna vel opposita. Flor. solitaria pedunculata terminalis. Fuler. glandulæ epiphyllæ sparsæ (in plurimis.)

* *Albis corollis.*

1. MESEMBR. foliis alternis ovatis obtusis undulatis. *Crysalinum* Linn. sp. 480.

Mesembryanthemum foliis alternis papillofis undulatis. Linn. Syst. 1059.

La Glaciale.

HOSPITATUR sub dio. Variat foliis oppositis. Annuum.

* *Rubicundis corollis.*

2. MESEMBR. acaule, foliis triquetris linearibus apice *Bellidiflorum* trifariam dentatis. Linn. sp. pag. 482.

Mesembryanthemum acaule, foliis triquetris impunctatis, &c. Linn. Syst. 1059. Acaule.

HOSPITATUR sub dio. Variat flore albo. Floret autumnno. Pedunculi unciales.

- Deltoidium*. 3. MESEMBR. caulescens, foliis deltoidibus triquetris dentatis impunctatis distinctis. *Linn. Syst.* 1059.
Mesembryanthemum caulescens foliis deltoidibus triquetris dentatis. *Linn. sp.* 480.
 HOSPITATUR in caldario.
- Barbatum*. 4. MESEMBR. foliis triquetro-ovatis papulosis distinctis apice barbatis. *Linn. Syst.* 1059.
Mesembryanthemum foliis apice barbatis. *Linn. sp.* 480.
 HOSPITATUR in caldario.
- Acinaciforme* 5. MESEMBR. foliis acinaciformibus impunctatis connatis, angulo carinali crenulatis, petalis lanceolatis. *Linn. Syst.* 1060.
Mesembryanthemum foliis acinaciformibus connatis, angulo carinali scabris, ramis angulatis. *Linn. sp.* 485.
 HOSPITATUR in caldario.
- Craessolium*. 6. MESEMBR. foliis semicylindræis impunctatis connatis apice triquetris, caule repente semicylindrico. *Linn. Syst.* 1060.
Mesembryanthemum caule repente semicylindrico, foliis laevibus semicylindræis connatis apice triquetris. *Linn. sp.* 484.
 HOSPITATUR cum prioribus.
- Scabrum*. 7. MESEMBR. foliis subulatis distinctis, subtus undique punctato-muricatis. *Linn. Syst.* 1060.
Mesembryanthemum foliis subulatis, subtus undique scabris. *Linn. sp.* 481.
 HOSPITATUR in caldario.

* *Lutis corollis.*

- Glaucum*. 8. MESEMBR. foliis triquetris acutis punctatis distinctis, foliolis calycinis ovato-cordatis. *Linn. Syst.* 1060.
Mesembryanthemum foliis subulatis triquetris strictis acutis, punctis pellucidis obsoletis sparsis. *Linn. sp.* 486.
 HOSPITATUR in caldario.
- Dolabriforme* 9. MESEMBR. foliis dolabriformibus punctatis. *Linn. Syst.* 1061.
Mesembryanthemum foliis dolabriformibus. *Linn. sp.* 487.
 HOSPITATUR cum congeneribus.

S P I R Æ A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 482.

Char. secund. *Rad.* fusiformis vel tuberosa fasciculata. *Caul.* herbacea teres ramosa. *Fol.* alterna interruptè & impari-pinnata foliolis sessilibus simplicibus integris. *Flor.* terminalis cymosa. *Fulcr.* stipulæ adnatæ geminæ.

1. SPIRÆA foliis pinnatis, foliolis uniformibus serratis, floribus cymosis, caule herbaceo. *Linn. sp.* 490. *Filipendula*.

Filipendula vulgaris. Tour. 293. Bot. Monf. 97.

La Filipendule.

HABITAT à Lesperon, au Capouladou.

2. SPIRÆA foliis pinnatis: impari majore lobato, floribus cymosis. *Linn. sp.* 490. *Ulmaria*.

Ulmaria Clusii. Tour. 265.

La Reine des prés.

HABITAT à Lesperou.

P O L Y G Y N I A.

R O S A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 484.

Char. secund. *Rad.* lignosa. *Caul.* fruticulosa. *Fol.* alterna impari-pinnata, foliolis simplicibus integris sessilibus. *Flor.* pedunculata axillaris & terminalis. *Fulcr.* aculei supra caulem petiolos pedunculosque stipulæ binæ adnatæ.

* *Germinibus subglobosis.*

1. ROSA aculeata, foliis odoratis subtus rubiginosis. *Eglanteria. Linn. sp.* 491.

Rosa germinibus globosis pedunculisque glabris, caule aculeis sparsis rectis, petiolis scabris, foliolis acutis. *Linn. Syst.* 1062.

Rosa sylvestris foliis odoratis. *Bot. Monf. 223. Tour. 638.*

L'Eglantier.

HABITAT à Mauquo, Villeneuve, Laverune.

2. ROSA germinibus globosis aculeatis, pedunculis hispids, caule aculeis sparsis, petiolis aculeatis. *Villosa.*

Q iij

246 ICOSANDRIA POLYGYNIA.

foliis tomentosis. *Linn. Syst.* 1068.

Rosa foliis utrinque villosis, fructu spinoso. *Linn. sp.* 491.

Rosa pomo spinoso folio hirsuto. *Bot. Mons.* 223.

Rosa sylvestris pomifera major. *Tour.* 638.

HABITAT à Selleneuve, Caunelles.

* *Germinibus ovatis.*

Canina. 3. ROSA germinibus ovatis pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis. *Linn. Syst.* 1062.

Rosa caule aculeato, petiolis inermibus, calycibus semipinnatis. *Linn. sp.* 491.

Rosa sylvestris vulgaris flore odorato incarnato. *Bot. Mons.* 222. *Tour.* 638.

Le Chinorodon; vernaculè *lou Tapacnou*.

HABITAT ad margines sepium.

Spinosissima. 4. ROSA germinibus ovatis glabris, pedunculis caule petiolisque aculeatissimis. *Linn. Syst.* 1062.

Rosa caule petiolisque aculeatis, calycis foliolis indivisis. *Linn. sp.* 491.

Rosa spinosissima pumila flore rubro. *Bot. Mons.* 223. *Tour.* 638.

HABITAT cum priori.

Centifolia. 5. ROSA caule aculeato, pedunculis hispidis, calycibus semipinnatis glabris. *Linn. sp.* 491.

Rosa germinibus ovatis pedunculisque hispidis, caule hispido aculeato, petiolis inermibus. *Linn. Syst.* 1062.

Rosa rubra milesia. *Bot. Mons.* 222.

Rosa rubra simplex & multiplex. *Tour.* 637.

HABITAT à Villeneuve, Mauguio.

R U B U S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 485.

Char. secund. Rad. lignosa reptans. Caul. fruticulosa. Fol. alterna petiolata ternata aut quinata foliolis simplicibus integris. Flor. terminalis subracemosa. Fulc. aculei supra caulem petiolo pedunculoque; stipulæ in paucis speciebus.

* *Frutescentes.*

Idem. 1. RUBUS foliis quinato-pinnatis, ternatisque, caule

aculeato, petiolis canaliculatis. *Linn. sp.* 492.

Rubus idæus spinosus. Tour. 614.

Rubus foliis ternatis ac quinatis, costa plerumque inermi, fructu rubro villosa. Sauv. 178.

Le Framboisier; vernaculè lou Framboisè.

HOSPITATUR sub dio. Aculei patentes folia subtus tomentosa.

2. RUBUS foliis ternatis nudis, caule aculeato tereti. *Cassus. Linn. sp.* 493.

Rubus repens fructu cæcio. Bot. Monf. 226. *Tour.* 614.

Le Ronce rampant.

HABITAT à la Colombière. Aculei recurvi.

3. RUBUS foliis quinato-digitatis, ternatisque, caule, *Eruticosus.* petiolisque aculeatis. *Linn. sp.* 493.

Rubus vulgaris seu fructu nigro. Bot. Monf. 226. *Tour.* 614.

Le Ronce; vernaculè lou Ronce, ou las amoures de Bartas.

HABITAT ad margines agrorum. Sepes majores constituit.

* *Herbacei.*

4. RUBUS foliis ternatis nudis, flagellis reptantibus *Saxatilis.* herbaceis. *Linn. sp.* 494.

Rubus saxatilis alpinus. Bot. Monf. 304. *Tour.* 615.

Rubus caule repente annuo, foliis ternatis. Sauv. 178.

HABITAT à Valmagne, à Saint Guillin le Désert, au Capouladou. Variat foliis simplicibus; inferioribus trilobis.

FRAGARIA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 486.

Char. secund. Rad. horizontalis stolonifera funiculiformis. Caul. scaposa multiflora. Fol. radicalis petiolata ternata: foliolis sessilibus integris. Flor. radicalis pedunculata. Fulc. bractea ad basin singuli pedicelli.

1. FRAGARIA flagellis reptans. *Linn. sp.* 494. *Vesca.*

Fragaria vulgaris. Bot. Monf. 99. *Tour.* 695.

Le Fraisier; vernaculè lou Frésé.

HABITAT ad agrorum margines; à la Colombière.

2. FRAG. caule decumbente repente. *Linn. sp.* 495. *Sterilis.*

Q iiij

248 ICOSANDRIA POLYGYNIA.

Fragaria sterilis. Tour 296.

Fragaria sterilis. Lob. Icon. 698.

HABITAT cum priori. *A Montferrier, à la source du Lés.*

POTENTILLA

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 487.

Char. secund. Rad. ramosa subhorizontalis. Caul. herbacea teres repens vel erecta. Fol. alterna petiolata æqualiter vel interrupte-pinnata, vel digitata; foliolis simplicibus integris. Flor. pedunculata, pedunculis axillaribus, terminalibusque unifloris, multiflorisve. Fulc. stipulæ adnatæ integræ.

- Anserina.* 1. POTENT. foliis pinnatis serratis, caule repente. Linn. sp. 495.
Pentaphylloides argenteum alatum seu potentilla. Tour. 298.
L'Argente.
HABITAT à Lesperou, au pont du Saint-Espirit.
- Multifida.* 2. POTENT. foliis bipinnatis: segmentis integerrimis distantibus subtus tomentosis, caule decumbente. Linn. sp. 496.
HOSPITATUR sub dio. Altitudo pedalis. Cauliculi simplices.
- Rupescres.* 3. POTENT. foliis pinnatis alternis: foliolis quinis ovatis crenatis, caule erecto. Linn. sp. 496.
Pentaphylloides erectum. Tour. 298.
Potentilla foliis quinatis pinnatis, foliolis ovatis crenatis. Sauv. 224.
HABITAT à Saint Guillin le Désert, à Lesperou.

* Foliis quinatis.

- Rolla.* 4. POTENT. foliis digitatis lanceolatis serratis utrinque subpinnatis, caule erecto. Linn. sp. 497.
Quinquefolium rectum luteum. Tour. 297.
Potentilla foliis digitatis inciso-serratis, caule erecto. Sauv. 179.
HABITAT à l'Allemagne.
- Argenson.* 5. POTENT. foliis quinatis cuneiformibus incisissubtus tomentosis, caule erecto. Linn. sp. 497.
Quinquefolium rectum foliis profunde dissectis subtus argenteis. Bot. Monsf. 216.

Quinquefolium folio argenteo. *Tour.* 297.

HABITAT à *Lesperou*, *Villemagne*, in humidis.

6. POTENT. foliis septenis, quinisque cuneiformibus incis. pilosis, caule ascendente. *Linn. sp.* 497. *Hirta.*

Quinquefolium rectum montanum luteum. *Bot. Monf.* 216. *Tour.* 297.

Potentilla foliis quinatis obtusè in apice serratis petalis cordatis. *Sauv.* 179.

HABITAT à *Cannelles*, *Lamousson*.

7. POTENT. foliis digitatis apice conniventi-serratis, *Alba.* caulibus filiformibus procumbentibus, receptaculis hirsutis. *Linn. sp.* 498.

Quinquefolium minus album alterum. *Tour.* 297.

HABITAT au *Mont Saint Loup*, à *Lesperou*.

8. POTENT. foliis digitatis, caule repente, pedunculis unis. *Reptans.* *Linn. sp.* 499.

Quinquefolium majus repens luteum. *Bot. Monf.* 215. *Tour.* 297.

La Quintefeuille.

HABITAT in fossis udis. *Aux prés d'Arene*, *Giamont*, *la Peissine*.

T O R M E N T I L L A.

Char. prim. *Vid. Linn. gen. pl.* 488.

Char. secund. *Rad.* nodosa reptans. *Caul.* herbacea teres ramosa. *Fol.* alterna petiolata ternata: foliolis sessilibus simplicibus integris. *Flor.* solitaria oppositifolia pedunculata. *Fulc.* stipulæ liberæ foliola mentientes.

1. TORMENTILLA caule erecto. *Linn. sp.* 500. *Erecta.*

Tormentilla sylvestris. Tour. 293.

La Tormentille.

HABITAT in humidis, à *Lesperou*.

G E U M.

Char. prim. *Vid. Linn. gen. pl.* 490.

Char. secund. *Rad.* fibrosa. *Caul.* herbacea teres ramosa. *Fol.* inferior lyrato-pinnata, superior digitato-pinnata; foliolis simplicibus. *Flor.* pedunculata axillaris & terminalis solitaria. *Fulc.* stipulæ liberæ integræ.

250 ICOSANDRIA POLYGYNIA.

- Urbanum.* 1. GEUM floribus erectis, fructu globoso : aristis uncinatis nudis, foliis lyratis. *Linn. sp. 501.*
Caryophyllata vulgaris. Bot. Mons. 52. Tour. 294.
La Benoitte.
 HABITAT in umbrosis; à la Colombiere, Lavalette, Gramont.
- Rivale.* 2. GEUM floribus nutantibus, fructu oblongo : aristis plumosis. *Linn. sp. 501.*
Caryophyllata aquatica, nutante flore. Tour. 295.
La Benoitte aquatique.
 HABITAT à Villemagne, Lamalou. Vix sesquipalmare.
- Montanum.* 3. GEUM flore erecto solitario, fructu oblongo : aristis plumosis. *Linn. sp. 501.*
Caryophyllata alpina lutea. Bot. Mons. 52. Tour. 295.
 HABITAT à Valmagne ad lævam, & à la Serane.



Classis XIII.

POLYANDRIA
MONOGYNIA.

CAPPARIS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 505.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. fruticulosa. Fol. alterna petiolata simplex integerrima. Flor. pedunculata axillaris solitaria. Fulcr. aculei ad latera petiolorum.

1. CAPPARIS aculeata. Linn. sp. 503.

Spinosa.

Capparis spinosa folio acuto, fructu minore. Bot.

Monf. 48. Tour. 261. & folio obtuso, ibid.

Le Caprier; vernaculè las Taperes.

HABITAT in hortis.

ACTÆA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 499.

Char. secund. Rad. nodosa. Caul. herbacea teres ramosa. Fol. alterna bipinnata: foliolis integris quinis, inferioribus petiolatis, superioribus sessilibus. Flor. terminalis racemosa. Fulcr. nulla.

1. ACTÆA racemo ovato, fructibus baccatis. Linn. 504. Spinosa.

Christophoriana vulgaris. Tour. 299. & Americana.

Ibid.

L'Herbe de Saint Christophe.

HABITAT à Lesperou.

CHELIDONIUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 496.

Char. secund. Rad. fusiformis. Caul. herbacea teres ramosa. Fol. alterna sessilis simplex integra vel pinnatifido-pinnata. Flor. pedunculata axillaris solitaria vel umbellata. Fulcr. nulla. In paucis bractea foliacea in medio pedunculo-
rum, . . . lactescentia crocea.

252 POLYANDRIA MONOGYNIA.

- Majus.* 1. CHELIDON. pedunculis umbellatis. *Linn. sp. 505.*
Chelidonium majus vulgare. Bot. Monsf. 62. Tour. 231.
La Chélidoine, ou éclairre.
 HABITAT in arvis & viis.
- Glaucium.* 2. CHELIDON. pedunculis unifloris, foliis amplexicaulibus sinuatis, caule glabro. *Linn. sp. 506.*
Papaver corniculatum luteum. Bot. Monsf. 198.
Glaucium flore luteo. Tour. 254.
Le Pavot cornu.
 HABITAT au pont de la Peyrade à Cette.
- Corniculatum.* 3. CHELIDON. pedunculis unifloris, foliis sessilibus pinnatifidis, caule hispido. *Linn. sp. 506.*
Papaver corniculatum phœniceum hirsutum. Bot. Monsf. 198. B. Pin. 171.
Glaucium hirsutum flore phœniceo. Tour. 254.
Le Pavot cornu à fleur rouge.
 HABITAT à Villeneuve & à la Mer.
- Hybridum.* 4. CHELIDON. pedunculis unifloris, foliis pinnatifidis linearibus, caule lævi. *Linn. sp. 506.*
Papaver corniculatum violaceum. Bot. Monsf. 199.
Glaucium flore violaceo. Tour. 254.
Le Pavot cornu à fleur violette.
 HABITAT à Salafon vers Grémont, Mauguio, Castelnau.

P A P A V E R.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 495.*

Char. secund. *Rad. fusiformis. Caul. herbacea ramosa teres, vel scaposa. Fol. radicalis bipinnata vel caulina alterna sessilis simplex pinnatifida. Flor. pedunculata solitaria radicalis vel caulina axillaris. Falc. pili rigidi in tota planta.*

* *Capsulis hispidis.*

- Hybridum.* 1. PAPAVER capsulis subglobosis torosis hispidis, caule multifloro folioso. *Linn. sp. 506.*
Papaver erraticum capite oblongo hispido. Tour. 238.
Argemone capitulo brevior. Bot. Monsf. 26.
 HABITAT à Prades & à la source du Lés.
- Argemone.* 2. PAPAVER capsulis clavatis hispidis, caule folioso multifloro. *Linn. sp. 506.*
Argemone capitulo longior. Bot. Monsf. 26.

POLYANDRIA MONOGYNIA. 253

Papaver erraticum capitulo longiore hispido. *Tour.* 238.

HABITAT à *Bouzigues*, & cum priori.

3. PAPAVER capsula hispida, scapo unifloro nudo *Alpinum*.
hispido, foliis bipinnatis. *Linn. sp.* 507.

Papaver alpinum saxatile, coriandri folio. *Ség. ver.* 1. 416. *T. IV. fig. 4.* & *Barr. Icon.* 264.

HABITAT in declivibus circa *Villemagne & Fongeres*,
à *Lespinouse*. Vix biuncialis villosissimus.

* *Capsulis glabris.*

4. PAPAVER capsulis glabris globosis, caule piloso *Rhaas*.
multifloro, foliis pinnatifidis incis. *Linn. sp.* 507.

Papaver erraticum majus. *Bot. Mons.* 198. *Tour.* 238.
flore pleno. *ibid.*

Le Coquelicot; vernaculè *la Graonsele*.

HABITAT in segetibus.

5. PAPAVER calycibus capsulisque glabris, foliis am- *Semiferum*
plexicaulibus incis. *Linn. sp.* 508.

Papaver hortense semine nigro. *Bot. Mons.* 197.
Tour. 237. & albo. *ibid.*

Le Pavot des jardins.

HABITAT à *Lattes*, *Manguio*, & locis vicinis.

ARGEMONE.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 494.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea
teres ramosa. *Fol.* alterna simplex incisa am-
plexicaulis. *Flor.* axillaris pedunculata solitaria.
Fulc. spinulæ in tota planta.

1. ARGEM. capsulis quinquevalvibus, foliis spinosis. *Mexicana*.
Linn. sp. 508.

Argemone. *Tour.* 239.

Le Pavot épineux.

HOSPITATUR sub dio. Apricatur. Flores albi.

NYMPHÆA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 493.

Char. secund. *Rad.* horizontalis funiformis stolo-
nifera. *Caul.* scaposa uniflora. *Fol.* petiolata
radicalis simplex integerrima peltata. *Flor.* ter-
minalis solitaria. *Fulc.* nulla.

254 · POLYANDRIA MONOGYNIA.

- Lutea.* 1. *NYMPHÆA* calyce magno pentaphyllo. *Linn. sp.* 510.
Nymphaea lutea major. Bot. Monf. 38. Tour. 261.
Le Nénuphar jaune; vernaculè leu Ninfea,
HABITAT in amne.

- Alba.* 2. *NYMPHÆA* foliis cordatis integerrimis, calyce quadrifido. *Linn. sp.* 510.
Nymphaea alba minor. Bot. Monf. 188. Tour. 260.
Le Nénuphar blanc, vernaculè leu Ninfea blan.
HABITAT cum priori.

T I L I A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 508.

Char. secund. Rad. lignosa. Caul. arborea. Fol. alterna petiolata simplex integra. Flor. pedunculata, pedunculis stipularibus subquadrifloris solitariis. Fusc. stipula lanceolata solitaria florifera.

- Europæa.* 1. *TILIA* floribus nectario destitutis. *Linn. sp.* 514.
Tilia vulgaris platyphyllos. Bot. Monf. 254.
Tilia femina. Tour. 611.
Le Tilleul ou Tilièul.

HABITAT à la Peissine, Lamousson, Laverune. Folia oblique cordata vel cordato-ovata serrata; pedunculi è medio stipulæ, pedicellis divaricatis.

C I S T U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 519.

Char. secund. Rad. lignosa vel fibrosa. Caul. herbacea vel fruticulosa. Fol. simplex integra vel integerrima, petiolata vel sessilis, opposita (in quibusdam connata) vel alterna. Flor. pedunculata nunc solitaria caulina vel axillaris, nunc terminalis racemosa vel subcorymbosa. Fusc. stipulæ in plurimis binæ solutæ. Bractæ in medio pedunculorum oppositæ vel in racemosis laterifloræ.

* *Exstipulatæ fruticosa.*

- Laurifolia.* 1. *CISTUS* arborescens, foliis ovatis petiolatis trinerviis supra glabris: petiolis basi connatis. *Linn. sp.* 523.
Cistus ledon foliis laurinis. Bot. Monf. 67. Tour. 260.
HABITAT à Saint George, Caunelles à droite. Folia subtus tomentosa.

POLYANDRIA MONOGYNIA. 255

2. CISTUS arborescens, foliis lanceolatis suprà lævibus, *Ladanifera*.
petiolis basi coalitis vaginantibus. *Linn. sp.* 523.
Cistus ladanifera hispanica incana. *Bot. Monf.* 67.
Cistus salicis folio, flore candido. *Tour.* 260.
HABITAT à Gramont, Montferri-r, Lavalette.
 3. CISTUS arborescens, foliis lanceolatis sessilibus utrin- *Monspeliensis*.
que villosis trinerviis, alis nudis. *Linn. sp.* 524.
Cistus ladanifera Monspeliensium. *Bot. Monf.* 67.
Tour. 260.
Le Ciste, vernaculè sous Mougès.
HABITAT cum priori.
 4. CISTUS arborescens, foliis oblongis tomentosis in- *Albida*.
canis sessilibus suprà aveniis, alis nudis. *Linn. sp.*
524.
Cistus mas quartus Monspeliensis folio oblongo albido.
Bot. Monf. 66.
Cistus mas folio oblongo incano. *Tour.* 259.
HABITAT ad mare, à Cette vers le Nazareth.
 5. CISTUS arborescens, foliis ovatis petiolatis utrinque *Salvisolia*.
hirsutis, alis nudis. *Linn. sp.* 524.
Cistus femina Monspeliaca flore albo. *Bot. Monf.* 67.
Cistus femina salviæ folio elatior & rectis virgis.
Tour. 259.
HABITAT à Gramont, Lavalette.
 6. CISTUS arborescens, foliis lanceolatis hirsutis re- *Crispa*.
pandis, alis nudis. *Linn. sp.* 524.
Cistus mas foliis undulatis & crispis. *Tour.* 259.
Cistus mas supinus & fimbriatis foliis. *Bot. Monf.* 66.
HABITAT à Villemagne, Lamalou.
- * *Exstipulata suffruticosa.*
7. CISTUS suffruticosus procumbens exstipulatus; foliis *Fumina*.
alternis linearibus, pedunculis unifloris. *Linn. sp.*
525.
Helianthemum tenuifolium glabrum erectum, flore
luteo. *Tour.* 249.
Cistus humilis sive chamæcistus ericæ folio luteus
erectior. *Bot. Monf.* 69.
 8. Helianthemum tenuifolium glabrum, flore luteo per
humum sparsum. *Tour.* 249.
Chamæcistus ericæ folio luteus humilior. *Bot. Monf.* 69.
HABITAT à la Garigue du Terrail, Cannelles, Lavalette.

256 POLYANDRIA MONOGYNIA.

- Cannus.** 8. **CISTUS** suffruticosus exstipulatus procumbens, foliis oppositis villosis subtus tomentosis. *Linn. sp. 525.*
 • **Chamæcistus** foliis myrti minoris incanis. *Bot. Monf. 69.*
Helianthemum foliis myrti minoris, subtus incanis. *Tour. 249.*
HABITAT à *St. Guillin le Désert*, à *la Serane*.
 * *Exstipulatæ herbacæ.*
- Tuberaria.** 9. **CISTUS** exstipulatus perennis, foliis radicalibus ovatis trinerviis tomentosis; caulinis glabris lanceolatis, summis alternis. *Linn. sp. 526.*
Helianthemum plantaginis folio perenne. *Tour. 250.*
Cistus plantaginis folio. *Bot. Monf. 69. & major. 293.*
HABITAT ad mare, & à *Villemagne*, *Fongeres*.
- Guttatus.** 10. **CISTUS** herbaceus exstipulatus, foliis oppositis trinerviis, racemis ebracteatis. *Linn. sp. 526.*
Helianthemum flore maculoso. *Tour. 250.*
HABITAT au bois de *Gramont*. Vix palmaris. Folia summa oblonga sæpius alterna stipulata. Flores albi; ad basim cujuslibet petali macula purpurea vel carnea.
- Ledifolius.** 11. **CISTUS** herbaceus erectus glaber stipulatus, floribus solitariis subsessilibus, folio ternato-oppositis. *Linn. sp. 527.*
Helianthemum ledi folio. *Tour. 249.*
Cistus annuus folius ledi. *Bot. Monf. 70.*
HABITAT à *la Verune*, *St. Jean de Vedas*. Folia & stipulæ ejusdem ferè magnitudinis. Pedunculus brevissimus è caule ipso, folio oppositus, sed infra ejusdem regionem.
- Nummularius.** 12. **CISTUS** suffruticosus stipulatus, foliis inferioribus orbiculatis, superioribus ovatis. *Linn. sp. 527.*
Cistus humilis vel *chamæcistus* nummulariæ folio luteus. *Bot. Monf. 294.*
Helianthemum ad nummulariam accedens. *Tour. 249.*
HABITAT à *St. Guillin le Désert*, à *la Serane*.
- Serpyllifolius.** 13. **CISTUS** suffruticosus stipulatus, foliis oblongis, calycibus lævibus. *Linn. sp. 527.*
Cistus sive *chamæcistus* repens serpyllifolio luteus. *Bot. Monf. 293.*
Cistus humilis serpyllifolio, flore majore aureo odorato. *Tour. 249.*
HABITAT à *Rouquet*, *Valene*, aux rochers de *Mijoulan*, pres de *St. Jean de Vedas*. 14. **CIST.**

14. CISTUS suffruticosus stipulatus procumbens, foliis *Thymifolius.*
 ovali-linearibus oppositis congestis. *Linn. sp. 528.*
 Cistus humilis sive chamæcistus folio thymi incano.
Bot. Monsf. 68.
 Helianthemum folio thymi incano. *Tour. 249.*
 HABITAT cum priori; à la Colombiere, Castelnau; ad
 lævam.
15. CISTUS suffruticosus stipulatus, foliis linearibus *Pilosus.*
 subtus bilulcatis incanis, calycibus lævibus. *Linn.*
sp. 528.
 Cistus humilis sive helianthemum folio samplici,
 capitulis valdè hirsutis. *Bot. Monsf. 68.*
 Helianthemum folio samplici. *Tour. 249.*
16. Cistus humilis sive helianthemum flore albo, folio an-
 gusto hirsuto. *Bot. Monsf. 68.*
 Helianthemum. *Tour. 249.*
 HABITAT à Montferrier, Castelnau. Bractææ solitariae
 ad latera pedicellorum.
16. CISTUS suffruticosus procumbens, stipulis lanceo- *Heliantha-*
 laris, foliis oblongis revolutis subpilosis. *Linn. sp. 528. mum.*
 Cistus humilis sive chamæcistus vulgaris flore luteo.
Bot. Monsf. 67.
 Helianthemum vulgare flore luteo. *Tour. 249.*
 Vernaculé, l'Hyssope de Garrigue.
 HABITAT au Terrail, la Verune, Prades.
17. CISTUS suffruticosus stipulatus, foliis ovatis, caly- *Hirtus.*
 cibus hispidis. *Linn. sp. 528.*
 Helianthemum rotundifolium folio subtus incano splen-
 dente. *Tour. 250.*
 Cistus humilis foliis minoribus & incanis. *B. Pin.*
465. Bot. Monsf. 68.
 HABITAT cum priori; & à la Valette.

CORCHORUS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 525.*

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. herbacea teres
 ramosa. Fol. alterna simplex integra petio-
 lata. Flor. subsessilis solitaria vel aggregata,
 oppositifolia & axillaris. Fruct. stipulae filiformes
 ad basim petiolorum, solutæ geminae.

1. CORCH. capsulis linearibus compressis bivalvibus. *Siliquosus*
Linn. sp. 529. R

258 POLYANDRIA DIGYNIA.

Corchorus Americana, foliis & fructu angustioribus.
Tour. 259.

HOSPITATUR sub dio. Apricatur. Flores terni vel quaterni, alii axillares, oppositifolii alteri. Siliquæ longissimæ biunciales. Folia lineari-lanceolata serrata.

Olitorius. 2. CORCH. capsulis oblongis ventricosus, foliorum infimis serraturis setaceis reflexis. *Linn. sp.* 529.

Corchorus sive *melochia*. *Tour.* 259.

HOSPITATUR sub dio. Folia ovata serrata. Capsulæ solitariae oppositifoliae; rarius axillares.

DIGYNIA.

PÆONIA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 531.

Char. secund. *Rad.* tuberosa fasciculata. *Caul.* herbacea teres ramosa. *Fol.* alterna duplicato-ternata. foliolis oblique lobatis. *Flor.* solitaria pedunculata terminalis. *Fulc.* nulla.

Officinalis. 1. PÆON. *Linn. sp.* 530.

Pæonia femina. *Tour.* 274. & mas. *Ibid.*

La Pivoine male & femelle; vernaculè, *lou Pavot double*.

HOSPITATUR sub dio.

TRIGYNIA.

DELPHINIUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 535.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea teres ramosa. *Fol.* alterna simplex palmata vel pinnatifida, petiolata aut sessilis. *Flor.* terminalis racemosa. *Fulc.* bractea solitaria bina vel terna, integerrima vel incisa, ad basim singuli pedicelli.

* *Unicapsulares.*

Consolida. 1. DELPH. nectariis monophyllis, caule subdiviso. *Linn. sp.* 530.

Delphinium segetum. *Tour.* 426.

Consolida regalis arvensis. Bot. Monsf. 73.

HABITAT in arvis; à Montferrier, la Valette.

1. DELPH. nectariis monophyllis, caule simplici. *Linn. Ajacis. sp. 531.*

Delphinium hortense flore majore & simplici. Tour. 426.

Le Pied d'aloëtte.

HOSPITATUR sub dio. Mirè varians culturâ.

* *Tricapfulares.*

3. DELPH. nectariis diphyllis, labellis bifidis apice barbatis, foliis incisis, caule erecto. *Linn. sp. 531. Elatum.*

Delphinium perenne montanum villosum aconitifolio. Tour. 426.

HOSPITATUR sub dio.

4. DELPH. nectariis diphyllis, foliis palmatis. *Linn. sp. 531. Staphisagria.*

Delphinium platani folio. Tour. 428.

Staphisagria. Bot. Monsf. 246.

La Staphisaigre, ou Herbe aux poux.

HABITAT au bois de Gramont; hodie rariùs. Occurrit à Prades.

ACONITUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 536.*

Char. secund. *Rad. tuberosa fasciculata, vel fusiformis. Caul. herbacea teres simplex. Pol. alterna petiolata simplex digitata multifida, Flor. terminalis racemosa. Fulc. nulla. In quibusdam speciebus, bractea ad basim cujuslibet pedicelli.*

1. ACON. foliis palmatis multifidis villosis. *Linn. sp. 532. Lycostonum.*
Aconitum lycoctonum luteum. Tour. 424. Barr. Ic. 399.
Le Tue-loup.

HABITAT à Lesperou. Petioli foliis breviores. Pedunculi inferiores ramosi, omnes bracteati.

2. ACON. laciniis foliorum linearibus supernè latioribus lineâ exaratis. *Linn. sp. 532. Napellus.*

Aconitum cæruleum seu napellus. Tour. 425.

L'Aconit, ou Napes.

HABITAT cum priori. Pedunculi omnes simplicissimi ebracteati.

3. ACON. floribus pentagynis. *Linn. sp. 532. Anthora.*

Aconitum salutariferum seu anchora. Tour. 425. Barr. Ic.
609.

L'Antithora.

HOSPITATUR in frigidario.

PENTAGYNIA.

AQUILEGIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 541.

Char. secund. *Rad.* subfusiformis. *Caul.* herbacea
ramosa. *Fol.* alterna triternata, foliolis inte-
gris latiusculis. *Flor.* terminalis subcorymbosa.
Fulc. bractæe subulatae parvæ ad basim pedicel-
lorum.

Vulgaris. 1. *AQUIL.* nectariis incurvis. Linn. sp. 533.

Aquilegia sylvestris. Bot. Monsf. 25. Tour. 428. Barr. Ic.
628. 608. 613.

L'Ancolie, ou Ayglantine.

HABITAT à Valmagne, Lespinouse.

NIGELLA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 542.

Char. secund. *Rad.* tenuis simplex. *Caul.* herba-
cea striata ramosa. *Fol.* alterna sessilis simplex
lineari-multifida. *Flor.* terminalis pedunculata
solitaria. *Fulc.* nulla.

* *Pentagynæ.*

Damascena. 1. *NIGEL.* floribus involucri folioso cinctis. Linn. sp. 534.
Nigella angustifolia flore majore. Tour. 258.

HABITAT in arvis.

Sativa. 2. *NIGEL.* petalis subtricuspidatis, foliis subpilosis. Linn.
sp. 534.

Nigella flore minore simplici candido. Tour. 258.

La NELLE.

HOSPITATUR sub dio.

Arvensis. 3. *NIGEL.* pistillis quinis, petalis integris, capsulis tur-
binatis. Linn. sp. 534.

Nigella arvensis cornuta. Bot. Monsf. 187. Tour. 258.

La route épice.

HABITAT cum priori.

* *Decagynæ.*

4. NIGEL. pistillis denis corollam æquantibus. *Linn. sp. Hispanica.*
 534.
Nigella latifolia, flore majori simplici cæruleo. *Tour.* 258.
 HOSPITATUR sub dio.
5. NIGEL. pistillis denis corolla longioribus. *Linn. sp.* 534. *Orientalis.*
Nigella orientalis flore flavo, semine alato plano.
Tour. Cor. 19.
 HOSPITATUR sub dio.

POLYGYNIA.

ANEMONE.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 450. 549. 548.

Char. secund. Rad. fibrosa vel tuberosa. Caul.
 scaposa vel foliosa. Fol. petiolata radicalis vel
 caulina, nunc simplex integra aut integerrima
 aut multifida, nunc pinnata. Flor. terminalis
 pedunculata solitaria, radicalis vel caulina.
 Fulc. nulla. In paucis bracteæ infra flores.

* *Hepaticæ & pulsatillæ flore bracteato, caule
 scaposo.*

1. ANEM. bracteis ternis approximatis integerrimis, foliis *Hepaticæ*
 trilobis integerrimis.
Anemone foliis trilobis integerrimis. Linn. sp. 538.
Trifolium hepaticum, sive trinitatis herba, flore cæruleo.
Bot. 271.
Ranunculus tridentatus vernus flore. *Tour.* 286. & 287.
L'Hépatique.
 HABITAT à Lesperou, à la Serane.
2. ANEM. bractea remota multifida, petalis rectis, foliis *Pulsatillæ*
 bipinnatis.
Anemone pedunculo involucrato, petalis rectis, foliis
bipinnatis. Linn. sp. 539.
Pulsatilla folio crassiori, majori flore. Bot. Mons. 304.
Tour. 284.
La Pulsatille.
 HABITAT cum priori.

262 POLYANDRIA POLYGYNIA.

* *Anemone caule folioso, seminibus caudatis.*

Coronaria. 3. ANEM. foliis radicalibus ternato-decompositis, involucro folioso. *Linn. sp.* 539.

Anemone tenuifolia, flore simplici. Tour. 277.

L'Anemone.

HABITAT in arvis; à la Verune, Château Bon.

Hortensis. 4. ANEM. foliis digitatis. *Linn. sp.* 540.

Anemone gerani folio rotundo. Tour. 276.

HOSPITATUR sub dio. In hortis coloribus & magnitudine varians.

* *Anemone flore nudo, seminibus ecaudatis.*

Virginiana. 5. ANEM. pedunculis alternis longissimis, fructibus cylindricis, seminibus hirsutis muticis. *Linn. sp.* 540.

HOSPITATUR sub dio.

Trifolia. 6. ANEM. foliis ternatis ovatis integris serratis, caule unifloro. *Linn. sp.* 540.

HABITAT à Lespinouse; ad lævam juxta rivulum.

Nemorosa. 7. ANEM. seminibus acutis, foliolis incis, caule unifloro. *Linn. sp.* 541.

Ranunculus phragmites albus vernus. Tour. 285.

Ranunculus nemorosus, anemones flore minor. Bot.

Monf. 219. 304. & *Bauh. Prod.* 95.

HABITAT à Lesperou, St. Guillin le Désert.

CLEMATIS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 551.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. herbacea volubilis ramosa. Fol. opposita sessilis vel petiolata, simplex integerrima aut impari pinnata. Flor. terminalis, solitaria vel subumbellata. Fulcr. nulla.

* *Scandentes.*

Vitalba. 1. CLEM. foliis pinnatis, foliolis cordatis scandentibus. *Linn. sp.* 544.

Clematis sylvestris latifolia. Bot. Monf. 70. *Tour.* 293.

Clematis foliis cordatis, foliolis inæqualiter serratis. Sauv. 249.

HABITAT à Montferrier, Lattes.

Flammula. 2. CLEM. foliis inferioribus pinnatis laciniatis, summis simplicibus integerrimis lanceolatis. *Linn. sp.* 544.

Clematis sive flammula scandens alba tenuifolia. Bot.

Monf. 70.

Clematis sive flammula repens. Tour. 293.

HABITAT à Castelnau, la Verune, Sellenneuve.

* *Erecta.*

3. CLEM. foliis pinnatis, foliolis ovato-lanceolatis integerrimis, caule erecto. *Linn. sp. 544. Sauv. 249.*

Clematis sive flammula surrecta alba. Tour. 294.

L'herbe aux gueux; vernaculè, d'Entrevoiges.

HABITAT au chemin de Castelnau, à droite avant le pont.

4. CLEM. foliis simplicibus ovato-lanceolaris. *Linn. sp. integrifolia. 544. Sauv. 149.*

Clematis cærulea erecta. Tour. 294. Barr. Ic. 397.

HOSPITATUR sub dio.

THALICTRUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 552.*

Char. secund. Rad. horizontalis stolonifera. Caul. herbacea rigida striata subsimplex. Fol. alterna amplexicaulis tripinnata, foliolis integris. Flor. terminalis paniculata vel subcorymbosa. Fulc. nulla.

1. THALICT. caule paniculato ramosissimo folioso. *Linn. Fœtidum. sp. 545.*

Thalictrum minimum foetidissimum. Tour. 271.

Thalictrum caule filiformi ramosissimo, interpersis foliolis paniculato. Sauv. 251.

HABITAT ad lævam; à Castelnau, sous la montagne.

2. THALICT. foliis sexpartitis, floribus cernuis. *Linn. Minus. sp. 546.*

Thalictrum minus. Bot. Monf. 249. Tour. 271.

HABITAT à Lattes, la Verune, Mauguio.

3. THALICT. foliolis lanceolato-linearibus integerrimis. *Angustifolium. Linn. sp. 546.*

Thalictrum pratense angustissimo folio. Tour. 271.

HABITAT ad mare & à Lattes.

4. THALICT. caule folioso sulcato, panicula multiplici *Flavum. erecta. Linn. sp. 546.*

Thalictrum majus siliqua angulosa seu striata. Tour. 270.

HABITAT cum priori, & à Lunel.

- Aquilegifo.* 5. THALICT. fructibus pendulis triangularibus rectis,
linn. caule tereti. *Linn. sp.* 547.
 Thalictrum majus alpinum aquilegiæ folio. *Tour.* 270.
 HOSPITATUR sub dio.

A D O N I S.

- Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 553.
 Char. secund. *Rad.* fibrosa. *Caul.* herbacea sub-
 simplex. *Fol.* alterna sessilis simplex lineari mul-
 tifida. *Flor.* solitaria pedunculata terminalis.
Fulc. nulla.
Anna. 1. ADON. floribus octopetalis, fructibus semi-cylindricis.
Linn. sp. 547.
 Ranunculus arvensis foliis chamæmeli, flore minore
 atrorubente. *Tour.* 291.
 Adonis recentiorum anemone species. *Bot. Monf.* 5.
 HABITAT in pascuis à *Lavanet*, *Boutonet*, *Selleneuve*;
 foliorum apices inermes.
Vernalis. 2. ADONIS flore dodecapetalo, fructu ovato. *Linn. sp.*
 547.
 Ranunculus fœniculaceis foliis, hellebori radice. *hort.*
Monf. 168. *Tour.* 291.
 Helleborus Hypocratis. *Tab. Icon.* 721. *Barr. Icon.*
 1178.
L'Hellebore d'Hypocrate.
 HABITAT à *Lesperou*. Foliorum laciniæ subspinosæ
 pungentes.

R A N U N C U L U S.

- Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 554.
 Char. secund. *Rad.* fibrosa bulbosa vel tuberosa
 fasciculata *Caul.* teres herbacea simplex vel
 ramosa. *Fol.* alterna petiolata vel inferior pe-
 tiolata, superior sessilis, simplex integra vel
 integerrima vel pinnatifida. *Fulc.* nulla.
 * *Foliis simplicibus.*
Flammula. 1. RANUNC. foliis ovato-lanceolatis petiolatis, caule
 declinato. *Linn. sp.* 548.
 Ranunculus longifolius palustris minor. *Bot. Monf.*
 218. *Tour.* 292.
 HABITAT à *Sauret* dans le pré à gauche, & à *Cannelles*.

2. RANUNC. foliis lanceolatis, caule erecto. *Linn. sp. Lingua.*
549.

Ranunculus longifolius palustris major. Tour. 292.

HABITAT à Laverune; Lamousson, Lattes.

3. RANUNC. foliis ovatis acuminatis amplexicaulibus, *Amplexicaulibus.*
caule subunifloro, radice fasciculata. *Linn. sp. 549.*

Ranunculus montanus gramineo folio. Bot. Monf. 218.

HABITAT à Rouquet ad lœvam, & au Mont St. Loup.

4. RANUNC. foliis cordatis angulatis petiolatis. *Linn. Ficarum.*
sp. 550.

Ranunculus vernus rotundifolius major & minor.

Tour. 286.

Chelidonia rotundifolia major & minor. Bot. Monf.
62.

HABITAT in fossis humidis. *À la Peissine, Sellenen-*
ve, Castelnau.

5. RANUNC. foliis reniformibus subtrilobis crenatis, *Thora.*
caulino sessili, floralibus lanceolatis, caule subbi-
floro. *Linn. sp. 550.*

Ranunculus foliis radicalibus cordato-subrotundis,
caulinis tripartitis sessilibus lanceolatis integerrimis.

Sauv. 205.

HOSPITATUR in frigidario.

* *Foliis dissectis & divisis.*

6. RANUNC. foliis radicalibus reniformibus crenatis *Auricomus.*
incisis: caulinis digitatis linearibus, caule multi-
floro. *Linn. sp. 551.*

Ranunculus rotundifolius vernus sylvaticus. B. Hist.
3. 841.

Ranunculus nemorosus seu sylvaticus, folio subro-
tundo. Tour. 285.

HOSPITATUR in frigidario.

7. RANUNC. foliis inferioribus palmatis, summis di- *Sceleratus.*
gitatis, fructibus oblongis. *Linn. sp. 551.*

Ranunculus palustris apii folio lœvis. Bot. Monf. 217.
Tour. 291.

Ranunculus rectus foliis pallidioribus. Bot. Monf.
217. *Tour. 291.*

HABITAT à Camnelles, Lattes, Laverune.

8. RANUNC. foliis ternatis integerrimis lanceolatis. *Alyricus.*
Linn. sp. 552.

266 POLYANDRIA POLYGYNIA.

- Ranunculus lanuginosus angustifolius*, grumosa radice major. *Bot. Mons.* 218. *Tour.* 289.
HABITAT cum priori, & à Castelnau pres des moulins.
- Monspeliacus* 9. *RANUNC.* foliis tripartitis crenatis, caule simplici villoso subnudo unifloro. *Linn. sp.* 553.
Ranunculus saxatilis magno flore. *Bot. Mons.* 217. *Tour.* 291.
HABITAT à Prades, à la source du Lés.
- Bulbosus.* 10. *RANUNC.* calycibus retroflexis, pedunculis sulcatis, caule erecto, foliis compositis. *Linn. sp.* 554.
Ranunculus bulbosus. *Bot. Mons.* 216.
Ranunculus pratensis, radice verticilli modo rotunda. *Tour.* 289.
HABITAT à Caunelles, Lamousson.
- Repens.* 11. *RANUNC.* calycibus patulis, pedunculis sulcatis, stolonibus repentibus, foliis compositis. *Linn. sp.* 554.
Ranunculus pratensis repens hirsutus. *Bot. Mons.* 216. *Tour.* 289.
Le Bouton dor.
HABITAT cum priori in hortis; variat foliis plenis, multiplicatis proliferis, & frondosis.
- Acris.* 12. *RANUNC.* calycibus patulis, pedunculis teretibus, foliis tripartito-multifidis: summi linearibus. *Linn. sp.* 554.
Ranunculus pratensis erectus acris. *Bot. Mons.* 216. *Tour.* 289.
HABITAT in fossis udis; à la Peissine, Selleneuve, Laverrune, aux Prés d'Arene.
- Lanuginosus.* 13. *RANUNC.* foliis tripartitis acutè sinuatis tomentosis. *Linn. sp.* 554.
Ranunculus montanus lanuginosus, foliis ranunculi pratensis repentis. *Tour.* 281.
Ranunculus magnus valdè hirsutus. *Bot. Mons.* 216.
HABITAT à Caunelles, Montferrier, le long du Lés.
- Charophyllos.* 14. *RANUNC.* calycibus retroflexis, pedunculis sulcatis, caule erecto, foliis compositis. *Linn. sp.* 555.
radice granulosa. *Linn. Syst.* 1087.
Ranunculus charophyllos asphodeli radice. *Bot. Mons.* 218. *Tour.* 289.
HABITAT cum priori.

POLYANDRIA POLYGYNIA. 267

15. RANUNC. seminibus aculeatis, foliis superioribus *arvensis*.
decompositis linearibus. *Linn. sp. 555.*
Ranunculus arvensis echinatus. Bot. Monf. 217.
Tour. 289.
HABITAT in segetibus.
16. RANUNC. seminibus aculeatis, foliis simplicibus *maritimus*.
palmatis incis. *Linn. sp. 555.*
Ranunculus palustris echinatus. Bot. Monf. 217.
Tour. 286.
HABITAT cum priori & in fossis inundatis, à *la*
Peissine, Montferrier.
17. RANUNC. foliis filiformi-ramosis, calycibus appen- *falcatus*.
diculatis. *Linn. sp. 556.*
Ranunculus ceratocephalus, seminibus falcatis in
spicam adactis. Tour. 289.
Ranunculus coronopifolius capite alopecuri. Bot.
Monf. 218.
Cratægonum pumilum luteum. Barr. Icon. 376.
icon imperfecta.
HABITAT in arvis, circà urbem. Raro biuncialis.
18. RANUNC. foliis submersis capillaceis, emerfis pel- *aquaticus*.
tatis. *Linn. sp. 556.*
Ranunculus aquaticus folio rotundo & capillaceo.
Bot. Monf. 219. Tour. 291. Barr. Icon. 565.
Millefolium aquaticum folus abrotani. Bot. Monf.
177.
Millefolium maratriphyllum fluitans, ranunculo five
polyanthemo affine. Bot. Monf. 178.
Millefolium aquaticum fluitans fœniculi foliis. B.
Pin. 141.
HABITAT in aquis, à *Lattes, Cannelles, Laverune*
& circà urbem.

ISOPYRUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 533.*

Char. secund. *Rad. simplex filiformis. Caul. teres*
herbacea ramosa. Fol. alterna pinnato-pinna-
tifida: foliolis integerrimis, inferior petiolata;
superior sessilis amplexicaulis. Flor. peduncu-
lata solitaria oppositifolia. Fulc. stipulæ fili-
formes minimæ laterifoliæ.

268 POLYANDRIA POLYGYNIA.

- Tumarioides*. 1. ISOPYRUM stipulis subulatis, petalis acutis. *Linn.*
sp. 557.
 HOSPITATUR sub dio. Annuum.

HELLEBORUS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 556.

Char. secund. *Rad.* ramosa vel fibrosa. *Caul.* scaposa pauciflora vel foliosa. *Fol.* petiolata pedata simplex linear-multifida, radicalis vel caulina. *Flor.* terminalis pedunculata radicalis vel caulina. *Fulc.* bractea solitaria foliacea ad basim singuli pedicelli, integerrima vel ad apicem incisa.

- Niger*. 1. HELLEB. scapo subunifloro subnudo, foliis pedatis.
Linn. sp. 558.

Helleborus niger angustiori folio. Tour. 272.

Helleborus scapo florifero subnudo, pedunculo communi bipartito. Sauv. 180.

L'Herbe du fen.

HOSPITATUR in frigidario.

- Fatidus*. 2. HELLEB. caule-multifloro folioso, foliis pedatis.
Linn. sp. 558.

Helleborus niger fatidus. Bot. Monf. 126. *Tour.* 272.

Veratrum nigrum tertium. Dod. Pempt. 382.

L'Hellebore ou pied de grison.

HABITAT secus amnem. *A Castelnau, Lavalette;*
 semperflorens.

CALTHA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 555.

Char. secund. *Rad.* subhorizontalis fibrosa. *Caul.* teres herbacea subsimplex. *Fol.* petiolata alterna simplex integra. *Flor.* pedunculata solitaria, axillaris & terminalis. *Fulcr.* nulla.

- Populago*. 1. CALTHA. *Linn. sp.* 558. *Sauv.* 110.

Populago. Tour. 273.

Le Souci d'eau.

HABITAT in aquis; *entre Lamalou & Villemagne, & à la Louzère.* Folia crenata; inferiora longe petiolata orbiculata; superiora petiolo donata brevissimo; subreniformia.

Classis XIV.

DIDYNAMIA
GYMNOSPERMIA.

A J U G A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 557.

Char. secund. *Rad.* horizontalis fibrosa stolonifera. *Caul.* herbacea simplicissima. *Fol.* opposita simplex integerrima : radicalis petiolata : caulina sessilis. *Flor.* verticillata. *Fulcr.* bractæ oppositæ integerrimæ foliaceæ.

1. AJUGA stolonibus repentibus. Linn. sp. 561. Reptans.

Consolida media pratensis cærulea. Bor. Monf. 73.

Bugula. Tour. 208.

Bugula media flore cæruleo. Barr. Icon. 338.

La Bugle.

HABITAT circa molendinas ultra amnem in pratis;
à Sauret, Castelnau.

T E U C R I U M.

Char. primi. Vid. Linn. gen. pl. 558. Adde in quibusdam calyces bilabiati.

Char. secund. *Rad.* fibrosa vel lignosa ramosa vel simplex. *Caul.* herbacea vel fruticosa, teres vel obtuse tetragona. *Fol.* opposita simplex integerrima integra aut multifida, sessilis vel petiolata. *Flor.* nunc axillaris solitaria aut verticillata, sessilis vel pedunculata, nunc terminalis racemosa, capitata. *Fulc.* nulla. Bractæ in paucis.

* Calycibus bilabiatis, floribus racemosis.

1. TEUCRIUM calycibus bilabiatis inferne ventricosus, Virginicum.
racemis æqualibus, foliis cordatis duplicato-crenatis petiolatis.

Teucrium foliis ovatis inæqualiter serratis, racemis terminalibus. Linn. sp. 564.

170 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

HOSPITATUR sub dio. Sempervirens. Caulis pubescens rubens tetragonus. Corollæ purpurascens. Variat foliis ovatis obtusis. Florens vere, æstate & autumno.

- Scorodonia*. 2. TEUCRIUM calycibus bilabiatis infernè ventricosus, racemis secundis, foliis cordatis serratis petiolatis. Teucrium foliis cordatis serratis petiolatis, racemis lateralibus secundis, caule erecto. *Linn. sp. 564.* Chamædrys fruticosa sylvestris melissa folio. *Tour. 205.* Teucrium foliis cordatis crenatis petiolatis, spicis laxis secundis. *Sauv. 145.*

La Sauge sauvage.

HABITAT à Prades, Valene, Lattes, Lamalou. In istâ & priori specie, bractæ ad basim pedicellorum setaceæ.

* Floribus subcapitatis.

- Montanum*. 3. TEUCRIUM floribus subcapitatis, foliis integerrimis lanceolatis. Teucrium corymbo terminali, foliis lanceolatis integerrimis. *Linn. sp. 565.* Polium lavandulæ folio. *Bot. Monf. 107. Tour. 206.* Polium montanum album non serratum viride. *Barr. Icon. 1081.*

HABITAT à Rouquet & cum priori.

- Polium*. 4. TEUCRIUM floribus subcapitatis, foliis linearibus sessilibus tomentosis apice crenatis. Teucrium spicis subrotundis, foliis oblongis obtusis crenatis tomentosis sessilibus. *Linn. sp. 566.* Polium montanum luteum. *Bot. Monf. 207. Tour. 206.* β. Polium maritimum erectum Monspeliacum. *Bot. 207. Tour. 208.*

Polium montanum supinum capite oblongo. *Barr. Icon. 1082.*

Le Pouillot.

HABITAT à Castelnau, Salason, Valene, Selleneuve, la Verune, & à la Garrigue du Terrail. β. Ad mare, Gignac, Salason. Foliis integerrimis angustissimis.

* Floribus axillaribus sessilibus.

- Chamapitys*. 5. TEUCRIUM floribus axillaribus solitariis sessilibus, foliis lineari-tripartitis integerrimis.

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 271

Teucrium foliis trifidis linearibus integerrimis, floribus sessilibus axillaribus. *Linn. sp.* 562.

Chamæpitys lutea vulgaris folio trifido. *Bot. Monf.* 61. *Tour.* 208.

HABITAT in arvis circa urbem.

6. *TEUCRIUM* floribus axillaribus solitariis sessilibus, *iva.*
foliis linearibus tridentatis sessilibus.

Teucrium foliis subtridentatis linearibus, floribus sessilibus. *Linn. sp.* 563.

Chamæpitys moschata folio serrato. *Bot. Monf.* 61. *Tour.* 208.

L'ivette.

HABITAT cum priori. *A Selleneuve, la Colombiere.*

* *Floribus axillaribus pedunculatis.*

7. *TEUCRIUM* floribus axillaribus solitariis peduncu- *Marum.*
latis secundis, calycibus inferne ventricosus, foliis
ovatis acutis subintegerrimis petiolatis.

Teucrium foliis ovatis integerrimis utrinque acutis,
racemis secundis villosis. *Linn. sp.* 564.

Chamædrys maritima incana frutescens, foliis lanceolatis. *Tour.* 205.

Le Marum ou l'herbe au chat.

HOSPITATUR sub dio. Sempervirens.

8. *TEUCRIUM* floribus axillaribus solitariis peduncu- *Pseudo-chamæpitys.*
latis, calycibus aristatis, foliis linearibus trifidis
integerrimis sessilibus.

Teucrium foliis trifidis linearibus integerrimis, floribus pedunculatis subracemosis, caule erecto.
Linn. sp. 562.

Teucrium floribus solitariis pedunculatis. . . . *Linn. Syst.* 1094.

Teucrium supinum perenne foliis laciniatis. *Tour.* 208.

Chamæpitys adulterina. *Lob. Ic.* 385.

HABITAT Massilia. Filamenta longissima.

* * *Floribus verticillatis.*

9. *TEUCRIUM* floribus verticillatis pedunculatis senis, *Betrys.*
calycibus inferne ventricosus, foliis pinnatifidis
petiolatis.

Teucrium foliis multifidis, floribus verticillatis utrinque ternis. *Linn. sp.* 562.

Chamædrys folio laciniato. Bot. Mons. 59. Tour. 205.
 HABITAT à *Lesperou, Valmagne.*

Creticum. 10. TEUCRIUM pedunculis axillaribus solitariis trifloris, calycibus tomentosis, foliis linearibus integerrimis subtus incanis.

Teucrium foliis lanceolato-linearibus integerrimis, racemo subspicato. Linn. sp. 563.

Teucrium . . . pedunculis trifloris. Linn. Syst. 1094.

Teucrium frutescens foliis linearibus integerrimis. Sauv. 141.

Teucrium frutescens stachadis Arabicæ folio & facie. Tour. cor. 14.

HOSPITATUR sub dio. Sempervirens. Variat (autumno) floribus solitariis subsessilibus. Calyces pungentes ut in specie 8^a.

Multiformum. 11. TEUCRIUM floribus verticillatis pedunculatis senis, calycibus infernè ventricosus, foliis ovatis petiolatis glabris apice ferratis.

Teucrium foliis ovatis utrinque acutis, supernè ferrato-dentatis, floribus racemosis. Linn. sp. 564. Syst. 1094.

Chamædrys multiflora tenuifolia Hispanica. Tour. 205.

HOSPITATUR sub dio.

Scordium. 12. TEUCRIUM floribus verticillatis quaternis pedunculatis, calycibus ventricosus, foliis ovatis sessilibus dentatis.

Teucrium foliis oblongis sessilibus dentato-ferratis, floribus geminis axillaribus, caule diffuso. Linn. sp. 565.

Scordium. Bot. Mons. 233.

Scordium sive trixago palustris. Lob. Ic. 497.

Chamædrys palustris canescens sive scordium Officinarum. Tour. 205.

La Germandrée aquatique.

HABITAT à *Lattes, Montferrier, Lamousson.*

Chamædrys. 13. TEUCRIUM floribus verticillatis quaternis pedunculatis, calycibus infernè ventricosus, foliis ovatis inciso-crenatis petiolatis.

Teucrium . . . floribus subverticillatis Linn. sp. 565.

Chamædrys vulgo vera exulimata. Bot. Mons. 58.

Chamædrys major repens. Tour. 204.

Le petit Chêne ou la Germandrée.

HABITAT

HABITAT cum priori; à la Valette.

14. TEUCRIUM floribus verticillatis senis pedunculatis, calycibus infernè ventricosus, foliis subcordatis petiolatis crenatis, bracteis concavis integerrimis s. *Flavum.*

Teucrium foliis cordatis undulatis obtusè-ferratis, floralibus concavis integerrimis, caule fruticoso. *Linn. sp. 565.*

Chamae-lrys frutescens teucrium vulgo. *Tour. 205.*
Teucrium vulgare fruticans. *Bot. Monsf. 249.*

HABITAT cum priori.

S A T U R E J A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 561.*

Char. sec. *Rad.* ramosa lignosa. *Caul.* obtusè-quadrangula, fruticosa vel herbacea. *Fol.* opposita sessilis simplex integerrima sæpius punctis callosis adpersa. *Flor.* axillaris subverticillata pedunculata. *Falc.* nulla. (bractæ in paucissimis setaceæ.)

1. SATUR. verticillis concatenatis fastigiatis, foliis lineari-lanceolatis. *Juliana.*
Linn. sp. 567.

Satureja floribus verticillatis, foliis lanceolatis. *Sauv. 147.*

Thymbra sancti Juliani. *Tour. 198.*

HOSPITATUR sub dio.

2. SATUR. floribus verticillatis, foliis ovatis acutis. *Thymbra.*
Linn. sp. 567.

Thymbra legitima. *Tour. 197.*

HOSPITATUR sub dio.

3. SATUR. pedunculis bifloris. *Linn. sp. 568. Sauv. 142. Hortensis.*

Satureja hortensis. *Bot. Monsf. 230. Sauv. 197.*

La Sariette; vernaculè de Sagrièche.

HABITAT à la Colombiere, la Valette, Lamousson.

4. SATUR. pedunculis dichotomis lateralibus solitariis, *Montana.*
calycibus foliisque mucronatis. *Linn. sp. 568.*

Satureja pedunculis dichotomis. *Sauv. 142.*

Satureja montana flosculis candidis. *Bot. Monsf. 230.*

Calamintha frutescens saturejæ folio & facie. *Tour. 230.*

HABITAT cum priori.

T H Y M B R A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 627.

Char. secund. *Rad.* ramosa lignosa. *Caul.* subangulata fruticulosa. *Fol.* opposita sessilis simplex integerrima. *Flor.* spicata terminalis. *Fulc.* bractæ foliaceæ floribus interjectæ.

Spicata. 1. THYMBRA. floribus spicatis, foliis bracteisque ciliatis. Linn. sp. 569.

Thymbra spicata ver. or Hispanica. Barr. Icon. 1230.
HOSPITATUR sub dio. Perennis. Flores purpurei, ex axilla cujuscunque bractæ, terni.

H Y S S O P U S.

Char. prim. vid. Linn. gen. pl. 565.

Char. secund. *Rad.* fibrosa. *Caul.* herbacea ramosa tetragona. *Fol.* opposita simplex integra vel integerrima, petiolata vel sessilis. *Flor.* spicato-verticillata pedunculata. *Fulcr.* bractæ ad basim pedunculorum sæpius binæ.

Officinalis. 1. HYSSOPUS foliis ovatis integerrimis sessilibus.

Hyssopus spicis secundis. Linn. sp. 569.

Hyssopus Officinarum cærulea. Tour. 201.

L'Hyssope.

HOSPITATUR sub dio. Corollæ calycibus longiores. Stamina & pistillum corollis longiora. Pedunculi multiflori.

Lophanthus. 2. HYSSOPUS foliis cordatis crenatis petiolatis.

Hyssopus corollis transversalibus, staminibus inferioribus corolla brevioribus. Linn. sp. 569.

Hyssopus corollis resupinatis. Linn. Syst. 1096.

HOSPITATUR sub dio. Petioli calycibus breviores. Pedunculi axillares solitarii, multiflori. Flores albi.

N E P E T A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 570.

Char. sec. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea ramosa tetragona. *Fol.* opposita petiolata simplex integra. *Flor.* spicato-verticillata pedunculata. *Fulcr.* bractæ subulatæ parvæ ad basim calycum solitariae vel binæ oppositæ.

1. NEPETA floribus spicatis, verticillis subpedicellatis, *Cataria*, foliis cordatis petiolatis dentato-serratis. *Linn. sp.* 570.

Cataria major & vulgaris. *Tour.* 201.

Mentha cataria major & vulgaris. *Bor. Monf.* 176.

L'Herbe au chat.

HABITAT à *Lattes*, *Sellenneuve*, *Villeneuve*. Pedunculi verticillorum bracteis obvallati viridibus margine albidis lineari-lanceolatis; calyces inæquales.

LAVANDULA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 564.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. tetragona herbacea vel fruticosa. Fol. opposita sessilis simplex pinnato-multifida integra aut integerrima. Flor. terminalis spicata vel spicato-verticillata. Fulc. bractæ (in spicatis) solitariae ad basim cujuslibet calycis; bractæ (in verticillatis) binæ oppositæ.

* *Spicata.*

1. LAVAND. foliis lanceolato-linearibus, spica comosa. *Stachas*. *Linn. sp.* 573.

Stachas Arabica vulgè dicta. *Bor. Monf.* 246.

Stachas Arabica cum ligulis albis. *Bor. Monf.* 246.

Stachas cauliculis foliatis. *Tour.* 201. & non foliatis. *Ibid.*

Le Stécas.

HABITAT à *Gramont*, au fond du bois.

2. LAVAND. foliis duplicato-pinnatifidis. *Linn. sp.* 572. *Multifida*.

Lavandula folio dissecto. *Tour.* 198. *Barr. Icon.* 798.

La Lavande à feuilles découpées.

HOSPITATUR sub dio. Sempervirens.

** *Spicato-verticillata.*

3. LAVAND. bracteis calyce majoribus, spica comosa, *Dentata*, foliis pinnato-dentatis.

Lavandula foliis pinnato-dentatis. *Linn. sp.* 571.

Stachas folio serrato. *Barr. Icon.* 797.

Lavandula folio crenato. *Tour.* 198.

HOSPITATUR sub dio. Folia linearia. Bractæ terminales coloratæ maximæ steriles.

Spica. 4. LAVAND. bracteis calyce brevioribus, foliis integerrimis.

Lavandula foliis lanceolatis integris, spicis nudis. *Linn. sp.* 572.

Lavandula latifolia. *Bot. Monf.* 151. *Tour.* 198. & angustifolia. *Ibid.*

La Lavande; vernaculè, *l'Aspic*.

HABITAT au Terrail, Montferrier, Selleneuve, &c.
Calyces cærulefcentes.

B E T O N I C A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 571.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. herbacea tetragona. Fol. opposita simplex integra sessilis, vel inferior petiolata, superior sessilis. Flor. verticillata vel spicata. Fulcr. bractæ ad basim floris singuli (in spicatis,) vel binæ (in verticillatis) oppositæ.

Officinalis. 1. BETON. spica interrupta, corollarum lacinia labii intermedii emarginata. *Linn. sp.* 573.

Betonica purpurea. *Bot. Monf.* 38. *Tour.* 203.

La Bétoine.

HABITAT à Gramont, la Verune. Folia radicalia petiolata.

Orientalis. 2. BETON. spica integra, corollarum lacinia labii intermedii integerrima. *Linn. sp.* 573.

Betonica orientalis angustissimo & longissimo folio, spica florum crassiori. *Tour. cor.* 13.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo bipedalis. Folia inferiora cordato-oblonga crenata villosa, superiora subsessilia.

Annua. 3. BETON. verticillata, calycibus spinosis. *Linn. sp.* 573.

Betonica glabriuscula calycibus spinosis. *Linn. Syst.* 1097.

Betonica arvensis annua, flore ex albo flavescente. *Tour.* 203.

Sideritis arvensis latifolia glabra. *Bot. Monf.* 305.

Stachys foliis lanceolatis sessilibus basi attenuatis. *Sauv.* 142.

HABITAT à Salafon, Latres, Sembrés. Folia sessilia.

Hirta. 4. BETON. verticillata villosa, calycibus subspinosis. *Linn. Syst.* 1097.

Betonica annua. 4. *Linn. sp.* 573.

Stachys foliis vix serratis scabris sessilibus. *Sauv.* 144.

Sideritis vulgaris hirsuta. *Bor. Monf.* 240. *Tour.* 191.

Betonica foliis inter verticillos dissitis longioribus. *Sauv.* 144. n^o. 166. & 167. & foliis brevibus. *Sauv. ibid.*

Sideritis hirsuta procumbens. *Baub. Pin.* 233. n^o. 11. & 111.

La Crapaudine.

HABITAT cum priori, & à la Valette, la Colombiere, Boutonet, Castelnau. Folia sessilia ad basim integra, supernè serrata, vel etiam summa integerrima.

SIDERITIS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 569.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. tetragona ramosa herbacea vel fruticosa. Fol. opposita sessilis simplex integra vel integerrima. Flor. verticillata. Fulc. bractæ verticillis majores oppositæ, sæpius spinosæ.

1. SIDER. fruticosa tomentoso-lanata, foliis lineari-lanceolatis. *Linn. sp.* 574. *Syrinea.*

Sideritis cretica tomentosa candidissima. *Tour. cor.* 12. Flore luteo.

2. *Stachys lychnoides incana repens.* *Barr. Icon.* 1187.

HOSPITATUR sub dio. Bractæ cordatæ maximæ integerrimæ lanaræ.

3. SIDER. herbacea hispido-pilosa, foliis superioribus *Perfoliata*, amplexicaulibus. *Linn. sp.* 575.

Sideritis orientalis phlomidis folio. *Tour. cor.* 12.

Sideritis salviæ folio nostras. *Bor. Monf.* 241. *Sauv.* 149.

HABITAT à Mougio, Medafon, & à la mer. Bractæ maximæ amplexicaules.

4. *Sideritis herbacea decumbens, calycibus spinosis, labio superiore trifido.* *Linn. sp.* 575. *Montana.*

Marrubiastrum sideritidis folio, calyculis aculeatis, flore albo, limbo atro-purpureo. *Tour.* 190.

HOSPITATUR sub dio. Folia ad basim verticillorum, loco bractearum. Altitudo pedalis. Facies sideritidis Romanæ. Folia transversalia sub-5nervia.

5. SIDER. herbacea decumbens, calycibus spinosis; labio superiori indiviso. *Linn. sp.* 575. *Romana.*

278 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

Marrubiastrum sideritis folio, flore candicante, calyculis aculeatis. *Tour.* 190.

Sideritis verticillis spinosis. *Bot. Monf.* 241.

Cumila calycum superiore latiore ovato-trinervi. *Sauv.* 145.

HABITAT à *Castelnau*, *Gramont*, *la Valette*; & in vicinis. Folia sessilia ovata hirsuta ad apicem serrata spinosa; verticilli 6flori. Corollarum labio superiori minori. Calyx villosus; labio inferiore quadridentato. Folia ad basim verticillorum, loco bractearum.

Hyssopifolia. 5. *SIDER.* folus lanceolatis glabris integerrimis, bracteis cordatis dentato-spinosis, calycibus æqualibus. *Linn.* sp. 575.

Sideritis foliis lanceolato-linearibus sessilibus glabris. *Sauv.* 142.

Sideritis alpina hyssopifolia. *Tour.* 191.

HABITAT à *Valene*, *Rouquet*, *Prades*.

Hirsuta. 6. *SIDER.* folus lanceolatis subdentatis, bracteis cordatis dentato-spinosis, calycibus æqualibus. *Linn.* sp. 575.

Sideritis montana scordioides altera. *Bot. Monf.* 240.

Sideritis foliis hirsutis profundè crenatis. *Tour.* 191.

Sideritis foliis dentatis recurvatis lanceolatis, bracteis cordatis dentato-spinosis, calycibus æqualibus, caulibus prostratis. *Linn. Syst.* 1098.

HABITAT à *Castelnau aux fourches*, à *Montferrier*, *la Valette*, *la source du Lès*. Caulis obtusè tetragonus. Folia sessilia, serraturis spinula terminatis. Bractææ floribus multo majores. Flores lutei vix calyce majores, calycis faux villosa.

Orymastrum. 7. *SIDER.* herbacea pilosa, foliis ovatis obtusis, corollis labio superiore divaricatis. *Linn. Syst.* 1098.

Galeopsis caule piloso, calycibus labio superiore corollæ longioribus. *Linn.* sp. 580.

Marrubium Hispanicum odore stachados. *Lob. Ic.* 519.

Galeopsis annua Hispanica rotundiore folio. *Tour.* 186.

HABITAT à *la Verune*, *Caunelles*. folia crenata, inferiora petiolata, summa subsessilia, omnibus apice aristatis. Calyces aristati. Variat foliis cordatis.

M E N T H A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen.* pl. 572.

Char. secund. *Rad.* ramosa, *Caul.* herbacea ra-

mosa tetragona. *Fol.* opposita simplex integra vel integerrima, sessilis vel petiolata. *Flor.* terminalis spicata vel spicato capitata vel verticillata. *Fulcr.* nulla. In quibusdam bractee circa flores.

1. MENTHA floribus spicatis, foliis oblongis serratis. *Spicata.*
Linn. sp. 576. Sauv. 143.
 Mentha sylvestris longioribus nigrioribus & minus incanis folus. *Tour. 189.*
- a. Mentha spicis confertis, foliis serratis tomentosis sessi- Longifolia.
 libus. *Sauv. 142.*
 Mentha sylvestris folio longiore. *Bot. Monf. 176. Tour. 189.*
- β. Mentha foliis ovatis tomentosis, verticillis in spicam Rotundifolia.
 nudam continuatis. *Sauv. 148.*
 Mentha sylvestris rotundiore folio. *Bot. Monf. 175. Tour. 189.*
 Vernaculè, *lou Mentastre.*
 HABITAT circa urbem. α. Foliis subtus incanis, bracteis subulatis longissimis. β. *A Selleneyve, Castelnau, Lattes.*
2. MENTHA floribus capitatis, foliis ovatis serratis *Aquatica.*
 petiolatis, staminibus corolla longioribus. *Linn. sp. 576.*
 Mentha foliis ovato-lanceolatis, verticillis paucis, supremo maximo. *Sauv. 146.*
 Mentha aquatica sive sisymbrium. *Bot. Monf. 175.*
 Nepeta rotundifolia palustris, sive aquatica major. *Tour. 189.*
 Le Baume, ou la Menthe aquatique; vernaculè etiam, *Mentastre.*
 HABITAT cum prioribus.
3. MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis acutis *Gentilis.*
 serratis, staminibus corolla brevioribus. *Linn. sp. 577.*
 Mentha sylvestris verticillata ocymi odore. *Tour. 189.*
 La Menthe, ou Baume des jardins; vernaculè, *de Mente.*
 HOSPITATUR sub dio.
4. MENTHA floribus verticillatis, foliis ovatis obtusis *Pulegium.*
 subcrenatis, caulibus subteretibus repentibus. *Linn. sp. 577.*

230 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

Mentha foliis subrotundis, verticillis nudis. *Sauv.* 148.

Mentha aquatica sive *pulegium*. *Tour.* 190.

Pulegium latifolium. *Bot. Monf.* 214.

Le Pouliot.

HABITAT in fossis humidis; à *Lavanet*, *la Peiffine*.

Folia ad basim verticillorum. Verticilli globosi. Caulis glaber. Folia petiolata.

Cervina. 5. MENTHA floribus verticillatis, foliis linearibus. *Linn.* sp. 578. *Sauv.* 143.

Mentha aquatica saturejæ folio. *Tour.* 190.

Pulegium cervinum Monspeliense odoratius. *Bot. Monf.* 214.

HABITAT cum priori.

GLECHOMA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 568.

Char. secund. Rad. horizontalis repens stoloni-fera. Caul. herbacea tetragona radicans. Fol. opposita petiolata simplex integra. Flor. verticillata pedunculata. Fulcr. nulla.

Hederaceæ. 1. GLECH. foliis reniformibus crenatis. *Linn.* sp. 578. *Sauv.* 149.

Chalamintha humilior folio rotundiore. *Tour.* 194.

Hedera terrestris vulgaris. *Bot. Monf.* 124.

La Rondote, ou Lievre terrestre.

HABITAT à *Lattes*. Cauliculi erecti palmares. Folia superiora sæpè cordata acuminata longè petiolata. Verticilli sexflori; floribus sessilibus. Aprili & martio florens.

LAMIUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 577.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. herbacea simplex tetragona. Fol. opposita petiolata simplex integra. Flor. verticillata subsessilis. Fulcr. bractæ integræ vel integerrimæ oppositæ vel sparsæ.

Album. 1. LAMIUM foliis cordatis acuminatis serratis petiolatis. *Linn.* sp. 579.

Lamium foliis diffusis cordatis acutis. *Sauv.* 150.

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 281

Lamium album five archangelica flore albo. *Tour.* 183.
L'Archangelique.

HABITAT à *Lesperou*. Frequentior à *Villemagne*, *Lamalon*. Petioli calycibus vix longiores, subtus ad basim puncto concavo notati. Verticilli multiflori. Calyces ad basim subtus purpurascens, compressi. Corollæ calycibus triplo majores; labio inferiori transversali; superiore villosa concavo. Variat floribus diandris. Bractæ subulatæ inter flores.

2. **LAMIUM** foliis cordatis obtusis petiolatis. *Linn. sp. Purpureum.* 579. *Sauv.* 151.

Lamium purpureum foetidum, folio subrotundo. *Bot. Monf.* 148.

Lamium ... five *Galeopsis* *Dioscoridis*. *Tour.* 183.

HABITAT à *Caunelles*, *la Verune*, *St. George*.

3. **LAMIUM** foliis cordatis crenatis, bracteis oppositis cordatis incisissimis amplexicaulibus. *Amplexicaulis.*

Lamium foliis floralibus sessilibus amplexicaulibus obtusis. *Linn. sp.* 579.

Lamium folio caulem ambiente minus. *Bot. Monf.* 149. *Tour.* 184.

HABITAT in arvis. Folia longissimè petiolata.

G A L E O P S I S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 578. Adde calyces aristati.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. herbacea tetragona ramosa vel simplex. Fol. opposita petiolata simplex integra. Flor. verticillata sessilis. Fulcr. bractæ subulatæ aristatæ involucriformes, ad basim singuli calycis.

1. **GALEOP.** internodiis caulinis æqualibus; verticillis omnibus remotis. *Linn. sp.* 579. *Ladanum.*

Galeopsis parula segetum flore purpurascens. *Tour.* 185.

Sideritis arvensis angustifolia rubra. *Bot. Monf.* 241.

Galeopsis ramis summis pubescentibus. *Sauv.* 143.

HABITAT in arvis; à *Gramont*, *la Verune*. Caulis bipedalis ramosissimus brachiatus. Folia lineari-lanceolata dentata vel integerrima. Corollæ calycibus triplo longiores radiis involucri alternis longioribus spinosis.

282 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

- Tetrakis.** 2. **GALEOPSIS** internodiis supernè incrassatis, verticillis subnudis subcontiguis. *Linn. sp.* 579.
Galeopsis procerior calyculis aculeatus, flore purpurascens. *Tour.* 185.
Galeopsis ramis summis strigosis. *Sauv.* 143.
HABITAT ad lævam; à *Castelnau vers Salason, Grammont.* In arvis.
- Galeobdolon.** 3. **GALEOPSIS** verticillis sexfloris, involucrio tetraphyllo. *Linn. sp.* 580.
Galeopsis sive *urtica* iners flore luteo. *Tour.* 185.
Lamium folio oblongo luteum. *Bot. Monf.* 149.
Leonurus foliis ovatis serratis acutis. *Sauv.* 147.
HABITAT à *Valene, la source du Lés, au mont St. Loup.*
 Altitudo pedalis. Folia cordata; summa lanceolata subsessilia. Verticilli sub-12flori.

S T A C H Y S.

- Char. prim.** Vid. *Linn. gen. pl.* 579. *Add* calyces aristati.
- Char. sec.** *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea tetragona sulcata simplex. *Fol.* opposita simplex integra, petiolata vel sessilis. *For.* verticillata. *Fulcr.* bractæ vel binæ oppositæ vel subulatæ involucrifformes plurimæ.
- Sylvatica.** 1. **STACHYS** verticillis sexfloris, foliis cordatis petiolaris. *Linn. sp.* 580.
Galeopsis procerior foetida spicata. *Tour.* 185.
Lamium maximum sylvaticum foetidum. *Bot. Monf.* 299.
HABITAT au *Capouladou, Lamalou.* Luxuriat in labyrintho Horti Regii. Altitudo bipedalis. Caulis villosus. Folia palmaria hispida longè petiolata serrata. Bractæ binæ lanceolatæ integerrimæ. Corollæ purpurascens; labio inferiore maculato.
- Palustris.** 2. **STACHYS** verticillis sexfloris, foliis lineari-lanceolatis semi-amplexicaulibus. *Linn. sp.* 580.
Galeopsis palustris *Betonica* folio, flore variegato. *Tour.* 185.
Stachys palustris foetida. *Bot. Monf.* 246.
Stachys foliis lineari-lanceolatis basi emarginatis sessilibus. *Sauv.* 142.

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 283

HABITAT à *Lattes*, *Caunelles*. Folia subcordata serrata subsessilia.

3. STACHYS verticillis multifloris, foliorum serraturis *Germanica*-
imbricatis. *Linn. sp.* 581.

Stachys major Germanica. *Bot. Monf.* 245. *Tour.* 186.

Stachys verticillis quadraginta-floris, caule lanato.
Sauv. 151.

HABITAT cum priori. Altitudo tripedalis. Verticilli lanati pedunculati. Folia summa brevissime petiolata, petiolo dilatato subamplexicauli. Bractæe subulatae vel ovatae ad basim singuli calycis. Denticuli calycum inæquales; superioribus longioribus.

4. STACHYS verticillis triginta-floris, calycibus pun- *Cretica*.
gentibus. *Linn. sp.* 581.

Stachys Cretica. *Tour.* 186.

Pseudo-stachys Cretica. *Bauh. prod.* 113.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo prioris. Minus lanata.

Folia crenata. Bractæe plurimæ subulatae præter duas oppositas cordatas, magnitudine verticillorum.

Obs. In speciebus plurimis, radices tuberibus præditæ magnitudine pomi.

B A L L O T A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 580.

Char. sec. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea tetragona ramosa. *Fol.* opposita simplex integra petiolata.

Flor. verticillata pedunculata. *Fulcr.* bractæe involucriformes ad basim floris singuli.

1. BALLOTA foliis cordatis indivisis serratis. *Linn. sp. Nigra.*
582.

Ballota. *Tour.* 185.

Marrubium nigrum fœridum. *Bot. Monf.* 174.

Le Marrube puant ou la Ballote.

HABITAT in arvis & ad eorum margines. Variat foliis obtusis crenatis ovatis. Involucrum dimidiatum.

M A R R U B I U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 581.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* tetragona herbacea vel fruticulosa. *Fol.* opposita simplex in-

284 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

tegra petiolata. *Flor.* verticillata sessilis. *Fult.*
bractæ subulatæ involucriformes.

* *Calycibus 5dentatis.*

- Peregrinum.* 1. MARRUB. foliis ovato-lanceolatis ferratis, calycum denticulis setaceis. *Linn. sp.* 582.
Marrubium album lac.folium peregrinum. *Tour.* 192.
Marrubium candidum. *Dod. Pempt.* 67.
HOSPITATUR sub dio. Bractæ calycibus æquales.

* *Calycibus 10dentatis.*

- Hispanicum.* 2. MARRUB. calycum limbis patentibus, denticulis acutis *Linn. sp.* 583.
Pseudo dictamnus Hispanicus amplissimo folio candicante & villoso. *Tour.* 188.
Marrubium folio subrotundo. *Barr. Icon.* 767.
Marrubium frutescens, foliis cordatis crenatis, denticulis calycinis densis alternè minoribus. *Sauv.* 150.
HOSPITATUR sub dio.
- Vulgare.* 3. MARRUB. dentibus calycinis setaceis uncinatis. *Linn. sp.* 583. *Sauv.* 150.
Marrubium album vulgare. *Bot. Monf.* 174. *Tour.* 192.
Le Marrube blanc.
HABITAT ad agrorum margines.
- Pseudo dictamnus.* 4. MARRUB. calycum limbis planis villosis, foliis cordatis, caule fruticoso. *Linn. sp.* 583. foliis concavis cordatis. *Linn. Syst.* 1101.
Pseudo-dictamnus verticillatus inodorus. *Tour.* 188.
Marrubium frutescens foliis obtusis cordatis tomentosis non crenatis. *Sauv.* 151.
HOSPITATUR sub dio. Calyces pungentes. Folia crenata.
- Acetabulosum.* 5. MARRUB. calycum limbis rubo longioribus membranaceis, angulis majoribus rotundatis. *Linn. sp.* 584.
Pseudo-dictamnus acetabulis Moluccæ. *Tour.* 188.
HOSPITATUR sub dio. Folia obrusa.

LEONURUS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 583. *Addo* calyces pungentes.

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 185

Char. sec. Rad. ramosa. **Caul.** tetragona herbacea ramosa. **Fol.** opposita petiolata simplex multifida. **Flor.** verticillata sessilis. **Fulc.** bractæ subulatæ involucrifformes.

1. LEONURUS foliis caulinis lanceolatis trilobis, Linn. *Cardiaca;*

sp. 584.

Cardiaca. Tour. 186.

L'Agripaume.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo humana. Folia summa lanceolata sæpius integerrima. Corollæ villosissimæ.

2. LEONURUS foliis tripartitis laciniauis, calycibus *Tataricus.*
villosis. Linn. *sp.* 584.

Cardiaca orientalis canescens foliis ranunculi. Tour.
cor. 12.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo prioris. Corollæ minus villosæ.

PHLOMIS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 585.

Char. secund. Rad. ramosa vel tuberosa. **Caul.** tetragona herbacea vel fruticosa. **Fol.** opposita simplex integra vel integerrima, petiolata vel inferior petiolata, summa sessilis. **Fulc.** bractæ subulatæ involucrifformes.

1. PHLOMIS foliis subrotundis tomentosis crenatis, involucri lanceolatis. Linn. *sp.* 584. *Fruticosa.*

Phlomis fruticosa salviæ folio latiore & rotundiore.
Tour. 177.

Phlomis foliis cordatis villosis, caule fruticoso. *SAUV.*
152.

2. Stachys fruticans flore aureo. *Barr. Icon.* 406.

HOSPITATUR sub dio. Perennis, sesquipetalis. Variat foliis cordatis vel lanceolatis; verticilli sæpius duo, raro terni.

3. PHLOMIS foliis radicalibus cordatis utrinque tomentosis villosis. Linn. *sp.* 585. *Nissolia.*

Phlomis orientalis angusto & longiore folio, flore luteo. *Tour. cor.* 10.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo humana. Folia tomento densissimo utrinque cooperta; summa ovata

286 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

subsessilia longitudine florum. Verticilli sexflori.
Bractæ sæpius quatuor vel sex.

- Lychnitis.* 3. PHLOMIS foliis lanceolatis tomentosis, floralibus ovatis, involucris setaceis lanatis. *Linn. sp.* 585.

Phlomis lychnitis. Tour. 178.

Verbascum sylvestre Monspeliense flore luteo hianthe. Bot. Monf. 175.

Stachas prælongo & angusto folio. Barr. Icon. 1321.

HABITAT à *Castelnau*, *Lavalette*, *Caunelles*, au *Terrail*. Altitudo cubitalis. Folia verticillis subjecta subcordata amplexicaulia acuminata bractæas æmulantia.

- Herba venti.* 4. PHLOMIS involucris setaceis hispidis, foliis ovato-oblongis scabris, caule herbaceo. *Linn. sp.* 586. *Sauv.* 152.

Phlomis Narbonensis hormini folio, flore purpurascete. Tour. 178.

Marrubium nigrum latifolium. Bot. Monf. 174.

Herba venti. Bot. Monf. 127.

HABITAT à *Caunelles*, à la *garrigue du Terrail*, à *Gramont*, *Castelnau & Lavanet vers la Gaillarde*. Altitudo bipedalis. Folia rigida scabra dentata. Flores purpuro-violacei. Bractæ hispidæ. Calyces quinque-dentati.

- Tuberosa.* 5. PHLOMIS involucris hispidis subulatis, foliis cordatis scabris, caule herbaceo. *Linn. sp.* 586.

Phlomis Orientalis hormini folio, flore minore, calyce glabro. Tour. cor. 10.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo humana. Folia crenata; summa ovata. Tuberâ magnitudine pomorum.

- Lecnurus.* 6. PHLOMIS foliis lanceolatis serratis, involucris linearibus nudis, calycibus decagonis decedentatis. *Linn. sp.* 587.

Lecnurus perennis Africanus sideritidis folio, flore phœniceo majore. Tour. 187.

La Queue de lion.

HOSPITATUR in hybernaculo. Sempervirens; fruticosa. Bis florens in anno, vere & autumnô. Folia ad basim integerrima, in petiolum attenuata. Denticuli calycis alternatim minores, bracteis longiores; rami abscissi in terram defossi radices agunt, novamque præbent sobolem.

MOLUCCELLA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 582.

Char. sec. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea tetragona simplex. *Fol.* opposita petiolata simplex integra vel incisa. *Flor.* verticillata sessilis. *Fulc.* bracteæ subulatae involucriformes calycum basi adnatæ.

1. MOLUC. foliis cuneiformibus dentatis, calycibus *Lævis.* campanulatis corollas superantibus.

Moluccella calycibus quinquedentatis, dentibus æqualibus. *Linn. sp.* 587.

Molucca lævis. *Tour.* 187.

Cardiaca melica sive molucca minus aspera. *Lob. Ic.* 516.

La Mousse des Isles Moluques.

HOSPITATUR sub dio. Annuæ. Altitudo bipedalis. Denticuli calycini minimi.

2. MOLUC. foliis subcordatis palmatis, calycibus bilabiatis spinosis, labio superiore longiore integro, inferiore 6dentato. *Spinosa.*

Molucca spinosa. *Tour.* 187.

Melica sive Molucca asperior. *Lob. Ic.* 517.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo humana. Calycis labium inferius denticulis 6. vel septem acuminatis. Corollæ calycibus duplo majores. Folia lobis septem vel quinque.

CLINOPODIUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 561.

Char. sec. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea ramosa tetragona. *Fol.* opposita petiolata simplex integra. *Flor.* terminalis, capitato-verticillata. *Fulc.* bracteæ setaceæ involucriformes.

1. CLINOPOD. capitulis subrotundis hispidis, bracteis *Vulgare.* setaceis. *Linn. sp.* 587.

Clinopodium origano simile. *Bor. Monf.* 224.

Clinopodium origano simile elatius, majori flore. *Tour.* 195.

Le Basilic sauvage.

288 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

HABITAT à *Castelnau*, *Selleneuve*. Caulis pedalis villosus. Folia ovata denticulata, subtus pubescentia. Flores purpurei. Calycis faux villosa.

ORIGANUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 563.

Char. sec. *Rad.* ramosa lignosa. *Caul.* tetragona ramosa fruticulosa. *Fol.* opposita simplex subintegerrima petiolata vel sessilis. *Flor.* terminalis spicata. *Fulc.* bractæ in srobilum tetragonum floriferum conniventes.

- Dictamnus*. 1. ORIGAN. foliis inferioribus tomentosis, spicis nutantibus. *Linn. sp.* 589.
Origanum Creticum latifolium tomentosum seu dictamnus Creticus. *Tour.* 199.
Dictamnus verum. *Dod. Pempt.* 281.
Le Dictame de Crète.
 HOSPITATUR in hybernaculo. Semina raro maturans. Folia sessilia integerrima ovato-orbiculata. Bractæ maximæ pellucidæ laxæ.
- Creticum*. 2. ORIGAN. spicis aggregatis longis prismaticis rectis, bracteis membranaceis, calyce duplo longioribus. *Linn. sp.* 589.
Origanum folio subrotundo. *Tour.* 199.
Origanum Monspelienae pulchrum. *Bot. Mons.* 194.
 HABITAT à *Salason*, *Castelnau*, la source du Lés. Folia subsessilia integerrima.
- Smyrnum*. 3. ORIGAN. foliis ovatis acutis serratis, spicis congestis umbellatim fastigiatis. *Linn. sp.* 589.
Majorana cretica, origani foliis, villosa, saturejæ odore, corymbis albis majoribus. *Tour. cor.* 13.
La Marjolaine du levant.
 HOSPITATUR sub dio. Caulis obtusè tetragonus villosus. Folia sessilia serraturis utrinque duabus tribusve. Spiculæ globosæ. Corollæ bracteis majores.
- Vulgare*. 4. ORIGAN. spicis subrotundis paniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ovatis. *Linn. sp.* 590.
Origanum sylvestre. *Bot. Mons.* 194.
Origanum sylvestre sive cunila bubula Plinii. *Tour.* 198.
Origanum foliis ovatis, spicis laxis erectis confertis paniculatim digestis. *Sauv.* 147.

• *L'Origan.*

L'Origan.

HABITAT in arvis & viis; altitudo bipedalis. Caulis subbrachiatus rubens. Folia denticulata brevi petiolo affixa. Stamina corollis duplo longiora.

5. ORIGAN. foliis ovatis obtusis, spicis subrotundis *Majorana*. compactis pubescentibus. *Linn. sp. 590.*

Majorana vulgaris. Tour. 199.

La Marjolaine; vernaculè *la Majurene*.

HOSPITATUR sub dio. Folia integerrima incana sessilia.

T H Y M U S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 360.*

Char. secund. *Rad.* ramosa lignosa. *Caul.* tetragona rigida herbacea vel fruticulosa. *Fol.* opposita simplex integra vel integerrima, sessilis aut petiolata. *Flor.* verticillata vel capitata pedunculata. *Falc.* nulla.

1. THYMUS floribus capitatis, caulibus repentibus, *Serpyllum*. folus planis obtusis basi ciliatis. *Linn. sp. 590.*

Serpyllum vulgare minus. Tour. 197.

Serpyllum vulgare repens. Bot. Monsf. 238.

Thymus verticillis in summis ramis congestis, foliis ovatis basi ciliatis, flore majore. Sauv. 148. & flore minore. ibid.

2. *Serpyllum citri odore. Bot. Monsf. 305. Tour. 197. Citratum. Le Serpolet*; vernaculè *lou serpoul.*

HABITAT à Prades, Rouquet, Valene. & à la Serane, au Capouladou.

3. THYMUS erectus, foliis ovatis revolutis, floribus *Vulgaris*. verticillato-spicatis. *Linn. sp. 591.*

Thymum vulgare rigidius folio cinereo. Bot. Monsf. 235.

Thymus vulgaris folio tenuiore. Tour. 196. & latiore. Ibid.

Le Thym; vernaculè *lou Tin, la pote, la frigoule.*

HABITAT in toto agro Monspessulano.

3. THYMUS floribus verticillato-spicatis, caule suffruto- *Zygis*. ticofo, foliis linearibus basi ciliatis. *Linn. sp. 591.*

Serpyllum longifolium hispidum. Bot. Monsf. 239.

Thymum angusto & longiori folio. Barr. Icon. 777.

Thymbra Hispanica coridis folio. Tour. 197.

290 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

HABITAT *au-delà de Caunelle, au Terrail.* Folia verticillis æqualia.

- Acinos.* 4. THYMUS floribus verticillatis, pedunculis unifloris, caulibus erectis subramosis, foliis acutis serratis. *Linn. sp.* 591. calycibus basi ventricosus.

Clinopodium arvense, ocymi facie. Bot. Mons. 71. *Tour.* 195.

Thymus floribus verticillatis, pedunculis unifloris, caulibus... *Sauv.* 148.

HABITAT à *Boutonet, Lavanet, Castelnau.* Est plantula semipedalis obtusè tetragona. Folia in petiolum attenuata, serraturis utrinque tribus, duabus aut unica. Labium inferius corollæ maculatum. Labium calycis superius, denticulis tribus divaricatis; labium inferius denticulis duobus conniventibus.

- Pulegioides.* 5. THYMUS ramis verticillatis longis, foliis ovalibus striatis. *Linn. sp.* 592.

HABITAT à *Prades, la source du Lés.* Sesquipedalis. Verticilli numerosiores quam in cæteris speciebus.

MELISSA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 566.

Char. secund. *Rad.* ramosa fibrosa. *Caul.* tetragona herbacea ramosa. *Fol.* opposita petiolata simplex integra. *Flor.* axillaris verticillata pedunculata, pedunculis unifloris vel multifloris. *Fulc.* nulla.

- Officinalis.* 1. MELISSA racemis axillaribus verticillatis, pedicellis simplicibus. *Linn. sp.* 592.

Melissa floribus ex alis inferioribus subsessilibus. *Sauv.* 149.

Melissa hortensis. Bot. Mons. 175. *Tour.* 193.

La Melisse; vernaculè la Citrounele.

HABITAT à *Coatondres, Valene.*

- Grandiflora.* 2. MELISSA pedunculis axillaribus dichotomis longitudine florum. *Linn. sp.* 592.

Calamintha magno flore. Tour. 194.

Calamintha montana præstantior. Lob. Icon. 512. *Barr. Icon.* 398.

HABITAT à *Lesperou.* Folia ovata serrata ut in priori. Flores maximi purpurei.

- Calamintha.* 3. MELISSA pedunculis axillaribus dichotomis longitudine foliorum. *Linn. sp.* 593.

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 291

Melissa floribus ex alis superioribus pedunculo communi confertis. *Sauv.* 149.

Calamintha vulgaris & officinarum Germaniæ. *Bor. Monf.* 44. *Tour.* 194.

Le Calament.

HABITAT à *Lesperou*, au *Caponladou*.

4. MELISSA pedunculis axillaribus dichotomis folio *Nepeta*: longioribus, caule decumbente. *Linn. sp.* 593.

Melissa folus ovato-triangularibus obtusis. *Sauv.* 149.

Calamintha pulegii odore, sive nepeta. *Bor. Monf.* 44. *Tour.* 194.

5. Calamintha montana præalta pulegii odore. *Tour.* 194.

HABITAT in toto agro Monspessulano. Altitudo bipedalis. Folia villosa dentata. Calycum denticulis inferioribus longioribus. Corollæ faux punctis adspersa purpureis.

DRACOCEPHALUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 574.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* tetragona herbacea vel fruticulosa. *Fol.* opposita petiolata nunc simplex integra vel incisa, nunc ternata foliolis sessilibus integris. *Flor.* terminalis spicata vel axillaris verticillata. *Fulg.* bractæ (in spicatis) ad basim calycum solitariae (in verticillatis) axillares geminatae.

* *Spicata.*

1. DRACOC. floribus spicatis, foliis compositis. *Linn. Canariensis. sp.* 594.

Moldavica Americana trifolia odore gravi. *Tour.* 184.

HOSPITATUR in hybernaculo. Æstate sub dio. Caulis acutè tetragonus glaber. Folia ternata petiolata; foliolis lateralibus oblique lanceolatis, obtusè serratis; foliolis imparibus majoribus. Petioli longitudine folioli imparis. Odor camphoræ.

2. DRACOC. floribus spicatis, foliis bracteisque lanceolatis indivisis muticis. *Linn. sp.* 595. *Russchiana.*

HOSPITATUR sub dio. Vix palmare. Folia utrinque denticulis duobus tribusvè. Calyces bilabiati, labio superiore majore tridentato; inferiore minore bidentato profundiusque diviso. T ij

* *Verticillata.*

- Moldavica.* 3. DRACOC. floribus verticillatis, bracteis lanceolatis; ferraturis capillaceis. *Linn. sp. 595. Sauv. 144.*
Moldavica betonica folio flore caeruleo. *Tour. 184.*
Melissophyllum Turcicum. *Lob. Icon. 515.*
La Melisse des Moldaves.
 Hospitatur sub dio. Serraturæ bractearum & foliorum filo terminatæ; folia petiolo brevi, ovata vel oblonga vel ovato-triangularia; calyces bilabiati. Bractææ ovatæ.
- Canescens.* 4. DRACOC. floribus verticillatis, bracteis oblongis; ferraturis spinosis, foliis subtomentosis. *Linn. sp. 595.*
Moldavica orientalis betonica folio, flore magno violaceo. *Tour. Cor. 11.*
Autre Melisse des Moldaves.
 Hospitatur cum prioribus. Altitudo pedalis. Folia ovato-lanceolata incana longe petiolata. Calix quinquefidus. Bractearum serraturæ filo terminatæ.
- Thymiflora.* 5. DRACOC. floribus verticillatis, bracteis oblongis integerrimis, corollis vix calyce majoribus. *Linn. sp. 596.*
 Hospitatur sub dio. Folia cordata vel cordato-ovata dentata; petioli longi; calyces magnitudine calycum thymi vulgaris.

H O R M I N U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 567.*

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. tetragona ramosa herbacea. Fol. opposita simplex integra; inferior petiolata, summa sessilis. Flor. spicato-verticillata. Fult. bractææ oppositæ, ad basim verticillorum.

- Virginicum.* 1. HORM. foliis cuneiformibus oblongis, caule bifolio. *Linn. sp. 596.*

L'Ormin de Virginie.

Hospitatur sub dio. Radix perennis. Caulis hirsutus pedalis, raro altior. Folia duo ad basim caulis, denticulata; duo ad apicem sessilia ovata, è quorum aliis rami simplicissimi solitarii floriferi & nudi. Verticilli sex vel octo.

MELITTIS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 575.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. tetragona herbacea simplex. Fol. opposita petiolata simplex integra. Flor. axillaris solitaria pedunculata. Fulc. nulla.

1. MELITTIS. Linn. sp. 597.

Lamium montanum melissæ folio. Bot. Monf. 149. *Melissaphyl.*

Melissa humilis latifolia, flore maximo purpurascens. Tour. 193.

Melissa Fuchsii. Lob. Icon. 515.

La Melisse de montagne.

HABITAT à Lesperou, à Lamalou, Fongeres. Folia ovata crenata obtusa vel acuminata. Pedunculi calycibus breviores. Corollæ calycibus triplo majores.

O CY M U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 573.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. tetragona, herbacea vel fruticulosa. Fol. opposita petiolata simplex integra. Flor. terminalis racemosa vel axillaris verticillata. Fulc. bractæ ad basim verticillorum, binæ.

1. OCYM. racemis secundis lateralibus, caule erecto. *Frutescens.*

Linn. sp. 597.

Le Basilic en arbre.

HOSPITATUR in hybernaculo. Altitudo bipedalis. Folia longè petiolata ovali-lanceolata dentata. Flores minimi. Perenne.

2. OCYM. foliis ovatis glabris, calycibus ciliatis. Linn. Basilicum. sp. 597.

Ocymum caryophyllatum majus. Tour. 204. & maximum. Ibid.

3. Ocymum latifolium maculatum. Tour. ibid. Barr. Ic. 1064. 1702. 1053.

4. Ocymum viride bullatis foliis. Tour. ibid.

Le Basilic; vernaculè lou Basari.

HOSPITATUR sub dio. Annuum.

5. OCYM. foliis ovatis integerrimis. Linn. sp. 597. *Minimum*

Ocymum minimum. Tour. 204.

294 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

Ocimum minimum vulgare folio acuto. *Barr. Icon*
1077.

HOSPITATUR sub dio.

SCUTELLARIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 587.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* tetragona herbacea ramosa. *Fol.* opposita petiolata simplex integra. *Flor.* terminalis spicata, vel axillaris solitaria pedunculata. *Falc.* vel nulla vel (in spicatis) bractæ oppositæ ad basim florum.

Orientalis. 1. SCUTELL. foliis incisus subtus tomentosis. *Linn. sp.* 598.

Cassida orientalis folio chamædryos, flore luteo. *Tour. Cor.* 11.

HOSPITATUR in hybernaculo. Bractæ integerrimæ concavæ. Folia profundè incisa subovata. Caulis diffusus.

Cretica. 2. SCUTELL. foliis cordatis obtusis obtuseque serratis, spicis foliosis. *Linn. sp.* 600.

Cassida cretica fruticosa, folio cataris, flore albo. *Tour. Cor.* 11.

HOSPITATUR in hybernaculo. Caulis & folia pubescentia. Bractæ ovata foliaceæ nec concavæ ut in cæteris speciebus.

Galericulata 3. SCUTELL. foliis cordato-lanceolatis crenatis, floribus axillaribus. *Linn. sp.* 599.

Cassida palustris vulgatiores flore cæruleo. *Tour.* 182.

HABITAT à *Lattes*. Petioli breves. Caulis erectus glaber pedalis.

Peregrina. 4. SCUTELL. foliis subcordatis serratis, spicis interruptis. *Linn. sp.* 599.

Cassida Columnæ, *Tour.* 181.

Lamium astragaloides. *Corn. Can.* 129.

La Toque.

HOSPITATUR sub dio.

BRUNELLA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 586.

Char. secund. *Rad.* subhorizontalis ramosa. *Caul.* tetragona simplex herbacea. *Fol.* opposita sim-

DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 295

plex incisa vel integra vel integerrima, petiolata vel sessilis, vel inferior petiolata, summa sessilis. *Flor.* terminalis verticillato-capitata. *Fulc.* bractæ oppositæ binæ amplexicaules verticillos distinguentes.

1. BRUN. foliis ovato-oblongis petiolatis. *Linn. sp.* 600. *vulgaris*.
Brunella major folio non dissecto. Bot. Monf. 39.
Tour. 182.
Brunella foliis dentatis, spica foliis minori. Sauv.
142. & 279.
- A. *Brunella foliis integris vix dentatis, spica foliis ma-* Grandiflora.
jori. Sauv. 142.
Brunella flore cæruleo magno. Tour. 182.
- γ. *Brunella foliis imis integris, summis laciniatis parvi-* Laciniata.
flora. Sauv. 279. & grandiflora. *Sauv. ibid.*
Brunella folio laciniato. Bot. Monf. 40. *Tour.* 182.
Symphytum petrzum. Lob. Icon. 475.
La Brunelle.

HABITAT juxtà amnem. B. à *Lesperou*, γ. à *Gramont*.
Vix semipedalis. Latera duo opposita alternatim
sulcata. γ. Folia villosa lineari pinnatifida; bractæ
ad margines villosæ.

2. BRUN. foliis lanceolato-linearibus ciliatis subsessili- *Hyssopifolia*.
bus. Sauv. 141. *Linn. sp.* 600.
Brunella hyssopifolia. Bot. Monf. 40. *Tour.* 183.
HABITAT à *Gramont*, *Caunelles*. Bractæ acuminatæ.
Folia retrorsum scabra seu pilis rigidis ciliata uni-
nervia.

P R A S I U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 588.

Char. secund. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* tetra-
gona fruticosa. *Fol.* opposita petiolata simplex
integra. *Flor.* axillaris solitaria subsessilis. *Fulc.*
nulla.

1. PRAS. foliis ovato-oblongis serratis. *Linn. sp.* 601. *Minjua*.
Galeopsis Hispanica frutescens teucrii folio. Tour. 186.
Teucrium fruticans amplo & albo flore, Italicum.
Barr. Icon. 895.

HOSPITATUR sub dio. Petioli foliis duplo breviores.
Stamina corollis æqualia; calyces ampliati.

ANGIOSPERMIA.

RHINANTHUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 593.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* tetragona herbacea simplicissima vel ramosa. *Fol.* opposita sessilis simplex integra. *Flor.* terminalis spicata. *Fulc.* bractea ad basim singuli floris

Trixago. 1. RHIN. calycibus hirsuto-tomentosis, foliis oppositis obrusè ferratis. Linn. Syst. 1107.

Bartisia (*trixago*) foliis oppositis lanceolatis obrusè ferratis. Linn. sp. 602.

Anthirrinum album serrato folio. *Bot. Monf.* 23.

Pedicularis maritima folio oblongo serrato. *Tour.* 172.

Trixago chamedryos foliis. *Barr. Icon.* 774. n°. 2.

HABITAT ad mare. *Au-delà du Nazareth*, à Cette. Altitudo sesquipalmaris.

Crista-galli. 2. RHIN. corollarum labio superiore compresso brevior. Linn. sp. 603.

Pedicularis pratensis lutea, sive crista galli. *Bot. Monf.* 100. *Tour.* 172.

La Crête de coq.

HABITAT in pratis inundatis. *A Lattes*, *Mauguio.*

Altitudo sesquipedalis. Folia glaberrima serrata.

Calyces compressi glaberrimi reticulati. Bractæ ovatæ serratæ magnæ.

EUPHRASIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 594.

Char. secund. *Rad.* ramosa rigida. *Caul.* herbacea tetragona vel teres, simplex vel ramosa. *Fol.* opposita sessilis simplex integra vel integerrima. *Flor.* spicata terminalis. *Fulc.* bractæ ad basim floris singuli.

Latifolia. 1. EUPHR. foliis dentato-palmatis, floribus subcapitatis. Linn. sp. 604.

Euphrasia foliis ovatis, floribus spicatis. *Sauv.* 139.

Pedicularis purpurea annua minima verna. *Tour.* 172.

Euphrasia purpurea minor. *Bot. Monf.* 95. *Icon.* 94.

Euphrasia. *Barr. Icon.* 276. n°. 1. & 3.

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 297.

HABITAT à *Caunelles & au-delà*. Vix triuncialis, obscure tetragona. Bractææ palmatæ hirsutæ.

2. EUPHR. foliis ovatis argutè dentatis. *Linn. sp. 604. Officinalis.*

Euphrasia officinarum. Tour. 174.

Euphrasia foliis ovatis acutè dentatis, floribus sparsis.

Sauv. 139.

L'Euphrase.

HABITAT à *Lesperou, à Saint Guillin le Désert.*

3. EUPHR. foliis linearibus : omnibus ferratis. *Linn. Odontites. sp. 604.*

Pedicularis serotina, purpurascence flore. Tour. 172.

Euphrasia pratensis rubra. Bot. Mons. 93.

Euphrasia foliis lanceolatis. Sauv. 139.

Euphrasia sylvestris major purpurea. Barr. Icon. 276. n^o. 2.

HABITAT à *Lattès, Castelnau &c* in fossis humidis, à *la Peissine*. Altitudinem pedalem excedit. Caulis brachiatus ramosissimus. Variat foliis ovatis; flores secundi purpurei.

4. EUPHR. foliis linearibus ferratis : superioribus integerrimis. *Linn. sp. 604. Lutea.*

Euphrasia pratensis lutea. Bot. Mons. 95.

Pedicularis serotina lutea. Tour. 172.

Euphrasia foliis linearibus. Sauv. 138.

HABITAT à *Castelnau le long du Lès à gauche, & à Montferrier*. Altitudo semi-pedalis. Caulis teres rubens.

MELAMPYRUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 595.*

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. ramosa subangulata. Fol. opposita sessilis simplex integra vel incisa. Flor. terminalis subspicata. Fuls. bractææ foliaceæ floribus interjectæ.

1. MELAMP. spicis conicis laxis laceris. *Linn. sp. 605. Arvense.*
Melampyrum purpurascence coma. Bot. Mons. 174.

Tour. 173.

Le Blé de vache.

HABITAT à *Rouquet, Prades, à Manguio & Lattes*; sed rarius.

2. MELAMP. florum conjugationibus remotis, corollis *Pratense.* clausis. *Linn. sp. 605.*

298 DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

Melampyrum luteum latifolium. Bot. Monf. 302.
Tour. 173.

Melampyrum foliis lanceolatis, florum paribus remotis. Sauv. 138. & 277.

HABITAT à *Lesperon*. Variat foliis integerrimis vel laciniatis.

P E D I C U L A R I S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 592.

Char. secund. Rad. funiculiformis vel fusiformis.

Caul. herbacea simplex vel ramosa, teres vel angulata. Fol. pinnata alterna vel opposita vel verticillata. Flor. axillaris solitaria pedunculata vel terminalis spicata. Fulc. nulla. Bractææ (in spicatis) ad basim calycum.

Sylvatica. 1. PEDICUL. caule ramoso, calycibus angulatis oblongis levibus. Linn. sp. 607.

Pedicularis. calycis labio cordato. Linn. Syst. 1109.

Pedicularis pratensis purpurea. Tour. 173.

Pedicularis. Lob. Icon. 548.

La Pédiculaire des prés.

HABITAT à *Lesperon*, *Lamalon*. Folia bipinnatifida. Flores axillares solitarii; pedunculi brevissimi. Folia alterna.

Rostrata. 2. PEDICUL. caule subramoso, corollis galea rostrato-acuminatis, calycibus subhirsutis. Linn. sp. 607.

Pedicularis alpina filicis folio, minor. Tour. 173.

HABITAT à *Lespinouse* auprès de *Lamalon*.

Verticillata. 3. PEDICUL. caule simplici, foliis quaternis. Linn. sp. 608.

Pedicularis alpina altera asphodeli radice. Tour. 173.

HABITAT à *Lesperon* & cum priori. Flores spicati terminales. Bractææ parvæ. Radix constat radiculis funiculiformibus aggregatis ut in sequenti.

Tuberosa. 4. PEDICUL. caule simplici, calycibus crenatis, corollis galea rostrato-aduncis. Linn. sp. 610.

Pedicularis alpina asphodeli radice, flore purpurascence. Tour. 173.

Alcatorolophos montana flore luteo. Barr. Icon. 469.

HABITAT cum superiori & à *Lesperon*. Radiculæ tres, vel quaternæ fusiformes.

ANTHIRINUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 589.

Char. sec. *Rad.* fusiformis vel ramosa. *Caul.* herbacea teres simplex aut ramosa. *Fol.* simplex petiolata vel sessilis; alterna vel opposita vel terna vel etiam sparsa; integra integerrima vel incisa; aut inferior incisa, superior integerrima. *Flor.* nunc axillaris solitaria pedunculata aut sessilis, nunc terminalis spicata vel racemosa. *Fulc.* nulla. (In paucis bracteæ foliaceæ ad basim florum.)

* *Foliis angulatis.*

1. ANTHR. foliis cordatis crenatis oppositis. Linn. *sp. Asarina.*
612.

Asarina seu *hederula saxatilis*. Lob. *ic.* 601. Tour. 171.
Anthirrinum (*asarina*) foliis oppositis cordatis crenatis, corollis ecaudatis, caulibus procumbentibus. Linn. *Syst.* 1110.

HABITAT à *Lesperon*. Caulis humifusus hispidus teres. Folia longè petiolata. Flores solitarii axillares albi vel flavi, petiolo brevi & villosa. Faux corollæ punctis insignita purpureis. Stamina alba. Pistillum purpurascens.

2. ANTHR. foliis cordatis alternis quinquelobis. Linn. *Cymbalaria.*
sp. 612.

Anthirrinum (*cymbalaria*) . . . caulibus procumbentibus. Linn. *Syst.* 1111.

Linaria hederaceo folio glabro seu cymbalaria. Tour. 169.

HABITAT in muris humidis. Luxuriat in horto regio. Petioli pedunculique longissimi.

3. ANTHR. foliis alternis hastatis, caule flaccido. *Elatine.*
Linn. *sp.* 612.

Linaria segetum nummulariæ folio aurito & villosa, flore cæruleo. Tour. 169.

Elatine folio acuminato, flore cæruleo. Ber. *Monsf.* 89.

Anthirrinum (*elatine*) foliis . . . caulibus procumbentibus, corollis calcaratis. Linn. *Syst.* 1111.

La Velvete.

300 DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

HABITAT à la Verune dans le bosquet ; à Boutonet ,
Sellenueve. Pedunculi longitudine foliorum.

Sparium. 4. ANTHIR. foliis ovatis alternis , caulibus procumben-
tibus , corollis calcaratis. *Linn. Syst.* 1111.

Anthirrinum foliis ovatis alternis , caule flaccido.
Linn. sp. 613.

Elarine folio subrotundo. *Bot. Monf.* 88.

Linaria segetum nummulariæ folio villoso. *Tour.* 169.
La Velvete femelle.

HABITAT à Lattes & cum priori. Folia sæpè cordata.
Pedunculi foliis multo longiores. Corollæ labium
superius atro-purpureum. Floret in fine septembris.

* *Foliis oppositis.*

Triphyllum. 5. ANTHIR. foliis ternis ovatis. *Linn. sp.* 613. *Sauv.* 165.
Linaria triphylla cærulea. *Tour.* 169.

Linaria Valentina. *Lob. Icon.* 408.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo semipedalis. Folia
sessilia integerrima , quandoque opposita ; vel in-
feriora terna , superiora opposita vel alterna. Flo-
res spicati.

Bipunctatum 6. ANTHIR. foliis lanceolatis glabris , inferioribus qua-
ternis , caule erecto paniculato , floribus spicato-
capitatis. *Linn. sp.* 614.

Linaria pumila foliis carnosiss , flosculis minimis fla-
vis. *Bauh. Pin.* 213. & *Tour.* 170.

Linaria lutea annua parva. *Bot. Monf.* 159.

Anthirrinum erectum , foliis linearibus , amplexu verti-
cillaris , pauciflorum. *Sauv.* 165.

HABITAT à Lamousson , Boutonet , St. George. Supra
muros antiquos & inter saxa. Variat foliis alternis
vel omnibus quaternis , floribusque duobus tribusve
alternis sessilibus.

Arvensis. 7. ANTHIR. foliis sublinearibus , inferioribus verticil-
latis , calycibus pilosis viscidis , floribus spicatis ,
caule erecto. *Linn. sp.* 614.

Linaria arvensis cærulea erecta. *Bot. Monf.* 157. *Tour.*
170.

HABITAT ad mare , & à Cette vers le Nazareth.

Pelisserianum 8. ANTHIR. foliis caulinis lanceolato-linearibus spar-
sis , radicalibus rotundis ternis. *Linn. sp.* 615.

Linaria annua purpureo-violacea , calcaribus longis ,

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 301

foliis imis rotundioribus. *Bot. Monsf. 159. Tour. 170.*
Anthirrinum foliis ad caulem linearibus, ad radicem
 ovatis sæpius ternis. *Sauv. 166.*

Chamælinaria violacea Italica. Barr. Icon. 1162.

HABITAT à Gramont. Variat caule ramosissimo, flo-
 ribus luteis calcaribus albidis donatis sessilibus, foliis-
 que omnibus linearibus.

9. ANTHIR. foliis oppositis lanceolatis, floribus laxè racemosis. *Linn. sp. 615.* *Origani-
 folium.*

Linaria faxatilis serpylli folio. Tour. 169.

*Anthirrinum faxatile serpylli folio. Bot. Monsf. 25.
 Icon. 24.*

Orontium faxatile serpylli folio. Barr. Icon. 1100.

HABITAT aux rochers de Mijoulan, & au-delà de la
Verune in loco dicto la Peyrière. Variat foliis al-
 ternis. Flores axillares. Pedunculi longitudine fo-
 liorum.

* Foliis alternis.

10. ANTHIR. foliis linearibus acuminatis alternis, flo-
 ribus racemosis, caule diffuso. *Linn. sp. 615.* *Supinum.*
Sauv. 48.

Linaria pumila supina lutea. Bot. Monsf. 159. Tour. 170.

Oxyris flava. Lob. Icon. 410.

HABITAT à Lesperon, à St. Guillin le Désert.

11. ANTHIR. foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, spicis sessilibus terminalibus, flori-
 bus imbricatis. *Linn. sp. 616.* *Linaria.*

Linaria vulgaris lutea, flore majore. Tour. 170.

- β. *Peloria. Linn. amæn. acad. tom. I. pag. 55. tab. 3.*
hybrida.

HABITAT à Gramont, Montferrier, Lavalette, &
 à Certe.

12. ANTHIR. foliis linearibus confertis, caule nitido paniculato, pedunculis spicatis nudis. *Linn. sp. 616.* *Monspessulana.*
Sauv. 47.

Linaria capillaceo folio, odora. Tour. 170.

Linaria odorata Monspessulana. Bot. Monsf. 157.

HABITAT cum priori; à Caunelles.

13. ANTHIR. foliis lanceolatis obtusis alternis, caule ramosissimo diffuso. *Linn. sp. 617. Sauv. 52.* *Minus.*

Linaria pumila vulgarior arvensis. Tour. 169.

302 DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

Anthirrinum arvense minus. Bot. Monf. 23.

HABITAT à *Castelnau*, *Selleneuve*. Flores axillares longè pedunculati.

* *Corollis ecaudatis hiantibus, foliis alternis integris.*

Majus. 14. ANTHIR. corollis ecaudatis, calycibus rotundatis. *Linn. sp. 617.*

Anthirrinum foliis lanceolatis petiolatis, calycibus brevissimis, racemo terminali. Sauv. 52.

Anthirrinum majus flore roseo. Bot. Monf. 23.

Anthirrinum vulgare. Tour. 168.

♂. *Anthirrinum latifolium. Barr. Icon. 655.*

Le Musle de veau.

HABITAT ubique supra muros. A *Castelnau*, & circa urbem.

Orentinum. 15. ANTHIR. corollis ecaudatis, calycibus corolla longioribus. *Linn. sp. 617.*

Anthirrinum arvense majus. Bot. Monf. 23. Tour. 168.

♂. *Anthirrinum. Barr. Icon. 652. & 651.*

HABITAT in arvis. Variat foliolo calycino superiore minimo vel majori. Flores axillares subsessiles dilutè rosei.

Bellidifolium 16. ANTHIR. foliis imis spathulatis, summis digitatis. *Sauv. 67.*

Anthirrinum foliis ovatis serratis, corollis patulis. Linn. sp. 617.

Anthirrinum foliis . . . corollis ecaudatis hiantibus. Linn. Syst. 1112.

Linaria bellidis folio. Tour. 169.

HABITAT à *Lesperou*, au *Capouladou*, à *St. Guillin le Désert*. Caulis tripedalis, basi ramosus, teres.

Folia summa linearia integerrima. Radix fusiformis.

Folia radicalia semiamplexicaulia. Flores axillares solitarii minimi, violacei cæruleive, subsessiles.

M A R T Y N I A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 611. Syst. nat. 671.*

Char. sec. *Rad.* articulata. *Caul.* herbacea teres, ramosa fistulosa. *Fol.* alterna petiolata simplex integerrima. *Flor.* terminalis laxè racemosa.

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 303

Fulcr. bractæ duæ ad basim singuli calycis (has Linnæus calycis exterioris nomine donat.)

1. MART. caule petiolisque fistulosis, floribus bibrac- *Anna.*
teatis.

Martynia caule ramoso, foliis angulatis. *Linn. sp.* 618.

Martynia caule ramoso, foliis integerrimis, calycibus cordato-lobatis, exterioribus diphyllis. *Linn. Syst.* 1113.

HOSPITATUR sub dio. Facta indigena. Occurrit in arvis circa hortum regium. Caulis diffusus hispidus. Folia cordata longè petiolata. Flores albi. Corollarum lacinie inferiores tres punctatæ; intermedia lineis 6. vel 7. croceis longitudinalibus notata; superioribus punctis insignita purpureis. Filamenta punctis adspersa. Corollæ extus villosæ hispidae; calyce trilobi; lobo intermedio majori. Bractæ ovatæ aut subulatæ.

SCROPHULARIA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 612.

Char. sec. *Rad.* ramosa vel nodosa. *Caul.* herbacea tetragona ramosa. *Fol.* opposita simplex integra vel pinnato-multifida. *Flor.* axillaris pedunculata, pedunculis ramosis, vel terminalis racemosa. *Fulcr.* bractæ vagæ solitariae subulatæ parvæ.

1. SCROPH. foliis cordatis basi transversis, caule ob- *Nodosa.*
tus-angulo. *Linn. sp.* 619.

Scrophularia nodosa foetida. *Bot. Monf.* 234. *Tour.* 166.

Scrophularia. *Dod. Pempt.* 50.

Scrophularia foliis cordatis oppositis, racemis terminalibus. *Sauv.* 138.

HABITAT à St. Guillin le Désert, Aniane, Villemaigne. Variat foliis cordato-lanceolatis. Racemus ramosissimus.

2. SCROPH. foliis cordatis petiolatis decurrentibus, *Aquatica.*
caule membranis angulato, racemis terminalibus.
Linn. sp. 620.

Scrophularia aquatica major. *Bot. Monf.* 234. *Tour.* 166.

Betonica aquatica. *Dod. Pempt.* 50.

304 DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

Scrophularia foliis oppositis ex elliptico-decrescentibus, caule & ramo paniculatis nudisque spicis terminalibus. *Sauv.* 138.

La Scrophulaire aquatique; vernaculè, *l'Herbe daouï siége.*

HABITAT in aquis; à *Castelnau, Lattes, & dans le Verdanson.*

Scorodonia. 3. SCROPH. foliis cordatis duplicato-serratis, racemo composito. *Linn. sp.* 620.

Scrophularia foliis oblongo-cordatis oppositis inæqualiter serratis, racemo composito. *Sauv.* 138.

Scrophularia melissæ folio. *Tour.* 166.

HOSPITATUR sub dio. Corollæ superius labium coloratum, inferius albicans.

Vernalis. 4. SCROPH. foliis cordatis, pedunculis axillaribus solitariis dichotomis. *Linn. sp.* 620.

Scrophularia flore luteo. *Tour.* 166.

Scrophularia foliis oppositis cordatis, pedunculis solitariis lateralibus multifloris. *Sauv.* 119. & 166.

Scrophularia montana maxima latifolia, flore luteo. *Barr. Ic.* 273.

HABITAT à *Lesperou, St. Guillin le Désert.* Caulis fistulosus cubitalis hispidus. Folia duplicato-serrata. Pedunculi longitudine foliorum compressi, triflori quadriflorive. Corollæ globosæ ferè clausæ. Odor foetidus. Floret martio.

Canina. 5. SCROPH. foliis pinnatis, racemo terminali nudo, pedunculis bifidis. *Linn. sp.* 621. *Sauv.* 247.

Scrophularia ruta canina dicta. *Bot. Mons.* 224. *Tour.* 167.

HABITAT à *Castelnau, la Verune, la Peissine, Lamousson.*

Peregrina. 6. SCROPH. foliis cordatis, superioribus alternis, pedunculis axillaribus bifloris. *Linn. sp.* 621. *Sauv.* 116.

Scrophularia urticæ folio. *Bot. Mons.* 234. *Tour.* 166.

HABITAT in humidis & umbrosis. Glaberrima.

DIGITALIS.

Char. prim. *Vid. Linn. gen. pl.* 614.

Char. secund. *Rad.* napiformis, radiculis lateralibus fibrosis. *Caul.* herbacea teres simplex. *Fol.* alterna sessilis simplex subintegerrima. *Flor.* terminalis

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 305

terminalis racemosa secunda. Fulc. bractea ad basim floris cujuslibet.

1. DIGIT. calycinis foliolis ovatis acutis, corollis obtusis, *Purpurea.*
labio superiore integro. *Linn. sp. 621.*
Digitalis purpurea, folio aspero. Tour. 165.
Digitalis foliolis calycinis acuminatis. Sauv. 66.
La Digitale, ou Gants de Notre-Dame.
HABITAT à Lesperou.
2. DIGIT. calycinis foliolis lanceolatis, corollis acutis, *Lutea.*
labio superiore bifido. *Linn. sp. 622.*
Digitalis foliolis calycinis lanceolatis. Sauv. 66.
Digitalis major lutea, sive pallida, parvo flore. Bor.
Monf. 86. Tour. 165.
HABITAT cum priori. Altitudo sesquipedalis. Caulis
striatus. Folia oblonga lanceolata semi-amplexicaulia
denticulata glabra. Bractæ foliaceæ ovatæ acumi-
natæ.

BIGNONIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 615.

Char. secund. Rad. horizontalis funiformis stolonifera. Caul. fruticosa flexuosa radicans. Fol. opposita impari-pinnata, foliolis simplicibus integris sessilibus oppositis. Flor. terminalis aggregata. Fulc. nulla.

1. BIGN. foliis pinnatis, foliolis incis, geniculis radica- *Radicans.*
tis. *Linn. sp. 624.*
Bignonia Americana fraxini folio, flore amplo phœ-
niceo. Tour. 164.
Gelseminum hederaceum Indicum. Barr. Ic. 59.
La Bignone.
HOSPITATA sub dio. Horti regii parietes scandit.
Rami teretes glabri. Calyx coloratus rubens carno-
sus, facie punicea granati. Corollæ calycibus triplo
maiores. Semina nunquam maturans.

LANTANA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 632.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. fruticulosa tetragona. Fol. simplex integra petiolata, opposita vel terna. Flor. axillaris pedunculata spi-

cata vel spicato-capitata. *Fulc.* bractæ ad basim calycum solitariae (aculei in una specie supra caulem.)

- Trifolia*. 1. LANT. foliis ternis, spicis oblongis imbricatis. *Linn. sp.* 626.

HOSPITATUR in hybernaculo. Folia rugosa dentata ovata. Petioli breves. Flores dilute carnei. Variat foliis oppositis.

- Spinosa*. 2. LANT. foliis oppositis, caule aculeato ramoso, floribus capitato-umbellatis. *Linn. sp.* 627.

Myrobatindum viburnifolium spinosum, floribus coccineis. *Vaill. Act.* 1722. p. 276.

HOSPITATUR in hybernaculo. Sempervirens. Priori altior. Aculei nulli in tenella planta. Apparent tantum secundo anno (in adulta.) Pedunculi longitudine foliorum. Flores miniat. Utraque species femina maturans. Petioli multo longiores quam in priori.

CAPRARIA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 636.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* teres ramosa fruticulosa. *Fol.* alterna sessilis simplex integra. *Flor.* axillaris geminata pedunculata. *Fulc.* nulla.

- Biflora*. 1. CAPR. foliis alternis, floribus geminis. *Linn. Syst.* 1116.

Ageratum Americanum folio & facie rapunculi. *Tour.* 652.

Le Thé de Curaçao.

HOSPITATUR in caldario. Sempervirens, semperflorens. Folia ovali-lanceolata serrata. Pedunculi breves. Flores albi. Variat floribus pentandris.

ERINUS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 619.

Char. secund. *Rad.* ramosa rigida. *Caul.* herbacea ramosa procumbens. *Fol.* alterna sessilis simplex integra. *Flor.* terminalis racemosa. *Fulcr.* bractea foliacea ad basim floris cujuslibet.

1. ERIN. floribus racemosis. *Linn. sp. 630. Sauv. 116. Alpina.*
Ageratum alpinum glabrum flore purpureo. Tour.
651.
2. *Ageratum flore albo, minus saxatile. Barr. Icon. 1192.*
HABITAT à Lesperou. Cauliculi triunciales glabri. Fo-
lia obversè-ovata seu spathulata, apice serrata. Brac-
teæ ovatæ longitudine florum.

L I N N Æ A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 624.*

Char. secund. *Rad. horizontalis stolonifera. Caul.*
herbacea simplicissima teres. Fol. opposita sub-
sessilibus simplex integra. Flor. terminalis gemit-
nata. Fulc. bractea gemina ad basim florum,
opposita minima.

1. LINN. floribus geminatis. *Linn. sp. 631. Sauv. 137. Borealis.*
Seg. ver. 1. p. 183.

Campanula serpyllifolia, Tour. 111.

La Linnée.

HABITAT entre Lesperou & Meyrueis. Cauliculi vix
triunciales glaberrimi stricti, oppositionibus folio-
rum duabus tribusve; cæterum nudi, apice biflori.
Folia inferioris oppositionis minora orbiculata; cæ-
tera majora ovata serrulata, foliis lysimachiz te-
nellæ simillima.

Obs. In horto regio nondum fuit demonstrata; attamen utpotè in agro Monspessulano nuper detecta, ipsius locum natalem, characteresque proprios botanophulis assignare necessarium putavimus. Occurrit etiam in monte *Lespinouse près de Lamalou*; cum pediculari rostrata.

R U E L L I A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 616.*

Char. secund. *Rad. lignosa. Caul. fruticulosa sub-*
tetragona. Fol. opposita petiolata simplex inte-
gerrima. Flor. axillaris sessilis verticillata. Fulc.
nulla.

1. RUELL. foliis petiolatis, floribus verticillatis subsessilibus. *Linn. sp. 634. Strepens.*

HOSPITATUR in caldario. Petioli brevissimi. Verticilli subquadriflori.

OROBANCHE.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 596.

Char. secund. Rad. funiculiformis. Caul. scaposa. Fol. nulla. Flor. terminalis spicata. Fulc. bractearum imbricarum foliacearum scapo adpressarum; aliarum ad basim florum, solitariae.

Lavis. 1. OROB. scapo laevi simplicissimo, staminibus exsertis. Linn. sp. 632.

Orobanche caule simplici caeruleo, bracteis brevibus. Sauv. 4.

Orobanche magna purpurea Monspessulana. Bot. Monf. 195.

HABITAT à Gramont, Lavalette, Castelnau.

Obs. Utrum synonymia Magnolii ad hanc pertineat, dubitamus; nam *orchidem abortivam* seu *limodorum austriacum* Clusii designasse, nobis visus est.

Major. 2. OROB. scapo pubescente simplicissimo, staminibus inclusis. Linn. sp. 632.

Orobanche caule simplici, bracteis longioribus. Sauv. 5.

Orobanche 1^a. Bot. Monf. 195.

Orobanche major garyophyllum olens. Tour. 176.

HABITAT cum superiori.

Ramosa. 3. OROB. scapo ramoso, corollis quinquefidis. Linn. sp. 633. Sauv. 4.

Orobanche subcaeruleo flore sive 2^a. Bot. Monf. 197. Tour. 176.

4. Orobanche minor purpureis floribus, sive ramosa. Bot. Monf. 197. Tour. 176.

HABITAT à Lattes, Laverune. Scapus flavescens. Bractearum pauciores. Flores minores, obvallati bracteis purpurascens.

VITEX.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 634.

Char. secund. Rad. ramosa lignosa. Caul. arboorea. Fol. opposita petiolata quinata, foliolis inaequalibus integerrimis. Flor. terminalis verticillato-spicata. Fulc. nulla.

1. **VITEX** foliis digitatis, spicis verticillatis. *Linn. sp. Agnus castus.*
638.

Vitex latiore folio. Tour. 603.

Elæagnus Theophrasti, sive vitex agnus castus. Lob. Icon. 2. 138.

2. **Vitex** serrato folio. *Lob. Icon. 2. 139.*

Vernaculé, l'Aoubre de Pébre.

HOSPITATUR sub dio. Rami foliaque subnuds incana glaberrima lanceolata quina vel septena. Spicæ verticillis octo vel novem subglobosis. Variat foliolis ad apicem serratis.

ACANTHUS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 540.*

Char. secund. *Rad.* fusiformis ramosa. *Caul.* scaposa teres multiflora. *Fol.* radicalis sinuato-pinnatifida semi-amplexicaulis. *Flor.* terminalis spicata. *Fulc.* bractæe solitariae ad quemlibet florem. (Spinulæ supra ferraturas foliorum & bractearum, in unâ specie.)

1. **ACANTH.** foliis sinuatis inermibus. *Linn. sp. 639. Mallia.*
Sauv. 278.

Acanthus sativus sive mollis Virgilii. Bot. Monf. 2. Tour. 176.

L'Acante, ou Branc-ursine.

HABITAT à Salafon à gauche, & à Nîmes. Foliola calycis binæqualia, superiore & inferiore latioribus, lateralibus utrinque duobus minoribus angustioribusque.

2. **ACANTH.** foliis spinosis pinnatifidis. *Linn. sp. 639. spinosus.*
Sauv. 278.

Acanthus aculeatus. Tour. 176.

La Branc-ursine épineuse.

HABITAT circà urbem. In utraque specie, filamenta lignosa.

MELIANTHUS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 641.*

Char. secund. *Rad.* lignosa. *Caul.* arborea. *Fol.* alterna semi-vaginata impari-pinnata, foliolis sessilibus integris. *Flor.* axillaris subracemosa.

310 DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

pedunculata solitaria. *Falc.* stipulæ binæ solutæ. Bractææ ad florem quemlibet concavæ solitariae.

Minor. 1. MELIANTH. stipulis geminis distinctis. *Linn. sp.* 639.

Melanthus Africanus. Tour. 431.

Le Méliante.

HOSPITATUR sub dio. Foliola septem vel novem lanceolata acurè dentata subæqualia, stipulæ setacæ.



Classis XV.

TETRADYNAMIA.
SILICULOSA.

MYAGRUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 642.

Char. secund. Rad. napiformis. Caul. herbacea striata ramosa vel simplex. Fol. alterna simplex integerrima integra vel incisa, sessilis vel radicalis petiolata, caulina sessilis. Flor. terminalis spicata vel paniculata. Fulc. nulla.

1. MYAGR. siliculis biarticularis dispermis, foliis ex- *Perenne.*
trorsum sinuatis denticulatis. Linn. sp. 640. Sauv.
280.
Raphanistrum monospermum capsulis striatis tenuibus
& longiusculis. Moris. Hist. 2. 267.
Rapistrum monospermum. Bot. Mons. 219. Tour. 211.
Seg. ver. 1. p. 368.
HABITAT in arvis. Variat foliis lanceolatis vel lyrato-
pinnatifidis. Siliculæ subseffiles.
2. MYAGR. siliculis cordatis subseffilibus, foliis ample- *Perfoliatum.*
xicaulibus. Linn. sp. 640. & Sauv. 77.
Myagr. monospermum latifolium. Seg. 1. p. 369.
Tour. 211.
Myagr. monospermum. B. Hist. 894. Tom. II.
HABITAT cum priori; à Lattes, Laverune. Siliculæ
pedunculo brevissimo.
3. MYAGR. siliculis ovatis pedunculatis polyspermis. *Sativum.*
Linn. sp. 641.
Myagr. sylvestre seu camelina. B. Hist. 2. p. 892.
Alyssum segetum foliis auriculatis acutis. Tour. 217.
Myagr. sativum. Bot. Mons. 180.
Myagr. siliculis obversè ovatis pedunculatis. Sauv. 77.
La Cameline.
HABITAT in sabulosis ultra amnem. A Castelnau, Sa-
lason. Folia lineari-lanceolata semi-amplexicaulæ
denticulata.

312 TETRADYNAMIA SILICULOSA.

*Panicula-
tum.* 4. MYAGR. filiculis globosis compressis punctato-rugosis. *Linn. sp.* 641.

Rapistrum arvense folio auriculato acuto. *Tour.* 211.

Myagro affinis herba capitulis rotundis. *Bot. Monf.* 180.

Myagro similis filiqua rotunda. *Seg. Tem. 1. p.* 368.

HABITAT cum prioribus.

Saxatile. 5. MYAGR. filiculis lentiformibus obovatis glabris, foliis lanceolatis serratis. *Linn. Syst.* 1126.

Cochlearia foliis radicalibus lanceolatis serratis, caulinis linearibus. *Linn. sp.* 648.

Thlaspi alpinum minus capitulo rotundo. *Bot. Monf.* 251.

Cochlearia perennis saxatilis minima. *Hort. Monf.* 59.

Alyssum alpinum foliis circa radicem subovatis serratis in orbem circumactis. *Seg. ver. 1. p.* 378.

HABITAT à Gramont, & cum prioribus. Altitudo semi-pedalis. Caulis subsimplicissimus. Variat foliis caulinis lineari-hastatis amplexicaulibus.

V E L L A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 654.

Char. secund. Rad. napiformis vel lignosa ramosa. Caul. ramosa herbacea vel fruticulosa. Fol. alterna sessilis simplex integerrima vel pinnatifida. Flor. racemosa oppositifolia vel terminalis. Fult. nulla.

Anna. 1. VELLA racemis oppositifoliis, foliis bipinnatifidis.

Vella folus pinnatifidis, filiculis pendulis. *Linn. sp.* 641.

Vella. *Sauv.* 280. 254.

HOSPITATUR sub dio. Tota pilis rigidis hispida. Lacinie foliorum lineares. Racemi foliis longiores.

Floret februario & aprili.

*Pseudo cyst.
fuit.* 2. VELLA racemis terminalibus, foliis carnosis obovatis ciliatis integerrimis.

Vella foliis integris, filiculis erectis. *Linn. sp.* 641.

Cyusi facie alysson fruticans. *Lob. Icon.* 1. 49.

HOSPITATUR in hybernaculo. Folia veluti spinulis ciliata. Variat floribus quibusdam (in tenella planta) axillaribus, vagis, solitariis.

ANASTATICA.

Char. prim. $\frac{1}{2}$ Vid. Linn. gen. pl. 643.

Char. secund. *Rad.* napiformis. *Caul.* lignosa
ramosa. *Fol.* alterna sessilis integerrima. *Flor.*
axillaris solitaria sessilis. *Fulcr.* nulla.

1. ANAST. Linn. sp. 641.

Hierocunthica.

Thlaspi rosa de Hiericho dictum. Tour. 213.

La Rose de Jéricho.

HOSPITATUR sub dio. Vix palmaris, ad basim ra-
mosa, pubescens. Folia carnosae spathulata vel ovata,
apice subcrenata. Flores albi. Semina saepius utrin-
que bina.

DRABA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 653.

Char. secund. *Rad.* napiformis tenuis. *Caul.* sca-
posa vel foliosa simplex. *Fol.* alterna simplex
integra, radicalis petiolata caulina sessilis. *Flor.*
terminalis racemosa. *Fulc.* nulla.

1. DRABA scapo ramoso, foliis lineari-lanceolatis den- *Verna,*
tatis.

Draba caulibus nudis, foliis incis. Linn. sp. 642.

Draba scapis nudis, foliis subserratis. Linn. Syst. 1127.

Alysson vulgare polygoni folio, caule nudo. Tour. 217.

Seg. ver. 1. pag. 375. tab. IV. fig. 3.

Bursa pastoris minor loculo oblongo. Bot. Mons. 43.

HABITAT in arvis, à *Boutonet*, *Castelnau*. Triuncialis. Folia ad apicem denticulata.

2. DRABA caule ramoso, foliis cordatis dentatis amplexicaulibus. *Linn. sp.* 642. *Muralis.*

Bursa pastoris major loculo oblongo. Bot. Mons. 43.

Myagroides subrotundis serratis foliis, flore albo. Barr.

Icon. 816. Optima.

Draba caule ramosissimo, foliis cordatis amplexicaulibus. Sauv. 118.

Alysson veronicæ folio. Tour. 217.

HABITAT in rupibus humidis & umbrosis. A *Castelnau*, *Lavalette*. Altitudo pedalis. Florum racemi laxi. Folia radicalia ovata, caulina inferiora oblonga, summa cordata. Variat floribus diandris & tetrandris.

314 TETRADYNAMIA SILICULOSA.

Memorata. 3. DRABA caule ramoso, foliis ovatis sessilibus dentatis. *Linn. sp.* 643.

Alyssum alpinum polygoni folio. *Tour.* 217.

HABITAT à Prades & à Rouquet, vers le bois de Valenc. Altitude prioris.

Inermis. 4. DRABA foliis caulinis numerosis incanis, siliculis obliquis. *Linn. sp.* 643. *Sauv.* 93. Absque synonymia Tournefortii.

HABITAT cum priori, & an Capouladou.

LEPIDIUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 645.

Char. secund. Rad. napiformis. Caul. scaposa ramosa vel foliosa. Fol. radicalis vel caulina alterna sessilis vel petiolata, vel inferior petiolata, superior sessilis, nunc simplex integerrima integra vel incisa, nunc impari-pinnata, vel etiam inferior pinnata, superior simplex multifida. Flor. racemosa radicalis aut caulina. Fulc. nulla.

Nudicaule. 1. LEPID. scapo nudo subsimplicissimo, floribus tetrandris. *Linn. Syst.* 1127.

Nasturtium minimum vernum foliis tantum circa radicem. *Bot. Mons.* 187. tab. 186. *Tour.* 214.

Thlaspi minus Monspeliensium. *Bauh. Pin.* 108.

Lepidium foliis filiformibus, apice pinnatifidis, caule nudo. *Sauv.* 228. & 281.

HABITAT à Castelnau, Gramont, sous la Citadelle; in arenosis. Scapus vix triuncialis rigidus glaber. Variat scapo foliis duobus tribusve instructo.

Procumbens. 2. LEPID. foliis pinnatifidis, extremo majore, scapo nudo, caulibus prostratis racemiferis. *Linn. Syst.* 1127.

Lepidium foliis pinnatis, impari majore, caule procumbente. *Sauv.* 228. *Linn. sp.* 643.

Nasturtium pumilum supinum vernum. *Bot. Mons. Icon.* 184. p. 125. *Tour.* 214.

HABITAT cum priori. Variat caule folioso.

Cardamine. 3. LEPID. foliis radicalibus pinnatis, caulinis lyratis. *Linn. Syst.* 1127.

HOSPITATUR sub dio. Caulis sesquipedalis ramosus. Folia radicalia pinnata, foliolis septem vel novem

TETRADYNAMIA SILICULOSA. 315

subcordatis integerrimis glaucis, impari majore. Folia caulina sessilia semi-amplexicaulia multo minora. Flores albi subpaniculati, sæpè tetrandri. Folia summa simplicia dentata.

4. LEPID. foliis pinnatis integerrimis, petalis emarginatis calyce minoribus. *Linn. Syst. 1127. sp. pl. 644. Petraem.*

Lepidium foliis pinnatis, pinnis lanceolatis. Sauv. 228.

Nasturtium pumilum vernum. Bot. Mons. 183. Tour. 214. seg. 1. 371. n° 1.

HABITAT cum superioribus & secus amnem; à Montferrier, Lavilette.

5. LEPID. floribus tetradynamis, foliis oblongis multifidis. *Linn. sp. 644. Sationm.*

Nasturtium horrense. Tour. 213.

Lepidium foliis oblongis multifidis. Sauv. 234.

Le Cresson aenois, ou Nasitor; vernaculè, leu Nasitor.

HOSPITATUR sub dio. Variat foliis lanceolatis vel obovatis dentatis simplicibus & summis apice tantum dentatis. Altitudo bipedalis.

6. *Lepidium foliis ovato-lanceolatis integris serratis. Latifolium. Linn. sp. 644.*

Lepidium latifolium. Bot. Mons. 153. Tour. 216.

HABITAT au Verdanson, Lavanet, Sellèneuve. Caulis glaber ramosissimus priori altior. Folia sessilia glaberrima. Racemi plurimi ex alis superioribus.

7. LEPID. floribus diandris apetalis, foliis radicalibus dentato-pinnatis, ramiferis linearibus integerrimis. *Linn. sp. 645. Ruderals.*

Lepidium foliis imis pinnato-multifidis, summis integris perangustis. Sauv. 254.

Thlaspi minus hortense osyridis folio. Lob. Icon. 214. Pessima Icon insufficiens.

HABITAT in maritimis & in sabulosis, vers la source du Lés, à Prades.

8. LEPID. floribus diandris tetrapetalis, foliis inferioribus serratis lanceolatis, superioribus linearibus integerrimis. *Linn. sp. 645. Sauv. 72. O' 93. Iberis.*

Lepidium gramineo folio seu iberis. Tour. 216.

Iberis latiore folio. Bot. Mons. 139.

La Passerage.

HABITAT supra muros & ad viarum, agrorum margines. Datur floribus tetrandris, tetradynamisque:

316 TETRADYNAMIA SILICULOSA.

foliis radicalibus spathulatis apice serratis, sæpè etiam lyrato-pinnatifidis.

THLASPI.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 648.

Char. secund. Rad. napiformis. Caul. herbaceus simplex vel ramosus. Fol. simplex integerrima integra vel incisa, radicalis petiolata, caulina sessilis. Flor. terminalis racemosa. Fulc. nulla.

- Peregrinum.* 1. THLASPI filiculis suborbiculatis, foliis lanceolatis integerrimis. Linn. sp. 645.
Thlaspi capsula cordata peregrinum. Tour. 212.
HOSPITATUR sub dio.
- Arvense.* 2. THLASPI filiculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris. Linn. sp. 646.
Thlaspi arvense filiquis latis. Tour. 212.
HOSPITATUR sub dio. Caulis glaber pedalis. Flores longè pedunculati. Folia caulina semiamplexicaulia.
- Saxatile.* 3. THLASPI filiculis ellipticis, foliis lanceolato-linearibus integerrimis. Sauv. 53. 71. Linn. sp. 646.
Thlaspi parvum saxatile flore rubente. Bot. Mons. 252.
Tour. 212. Seg. 1. 370.
Thlaspi filiculis subrotundis, foliis lanceolato-obtusis integerrimis carnosiss. Linn. Syst. 1128.
Thlaspi montanum pingui folio, carneo flore. Barr. Icon. 845.
HABITAT au Capouladou, à St. Guillin le Désert. Altitudinem sesquiuncialem attingit. Occurrit à Grabels, Viols.
- Perfoliatum.* 4. THLASPI filiculis subrotundis, foliis amplexicaulibus cordatis subserratis. Linn. sp. 646.
Thlaspi foliis imis petiolatis; reliquis amplexicaulibus cordatis. Sauv. 110.
Thlaspi arvense perfoliatum majus. Bot. Mons. 252.
Tour. 212. Seg. 1. 370.
Thlaspi cordatum minus flore albo insipidum. Barr. Icon. 815.
HABITAT à Selleneuve, Boutonnet, Castelnau. In umbrosis.
- Hirum.* 5. THLASPI filiculis subrotundis pilosis, foliis caulinis sagittatis hirsutis. Linn. sp. 646. Sauv. 120.

TETRADYNAMIA SILCULOSA. 317

Thlaspi villosum capsulis hirsutis. *Bot. Monf.* 250.
Tour. 212.

HABITAT à la Colombiere, Lavalette, Montferrier.
Palmaem raro attingit altitudinem.

6. *THLASPI* filiculis subrotundis, foliis sagittatis den- *Campestre.*
tatis incanis. *Linn. sp.* 646. *Sauv.* 78.

Thlaspi vulgatus. *Tour.* 212. & alterum. *Dod. pempt.*
700.

9. *Thlaspi arvense vaccariae* incano folio, minus. *Bot.*
Monf. 251. *Tour.* 212.

HABITAT à Prades, Rouquet, Viols.

7. *THLASPI* filiculis orbiculatis, foliis radicalibus cu- *Montanum.*
neiformibus integerrimis. *Linn. sp.* 647.

Bursa pastoris montana globulariae folio. *Tour.* 216.

Thlaspi Alpinum bellidis folio. *Bot. Monf.* 305.

Thlaspi montanum bellidis folio, flore albo. *Barr.*
Icon. 861.

Thlaspi subrotundo folio, utriculo gruinali. *Barr.*
Icon. 1305. n^o. 2.

HABITAT cum priori, & à Cette derriere la montagne.
Raro palmaem superat altitudinem. Flores calyci-
bus triplo majores. Occurrit à Valene, Rouquet.

8. *THLASPI* filiculis obcordatis, foliis radicalibus pin- *Bursa pastoris*
natifidis. *Linn. sp.* 647.

Bursa pastoris major folio sinuato. *Bot. Monf.* 43.
Tour. 216.

Thlaspi filiculis obcordatis. *Sauv.* 281.

Le Tabouret ou Bourse à Berger.

HABITAT in arvis. Mirè varians ex loco.

C O C H L E A R I A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 646.

Char. secund. *Rad.* napiformis. *Caul.* herbacea
ramosa. *Fol.* simplex integerrima integra vel
incisa, radicalis petiolata, caulina sessilis. *Flor.*
racemosa axillaris & terminalis. *Fulc.* nulla.

1. *COCHL.* foliis radicalibus subrotundis, caulinis ob- *Officinalis.*
longis sinuatis. *Linn. sp.* 647.

Cochlearia folio subrotundo. *Tour.* 215.

L'herbe aux Cuilliers.

HOSPITATUR sub dio. Folia succulenta. Radicalia
saepè cordata.

318 TETRADYNAMIA SILICULOSA.

- Draba*. 2. COCHL. foliis lanceolatis amplexicaulibus dentatis.
Linn. Syst. 1129.
Lepidium (*draba*) foliis lanceolatis.... *Linn. sp.* 645.
Sauv. 78. & 120.
Lepidium humile incanum arvense. *Tour.* 216.
Draba umbellata vel draba major capitulis donata.
Bot. Monf. 86.
La Drave, espèce de passérage.
 HABITAT in arvis. *A la Peissine, Gramont, aux prés d'Arene, Castelnaud.* Folia caulina saepius sagittato-lanceolata.
- Coronopus*. 3. COCHL. foliis pinnatifidis. *Linn. sp.* 648. *Sauv.* 254-281.
Coronopus Ruellii sive nasturtium verrucosum. *Bot. Monf.* 80.
Nasturtium sylvestre capsulis cristatis. *Tour.* 214.
La Corne de cerf.
 HABITAT in fossis humidis, à Gramont, sous la Citadelle, secus vias. Racemi pauciflori laterales brevissimi.
- Armeracia*. 4. COCHL. foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis incis. *Linn. sp.* 648. *Sauv.* 72. & 78. & 280.
Raphanus rusticus. *Lob. Icon.* 380.
Cochlearia folio cubitali. *Tour.* 215. *Sauv.* 72.
Le grand Raifort sauvage.
 HABITAT in aquis sous la Citadelle.
5. COCHL. foliis caulinis cordato-sagittatis amplexicaulibus. *Linn. sp.* 648. *Sauv.* 78. & 120.
Cochlearia altissima glasti folio. *Tour.* 215.
Lepidium annuum. *Lob. Icon.* 321.
 HOSPITATUR sub dio.

IBERIS.

- Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 647.
- Char. sec. *Rad.* napiformis. *Caul.* herbacea vel fruticulosa, scaposa vel foliosa, *Fol.* alterna simplex integerrima vel pinnato pinnatifida (in quibusdam speciebus succulenta.) *Flor.* terminalis racemoso-corymbosa. *Fulc.* nulla.
- Semperflorans* 1. *IBERIS* foliis cuneiformibus integerrimis obtusis. *Linn. sp.* 648.

TETRADYNAMIA SILICULOSA. 319.

Thlaspidium frutescens folio leucoji , semperflorens.

Tour. 214.

Le Thlaspi ou Taraspi des Jardiniers.

HOSPITATUR sub dio. Folia carnosâ. Rami abscissi novam præbent sobolem , & radices agunt.

2. IBERIS frutescens foliis linearibus acutis integerrimis. *Sempervirens*
Linn. sp. 648.

Thlaspi montanum sempervirens. Tour. 213.

Thlaspi Creticum perenne flore albo. Barr. Icon. 214.

Autre Taraspi.

HOSPITATUR sub dio.

3. IBERIS foliis lanceolatis acuminatis , inferioribus *Umbellata.*
ferratis, superioribus integerrimis. Linn. sp. 649.
Thlaspi Creticum iberidis folio. Barr. Icon. 893. n° 1.
Thlaspi Creticum quibusdam flore rubente & albo.
Tour. 213.

Le Taraspi ou Thlaspi de Candie.

4. Iberis foliis lanceolatis indivisis , corymbis hæmisphæ- *Cretica.*
ricis. Sauv. 72. Linn. sp. 649.

Thlaspi Lusitanicum umbellatum gramineo folio ,
flore purpurascente. Tour. 21.

HABITAT in arvis. 8. *A Montferrier , la source du*
Lés , & au pont de la Lironde.

4. IBERIS foliis lanceolatis acutis subdentatis , floribus *Amarâ.*
racemosis. Linn. sp. 649. Sauv. 72.

Thlaspi umbellatum arvense amarum. Tour. 213.

HABITAT in arvis; à *Castellan , Montferrier , & au-*
dela du Lés. Caulis semipedalis striatus ramosissi-
mus. Florescentia corymbosa ; fructificatio racemosa.

5. IBERIS foliis sinuatis , scapo nudo simplici. *Linn. sp. 650. Nudicaulis.*
Bursa pastoris minor foliis incis. Bor. Mons. 43.

Nasturtium petræum foliis burse pastoris. Bauh. Pin.
104. Tour. 214.

8. Pastoria bursa minima. *Lob. Icon. 221.*

HABITAT in umbrosis arenosis. *A Valmagne , Ville-*
magne. Altitudo lepidii procumbentis.

6. IBERIS foliis linearibus pinnatifidis. *Linn. Syst. 1129. Pinnata.*
cent. 49.

Iberis foliis linearibus apice pinnatifidis. Sauv. 228.
& 281.

Thlaspi alterum umbellatum nasturtii folio Monspe-
liacum. Bauh. Pin. 106.

320 TETRADYNAMIA SILICULOSA.

Thlaspi alterum umbellatum minus folio nasturtii hortenſis. Lob. Icon. 218.

HABITAT cum ib. amara, umbellata. Caulis corymbosus. Florescentia remanet corymbosa ut in ſpecie tertiâ.

ALYSSUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 651. Syſt. nat. 722.

Char. ſec. *Rad.* napiformis. *Caul.* herbacea rigida teres ſimplex vel ramoſa vel ſuffruticulosa. *Fol.* alterna ſeſſilis ſimplex integra vel integerrima. *Flor.* terminalis racemoſa. *Falc.* nulla.

* *Suffruticoſa.*

Spinofum. 1. **ALYSSUM** ramis ſenilibus ſpiniformibus nudis. Linn. ſp. 650. Sauv. 70.

Alyſſum ramis floreis ſenilibus ſpiniformibus nudis. Linn. Syſt. 1129.

Alyſſum frutiçoſum aculeatum. Tour. 217.

Thlaſpi frutiçoſum ſpinofum Narbonenſe. Bot. Menſ. 251.

HABITAT à *Valmagne*, *Leſpinouſe*, *Ganges*. Folia cuneiformia incana glabra.

Saxatile. 2. **ALYSSUM** caulibus fruteſcentibus paniculatis, foliis lanceolatis undulatis integris. Linn. ſp. 650. foliis molliſſimis. Syſt. nat. 1129.

Alyſſum Creticum ſaxatile, foliis undulatis incanis. Tour. cor. 15.

Alyſſum foliis lanceolatis integris, radicibus cauleſcentibus diffuſis, caule paniculato. Sauv. 71.

Thlaſpi luteo leucoji flore. Barr. Icon. 842.

HOSPITATUR ſub dio.

* *Herbacea.*

Clypeatum. 3. **ALYSSUM** caule erecto herbaceo, ſiliculis ſeſſilibus ovalibus, compreſſo-planis, petalis acuminatis. Linn. ſp. 651.

Lunaria leucoji folio, ſiliqua oblonga majori. Tour. 218.

Thlaſpi album leucoji flore & folio, Italicum. Barr. Icon. 911. n^o. 2.

Alyſſon Dioſcoridis. Lob. Icon. 323.

HABITAT

TETRADYNAMIA SILICULOSA. 311

HABITAT ad mare. *A Maguelone*. Sesquipedalis. Folia scabra lanceolata.

4. ALYSSUM caule herbaceo, foliis lanceolatis dentatis, siliculis inflatis. *Linn. sp. 651. Sinuatum.*

Alyssoides incanum foliis sinuatis. *Tour. 213.*

Alysson foliis lanceolatis repando-dentatis. *Sauv. 280.*

HOSPITATUR sub dio.

5. ALYSSUM caule herbaceo erecto, foliis lanceolatis incanis subintegerrimis, siliculis inflatis. *Linn. sp. 651. Creticum.*

Alyssoides fruticosum Creticum, leucoji folio incanum. *Tour. cor. 15.*

HOSPITATUR sub dio. Variat foliis denticulato-sinuatis.

6. ALYSSUM staminibus quatuor dentatis, duobus squama longitudinali, calycibus persistentibus. *Linn. Syst. 1130. Alyssoides.*

Clypeola (*Alyssoides*) siliculis bilocularibus tetraspermis. *Linn. sp. 652. Sauv. 71.*

Alyssum incanum serpylli folio majus. *Tour. 215.*

HABITAT in sterilibus saxosis. *Au mont Saint Loup, Viols, Valene.* Folia scabra punctis prominulis.

Denticuli à latere interno staminum longiorum.

Squama à latere filamenti brevioris.

7. ALYSSUM staminibus terminalibus setis interpositis. *Campestre. Linn. Syst. 1130.*

Clypeola (*campestris*) annua, siliculis bilocularibus dispermis, calycibus persistentibus. *Sauv. 71. Linn. sp. 652.*

Alyssum incanum serpylli folio minus. *Tour. 217.*

Thlaspi alyssum dictum campestre minus. *Bot. Mons. 251.*

Thlaspi alysson incanum. *Barr. Icon. 908. n°. 2.*

Thlaspi alysson incanum luteum, lunato utriculo. *Barr. Icon. 912. n°. 2.*

8. Alysson incanum serpylli folio, fractu nudo. *Tour. 215.*

Thlaspi alysson dictum minus (*capsulis non foliatis.*) *Bot. Mons. 251.*

HABITAT ad agrorum margines. *A Boutonet, sous le Perou, à Lavanet.* Vix palmare, ad basim ramosum.

CLYPEOLA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 650.

Char. secund. *Rad.* tenuis napiformis. *Caul.* teres debilis ramosa. *Fol.* alterna sessilis simplex integerrima. *Flor.* terminalis racemosa. *Fulc.* nulla.

Jonthlaspi. 1. CLYP. siliculis unilocularibus monospermis. Linn. Syst. 1130. sp. 652.

Jonthlaspi minimum spicatum lunatum. Tour. 210.

Thlaspi clypeatum serpylli folio. Bor. Monf. 252.

Thlaspi alterum minus clypeatum serpylli folio. Lob. Icon. 215.

HABITAT à *Boutonnet* suprà muros. A *Castelnau*, *Cau-nalles*, *Monferrier*.

Maritima. 2. CLYP. perennis, siliculis bilocularibus ovatis disper-mis. Linn. sp. 652.

Alyssum maritimum. Tour. 216.

Thlaspi Narbonense centunculi angusto folio. Bor. Monf. 251.

Thlaspi montanum perenne flore albo. Barr. Icon. 844.

HABITAT ad littora maris. Facies lepidii. Folia linea-ria vel linearilanceolata. Caulis diffusus valdè ra-mosus. Petala extus rubent vel dilute rosea, intus alba.

BISCUTELLA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 649.

Char. secund. *Rad.* napiformis. *Caul.* erecta sim-plex teres herbacea. *Fol.* alterna simplex inte-gra, radicalis subpetiolata, caulina sessili-am-plexicaulis. *Flor.* racemosa terminalis. *Fulc.* nulla.

Auriculata. 1. BISCUT. calycibus nectario utrinque gibbis, siliculis in stylum coeuntibus. Linn. sp. 652.

Thlaspidium hirsutum flore calcari donato. Tour. 214.

Jondraba alyssoides lutea angustifolia. Barr. Icon. 230. & 1219.

La Lunetiere.

HOSPITATUR sub dio... è pyrenæis.

Didyma. 2. BISCUT. siliculis orbiculato-didymis à stylo diver-gentibus. Linn. sp. 653. Sauv. 72. 282.

TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 323

Thlaspidium Monspeliense hieracii folio hirsuto. Tour.

214.

Thlaspi parvum hieraciifolium sive lunaria lutea Monspeliaca. Bot. Monf. 252.

Jondraba. Barr. Icon. 900. 253. n^o. 1.

Aure Lunetiere.

HABITAT in arvis & sterilibus. *A Castelnau, Bournet, Lavanet, Caunelles.* Altitudo bipedalis. Caulis pilis rigidis hispidus. Variat foliis lanceolatis vel cuneiformibus, integerrimis vel serratis, pinnatifidisque. Corollæ duplo minores quam in priori.

LUNARIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 652.

Char. secund. *Rad.* napiformis. *Caul.* herbacea teres ramosa. *Fol.* alterna simplex integra, radicalis petiolata, superior sessilis. *Flor.* terminalis racemosa. *Falc.* nulla.

1. LUNARIA siliculis oblongis, foliis cordatis. *Linn. sp. Radicum.* 653.

Lunaria major siliqua oblonga. Tour. 220.

La Lunaire.

HOSPITATUR sub dio. Folia summa acuminata serrata.

Racemi ex alis superioribus, duobus tribusve foliis instructi; radix interdum tuberosa vel fasciculata.

SILIQUOSA.

DENTARIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 659. •

Char. secund. *Rad.* nodosa squamis imbricatis obtecta. *Caul.* teres herbacea simplex. *Fol.* alterna petiolata digitata; foliolis simplicibus integris. *Flor.* terminalis racemosa. *Falc.* nulla.

1. DENT. foliis summis digitatis. *Linn. sp.* 654. *Pentaphyllos.*

Dentaria foliolis septenis, superioribus quinaus. Sauv. 180. & 228.

Dentaria heptaphyllos. Tour. 225.

La Dentaire.

HABITAT à *Lesperou.* Altitudo pedalis. Foliola serrata lanceolata acuminata.

X ij

CARDAMINE.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 660.

Char. secund. *Rud.* tenuis napiformis. *Caul.* herbacea debilis ramosa vel simplex. *Fol.* alterna pinnata foliolis simplicibus subintegerrimis. *Flor.* terminalis racemosa. *Futc.* nulla.

Impatiens. 1. CARDAM. foliis pinnatis, floribus apetalis. *Linn.* sp. 655.

Cardamine annua exiguo flore. *Tour.* 224.

Cardamine foliis pinnatis, pinnis laciniatis. *Sauv.* 255.

HABITAT à *Lesperou & au mont Saint Loup* ad lævam in humidis umbrosis. Luxuriat in labyrintho horti regii. Foliola acuminata incisa sublanceolata. Petala capillaria cito decidua. Variat floribus tetrandris. Altitudinem pedalem sæpius attingit.

Hirsuta. 2. CARDAM. foliis pinnatis, floribus tetrandris. *Linn.* sp. 655. *Sauv.* 229.

Cardamine sylvestris minor italica. *Barr. Icon.* 455.

Cardamine quarta Dalechampii. *Tour.* 224.

Nasturtium aquaticum minus. *Bot. Monf.* 183.

Vernaculè de *Creissous* *sauvages.*

HABITAT juxtà hortorum muros humidos. Foliola sæpius ovata, subcordata integerrima. Petala calycibus majora. Flores albi.

Pratenfis. 3. CARDAM. foliis pinnatis, foliolis radicalibus subrotundis, caulinis lanceolatis. *Linn.* sp. 656.

Cardamine foliis pinnatis, imorum pinnis subrotundis angulosis, superiorum oblongis. *Sauv.* 229.

Cardamine pratensis magno flore. *Tour.* 224.

4. Cardamine pratensis parvo flore. *Tour.* 224.

Nasturtium pratense parvo flore. *Bot. Monf.* 183.

Cardamine caule & foliis hirsutis. *Sauv.* 229.

HABITAT in pratulo à *Gramont* cum gratiola & scilla autumnali. Foliola summa sæpe linearia. Ad altitudinem semipedalem excrescit.

Amara. 4. CARDAM. foliis pinnatis, axillis stoloniferis. *Linn.* sp. 656.

Cardamine flore majore elatior. *Tour.* 224.

Cardamine foliis pinnatis, pinnis angulosis subrotundis. *Sauv.* 229.

HABITAT in aquis; à *Castelnau, Selleneuve.*



CARDAMINE *lunaria* . pag. 324 .

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 325

5. CARDAM. foliis inferioribus ovatis integris, inter- *Resedifolia.*
 medius ternatis, summis pinnatis.
 Cardamine foliis pinnatis, foliolis decurrentibus
 confluentibus. *Linn. sp. 656.*
 Cardamine alpina minor resedæ foliis. *Tour. 225.*
 Cardamine caule procumbente, pinnulis ovatis, cum
 nervo confluentibus. *Sauv. 229.*
 HABITAT in humidis *au mont Saint Loup, à Mont-*
ferrier. Vix palmaris; variat caule ad basim ramoso,
 glabro vel hirsuto. Foliola integerrima.
6. CARDAM. filiculis ellypticeis sinuatis pendulis unulo- *Luzaria.*
 cularibus, foliis bipinnatifidis incisis.
 Cardamine foliis supradecompositis, siliquis unilo-
 cularibus pendulis. *Linn. sp. 656.*
 HOSPITATUR sub dio. Annuæ, glabra, debilis. Folia
 summa sisymbrii sophiæ foliis satis similia; siliculæ
 stylo terminatæ. Corollæ violacæ.

SISYMBRIUM.

Char. prim. Vid. Lin. gen. pl. 666.

Char. secund. *Rad.* napiformis. *Caul.* herbacea
 teres simplex vel ramosa. *Fol.* alterna nunc
 simplex integra vel pinnatifida, nunc impari-
 pinnata; foliolis simplicibus aut incisis. *Flor.*
 nunc terminalis racemosa, nunc axillaris sessilis
 solitaria vel aggregata. *Fulc.* nulla.

* *Siliquis declinatis brevibus.*

1. SISYMB. filiquis declinatis, foliis pinnatis: foliolis *Nasturtium.*
 subcordatis. *Linn. sp. 657.*
Sisymbrium aquaticum. Tour. 226.
Nasturtium aquaticum supinum. Bot. Mons. 183.
Sisymbrium folus pinnatis, foliolis subcordatis. Sauv.
228.
Le Cresson d'eau; vernaculè de Creissous.
 HABITAT in aquis. *Dans le Verdanson, à Lattes, &c.*
2. SISYMB. filiquis declinatis, foliis pinnatis: foliolis *Sylvestre.*
 lanceolatis serratis. *Linn. sp. 657.*
Sisymbrium palustre repens nasturtii folio. Tour. 226.
 HABITAT ubique in humidis.
3. SISYMB. filiquis declinatis oblongo-ovatis, foliis *Amphibium.*
 pinnatifidis serratis. *Linn. sp. 657.*

326 TETRADYNAMIA SILIQUOSA.

- Sisymbrium aquaticum* foliis in profundas lacinias divisis, siliqua breviori. *Tour.* 226.
- Aquaticum.** *Raphanus aquaticus* foliis in profundas lacinias divisis. *Bot. Monf.* 219.
- Sisymbrium* foliis pinnatis, pinnis ferratis, siliqua brevi. *Sauv.* 229.
- Terrestre. β.** *Sisymbrium* foliis imis integris ovatis ferratis, summis pinnatis. *Sauv.* 229.
- HABITAT** in aquis... β. Ad margines viarum.

* *Siliquis axillaribus sessilibus.*

- Polyceratium 4.** *SISYMB.* siliquis axillaribus sessilibus subulatis aggregatis, foliis repando dentatis. *Linn. sp.* 658. *Sauv.* 283.
- Erysimum polyceratum* five cornicularum. *Bot. Monf.* 92. *Tour.* 228.
- Erysimum alterum.* *Lob. Icon.* 206.
- HABITAT** à Montferrier, Caunelles. Folia sæpè lanceolata denticulata.
- Murale. γ.** *SISYMB.* foliis lyratis denticulatis, siliquis sessilibus. *Linn. sp.* 658.
- Eruca sylvestris minor lutea* bursæ pastoris folio. *Bot. Monf.* 91. *Tour.* 227.
- Sisymbrium* foliis lanceolatis integris ferratis. *Sauv.* 109.
- HABITAT** à la Livonde, Montferrier.

* *Foliis Bipinnatis.*

- Asperum. 6.** *SISYMB.* siliquis scabris, foliis pinnatifidis : pinnis lineari-lanceolatis subdentatis, corollis calyce longioribus. *Linn. sp.* 659. *Sauv.* 283.
- Sisymbrium* foliis pinnatifidis raro dentatis angustissimis. *Sauv.* 255.
- Sisymbrium palustre minus* siliqua aspera. *Tour.* 226.
- Sisymbrium foliorum* pinnis lineari-lanceolatis, raro dentatis, corollis luteis calyce majoribus. *Sauv.* 283.
- Sisymbrium Monspeulanum* siliqua hirsuta aspera. *Bot. Monf.* 242.
- HABITAT** à Lattes, Peraults. Vix palmare, sæpius simplicissimum.
- Sophia. 7.** *SISYMB.* petalis calyce minoribus, foliis decomposito-pinnatis. *Linn. sp.* 659. *Sauv.* 254.

TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 327

Sisymbrium annuum absinthii minoris folio. Tour.

216.

Sophia Chirurgorum. Lob. Icon. 738.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo bipedalis. Florum pedicelli longissimi.

8. SISYMB. foliis pinnato-hastatis flaccidis : foliolis *Altrissimum.* sublinearibus integerrimis, pedunculis laxis. *Linn. sp. 659. Sauv. 229.*

Erysimum angustifolium majus. Bot. Mons. 93. Tour. 228.

HABITAT ad sepium & agrorum margines.

9. SISYMB. foliis pinnato-hastatis dentatis, siliquis *trio.* erectis. *Linn. sp. 659.*

Erysimum foliis lyrato-pinnatis : extimo hastato. Sauv. 284.

Erysimum latifolium majus glabrum. Bot. Mons. 92. Tour. 228.

HABITAT in arvis & viis.

* *Foliis lanceolatis integris.*

10. SISYMB. foliis lanceolatis dentato-serratis caulinis. *Strictissimum.* *Linn. sp. 660. Sauv. 109.*

Hesperis lutea siliquis strictissimis. Tour. 222.

HOSPITATUR sub dio. Radix perennis. Folia laurina glaberrima. Altitudo sesquipedalis.

ERYSIMUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 664.*

Char. secund. Rad. napiformis. Caul. herbacea simplex vel ramosa. Fol. alterna simplex integra vel pinnatifida petiolata vel sessilis. Flor. terminalis racemosa. Falc. nulla.

1. ERYSIM. siliquis spicæ adpressis. *Linn. sp. 660. Officinale. Sauv. 283.*

Erysimum vulgare. Bot. Mons. 92. Tour. 228.

Le Velar ou Tortelle.

HABITAT in arvis. Folia sæpius lyrata, extima lacinia acuminata, siliquæ obscure tetragonæ, brevissimæ, subsessiles.

2. ERYSIM. foliis lyratis, extimo subrotundo. *Linn. Barbarea. sp. 660.*

328 TETRADYNAMIA SILIQUOSA.

Sisymbrium erucæ folio glabro, flore luteo. *Tour.* 226.

Eruca latifolia lutea sive barbarea. *Bot. Monf.* 98.

Barbarea latifolia. *Dod. Pempt.* 700.

L'Herbe de Sainte Barbe, ou l'Herbe au charpentier.

HABITAT in fossis inundatis. *A Lattes.* Folia inferiora in petiolum attenuata, summa semiamplexicaulia; variat foliorum laciniis lateralibus linearibus, extrema laciniata lanceolata.

Alliaria. 3. ERYSIM. foliis cordatis. *Linn. sp.* 660. *Sauv.* 113.

Hesperis allium redolens. *Tour.* 222.

Alliaria. *Bot. Monf.* 8.

L'Alliane.

HABITAT à *Lattes, Castelnau* secus amnem. Altitudo pedalis. Folia petiolata dentata vel crenata. Variat foliis inferioribus reniformibus. Flores albi.

Cheiranthoides. 4. ERYSIM. foliis integris lanceolatis. *Linn. sp.* 661.

des.

Turritis leucopi folio. *Tour.* 224.

Camelina sive *myagrum thlaspi* effigie. *Lob. Icon.* 225.

HOSPITATUR sub dio. Altitudinem pedalem superat. Folia conferta repanda sessilia; nervo foliorum in caulem decurrente. Flores parvi lutei. Siliquæ longè pedunculatæ.

Repandum. 5. ERYSIM. foliis lanceolatis, radicalibus repando-dentatis, siliquis racemosis. *Linn. Sy?* 1133. *amæn. Acad. tom. III. pag.* 415.

HOSPITATUR sub dio. Vix palmare. Folia linearilanceolata. Radix tenuissima.

CHEIRANTHUS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 656.

Char. sec. *Rad.* napiformis. *Caul.* teres ramosa herbacea vel fruticulosa. *Fol.* alterna sessilis simplex integerrima vel integra. *Flor.* terminalis racemosa. *Fulc.* nulla.

Erysimoides. 1. CHEIR. foliis lanceolatis dentatis, caule erecto, siliquis tetragonis. *Linn. sp.* 661.

Hesperis leucopi folio non serrato, siliqua quadrangula. *Tour.* 223.

Leucopum. *Allien. Ped. tab. VIII. fig.* 2.

HOSPITATUR sub dio. Nervi foliorum decurrunt in caulem. Flores coloris sulphurei, odoris suavissimi, floribus cheiranthi hortensis paulo majores.

TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 329

2. CHEIR. foliis lanceolatis acutis glabris, ramis angulatis. *Cheiri.*
latis. *Linn. Syst.* 1133. *sp.* 661.
Leucojum luteum vulgare. Bot. Monf. 154. *Tour.* 221.
Cheiranthus foliis lanceolatis acutis glabris. Sauv. 73.
3. Erysimum foliis serratis lanceolatis. *Sauv.* 109.
Le Violier jaune; vernaculé, le Violier jaune.
HABITAT supra muros antiquos.
3. CHEIR. foliis lanceolatis integerrimis obtusis incanis, *Incans.*
siliquis apice truncatis compressis, caule suffruticoso. *Linn. sp.* 662.
Leucojum incanum hortense. Tour. 220.
Le Violier ou Geroflée; vernaculé, le Violier.
HABITAT in maritimis.
4. CHEIR. foliis lanceolatis subdentatis obtusis incanis, *Annus.*
siliquis cylindricis apice acutis, caule herbaceo.
Linn. sp. 662.
Leucojum incanum minus. Tour. 221.
Cheiranthus foliis lanceolatis rarius denticulatis obtusis incanis. Sauv. 282.
HABITAT ad mare.
5. CHEIR. foliis linearibus subsinuatis, floribus sessilibus, petalis undatis, caule suffruticoso. *Trunculosus.*
Linn. sp. 662.
Leucojum maritimum angustifolium. Bot. Monf. 154.
Hesperis maritima angustifolia incana. Tour. 223.
Leucojum minus breviori folio, obsoleto flore. Barr.
Icon. 999. n^o. 2.
Cheiranthus (tristis) Linn. Syst. 1134.
HABITAT cum prioribus, à *Peraults, Magnelone.*
6. CHEIR. foliis conferto-capitatis recurvatis undatis. *Fenestralis.*
Linn. Syst. 1134. *sp. pl. app.* 1198.
HABITATUR sub dio. Biennis. Siliquæ ad basin crassiores. Floret tantum secundo anno.

HESPERIS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 657.

Char. sec. *Rad.* napiformis. *Caul.* teres herbacea simplex vel ramosa. *Fol.* alterna sessilis simplex integerrima vel integra, radicalis attenuato-petiolata, superior sessilis. *Flor.* terminalis racemosa. *Falc.* nulla.

1. HESP. caule hispido ramoso patente. *Linn. sp.* 663. *Tristis.*

330 TETRADYNAMIA SILIQUOSA.

- Hesperis. . . . caule procumbente. *Sauv.* 104.
 HOSPITATUR sub dio.
- Matronalis.* 2. HESP. caule erecto simplici, foliis ovato-lanceolatis denticulatis, petalis mucrone emarginatis. *Linn. sp.* 663. *Sauv.* 74. & 104.
 Hesperis hortensis. *Tour.* 222.
La Julienne ou Cassolete; vernaculè, *la Cassoulète, Julienne.*
 HOSPITATUR sub dio.
- Africana.* 3. HESP. caule ramosissimo diffuso, foliis lanceolatis serratis scabris, siliquis sessilibus. *Linn. sp.* 663.
 Hesperis sylvestris parvo flore. *Bot. Mansf.* 127. *Tour.* 223.
 Hesperis caule ramosissimo, foliis lanceolatis, sæpius dentatis. *Sauv.* 74. & 104.
 HABITAT à Selleneuve, & sous le Perou; sed rarior..
 Variat foliis cuneiformibus integerrimis. Flores remoti.
- Provincialis.* 4. HESP. caule ramoso diffuso, siliquis teretibus. *Linn. sp.* 664.
 Leucorum minus lavandulæ folio, obsoleto flore. *Barr. Icon.* 803.
 HOSPITATUR sub dio.
- Verna.* 5. HESP. caule erecto ramoso, foliis cordatis amplexicaulibus serratis villosis. *Linn. sp.* 664.
 Turritis annua verna, flore purpurascens. *Tour.* 224.
 Leucorum rotundifolium minus. *Barr. Icon.* 876.
 HABITAT au mont St. Loup, & in loco dicto *Mont-ferrand*, ultrapagum sic dictum. Facies drabæ muralis.
- Sibirica.* 6. HESP. caule simplici, foliis lanceolatis dentato-serratis, petalis obtusissimis integris. *Linn. sp.* 663.
 HOSPITATUR sub dio. Folia acuminata glaberrima, denticulis alternis minoribus, ut in chenopodio hybrido. Racemi ex alis superioribus plures.

A R A B I S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 663.

Char. sec. *Rad.* napiformis. *Caul.* teres herbacea simplex vel ramosa. *Fol.* alterna simplex integerrima vel integra, radicalis attenuato-petiolata, summa sessilis. *Flor.* terminalis racemosa. *Fulcr.* nulla.

TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 331

1. ARABIS foliis amplexicaulibus dentatis. *Linn. sp.* 664. *Alpina*.
Sauv. 282.
Hesperis ramosa procumbens, foliis tomentosis crenatis amplexicaulibus. Sauv. 74. & pag. 282.
2. Leucojum vernum perenne album majus. *Tour.* 221.
Draba alba siliquosa. Bot. Mons. 87.
Hesperis Alpina sive muralis minor. B. hist. 2. p. 280.
HABITAT à Lesperou. Bipedalis, pubescens. Folia radicalia dentata scabra succulenta livida, sæpius pinnatifida. 4. Folia mollia lanceolato-oblonga tomentosa.
2. ARABIS foliis petiolatis lanceolatis integerrimis ciliis. *Thaliana*.
ris. Linn. sp. 665.
Bursæ pastoris similis siliquosa major. B. hist. 1. 870.
Bot. Mons. 43.
Turritis vulgaris ramosa. Tour. 224.
Draba. Barr. Lon. 869. & 870.
*HABITAT à Castelnau, Lavalette; sponte in ambu-
lacris horti regii provenit. Altitudo sesquipedalis.
Folia radicalia ovata vel lanceolata, quandoque sinuato-dentata; caulina ovata sessilia vel lingulata.*
3. ARABIS foliis amplexicaulibus, siliquis decurvis planis linearibus, calycibus subrugosis. *Linn. sp.* 665. *Turrita*.
Turritis caule simplici, foliis lanceolatis subdentatis glabris. Sauv. 73.
Glaustifolia chicoroides. B. hist. 2. 836.
Brassica sylvestris hispida non ramosa. B. Pin. 112.
edit. 2. & foliis integris hispidis, edit. 1. p. 112.
Leucojum hesperidis folio. Tour. 221.
HABITAT cum specie primâ. Multo minor. Caulis sæpissimè simplex.

T U R R I T I S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 665.

Char. sec. Rad. napiformis. *Caul.* teres herbacea simplicissima. *Fol.* alterna simplex integra, radicalis attenuato-petiolata, caulina semiamplexicaulis. *Flor.* terminalis racemosa. *Fulcr.* nulla.

1. TURRITIS foliis omnibus hispidis, caulinis amplexicaulis. *Hirsuta*.
Linn. sp. 666.
Turritis minor. Bot. Mons. 272. *Tour.* 223.

332 TETRADYNAMIA SILIQUOSA.

Turritis foliis omnibus hispidis. *Sauv.* 72. & 123.
La Tourrette.

HABITAT à la Peissine, Selleneuve, Caunelles, Castelnau, Gramont. Variat folus inferioribus ovatis vel lanceolatis, dentatis aut pinnatifidis. Altitudo pedalis. Siliquæ cauli adpressæ.

BRASSICA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 661.

Char. secund. Rad. napiformis vel orbiculata rapacea. Caul. herbacea simplex vel ramosa. Fol. alterna simplex integerrima vel integra, caulina sessili-amplexicaulis. Flor. terminalis racemosa. Fulc. nulla.

* Stylo obtusiusculo.

Orientalis. 1. BRAS. foliis cordatis amplexicaulibus glabris, radicalibus integerrimis scabris, siliquis tetragonis. Linn. sp. 666.

Brassica campestris perfoliata flore albo. *B. Pin.* 112. luteo. *Sauv.* 117.

Brassica orientalis perfoliata, flore albo, siliqua quadrangula. *Tour. cor.* 16.

Perfoliata napifolia. *Lob. Icon.* 396.

HOSPITATUR sub dio. Ferè pedatis, glabra simplicissima. Folia glaberrima glauca. Variat foliis caulinis ovatis denticulatis.

Napus. 2. BRAS. radice caulescente fusiformi. Linn. sp. 666. *Sauv.* 284.

Napus sativa. *Bot. Monf.* 181.

Napus radice alba. *Tour.* 229.

Le Navet; vernaculè, *lou Nar.*

HABITAT in arvis. Folia radicalia lyrata; caulina cordato-amplexicaulia acuminata. Racemi plures axillares, folio unico vel gemino instructi. Flores lutei laxè racemosi. Filamenta subæqualia. Variat foliis omnibus serratis, radicalibus lanceolatis.

Rapa. 3. BRAS. radice caulescente orbiculari depresso carnosâ. Linn. sp. 666. *Sauv.* 284.

Rapum sylvestre non bulbosum. *Bot. Monf.* 219.

Rapa sylvestris. *Tour.* 229.

La Rave; vernaculè, *la Rave.*

TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 333

HABITAT cum priori. *À la Verune, Pignan.*

4. BRAS. radice caulescente tereti carnosâ. *Linn. sp. 667. Oleracea.*
Brassica radice alba. Tour. 219. & varietates.
Le Chou; vernaculè, le Caoulet.
 HABITAT in hortis.

* *Erucae filiquis stylo ensiformi.*

5. BRAS. foliis dentato-pinnatifidis, caule hispido, si- *Erucastrum;*
 liquis lævibus. *Linn. sp. 667.*
Sisymbrium foliis imis pinnatifidis, aliis longis linearilanceolatis, caule glabro. Sauv. 283.
 6. *Eruca tenuifolia perennis luteo flore. Bot. Monsf. 91.*
Tour. 227.
La Roquette sauvage; vernaculè, la Rouquette sauvage.
 HABITAT in arvis & supra muros.
 6. BRAS. foliis lyratis, caule hirsuto, foliis glabris. *Eruca.*
Linn. sp. 667. Sauv. 284.
Eruca latifolia alba. Tour. 227.
Sisymbrium foliis pinnatifidis, laciniis exterioribus majoribus, caule hirsuto. Sauv. 283.
La Roquette; vernaculè, la Rouquette.
 HABITAT in arvis. Calyx coloratus rubens. Foliola calycina ferè coalita; filamenta apice purpurascencia.

S I N A P I S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 662.*

Char. sec. *Rad. napiformis. Caul. herbacea ramosa teres. Fol. alterna sessilis simplex pinnatifida. Flor. terminalis racemosa. Fulc. nulla.*

1. SINAPIS filiquis multangulis toroso-turgidis rostro *Arvensis.*
 longioribus. *Linn. sp. 668. Sauv. 284.*
Raphanistrum segetum flore luteo vel pallido. Tour.
Rapistrum flore luteo. Bot. Monsf. 219.
La Montarde; vernaculè, la Moustarde.
 HABITAT in arvis.
 2. SINAPIS filiquis tetragonis glabris. *Linn. sp. 668. Nigra.*
Sauv. 284.
Sinapis filiqua latiuscula glabra, semine rufo, sive vulgare. Bot. Monsf. 241.
Sinapis rapi folio. Tour. 227.
Autre Montarde.

334 TETRADYNAMIA SILIQUOSA.

HABITAT à Lattos, Mauguio.

Alba. 3. SINAPIS filiquis hispidis, rostro obliquo longissimo.
Linn. sp. 668. Sauv. 230. & 284.

Sinapis album filiqua hirsuta, semine albo & rufo.
Tour. 227.

HABITAT cum priori, & ad mare.

Lavigata. 4. SINAPIS filiquis lævibus patulis, foliis lyratis glabris, summis lanceolatis, caule lævi. *Linn. Syst. 1136. cent. 57.*

HOSPITATUR sub dio. Altitudo bipedalis. Siliquæ longissimæ. Variat foliis omnibus lyratis.

R A P H A N U S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 658.*

Char. sec. *Rad. napiformis. Caul. herbacea teres ramosa. Fol. alterna simplex pinnatifida, inferior petiolata, summa sessilis. Flor. racemosa terminalis. Fulc. nulla.*

Sativus. 1. RAPH. filiquis teretibus torosis bilocularibus. *Linn. sp. 669. Sauv. 285.*

Raphanus minor oblongus. *Tour. 229.*

2. Raphanus radice suborbiculata tuberiformi.
Le Raifort; vernaculè, leu Rabé, β. Le Radi.

HABITAT in hortis.

Raphanistrum. 2. RAPH. filiquis teretibus articulatis lævibus unilocularibus. *Linn. sp. 669.*

Raphanistrum filiqua articulata glabra majore. *Tour. 229.*

Rapistrum flore albo, filiqua articulata. *Bot. Mons. 219. Le Raifort sauvage.*

HABITAT in arvis. A Boutonnet, Selleneuve.

B U N I A S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 655.*

Char. sec. *Rad. napiformis. Caul. herbacea teres ramosa. Fol. alterna simplex pinnatifida sessilis, radicalis attenuato-petiolata (in unâ specie fuculenta.) Flor. terminalis racemosa. Fulc. tubercula supra capsulas & in totâ plantâ (in quibusdam speciebus.)*

TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 335

1. BUNIAS filiquis tetragonis : angulis bicristatis. *Linn. Erucago.*
sp. 670.
Bunias foliis antrorsum sinuatis. *Sauv. 285.*
Erucago segetum. *Tour. 232.*
Erucago Monspeliaca filiqua quadrangula echinata.
Bot. Monf. 91.
La Masse au bedeau.
HABITAT in arvis & in sterilibus. *A Castelnau, Bour-
ronet, Lavalette, & variat foliis pinnatifidis, lan-
ceolatis vel lyratis.*
2. BUNIAS filiquis ovatis gibbis verrucosis. *Linn. sp. Orientalis.*
670.
Crambe orientalis dentis leonis folio erucaginis facie.
Tour. Cor. 14.
Crambe foliis pinnato-hastatis. *Sauv. 281.*
HOSPITATUR sub dio. Variat foliis lanceolatis inte-
gerrimis. Altitudo pedalis; filiquæ patulæ subglobo-
sæ, apice recurvo, latere altero ventricosiore.
3. BUNIAS filiquis ovatis lævibus ancipitibus. *Linn. sp. Cakile.*
670.
Crambe foliis succulentis linearibus pinnato-den-
tatis. *Sauv. 280.*
Raphanus filiquis ovatis angularis monospermis. *Sauv.*
285.
Cakile maritima folio ampliori & angustiori, fructu
hastæformi. *Tour. Cor. 49.*
Eruca maritima Italica, filiqua hastæ cuspidi simili.
Bot. Monf. 92. Bauh. Prod. pag. 40.
La Roquette de mer.
HABITAT ad mare. Datur filiquis tetragonis basi den-
tatis. Folia carnosæ.

I S A T I S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 668.*

Char. secund. *Rad. napiformis. Caul. herbacea
teres ramosa. Fol. alterna simplex integra, ra-
dicalis petiolata, caulina sessilis amplexicaulis.
Flor. terminalis racemoso-corymbosa. Fulc.
nulla.*

1. ISATIS foliis radicalibus crenatis : caulinis sagittatis, *Tinctoria.*
filiquis oblongis. *Linn. sp. 670.*

336 TETRADYNAMIA SILIQUOSA.

Isatis syvestris. *Tour.* 211. *Sauv.* 78. & 120.

Le Pastel ou la Guède.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo bipedalis; caulis glaberrimus. Racemi alterni plures.

C R A M B E.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 667.

Char. secund. *Rad.* napiformis. *Caul.* herbacea teres ramosa. *Fol.* alterna simplex pinnatifida sessilis vel petiolata. *Flor.* terminalis racemosa. *Falc.* nulla.

Maritima. 1. CRAMBE foliis cauleque glabris. *Linn. sp.* 671. *Sauv.* 119.

Crambe maritima brassicæ folio. *Tour.* 211.

Le Chou marin.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo tripedalis. Folia magna sinuato-pinnatifida.

Orientalis. 2. CRAMBE foliis scabris, caule glabro. *Linn. sp.* 671. Crambe foliis & foliolis alternatim pinnatifidis. *Sauv.* 254. & 280.

Rapistrum orientale acanthi folio. *Tour. Cor.* 14.

HOSPITATUR sub dio. Folia majora quam in priori, lanceolata pinnatifida. Altitudo prioris & major. Caulis & racemi, ramosi. Flores albi.

Hispanica. 3. CRAMBE foliis cauleque scabris. *Linn. sp.* 671. Crambe foliis subcordatis crenatis scabris. *Sauv.* 119. Rapistrum maximum rotundifolium monospermum. *Tour.* 211.

Rapistrum maximum monospermum flore luteo. *Barr. Icon.* 387.

HOSPITATUR sub dio. Caulis vix pedalis. Variat foliis lyratis, extimo cordato majori. Petioli longitudine foliorum angulati. Folia omnia petiolata, summa brevissimo petiolo donata.

C L E O M E.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 669.

Char. secund. *Rad.* napiformis. *Caul.* herbacea teres simplex vel ramosa *Fol.* alterna digitata, foliolis integerrimis sessilibus, petiolata, summa sessilis *Flor.* axillaris solitaria pedunculata. *Falc.* nulla.

1. CLEOME

1. CLEOME floribus gynandris, foliis digitatis. *Linn. Gynandra.*
sp. 671.

Synapistrum Ægyptiacum heptaphyllum, flore carneo, majus. *Tour. 231.*

HOSPITATUR sub dio. Folia longè petiolata. Foliola utrinque acuminata ovalia, inferiora minora. Folia ad basim cujuslibet pedunculi ternata subsessilia vel simplicia.

2. CLEOME floribus hexandris, foliis ternatis: foliolis *Ornithopodi*
 ovali-lanceolatis. *Linn. sp. 672.* *divides.*

Synapistrum orientale triphyllum, ornithopodii filiquis. *Tour. 231.*

HOSPITATUR sub dio. Pedunculi longitudine petiolorum. Folia floralia inferiora petiolata, summa sessilia.



Classis XVI.

MONADELPHIA

PENTANDRIA.

HERMANNIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 670.

Char. secund. *Rad.* ramosa lignosa. *Caul.* fruticosa teres ramosa. *Fol.* alterna petiolata simplex integra. *Flor.* axillaris pedunculata, pedunculis solitariis multifloris. *Fulc.* stipulæ geminæ solutæ integerrimæ. Bractea infra florem quemlibet, foliacea integerrima.

Hyssopifolia. 1. HERM. foliis cuneiformibus apice serratis, pedunculis trifloris.

Hermannia (*hyssopifolia*) foliis lanceolatis obtusis serratis. Linn. sp. 674.

Hermannia folio oblongo serrato. Tour. 656.

L'Hermanne.

HOSPITATUR in caldario. Alitudo humana. Rami distichi parentes. Folia ferè ononidis; petioli stipulis multo breviores. Stipulæ ovatæ acuminatæ integerrimæ. Pedunculis sæpius triflori. Bractææ stipulis subæquales, similesque. Calyces inflati pubescentes globosi lutei. Corollæ flavæ. Faux corollæ angustissima.

DECANDRIA.

GERANIUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 675. *Add.* foliola calycis duo angustiora.

Char. secund. *Rad.* napiformis vel tuberosa aggregata vel ramosa. *Caul.* ramosa, herbacea vel fruticosa. *Fol.* alterna vel opposita, simplex, integra nunc incisa vel pinnata, petiolata

summa subsessilis, (in quibusdam succulenta.)
Flor. pedunculata, umbellata vel solitaria,
 axillaris vel oppositifolia. *Fulc.* stipulæ geminæ
 solutæ integerrimæ. Bractææ involucriformes
 ad basim pedunculorum partialium.

. Obs. ut facilius eruerentur species, à situ pedunculo-
 rum & foliorum potiusquam à numero staminum
 fertilium steriliumve, divisionem sumimus.

* *Pedunculis oppositifoliis, foliis alternis.*

1. GERAN. pedunculis oppositifoliis, foliis alternis, ca- *Triste.*
 lycibus monophyllis, tubis longissimis subsessilibus,
 radice subrotunda. *Linn. sp. 676.*
 Geranium pedunculis novemfloris, foliis tripinnatifi-
 dis ligulatis, petalis maculatis. *Sauv. 251.*
 Geranium triste noctu olens. *Tour. 270.*
2. GERAN. pedunculis oppositifoliis, foliis alternis or- *Inquinans.*
 biculato-reniformibus tomentosis crenatis integrius-
 culis, calycibus monophyllis. *Linn. sp. 676.* Caule
 fruticoso. *Linn. Syst. 1141.*
 HOSPITATUR cum priori. Fruticosum & succulentum.
 Folia longè petiolata succulenta. Stipulæ cordato-
 ovatæ latiusculæ. Bractææ latiores. Flores maximi.
3. GERAN. pedunculis oppositifoliis, foliis alternis angu- *Papilionaceum.*
 latis, calycibus monophyllis, corollis papilion-
 ceis, vexillo dipetalo maximo. *Linn. sp. 677. Syst. 1141.*
 HOSPITATUR cum prioribus. Folia lobato-cordata
 villosa verrucosa. Bractææ sæpius quinæ. Calyces
 reflexi. Rami sæpius terminati umbellulâ. Petala tria
 linearia calycibus ferè minora, duo superiora ma-
 xima obversè ovata. Floret martio.
4. GERAN. pedunculis oppositifoliis, foliis alternis gla- *Acetosifolium.*
 bris subovatis carnosissimis crenatis, calycibus mono-
 phyllis. *Linn. sp. 678.* Caule fruticoso. *Syst. 1142.*
 HOSPITATUR cum prioribus. Succulentum glaberr-

mum. Flores maximi sex vel septem. Variat foliis reniformibus. Bractæ orbiculatæ sæpius quinæ.

- Zonale.* 5. GERAN. pedunculis oppositifoliis, foliis alternis cordato-orbiculatis zona notatis, calycibus monophyllis. *Linn. sp.* 678. *Sauv.* 154. Caule fruticoso. *Linn. Syst.* 1142.

Geranium Africanum betonicæ folio laciniato & maculato, flore incarnato. *Tour.* 269.

HOSPITATUR cum congeneribus. Umbella vigintiflora. Succulentum & fruticosum. Bractæ ovatæ acuminatæ. Stipulæ subcordatæ latusculæ.

- Vitifolium.* 6. GERAN. pedunculis oppositifolius, foliis alternis, lobatis ascendentibus pubescentibus, floribus capitatis, caule fruticoso. *Linn. Syst.* 1142.

Geranium (*vitifolium*) calycibus monophyllis, foliis ascendentibus lobatis pubescentibus. *Linn. sp.* 678.

HOSPITATUR cum prioribus. Facies gerani papilionacei. Corollæ maximæ. Flores in medio bractearum sessiles.

Obs. Species omnes supra memoratæ (excepta prima) ramis abscissis & in terram defossis, sobolescentes. Prima autem à radicibus multiplicatur.

* *Pedunculis axillaribus, foliis sapissimè oppositis.*

- Alchimillodes.* 7. GERAN. pedunculis axillaribus, foliis oppositis orbiculatis palmatis incisís pilosis, calycibus monophyllis, caule herbaceo. *Linn. sp.* 678. *Sauv.* 154.

Geranium Africanum alchimillæ folio hirsuto, floribus albidis. *Tour.* 269.

HOSPITATUR sub dio. Maximè villosam. Pedunculi longissimi. Umbella subquinqueflora. Bractæ subulatae. Stipulæ utrinque solitariae oppositæ interfoliaceæ, nec duæ ad folium singulare ut in sequentibus, prioribusque.

- Cicutarium.* 8. GERAN. pedunculis axillaribus multifloris, foliis oppositis pinnatis incisís obtusis, calycibus pentaphyllis, floribus pentandris. *Linn. sp.* 680. & foliis duplicato-pinnatis. *Sauv.* 252.

Geranium cicutæ folio minus & supinum. *Bot. Mons.* 109. *Tour.* 269.

- Moschatum.* 9. Geranium floribus pentandris, pedunculis multifloris, foliolis ovalibus impari trifido. *Sauv.* 227.

Geranium moschatum. Tour. 268.

7. *Geranium petraeum* cicutæ folio, radice crassa, forti- *Petraeum.*
dum. *Bot. Monf. 109. Icon. 108. Tour. 269.*

HABITAT in arvis & pratis. *B. A Rouquet, Valene, Prades.* Stipulae membranaceae. Foliola ovata incisâ duplo majora quàm in *a. y. au mont St. Loup.* Foliola lineari-multifida. Cauliculi vix palmares.

9. GERAN. pedunculis axillaribus multifloris, foliis *Malacoides;*
oppositis cordatis sublobatis, calycibus pentaphyl-
lis, floribus pentandris. *Linn. sp. 680. Sauv. 154.*
or 286.

Geranium folio althææ. Bot. Monf. 108. Tour. 268.

Pes columbinus. Dod. Pempt. 61.

HABITAT in arvis & herbis circa urbem. *Alz Peissine, Laverune, &c.*

10. GERAN. pedunculis axillaribus multifloris, foliis *Gruinum.*
oppositis pinnatis acutis sinuatis, calycibus penta-
phyllis, floribus pentandris. *Linn. sp. 680.*

Geranium cicutæ folio acu longissima. Tour. 268.

Geranium maximum acu longissima. Bot. Monf. 108.

Geranium pedunculis multifloris, pinnis foliorum aliis laciniatis, aliis simplicibus minimis. Sauv. 251.

Le Bec de grue; vernaculè, las Agujetas.

HABITAT cum prioribus, ad margines sepium.

11. GERAN. pedunculis axillaribus bifloris, foliis op- *Tuberosum.*
positis multipartitis, laciniis linearibus subdivisis.
Linn. sp. 681.

Geranium bulbosum. Lab. Icon. 661.

Geranium pedunculis bifloris, foliis multipartitis, laciniis linearibus ramosis patulis obtusis. Sauv. 208.

Geranium tuberosum-majus. Tour. 267.

HOSPITATUR sub dio.

12. GERAN. pedunculis axillaribus bifloris, foliis alter- *Phaenum.*
nis, calycibus subaristatis, caule erecto. *Linn. sp. 681. Petalis undatis. Linn. Syst. 1143.*

Geranium foliis semi-quinquelobis sericeis, floribus spicatis ex atro-purpureis. Sauv. 207.

Geranium phæum sive fuscum, petalis reflexis. Tour. 267.

HOSPITATUR sub dio.

13. GERAN. pedunculis axillaribus bifloris, foliis op- *Nodosum.*

positis, caulinis trilobis integris serratis, summis sub'effilibus. *Linn. sp. 681. Sauv. 208.*

Geranium nodosum. Tour. 267.

HABITAT près de Lesperou. Variat foliis caulinis cordatis quinquelobis. Caulis & folia glabra.

Sylvaticum. 14. GERAN. pedunculis bifloris axillaribus, foliis oppositis peltatis inciso-serratis, caule erecto. Linn. sp. 681. petalis emarginatis. Syst. 1143. Sauv. 207.

Geranium batrachioides folio aconiti. Tour. 266.

HOSPITATUR sub dio. Bractææ quatuor vel tres, latiusculæ. Foliola acuminata. Variat pedunculis unifloris.

Pratenfe. 15. GERAN. pedunculis axillaribus bifloris, foliis oppositis peltatis multi-partitis rugosis pinnato-lacinatis acutis. Linn. sp. 681. Petalis integris. Syst. nat. 1143.

Geranium batrachioides gratia Dei Germanorum. Tour. 266.

HABITAT à Lattes, Montferrier.

Robertia- num. 16. GERAN. pedunculis axillaribus bifloris, foliis oppositis, calycibus pilosis decem-angulatis. Linn. sp. 681.

Geranium robertianum murale. Bot. Monf. 108.

Geranium robertianum primum. Tour. 268.

Geranium pedunculis bifloris, foliis quinque-partitis, lobis pinnatifidis. Sauv. 252.

L'Herbe à Robert.

HABITAT cum priori, & à Lattes, Selleneuve, Castelnau.

Molle. 17. GERAN. pedunculis axillaribus, superioribus oppositifoliis, foliis inferioribus oppositis, summis ramis alternis, caule ramofo diffuso, calycibus muticis. Linn. sp. 682.

Geranium columbarum minus, majori flore, & foliis bifidis. Bot. Monf. 107. Tour. 268.

Geranium pedunculis bifloris, foliis sparsis reniformibus mollibus semiquinquesidis, latissimis. Sauv. 207.

HABITAT sous la Citadelle, à Castelnau, sous le Péron; & ad agrorum margines.

Lucidum. 18. GERAN. pedunculis axillaribus bifloris, foliis oppositis quinquelobis rotundatis, calycibus pyramidalis angulatis. Linn. sp. 682. Sauv. 207.

Geranium lucidum saxatile. Bot. Monf. 108. Tour. 267.

MONADELPHIA DECANDRIA. 343

HABITAT au-delà de Caunelles le long de la rivière, vers Grabels.

HOSPITATUR in frigidario. Caulis rubens glaberrimus.

19. GERAN. pedunculis bifloris, foliis oppositis quinquepartito-multifidis angulatis, laciniis acutis, capsulis glabris, calycibus aristatis. *Linn. sp.* 682. *Columbinum.*

Geranium columbinum majus foliis tenuiter dissectis, foliis florum bifidis. *Bot. Mons.* 107. *Tour.* 268.

Geranium columbinum foliis dissectis, foliis florum longissimis. *Sauv.* 206.

HABITAT à Montferrier, Selleneuve, Laverune. Pedicelli partiales longiores quàm in reliquis speciebus.

20. GERAN. pedunculis axillaribus bifloris, foliis oppositis reniformibus, petalis integris, longitudine calycis, caule prostrato. *Linn. sp.* 683. *Incisus. Linn. Syst.* 1144. *Rotundifolium.*

Geranium folio malvæ rotundo. *Bot. Mons.* 106. *Tour.* 268.

Geranium pedunculis bifloris, foliis subrotundis multifidis, caule procumbente. *Sauv.* 206.

HABITAT in herbis & pratis.

21. GERAN. pedunculis axillaribus unifloris, foliis oppositis quinquepartitis trifidis orbicularis. *Linn. sp.* 683. *Sanguineum.*

Geranium pedunculis unifloris simplicibus. *Sauv.* 206.

Geranium sanguineum sive hæmatodes radice crassa. *Bot. Mons.* 107. *Tour.* 267.

HABITAT à Mauguio, Valene, Aniane, Valmagne.

Caulis pilosus folia summa petiolis affixa brevissimis. Bractæ duæ tantum in summo pedunculo. Corollæ maximæ violacæ.

Obs. petioli è quorum alis prodeunt pedunculi, semper petiolo opposito breviores sunt.

22. GERAN. pedunculis bifloris, foliis quinquepartito-multifidis angulatis, laciniis acutis, capsulis glabris, calycibus aristatis. *Linn. syst.* 1144. *cent.* 62. *Dissectum.*

Geranium columbinum majus, foliis tenuiter dissectis, foliis florum bifidis. *Bot. Mons.* 107. *Tour.* 268.

POLYANDRIA.

SIDA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 674.

Char. secund. Rad. fusiformis. Caul. teres herba-
cea vel fruticosa. Fol. alterna petiolata simplex
integra. Flor. axillaris solitaria pedunculata.
Fulcr. stipulae solutae geminae integerrimae.

- Spinosa.* 1. SIDA foliis cordato-ovatis serratis, stipulis seraceis,
axillis subspinosis. Linn. sp. 683.
Malva Canadensis mori folio, semine cum gemino
rostro. Tour. 96.
2. Malva indica foliis subrotundis. Tour. 96.
HOSPITATUR sub dio. Caulis pedalis. Corollae luteae
calycibus paulo majores. Pedunculi petiolis subae-
quales. Annua.
- Cordifolia.* 2. SIDA foliis cordatis subangulatis serratis villosis. Linn.
sp. 684.
HOSPITATUR in caldario. Apud nos fruticosa. Alti-
tudo humana. Rami subrigoni. Pedunculi petiolis
multo longiores; capsulae calycibus majores. Folia
mollissima.
- Abutilon.* 3. SIDA foliis subrotundo-cordatis acuminatis crenatis.
Linn. sp. 685.
Sida foliis subrotundo-cordatis acuminatis, pedun-
culis folio brevioribus, capsularum corniculis bifidi-
dis. Linn. Syst. 1145.
Abutilon. Tour. 99.
La fausse Guimauve.
HOSPITATUR sub dio. Altitudo prioris. Caulis teres
nec angulatus; capsulae quadruplo majores. Pedun-
culi petiolis duplo breviores.
- Cristata.* 4. SIDA foliis angulatis: inferioribus cordatis, superio-
ribus panduri-formibus. Linn. sp. 685.
5. Sida foliis inferioribus cordato-angulatis, superioribus
hastatis, petalis integerrimis. Linn. Hort. ups. 199.
HOSPITATUR sub dio. Annua. Folia saepius palmato-
quinquepartita vel quinquangularia glabra, ad
margines integerrima & obscure rubentia. Caulis
& petioli hirsuti. Pedunculi foliis duplo longiores.
Corollae calycibus duplo majores dilute caeruleae.
Variat foliis summis lanceolatis aut hastatis.

N A P Æ A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 1083.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* teres herbacea ramosa. *Fol.* alterna petiolata simplex palmata. *Flor.* axillaris pedunculata, pedunculis ramosis. *Fulc.* stipulæ geminæ solutæ. (Bractæe vagæ ad basim florum, in una specie.)

1. NAPÆA glabra, pedunculis subquadrifloris ebracteatis. *Hermaphro-
dita.*
Napæa pedunculis nudis lævibus, foliis glabris, floribus hermaphroditis. Linn. sp. 686.
Sida foliis palmatis: laciniis lanceolato-acuminatis. Sauv. 201.

Malva aceris folio virginiana. Tour. 95.

HOSPITATUR sub dio. Radix perennis. Petioli brevissimi. Folia inferiora palmato-quinquepartita; summa tripartita. Pedunculi foliis æquales.

2. NAPÆA hirsuta, pedunculis multifloris, floribus *Dioica* subcapitatis bracteatis.

Napæa pedunculis involucratis angulatis, foliis scabris, floribus dioicis. Linn. sp. 686.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo humana seu prioris. Caulis striatus. Folia profundius divisa; stipulæ latiores. Flores multo minores.

A L T H Æ A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 680.

Char. secund. *Rad.* fusiformis tereti-attenuata.

Caul. teres herbacea ramosa. *Fol.* alterna petiolata nunc simplex integra vel palmata, nunc inferior simplex palmata, superior digitata, foliolis simplicibus. *Flor.* axillaris pedunculata, pedunculis unifloris multiflorisvè. *Fulc.* stipulæ geminæ solutæ simplices integerrimæ.

1. ALTHÆA foliis cordato-ovatis angulatis crenatis, *Officinalis*, pedunculis subtrifloris.

Althæa foliis simplicibus tomentosis. Linn. sp. 686.
Sauv. 99.

Althæa Dioscoridis & Plinii. Bot. Mons. 16. Tour. 97.
La Guimauve.

346 MONADELPHIA POLYANDRIA.

HABITAT copiosè à *Lattes*, *Lamousson*. Petioli foliis breviores. Pedunculi longitudine petiolorum vel breviores, uniflori biflori triflorivè. Flores in summo caule plures subsessiles. Altitudo tripedalis.

- Cannabina*. 2. ALTHÆA foliis inferioribus palmatis, superioribus digitatis, caule suffruticoso. *Linn. sp.* 686. *Sauv.* 200. *Alcea cannabina. Tour.* 98.

HABITAT à *Castelnau*, *Gramont*, *Sellenewue* & circa Urbem. Altitudinem humanam longè superat. Foliola lanceolata inciso-ferrata. Caulis obscure rubens vel viridis. Pedunculi uniflori foliis longiores.

- Hirsuta*. 3. ALTHÆA foliis inferioribus subcordatis inciso-crenatis, cæteris trifidis. *Althæa foliis trifidis piloso-hispidis. Linn. sp.* 687. *Sauv.* 200.

Alcea hirsuta. Bot. Mons. 6. *Tour.* 98.

HABITAT in sterilibus & saxosis. *A la Colombière*, *Lavalette*, *Caunelles*. Cauliculi vix palmares ramosi diffusi. Petioli foliis longiores. Pedunculi foliis duplo longiores. Calyces interiores maximi acuminati hispidi. Variat foliis inferioribus cordatis, ovatis vel reniformibus.

A L C E A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 679.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea ramosa. *Fol.* alterna petiolata simplex integra vel palmato-incisa. *Flor.* axillaris pedunculata subsolitaria. *Fulc.* stipulæ geminæ solutæ simplices.

- Rosea*. 1. ALCEA foliis cordatis sinuato-angulosis. *Linn. sp.* 687. *Malva rosea folio subrotundo. Tour.* 98.

La Mauve rose ou Passerose; vernaculè *la Passerose*. HOSPITATUR sub dio. Altitudinem humanam superat. Stipulæ palmatæ trifidæ. Variat floribus senis, quinis.

- Ficifolia*. 2. ALCEA foliis palmatis. *Linn. sp.* 687. *Malva rosea folio ficus. Tour.* 98.

HOSPITATUR sub dio. Radix perennis. Utræque in hortis colitur; folia palmato-quinquepartita vel septempartita. Flores plurimi sparsi in summo caule subsessiles.

MONADELPHIA POLYANDRIA. 347

M A L V A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 676.

Char. secund. *Rad.* fusiformis vel ramosa. *Caul.* herbacea vel fruticosa. *Fol.* alterna petiolata simplex integra vel incisa, aut inferior simplex, superior pinnato-multipartita. *Flor.* axillaris pedunculata solitaria vel aggregata vel spicata. *Fult.* stipulæ geminæ solutæ simplices.

* *Foliis indivisis.*

1. MALVA foliis ovato-oblongis acutè-serratis, capsulis tricuspidatis. *Linn. sp.* 687. *Cermande-liana.*

HOSPITATUR sub dio. Caulis pilosus sesquipedalis. Petioli foliis longiores. Pedunculi un'flori brevissimi. Folia summa lanceolata. Flores lutei parvi.

* *Foliis angulatis.*

2. MALVA caule erecto herbaceo, foliis lobatis, spicis secundis, seminibus lævibus. *Linn. Syst.* 1146. *Peruviana.*

Malva caule erecto herbaceo, foliis lobatis, spicis axillaribus secundis. *Linn. sp.* 688.

Malva lusitanica ribesii folio. *Tour.* 96.

HOSPITATUR in hybernaculo. Spicæ pedunculus longitudine foliorum.

3. MALVA foliis subcordatis laciniatis glabris, caule arborecente. *Linn. sp.* 688. *Capeensis.*

Malva caule frutescente, pilis compositis, foliis cordatis quinquelobis, floribus cernuis: petalis distantibus. *Linn. Syst.* 1147.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo humana. Folia summa quinquelobata: lobo terminali majore. Petala cordata. Puncta rubra ad basim filamentorum. Flores rubri. Variat foliis ovatis, cordatis, vel summis lanceolatis.

4. Malva caule repente, foliis multifidis. *Linn. sp.* 688. *Caroliniana.* *Sauv.* 200, & 174.

HOSPITATUR sub dio. Petioli pedunculique subæquales. Folia inferiora orbiculata incisa; summa quinque vel septem partita, laciniis incisus acuminatis.

5. MALVA caule repente, foliis cordato-orbiculatis *Rotundifolia.*

348 MONADELPHIA POLYANDRIA.

- obsoletè quinquelobis. *Linn. sp.* 688. *Sauv.* 200.
Malva sylvestris folio rotundo. Bot. Monf. 173. & 301.
Malva vulgaris flore minore, folio rotundo. Tour. 95.
 HABITAT ad margines sepium & in arvis.
Sylvestris. 6. MALVA caule erecto herbaceo, foliis lobatis obtusis, pedunculis & petiolis pilosis. *Linn. sp.* 689.
Malva caule erecto, foliis fermè palmatis, obsoletè ferratis. Sauv. 200.
Malva vulgaris folio sinuato. Bot. Monf. 173. & 301.
Malva vulgaris flore majore, folio sinuato. Tour. 95.
La Mauve; vernaculè la Mauibe.
 HABITAT cum priori. Pedunculi sæpius quinque vel septem.
Alcea. 7. MALVA caule erecto, foliis multipartitis scabriusculis. *Linn. sp.* 689. *Sauv.* 200.
Alcea vulgaris major. Bot. Monf. 6. *Tour.* 67.
L'Alcée ou Mauve sauvage.
 HABITAT à Castelnau, Gramont & cum precedenti.
Moschara. 8. MALVA foliis radicalibus reniformibus incis, caulibus quinquepartitis pinnato-multifidis. *Linn. sp.* 690.
Malva foliis quinquepartitis, laciniis lateralibus bis tripartitis. Sauv. 200.
Alcea folio rotundo laciniato. Tour. 97.
 HABITAT à Lesperou & au Mont Saint Loup. Stipulæ ovato-lanceolatæ.

LAVATERA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 677.

Char. secund. Rad. ramosa Caul. herbacea vel arborea. Fol. alterna petiolata simplex angulata integra. Flor. axillaris pedunculata pedunculis aggregatis. Fult. stipulæ geminæ solutæ.

* *Caule fruticoso.*

- Arborea.* 1. LAVAT. caule arboreo, foliis septemangularibus tomentosis plicatis, pedunculis confertis unifloris axillaribus. *Linn. sp.* 690.
Althæa arborea veneta maritima. Tour. 97.
Lavatera caule arboriformi, foliis . . . Sauv. 199.

MONADELPHIA POLYANDRIA. 349

La Mauve en arbre.

HOSPITATUR sub dio. Altitudinem humanam superat. Variat pedunculis binis vel solitariis. Pedunculi brevissimi. Lobi calycis exterioris obtusi sæpe emarginati.

2. LAVAT. caule fruticoso, foliis quinquelobo-hastatis. *Olbia*,
Linn. sp. 690. Sauv. 200.

Althæa frutescens folio acuto, parvo flore. Tour. 96.

HOSPITATUR sub dio. Folia summa sæpè lanceolata. Laciniæ calycis exterioris acuminatæ. Pedunculi foliis longiores bini, terni, altero longiore.

3. LAVAT. caule fruticoso, foliis subcordatis subtrilobis rotundatis crenatis, stipulis cordatis, pedunculis unifloris. *Linn. sp. 691. aggregatis. Linn. Syst. 1147.*

Althæa frutescens folio rotundiore incano. Tour. 97. Barr. Icon. 428.

Althæa arborescens. Bot. Monf. 16.

HABITAT à Miraval, & à la plaine de Laumac à gauche sur la montagne. Calyx exterior profundè trifidus. Pedunculi sex vel septem subæquales, petiolis breviores. Crenæ foliorum acuminatæ.

* *Caulis herbaceo.*

4. LAVAT. caule herbaceo, fructibus denudatis, calycibus incis. *Linn. sp. 691. Sauv. 200.*

Althæa flore majore. Bot. Monf. 16. Tour. 97.

HOSPITATUR sub dio. Utrum in agro Monspessulano occurrat, adhuc ignoramus.

5. LAVAT. foliis glabris, caule scabro herbaceo, pedunculis unifloris, fructibus orbiculo tectis. *Linn. sp. 692.*

Lavatera foliis ovato-lanceolaris, infernè angulatis, pedunculis unifloris, caule herbaceo. Sauv. 101.

Malva trimestris cum unguibus purpureis. Tour. 96.

HOSPITATUR sub dio.

M A L O P E.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 683.*

Char. sec. *Rad. tenuis fusiformis. Caul. herbacea ramosa procumbens. Fol. alterna petiolata sim-*

350 MONADELPHIA POLYANDRIA.

plex integra. *Flor.* axillaris solitaria pedunculata. *Fulc.* stipulæ solutæ geminæ integerrimæ.

Malacoides. 1. MALOPE foliis ovatis crenatis supra glabris. *Linn.* sp. 692.

Malacoides betonicæ folio. *Tour.* 98.

Alcea betonicæ folio, flore purpureo-violaceo. *Barr.* Icon. 1189.

HOSPITATUR sub dio. In caldario perennis. Petioli longissimi; pedunculi iis æquales. Folia summa lanceolata.

G O S S Y P I U M.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 678.

Char. sec. *Rad.* ramosa. *Caul.* teres ramosa herbacea vel arborea. *Fol.* alterna petiolata simplex lobata, lobis integerrimis *Flor.* pedunculata solitaria oppositifolia. *Fulcr.* stipulæ oppositæ, inter pedunculum petiolumque glandulæ (in unâ specie) hypophyllæ.

Herbaceum. 1. GOSSYP. foliis quinquelobis, caule herbaceo. *Linn.* sp. 693. *Sauv.* 199.

Xylon sive gossypium herbaceum. *Tour.* 101.

Le Coton; vernaculè, le coton.

HOSPITATUR sub dio. Apricatur. Apud nos bienne.

Barbadeso. 2. GOSSYP. foliis trilobis integerrimis. *Linn.* sp. 693. *Sauv.* 199.

Gossypium foliis . . . subtus triglandulosis. *Linn.* Syst. 1148.

Le Coton des Barbades.

HOSPITATUR hyeme in caldario.

Arboreum. 3. GOSSYP. foliis palmatis, lobis lanceolatis, caule fruticoso. *Linn.* sp. 693.

Xylon arboreum. *Tour.* 101.

Le Coton en arbre.

HOSPITATUR cum prioribus.

H I B I S C U S.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 681.

Char. sec. *Rad.* subfusiformis, ramosa. *Caul.* herbacea vel arborea. *Fol.* alterna petiolata sim-

MONADEEPHIA POLYANDRIA. 351

plex palmato-multifida. *Flor.* axillaris solitaria pedunculata subpetiolaris. *Falc* stipulæ geminæ solutæ integerrimæ. Aculei in caule, luxuriantionis effectus (in unâ specie.)

1. HIBISC. foliis ovato-lanceolatis, supernè inciso-serratis, caule arboreo. *Linn. sp.* 695. *Sauv.* 60. foliis rhomboideis. *Sauv.* 99.

Ketmia Syrorum quibusdam. *Tour.* 99.

Althæa frutescens flore albo & rubro. *Barr. Icon.* 491.

La Rose de Cayenne.

HOSPITATUR sub dio. Petioli foliis triplo breviores.

Pedunculique petiolis breviores & crassiores. Variat foliis trilobis; intermedio longiore. Stipulæ minimæ setaceæ. Calyces glaberrimi æquales.

2. HIBISC. foliis tripartitis-incisis, calycibus inflatis capsulam obtegentibus. *Sauv.* 201. *Linn. sp.* 697.

Ketmia vesicaria vulgaris. *Tour.* 100.

Alcea vesicaria. *Barr. Icon.* 472.

HOSPITATUR sub dio. Caulis sesquipedalis diffusus

hirsutus. Petioli foliis æquales; pedunculi longitudine petiolorum. Capsulæ subglobosæ. Corollæ extus coloris violacei obsoleti.

3. HIBISC. foliis serratis, inferioribus ovatis indivisis, superioribus tripartitis, caule aculeato. *Linn. sp.* 695. *inermi.* *Syst.* 1149.

Ketmia indica gossypii folio, acetosæ sapore. *Tour.* 100.

- β. *Ketmia vixis* folio ampliore. *Tour. ibid.*

Hibiscus inermis, foliis indivisis, mediis tripartitis, summis quinquepartitis. *Linn. sp.* 695.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo sesquipedalis. Caulis

scaber. Petioli longissimi. Flores subsessiles. Calyx interior quinquangularis tuberculatus persistens capsulam involvens. Filamenta purpurea. Capsula calycem excedens hirta.

4. HIBISC. foliis palmato-digitatis septempartitis. *Linn. Manibot. sp.* 696.

HOSPITATUR sub dio. Fruticosus. Altitudinem humanam superans. Calyx exterior pilis punctisque purpureis adpersus.

5. HIBISC. foliis subpeltato-cordatis septemangularibus. *Atelmoschus.* serratis hispidis. *Linn. sp.* 696. *Sauv.* 201.

352 MONADELPHIA POLYANDRIA.

Ketmia Aegyptiaca femine moschato. *Tour.* 100.

HOSPITATUR sub dio. Vix pedalis. Petioli foliis multo longiores. Stipulae deciduae setaceae.

Esulentus. 6. **HIBISC.** foliis quinquepartito-pedatis, calycibus interioribus latere rumpentibus. *Linn.* sp. 696.

Ketmia Brasiliensis folio ficus, fructu pyramidato sulcato. *Tour.* 100.

HOSPITATUR sub dio. Capsulae saepius decagonae biunciales vel longiores glabriusculae.



Classis XVII.

DIADELPHIA

HEXANDRIA.

FUMARIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 685.

Char. secund. Rad. fusiformis attenuata vel bulbosa. Caul. herbacea teres vel angulata, simplex vel ramosa, (in unâ specie flexuosa.) Fol. alterna petiolata impari-pinnata, foliolis pinnato-multifidis. Flor. racemosa terminalis vel oppositifolia. Falc. nulla (in unâ specie cirrhus folia terminans.)

* Floribus unicalcaratis.

1. FUM. caule simplici, bracteis longitudine florum. *Bulbosa*.
Linn. sp. 699.
Fumaria caule diphylo simplici, floribus calyce destitutis. Sauv. 194.
Fumaria bulbosa radice cava major. Bar. Mons. 296.
Tour. 424.
HABITAT à Lesperon. Folia sæpius ternata, foliolis ternato-pinnatifidis; laciniis lateralibus obtusis bifidis; intermedia triloba obtusa. Corollæ maximæ violacæ. Calcar longissimum. Racemi quinqueflori vel 6flori laxi. Floret martio.
2. FUM. siliquis linearibus tetragonis, caulibus diffusis *Capnoides*.
acutangulis. Linn. sp. 700.
HOSPITATUR sub dio. Caulis pedalis glaberrimus. Foliorum petioli canaliculati longissimi. Flores laxè racemosi pauci. Quidam axillares vagi. Siliquæ curvilineæ.
3. FUM. pericarpis monospermis racemosis, caule dif- *Officinalis*.
fuso. Linn. sp. 700.
Fumaria pericarpis monospermis, foliis obtusis incisis. Sauv. 263.

Fumaria Officinarum, *Bot. Monsf.* 100. *Tour.* 422.
La Fumeterre.

HABITAT in arvis & supra muros. Calyces ciliati.
Racemi oppositifolii.

Spicata. 4. FUM. pericarpis monospermis spicatis, caule erecto,
foliis filiformibus. *Linn. sp.* 700. *Sauv.* 263.

Fumaria minor tenuifolia flore variegato. *Tour.* 422.

Fumaria minor seu nobilis Monspeliaca. *Bot. Monsf.* 101.

β. *Fumaria foliis tenuissimis*, flore albo. *Bot. Monsf.* 101.
Tour. 422.

HABITAT cum priori. Racemi oppositifolii densi.
Capsulae corollis minores.

Caprolata. 5. FUM. pericarpis monospermis racemosis, foliis scandentibus subcirrhosis. *Linn. sp.* 701.

Fumaria viticulis & capreolis plantis vicinis adhaerens. *Bot. Monsf.* 101. *Tour.* 422.

HABITAT à la plaine de Laumac, à Fabregues. Folia volubilia terminata vel cirrho vel petiolo denu-
dato aphylo.

Claviculata. 6. FUM. siliquis linearibus, foliis cirrhiferis. *Linn. sp.* 701.

Fumaria folis cirrhiferis, floribus spicatis. *Sauv.* 194.

HABITAT cum priori, & aux rochers de Mijoulan. Ra-
cemi oppositifolii. Foliola remota. Cirrus folis
terminans.

O C T A N D R I A.

P O L Y G A L A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 686.

Char. sec. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea simplex
erecta. *Fol.* alterna sessilis simplex integerrima.

Flor. terminalis racemosa. *Fulcr.* bractea subu-
lata solitaria ad basim floris singuli.

Vulgaris. 1. POLYG. floribus cristatis racemosis, caulibus herba-
ceis simplicibus procumbentibus, foliis linearibus
lanceolatis. *Linn. sp.* 702.

Polygala major. *Bot. Monsf.* 107. *Tour.* 174. *vulgaris.*
Bot. Monsf. 208. *Tour.* 174.

Polygala foliis lineari-lanceolatis, caulibus diffusis
herbaceis. *Sauv.* 52.

DIADELPHIA DECANDRIA. 355

HABITAT à Lattes, Cannelles, Lamousson. Altitudo palmaris.

1. POLYG. floribus cristatis racemosis, caule erecto, *Monspeliaca*, foliis lanceolato-linearibus acutis. *Linn. sp. 702. Sauv. 53.*

Polygala annua erecta angustifolia, floribus coloris obsoleti, carneis lineis virgatis. *Bot. Monf. 208. Tour. 175.*

2. Polygala acutioribus foliis *Monspeliaca. Bot. Monf. 207. Tour. 174.*

HABITAT au Terrail, Laverane, l'Engarran.

DECANDRIA.

SPARTIUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 690.*

Char. sec. Rad. ramosa lignosa. Caul. fruticulosa teres vel angulata. Fol. alterna, sessilis vel petiolata, simplex integerrima vel ternata, foliolis simplicibus. Flor. racemosa ramea, terminalis vel lateralis. Fult. stipulae adnatæ minimæ; (in quibusdam spinæ floriferae ramosæ.)

* Foliis simplicibus,

1. SPART. ramis oppositis teretibus apice floriferis, foliis lanceolatis. *Linn. sp. 708. Sauv. 60. & 93.*

Genista juncea. *Bot. Monf. 105. Tour. 643.*

Le Genêt d'Espagne.

- HABITAT à Gramont. Flores maximi. Legumina villosissima.

2. SPART. ramis angulatis, racemis lateralibus, foliis lanceolatis. *Linn. sp. 708. Sauv. 60. & 93.* *Monosperma.*

Spartium altissimum monosperma semine reni simili. *Tour. 646.*

HABITAT à Valene, Lesperon.

3. SPART. ramis spinosis patentibus, foliis ovatis. *Linn. Scorpius. sp. 708.*

Genista-spartium majus spinosum, flore luteo. *Bot. Monf. 106. Tour. 645.*

Genista foliis lanceolatis, spinis nudis multifloris. *Sauv. 94.*

Le Genêt épineux; vernaculè, lous Arjalas.

HABITAT à Gramont, Monferrier, Lavatette; Laverane.

* *Foliis ternatis.*

Complicatum 4. SPART. foliis ternatis, foliolis involutis, caulibus inermibus prostratis glabris, leguminibus scabris. *Linn. sp.* 709.

Cytisus ramis humifusis albidis, floribus capitatis terminalibus, foliolis ovalibus glabris aggestis. *Sauv.* 190.

Cytisus foliis incanis angustis quasi complicatis. *Bor. Monf.* 84. *Tour.* 648.

HABITAT au Vigan, & à Gramont vers Mauguio.

Scoparium 5. SPART. foliis ternatis solitariisque, ramis inermibus angulatis. *Linn. sp.* 709.

Cytiso-genista scoparia vulgaris flore luteo. *Tour.* 649. *Le Genêt à balais.*

HABITAT à Lesperon.

Spinosum 6. SPART. foliis ternatis, ramis angularis spinosis. *Linn. sp.* 709. *Sauv.* 191.

Cytisus spinosus. *Tour.* 648.

Acacia trifolia. *Bor. Monf.* 1.

HABITAT à Lamalou, Valmagne, Beziers, & au bois de Candiac avec la Fraxinelle.

G E N I S T A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 691.

Char. sec. *Rad.* lignosa. *Caul.* teres vel angulata, simplex vel articulata, herbacea vel fruticulosa. *Fol.* alterna sessilis simplex integerrima. *Flor.* terminalis spicata, vel axillaris subsolitaria. *Fult.* nulla. *Spinæ* in quibusdam speciebus ramosæ axillares floriferæ; in aliis bractæ ad basim pedicellorum; in paucis verò stipulæ setacæ.

* *Inermes.*

Sagittalis 1. GEN. ramis ancipitibus articulatis, foliis ovatis lanceolatis. *Linn. sp.* 710.

Chamaespartium supinum caule folioso, *Hispanicum.* *Barr. Icon.* 570.

Genista ramis triangulari-ancipitibus, petiolis decurrentibus, foliis ovato-lanceolatis. *Sauv.* 92.

Genistella herbacea. *Tour.* 646.

La Spargelle.

HABITAT à *Lesperou*, au mont *St. Loup*. Vix sésquipalmaris. Caulis alatus anceps. Flores spicati. Bractæ subulatæ minimæ.

2. GEN. foliis lanceolatis, ramis striatis teretibus erectis. *Tinctoria*, *Linn. sp.* 710. *Sauv.* 60.

Genista tinctoria Germanica. *Bot. Mons.* 106. *Tour.* 643. *Le Genêt*; vernaculè, de *Geniste* ou *Genet*.

HABITAT à *Gramont*, *Selleneuve*, *Laverune*, *Lavalette*. Spicæ ramos terminant. Stipulæ vix conspicuæ. Bractæ ovatæ foliaceæ.

3. GEN. foliis lanceolatis obtusis, caule tuberculato pilosa decumbente. *Linn. sp.* 710.

Genistella pilosa. *Bot. Mons.* 106.

Genista ramosa foliis hyperici. *Tour.* 643.

Genista foliis ovatis confertis, infernè pilosis, floribus sessilibus sparsis. *Sauv.* 92.

HABITAT à *Gramont*, *Monferrier*, la source du *Lès*.

* *Spinæ laterales.*

4. GEN. spinis decompositis, ramis floriferis inermibus, *Hispanica*, foliis linearibus pilosis. *Linn. sp.* 711.

Genista-spartium montis ventosi. *Tour.* 645.

Genistella spinosa Monspeliaca. *Bot. Mons.* 106.

HABITAT au mont *St. Loup*, à *Lesperou*. Flores subcapitati. Spinæ crassæ remotæ; ramis etiam spinula acutiori & tenui terminatis.

5. GEN. spinis compositis, ramis floriferis inermibus, *Germanica*, foliis lanceolatis. *Linn. sp.* 710. *Sauv.* 61.

Genista-spartium minus Germanicum. *Tour.* 645.

HABITAT à *Lesperou*. Caulis striatus pilosus.

A M O R P H A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 689.

Char. sec. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* fruticosa.

Fol. alterna impari-pinnata, foliolis integerrimis petiolatis oppositis. *Flor.* terminalis racemosa. *Fulc.* stipulæ geminæ solutæ setaceæ. *Fi-*
lum ad basim singulæ pinnulæ.

1. AMORPHA. *Linn. sp.* 713.

Eruicifera

358 DIADELPHIA DECANDRIA.

HOSPITATUR sub dio. Altitudinem humanam superat. Rami stricti rubent. Folia pinnata foliolis utrinque 13. vel 15. ovali-lanceolatis integerrimis. Corollæ atro-purpureæ. Filamenta corollis multo longiora. Antheræ luteæ. Floret vere & autumnno. Racemi interdum quidam vagi axillares.

G A L E G A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 692.

Char. sec. Rad. ramosa lignosa. Caul. fruticulosa striata. Fol. alterna impari-pinnata, foliolis integerrimis petiolatis suboppositis. Flor. racemosa axillaris, racemis solitariis. Fulcr. stipulæ geminæ solutæ sagittatæ. Bractea gemina ad basim floris singuli. Filum terminans singulum foliolum.

Officinalis. 1. GALEGA. Linn. sp. 714. Sauv. 235.

Galega vulgaris. Tour. 398. & floribus candicantibus. *Ibid.*

HOSPITATUR sub dio. Altitudo humana. Folia pinnata foliolis utrinque 7. vel 9. ovatis vel obovatis vel lanceolatis apice emarginatis. Petioli quandoque spinulam exferunt ad basim folioli imparis. Secunda species *Tournefortii* pauciflora, minor. Floret vere & æstate.

O N O N I S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 696.

Char. sec. Rad. ramosa lignosa. Caul. herbaceæ ramosa vel fruticulosa. Fol. alterna petiolata, simplex integra vel ternata, vel utraque simul in eadem specie. Flor. axillaris solitaria pedunculata aut sessilis, vel spicata interjectis foliolis. Fulcr. stipulæ adnatæ geminæ vaginantes amplexicaules. Filum ad apicem pedunculi in plurimis speciebus.

* *Floribus sessilibus.*

Spinosa. 1. ONONIS floribus racemosis solitariis, foliis ternatis, ramis spiniformibus. Linn. Syst. 1159.

Ononis floribus racemosis geminatis, foliis ternatis,

ramis spinosis. *Linn. sp.* 716.

Ononis spinosa flore purpureo. *Bot. Mons.* 20. *Tour.* 408.

Ononis floribus sessilibus lateralibus, caule spinoso. *Sauv.* 189.

HABITAT aux prés d'Arene, à Lattes, Sellencuve.

Variat floribus geminatis. Rami brevissimi uniflori, biflori, triflori.

2. *ONONIS* floribus racemosis geminatis, foliis ternatis, ramis inermibus. *Linn. Syst.* 1159.

Ononis spinosa. *B. Linn. sp.* 716.

Ononis floribus sessilibus solitariis, ramis junioribus inermibus, floribus albis. *Sauv.* 189.

Ononis spinis carens purpurea. *Tour.* 408.

HABITAT cum priori, & à Laverune.

3. *ONONIS* floribus sessilibus lateralibus, foliis omnibus ternatis & petiolatis, stipulis seraceis. *Linn. sp.* 717.

Ononis . . . stipulis calycibusque seraceis. *Linn. Syst.* 1159.

Ononis trifolia, calycibus ad axillas sessilibus erectis & stipulis longas setas exerentibus. *Sauv.* 190.

Ononis pusilla glabra angustifolia lutea. *Tour.* 409.

Ononis pusilla glabra fruticans trifoliis affinis. *Bot. Mons.* 22.

HABITAT inter saxa; à Montferrier, Lavalette, Lacolombiere, Castelnau. Cauliculi & calyces rubent. Corollæ calycibus breviores. Folia sæpius obversè ovata emarginata, interdum lanceolata.

4. *ONONIS* spicis foliosis, foliis simplicibus obtusis suborbiculatis. *Linn. sp.* 717.

Ononis sicula alopecuroides. *Tour.* 408.

HOSPITATUR sub dio. Annua herbacea. Spica foliis lanceolatis apice serratis interrupta. Folia caulina omnia ad margines denticulata. Stipulæ latissimæ.

* *Floribus pedunculatis.*

5. *ONONIS* pedunculis unifloris filo terminatis, foliis ternatis. *Linn. sp.* 718. *Sauv.* 189.

Anonis viscosa spinis carens latea major. *Bot. Mons.* 20. *Tour.* 409.

Ononis pedunculis unifloris filo terminatis, foliis ternatis, stipulis integerrimis. *Linn. Syst.* 1160.

360 DIADELPHIA DECANDRIA.

β. Ononis pedunculis unifloris seta terminatis, foliis ternatis simplicibusque. *Sauv.* 189.

Anonis viscosa spinis carens lutea minor. *Bot. Mons.* 21. *Tour.* 409.

L'Arrête-bœuf; vernaculè, *tous Agalouffes.*

HABITAT in arvis; à *Castelrau*, *Boutonnet*, *Sellenouve.*

Viscosa. 6. ONONIS pedunculis unifloris filo terminatis, foliis simplicibus. *Linn. sp.* 718. Ternatisque. *Syst.* 1160.

Ononis viscosa spinis carens lutea latifolia annua. *Bot. Mons.* 21. *Tour.* 409. *Sauv.* 190.

HABITAT à *Bouzigues*, *Frontignan*, *Balarue.*

Cherleri. 7. ONONIS pedunculis unifloris filo terminatis, foliis ternatis stipulis dentatis. *Linn. Syst.* 1160.

Ononis trifolia viscosa hirsuta, pedunculis congestis, floribus pendulis. *Sauv.* 190.

Anonis pusilla villosa & viscosa purpurascens flore. *Tour.* 408.

Trifoliis affinis anonis minima hirsuta *Cherleri.* *J. B. Hist.* 2. 394.

Anonis minima hirsuta *Cherleri.* *Bot. Mons.* 20.

HABITAT cum priori; à la source du *Lès*, au-delà de *Montferrier.* Facies ononidis minutissimæ.

A N T H Y L L I S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 712.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* teres ramosa; herbacea vel fruticosa. *Fol.* alterna imparipinnata, foliolis integerrimis, ternis quaternis sessilibus, pluribusvè. *Flor.* nunc terminalis pedunculata capitata, nunc axillaris aggregata pedunculata aut sessilis. *Falc.* bractæ in plurimis speciebus ad basim capitulorum, palmato-incisæ vel pedunculos terminantes & integerrimæ; in aliis nullæ.

* *Herbaceæ.*

Tetraphylla. 1. ANTH. herbacea, foliis quaterno-pinnatis, floribus lateralibus. *Linn. sp.* 719. *Sauv.* 237.

Vulneraria pentaphyllos. *Tour.* 291.

Lotus pentaphyllos vesicaria. *Bot. Mons.* 166.

Anthylus leguminosa vesicaria lutea. *Barr. Icon.* 554.

DIADELPHIA DECANDRIA. 361

HABITAT à Selteneuve à droite, & à Lamousson à gauche: cauliculi villosi subangulati. Petioli foliorum plani dilatati. Flores axillares sessiles quaterni vel quini multo majores quam in cæteris speciebus. Vexillum album; alæ & carina flavæ. Folium impar maximum.

2. ANTH. herbacea, foliis pinnatis inæqualibus, capitulo duplicato. *Linn. sp. 719. Vulneraria.*

Anthyllis foliis pinnatis, foliolis pluribus (septenis) terminali majore. *Sauv. 237.*

Vulneraria rustica. *Tour. 391.*

Loto affinis vulneraria pratensis. *Bot. Monf. 166.*

Anthyllis leguminosa luteo flore. *Barr. Icon. 575. & cæruleo. 553.*

La Vulnèraire.

HABITAT à Lesperou. Folium impar lanceolatum. Folia sæpius pinnata foliolis septem. Variat capitulis alternis, quod rectè exprimit icon Barrelieri 575. Bractææ palmatæ.

3. ANTH. herbacea, foliis pinnatis æqualibus, capitulo terminali. *Linn. sp. 719. Montana.*

Vulneraria, foliis sub umbella palmatis. *Sauv. 237.*

Astragalus villosus floribus globosis. *Bot. Monf. 34.*

Barba jovis pumila villosa flore globoso & purpureo. *Tour. 651.*

Astragalus montanus tomentosus globoso & pallido flore. *Barr. Icon. 712.*

HABITAT à Lesperou. Cauliculi vix palmares rigidi. Folia pinnata foliolis utrinque 7. vel 9. Petioli amplexicaules. Bractææ palmatæ.

* *Fruticosa.*

4. ANTH. fruticosa, foliis pinnatis æqualibus, floribus capitatis. *Linn. sp. 720. Sauv. 237. Barba jovis.*

Barba jovis pulchrè lucens. *Tour. 651.*

Barba jovis. *Bot. Monf. 36.*

Barba jovis lentifolia incana. *Barr. Icon. 378.*

HOSPITATUR in hybernaculo. Non occurrit in agro Monspessulano. Petioli amplexicaules. Folia pinnata foliolis utrinque 7. vel 9. coloris argentei; flores lutei. Bractææ digitatæ.

- Cytisoides*. 5. ANTH. fruticosa, foliis ternatis inæqualibus, calycibus lanatis lateralibus. *Linn. sp.* 720.
 Barba jovis incana Hispanica. *Tour.* 651.
 Spartium latifolium parvo flore. *Barr. Icon.* 1182.
 Hospitatur sub dio. Bipedalis, incana: rami teretes. Folia inferiora ternata. Foliolis integerrimis; impari petiolato majori. Folia summa simplicia sessilia ovata, è quorum alis pedunculi solitarii triflori quadriflorivè, bractea ovata foliacea integerrima terminati. Flores lutei. Semina non maturans.

LUPINUS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 693.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. herbacea simplex. Fol. alterna petiolata digitata foliolis integerrimis. Flor. sessilis terminalis subverticillata. Fulc. stipulæ geminæ solutæ integerrimæ, basi adnatæ.

Varius. 1. LUPINUS calycibus semiverticillatis appendiculatis: labio superiore bifido, inferiore subtridentato. *Linn. sp.* 721.

Lupinus calycibus alternis utrinque appendiculatis. *Sauv.* 214.

Lupinus calycibus verticillatis trifoliis, foliis linearibus septenis. *Sauv.* 215.

Lupinus sylvestris purpureo flore, semine rotundo vario. *Bot. Mons.* 167.

Et semine majore. *Bot. app.* 301. & minor. *Ibid.* & *Tour.* 392.

Le Lupin.

HABITAT à Gramont. Huc certè referendus lupinus. *Sauv.* 215. n°. 138. & *Bot. Mons.* 167. n°. 2.

Hirsutus. 2. LUPINUS calycibus verticillatis appendiculatis: labio superiore & inferiore integris. *Linn. sp.* 721.

Lupinus Indicus. *Corn. can.* 207.

Lupinus calycibus verticillatis, labio inferiore integerrimo. *Sauv.* 215.

Lupinus peregrinus vel villosus cæruleus major. *Tour.* 392.

Hospitatur sub dio.

Ensis. 3. LUPINUS calycibus verticillatis appendiculatis: labio

DIADELPHIA DECANDRIA. 363

superiore bipartito, inferiore tridentato. *Linn. sp.*
722.

Lupinus calycibus verticillatis, labio inferiore trifido.
Sauv. 215.

Lupinus luteo flore, semine compresso vario. Bdt.
Monf. 167.

Lupinus sylvestris flore luteo. Tour. 393. Barr. Icon.
1032.

HABITAT à Rouquet, Valene.

R O B I N I A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 702.*

Char. secund. *Rad. ramosa lignosa. Caul. arborea*
vel fruticulosa. Fol. alterna, abrupte vel impa-
ri-pinnata, foliolis æqualibus integerrimis op-
positis, sessilibus vel petiolatis. Flor. axillaris ra-
cemosa vel aggregata. Fulc. aculei geminati loco
stipularum. Spinulæ (in una specie) petiolos
& foliola terminantes.

1. ROBIN. pedunculis racemosis, foliis impari - pin- *Pseudo-*
natis. *Linn. sp. 722.* *acacia.*

Robinia aculeis geminatis. Sauv. 238.

Acacia Americana Robini. Barr. It. 740. Corn. can. 172.

Le faux Acacia; vernaculè l'Acacia.

HOSPITATUR sub dio. Facta indigena.

2. ROBIN. pedunculis simplicissimis, foliis abruptè-pin- *Caragana.*
natis. *Linn. sp. 722.*

Robinia pedunculis simplicissimis, foliis pinnatis.
Hort. ups. 212.

HOSPITATUR sub dio. Frutex humanæ altitudinis. E
gemmis prodeunt primo vere folia sex vel quinque,
e quorum medio simul pedunculi totidem uniflori.
Rami angulati. Folia pinnata foliolis quinque vel
utrinque 7.

3. ROBIN. pedunculis simplicissimis, foliis quaternatis *Pygmaea.*
sessilibus. *Linn. sp. 723.*

HOSPITATUR sub dio. Petiolorum basis incrassata.
Foliola lanceolata apice pungentia. Petioli spinulæ
etiam terminati loco folioli imparis.

C O L U T E A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 722.

Char. secund. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* fruticosa. *Fol.* alterna impari-pinnata, foliolis petiolatis æqualibus integerrimis. *Flor.* axillaris petiolata, laxè racemosa. *Fulc.* stipulæ minimæ solutæ geminæ. Bractææ minimæ ad basim singuli pedicelli.

Arborescens. 1. COLUT. arborea, foliolis obcordatis. Linn. sp. 723.
Colutea vesicaria. Bor. Monf. 72. Tour. 649.
Le Baguenaudier.

HABITAT à Castelnau, Lavalette, le long de la rivière.
Rami glaberrimi. Foliola sæpius ovata, emarginata, stylo terminata. Flores lutei.

Frutescens. 2. COLUT. fruticosa, foliolis ovato-oblongis. Linn. sp. 723.

Colutea Æthiopica flore purpureo. Tour. 649.

Le Baguenaudier d'Ethiopie.

HOSPITATUR in hybernaculo. Rami striati pubescentes.
Foliola pubescentia. Flores coccinei. Frutex.

P H A S E O L U S,

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 703.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea volubilis ramosa. *Fol.* alterna petiolata ternata: foliolis integerrimis: lateralibus deorsum latioribus sessilibus: impari æquali petiolato. *Flor.* axillaris racemosa vel subcapitata. *Fulc.* stipulæ minimæ solutæ geminæ. Bractææ binæ ad singulum florem singulumque foliolum.

* Scandentes.

Vulgaris. 1. PHAS. caule volubili, floribus racemosis geminis, bracteis calyce majoribus, leguminibus pendulis. Linn. sp. 723.

Phaseolus vulgaris. Tour. 412.

Phaseolus radice annua, caule volubili, leguminibus pendulis torulosis compressis. Sauv. 191.

L'Haricot; vernaculè lou Fabarouit, las Moungetes.

HABITAT in hortis oleraceis.

Coccineus. 2. PHAS. caule volubili, floribus racemosis geminis.

bracteis calyce brevioribus, leguminibus pendulis.

Linn. sp. 724.

Phaseolus phariceo flore. *Tour. 414. Sauv. 192.*

HABITAT in hortis pro ornamento.

3. PHAS. caule volubili, pedunculis subcapitatis, seminibus tetragono-cylindricis pulverulentis. *Linn. sp. 724. Sauv. 192.* *Farinosus.*

HOSPITATUR sub dio. Foliolum impar trilobum, intermedio productiore. Foliola lateralibus subbiloba. Pedunculi foliis longiores.

4. PHAS. caule volubili, vexillis & carina spiraliter convolutis. *Linn. sp. 725.* *Caracalla.*

Phaseolus Indicus cochleato flore. *Tour. 414.*

Phaseolus radice perenni subrotunda, leguminibus folio longioribus teretiusculis glabris. *Sauv. 192.*

La Caracalle.

HOSPITATUR in hybernaculo.

DOLICHOS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 704.*

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. volubilis herbacea ramosa. Fol. alterna petiolata ternata foliolis integerrimis; ut in priori. Flor. terminalis subverticillata. Fulc. ut in priori.

Obs. genus istud priori summopere vicinum, & à sola fructificatione repetenda disparitas.

1. DOLIC. leguminibus ovato-acinaciformibus, seminibus ovaris hulo arcuato versus alteram extremitatem. *Linn. sp. 725. Sauv. 192.* *Lablap.*

Phaseolus Aegyptiacus nigro semine. *Tour. 414.*

HOSPITATUR sub dio. Bractea setacea ad basin foliorum. Bractea ad basin calycum concava; ipso fere majores, ovatae. Basis communis florum callosa. Caulis saepius scaber. Flores semiverticillati, quatuor vel quinque simul.

2. DOLIC. leguminibus pendulis cylindricis torulosis, pedunculis erectis multifloris. *Linn. Cent. 184. Syst. 1162.* *Sinensis.*

HOSPITATUR sub dio. Folia magna. Legumina longiora.

P I S U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 706.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea volubilis ramosa. *Fol.* alterna abruptè pinnata : foliolis integerrimis sessilibus. *Flor.* axillaris pedunculata, pedunculis unifloris multiflorisvè. *Falc.* stipulæ geminæ solutæ Cirrhus ramosus folia terminans. Pedunculi filo terminati.

- Sativum.* 1. PISUM stipulis infernè rotundatis crenatis, petiolis teretibus, pedunculis multifloris. *Linn. sp.* 727.
Pisum hortense majus. *Tour.* 394. & varietates.
Le Pois ; vernaculè *lous pèssés*.

HABITAT in hortis. Stipulæ foliolis multo majores. Foliola ovata.

- Ochrus.* 2. PISUM petiolis decurrentibus membranaceis diphyllis, pedunculis unifloris. *Linn. sp.* 727.
Ochrus folio integro capreolos emittente. *Bot. Monf.* 188. *Tour.* 396.

HABITAT à la Colombiere, Montferrier, Laverune. Occurrit sæpe petiolis tetraphyllis... Facies lathyti.

O R O B U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 709.

Char. secund. *Rad.* ramosa vel tuberosa. *Caul.* herbacea rigida, simplex vel ramosa. *Fol.* alterna abruptè pinnata : foliolis subpetiolatis integerrimis. *Flor.* axillaris pedunculata subracemosa. *Falc.* stipulæ solutæ geminæ.

- Vernus.* 1. OROB. foliis pinnatis ovatis, stipulis semisagittatis integerrimis, caule simplici. *Linn. sp.* 718.
Orobis sylvaticus purpureus vernus. *Tour.* 393.
Orobis caule simplicissimo, foliolis pluribus ovatis acutis. *Sauv.* 236.

L'Orobe Sauvage.

HABITAT à Lesperou, Lamalon, Villemagne.

- Tuberosus.* 2. OROB. foliis pinnatis lanceolatis, stipulis semisagittatis integerrimis, caule simplici. *Linn. sp.* 718.
Orobis caule simplicissimo, foliolis pluribus lanceolatis oblongis. *Sauv.* 235.
Orobis sylvestris angustifolius asphodeli radice. *Bot. Monf.* 303. *Tour.* 393.

HABITAT cum priori, & à Valene.

3. OROB. caule ramoso, foliis sexjugis ovato-oblongis. *Niger*.
Linn. sp. 729. stipulis subulatis.

Orob. caule ramoso glabro, foliis... Linn. Syst.
1164.

Orob. sylvaticus foliis viciz. *Bot. Monsf.* 196. *Tour.*
393.

Orob. caule ramoso. *Sauv.* 236.

L'Orobe.

HABITAT cum prioribus.

4. OROB. caule ramoso, foliis bijugis lanceolatis ner- *Pyrenaicus*,
vosus, stipulis subspinosis. Linn. Syst. 1164.

Orob. caule ramoso, foliis trijugis... sp. pl. 729.

Orob. pyrenaicus laxifolius nervosus. *Tour.* 235.

HABITAT à Lespinouse près de Lamalon.

LATHYRUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 707.

Char. secund. Rad. fibrosa ramosa vel tuberosa.

Caul. herbacea volubilis angulata. *Fol.* alterna,
nunc simplex integerrima sessilis, nunc abruptè
pinnata, petiolata; petiolis sæpius diphyllis.
Flor. axillaris pedunculata, pedunculis uniflo-
ris multiflorisve. *Falc.* stipulæ sagittatæ vel
semi-sagittatæ solutæ geminæ. Cirrhi ramosi ad
apicem petiolorum.

Obs. Species una aphylla, & cirrhis destituta.

* *Pedunculis unifloris.*

1. LATH. pedunculis unifloris, foliis simplicibus, stipu- *Nissolia*,
lis subulatis. Linn. sp. 729.

Lathyrus sylvestris minor. *Bot. Monsf.* 150.

Nissolia vulgaris. *Tour.* 656.

Lathyrus angustifolius erectus, folio singulari sine ca-
preolis Nissolii. *Hort. Monsf. Icon.* 112.

HABITAT à Montferrier, Lavalette, Clapiers. Cirrhi
nulli. Folia linearia. Variat pedunculis bifloris.

2. LATH. pedunculis unifloris, cirrhis aphyllis, sti- *Aphaca*,
pulis sagittato-cordatis. Linn. sp. 729.

Vicia lutea foliis convolvuli minoris. *Bot. Monsf.* 278.

Aphaca Lobelii. *Tour.* 399.

Vernaculè, *la Lifette*.

HABITAT in arvis. Caulis subtetragonus. Cirrhi è medio stipularum, pedunculus ex ala cirrhi.

Amphicar. 3. LATH. pedunculis unifloris calyce longioribus, cirrhis diphyllis simplicissimis. *Linn. sp. 729.*

Lathyrus pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, radicibus etiam sub terram fructificantibus. *Sauv. 192.*

Vicia filiquas infra supraque terram edens. *Tour. 397.*

Viciæ similis supra & infra terram fructum gerens. *Bot. Mons. 276.*

HABITAT à la Garrigue du Terrail, & au-delà de Lavurune.

Cicera. 4. LATH. pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, leguminibus ovatis compressis, dorso canaliculatis. *Linn. sp. 730.*

Lathyrus pedunculis unifloris, foliis lanceolato-linearibus, internodiis membranaceis. *Sauv. 193.*

Lathyrus sativus flore purpureo. *Bot. Mons. 150. Tour. 395.*

Vernaculè, *las Gairouttes*.

HABITAT in arvis.

Sativus. 5. LATH. pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, leguminibus ovatis compressis, dorso bimarginatis. *Linn. sp. 730. Sauv. 193.*

Lathyrus pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis tetraphyllisque. *Linn. Syft. 1164.*

Lathyrus sylvestris flore fructuque albo. *Bot. Mons. 150. Tour. 395.*

La Gesse, vernaculè, *las Geisses*.

HABITAT cum prioribus. Caulis anceps. Corollæ vexillum coccineum vel violaceum. Alæ albæ, apice nigricantes. Calycis lacinia inferior longior.

Serifoliust. 6. LATH. pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, foliolis fetaceo-linearibus. *Linn. sp. 731.*

Lathyrus foliis linearibus, stipulis subulatis, caulibus nudis. *Sauv. 193.*

Lathyrus folio tenuiore, floribus rubris. *Bot. Mons. 151. Tour. 396.*

HABITAT à Gaunelles, Montferrier. Folia radicalia stylo terminata. Legumina subtetrasperma glabra ventricosa; corollæ calycibus majores.

7. LATH.

7. LATH. pedunculis unifloris cirrho terminatis, cirrhis *Angulatus*,
diphyllis, foliis linearibus. *Linn. sp. 731.*

Lathyrus angustifolius humilior. Bot. Mons. 150.

Lathyrus pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, foliis capillaceis. Sauv. 193.

Lathyrus angustissimo folio semine anguloso. Tour. 395.

HABITAT cum superiori, à *Castelnau, au Terrail.*
Filum pedunculos terminans calyce longius. Legumina lineari-lanceolata compressa subdecaisperma.

* *Pedunculis bifloris.*

8. LATH. pedunculis bifloris, cirrhis diphyllis, foliis *Ovaratus*,
ovato-oblongis, leguminibus hirsutis. *Linn. sp. 732.*

Le Pois d'odeur.

HOSPITATUR in hybernaculo. Sempervirens.

9. LATH. pedunculis bifloris, cirrhis diphyllis, foliis *Hirsutus*,
lineari-lanceolatis, leguminibus hirsutis, seminibus scabris. *Linn. sp. 732. Sauv. 113.*

Lathyrus angustifolius siliqua hirsuta.

Tour. 396.

HABITAT à *Prades, Laverune.*

10. LATH. pedunculis bifloris, cirrhis diphyllis, foliis *Annuus*,
ensiformibus, leguminibus glabris, stipulis bipartitis. *Linn. syst. 1165.*

HABITAT aux prés d'*Arene & à Lattes.* Lobus inferior stipularum superiore sextuplo minor, capillaris.

* *Pedunculis multifloris.*

11. LATH. pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis; foliis *Tuberosus*,
ovalibus, internodiis nudis. *Linn. sp. 732.*

Sauv. 194.

Lathyrus arvensis repens tuberosus. Bot. Mons. 151.

Tour. 395.

Les Glands de terre, ou Vesse sauvage.

HABITAT à *Lattes.* Rami humifusi. Foliola ovalia stylo terminata.

12. LATH. pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis; foliis *Pratensis*,
lanceolatis; cirrhis simplicissimis. *Linn. sp. 733.*

Lathyrus sylvestris luteus foliis viciae. Tour. 395.

Lathyrus sylvestris luteus dumetorum. Bot. Mons. 151.

370 DIADELPHIA DECANDRIA.

Lathyrus pedunculis multifloris.... internodiis nudis. *Sauv.* 193.

β. Lathyrus pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis simplicissimis.

Lathyrus foliis lanceolato-linearibus, internodiis membranaceis. *Sauv.* 193. n°. 152.

Lathyrus latifolius luteus. *Bot. Mens.* 150. *Tour.* 395.

HABITAT à Gramont, Lattes. Stipulæ maximæ. Foliola cirrho longiora.

Latifolius. 13. LATH. pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis; foliolis lanceolatis, internodiis membranaceis. *Linn. sp.* 733. *Sauv.* 194.

Lathyrus latifolius. *Bot. Mens.* 151. *Tour.* 395.

HABITAT cum superioribus, & à Lavalette.

Heterophyll. 14. LATH. pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis tetraphyllisque; foliolis lanceolatis. *Linn. sp.* 733.

Lathyrus foliolis gramineis trinerviis, internodiis membranaceis. *Sauv.* 193.

Lathyrus major Narbonensis angustifolius. *Bot. Mens.* 151. *Tour.* 395.

HABITAT au Terrail, Laverune; & cum congenerebus.

V I C I A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 708.

Char. secund. Rad. fibrosa ramosa. Caul. herbacea ramosa subtetragona. Fol. alterna abruptè pinnata, foliolis integerrimis subsessilibus. Flor. axillaris, nunc subsessilis solitaria vel aggregata, nunc racemosa pedunculata. Fulc. stipulæ geminæ solutæ sæpius semi-sagittatæ integerrimæ vel integræ. Cirrhi petiolos terminantes, ramosi.

* *Floribus racemosis seu pedunculis multifloris.*

Dumetorum. 1. VICIA pedunculis multifloris, foliolis reflexis mucronatis ovatis, stipulis subdentatis. *Linn. sp.* 734.

Vicia... petiolis polyphyllis cirrhosis, foliolis alternis ovatis, stipulis dentatis. *Sauv.* 234.

Vicia sepium perennis. *Bot. Mens.* 307.

Vicia maxima dumetorum. *Tour.* 307.

HABITAT inter Dumeta; à Prades, Rouquet, Valenc.

2. VICIA pedunculis multifloris, foliolis ovalibus, stipulis denticulatis. *Linn. sp. 734.* *Sylvatica;*

Vicia pedunculis multifloris, stipulis crenatis. *Sauv.* 234.

HABITAT à Valene, au Mont St. Loup.

3. VICIA pedunculis multifloris, floribus imbricatis, foliolis lanceolatis pubescentibus, stipulis integris. *Linn. sp. 735.* *Cracca.*

Vicia pedunculis multifloris, stipulis utrinque acutis integris. *Sauv.* 234.

Vicia perennis dumetorum multiflora. *Bot.* 277. & perennis incana multiflora. *Ibid.*

Vicia multiflora. *Tour.* 397.

HABITAT in pratis; à Lattes. Racemi foliis multo longiores, infernè nudi.

4. VICIA pedunculis multifloris, floribus distantibus, foliolis linearibus, stipulis infernè denticulatis. *Linn. des. sp. 735.* *Onobrychoi-*

Vicia pedunculis multifloris, stipulis crenatis, foliolis linearibus. *Sauv.* 235.

Vicia five cracca foliis & siliquis longioribus. *Bot. Monf.* 277. *Tour.* 397.

HABITAT à Lattes, Monteils.

5. VICIA pedunculis multifloris, petiolis sulcatis subdecaphyllis; foliolis lanceolatis glabris. *Linn. sp. 736.* *Biennis.*

Vicia pedunculis multifloris, petiolis polyphyllis, foliolis.... *Sauv.* 234.

Vicia perennis multiflora majori flore caeruleo & albo. *Bot. Monf.* 307. *Tour.* 397.

* Floribus axillaribus subsessilibus.

6. VICIA leguminibus sessilibus subbinatis erectis, foliolis retusis, stipulis macula notatis. *Linn. sp. 736.* *Sativa;*

Vicia leguminibus erectis, petiolis polyphyllis, foliolis acumine emarginatis, stipulis dentatis. *Sauv.* 234.

Vicia sativa vulgaris. *Bot. Monf.* 276. *Tour.* 396.

La Vesse; vernaculè, de Besses.

HABITAT in arvis. Foliola lineari-lanceolata stylo terminata. Stipularum denticulus uncinatus. Flores foliolis æquales.

7. VICIA leguminibus sessilibus solitariis erectis glabris, foliolis fœtis, inferioribus obcordatis. *Linn. sp. 736.* *Lathyroides.*

Vicia minima cum filiquis glabris. *Tour.* 397.

Viciæ sive *cracæ minimæ* species cum filiquis glabris.
Bot. Monf. 277.

HABITAT copiosè *au bois de Gramont*. Cauliculi palmates tenuissimi humifusi. Petioli inferiores sæpiùs diphylli. Stipulæ integerrimæ. Legumina subdeca-sperma lanceolata. Foliola superiora lanceolata acuminata, leguminibus duplo minora. Flores cærulei minimi. Floret ferè toto anno.

Lutea. 8. *VICIA* leguminibus sessilibus reflexis pilosis solitariis pentaspermis, corollæ vexillis glabris. *Linn. sp.* 736.

Vicia leguminibus solitariis deorsum flexis hirsutis.
Sauv. 235.

Vicia sylvestris lutea filiqua hirsuta. *Tour.* 398.

Vernaculè, *Cornebioou*.

HABITAT in arvis, pratis & herbidis. Foliola obversè cordata vel ovata stylo terminata. Stipulæ integerrimæ vel denticulatæ, minimæ. Legumina sæpiùs pentasperma ovata ventricosa.

Hybrida. 9. *VICIA* leguminibus sessilibus reflexis pilosis pentaspermis, corollæ vexillis villosis. *Linn. sp.* 737.

HABITAT cum priori cui simillima.

Peregrina. 10. *VICIA* leguminibus sessilibus pendulis glabris tetraspermis, foliolis linearibus emarginatis. *Linn. sp.* 737.

Vicia angustifolia purpureo-violacea, filiqua lata glabra. *Bot. Monf.* 276. *Tour.* 397.

Vicia pedunculis unifloris, cirrhus polyphyllis, foliolis linearibus, stipulis crenatis. *Sauv.* 234.

HABITAT à *Castelnau*, *Montferrier*, *Lavalette*, *Lacombière*. Foliola angustissima linearia emarginata cum stylo. Petioli calycibus subæquales. Variat foliolis obcordatis.

Sepium. 11. *VICIA* leguminibus pedicellatis subquaternis erectis, foliolis ovatis integerrimis, exterioribus decre-scentibus. *Linn. sp.* 737.

Vicia leguminibus ascendentibus, petiolis polyphyllis, foliolis ovatis acutis integerrimis. *Sauv.* 234.

Vicia sepium folio rotundiore acuto. *Tour.* 397.

HABITAT à *Valene*, vers la source du Lès, à *Lesperou*, au mont St. Loup. Flores sæpiùs bini vel terni pedunculo brevissimo donati.

Narbonensis. 12. *VICIA* leguminibus subsessilibus solitariis erectis vil-

lofis, foliolis senis subovatis, stipulis denticulatis.
Linn. sp. 737.

Vicia leguminibus subsessilibus erectis, foliolis subovatis, stipulis dentatis. *Sauv. 234.*

Vicia sepium latissimo folio non serrato. *Tour. 397.*

Faba sylvestris fructu rotundo atro. *Bot. Monf. 96.*

HABITAT ad dexteram; à Boutonet, Prades, Grabels, & à la mer. Datur foliolis omnibus quaternis acuminatis integerrimis.

13. VICIA caule erecto, petiolis absque cirrhis. *Linn. Faba sp. 737.*

Faba rotunda oblonga. *Tour. 391.*

La Fève de Marais; vernaculé, las Fabas.

HABITAT in hortis.

C I C E R.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 715.*

Char. secund. Rad. fibrosa ramosa. Caul. herbacea erecta ramosa angulata. Fol. alterna impari-pinnata, foliolis simplicibus subsessilibus. Flor. axillaris solitaria pedunculata. Fulc. stipulae geminae solutae. Filum pedunculos terminans.

1. CICER foliolis serratis ovatis ad basim integerrimis, *Aristinum*, stipulis dentatis.

Cicer foliolis serratis. *Linn. sp. 738. Sauv. 233.*

Cicer sativum. *Bot. Monf. 65. Tour. 389.*

Le Pois chiche; vernaculé, lous Séses.

HABITAT circa urbem, in fossis & arvis. Caulis villosus. Pedunculi longitudine foliolorum. Folia pinnata, foliolis 15 vel 17.

E R V U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 714.*

Char. secund. Rad. fibrosa ramosa. Caul. herbacea ramosa angulata. Fol. alterna abruptè-pinnata, foliolis sessilibus integerrimis. Flor. axillaris pedunculata, pedunculis unifloris multiflorisve. Fulc. stipulae subsagittatae geminae solutae. Cirrus petiolos terminans simplex.

Obs. Genera vicie & ervi summopere affinia:

- Lens.* 1. ERVUM seminibus compressis convexis. *Linn. sp.* 738.
Cicer pedunculis bifloris, foliis integerrimis, stipulis indivisis. *Sauv.* 233.
Lens vulgaris. *Bot. Mons.* 152. *Tour.* 390.
La Lentille; vernaculè, *las Lentilles*.
HABITAT in arvis. Pedunculi longitudine foliorum subquadriflori. Foliola ovata.
- Tetrasper-* 2. ERVUM pedunculis subbifloris, seminibus globosis
nunq. quaternis. *Linn. sp.* 738.
Vicia segetum singularibus siliquis glabris. *Tour.* 397.
Vicia sive eracca foliis & siliquis longioribus. *Bot. Mons.* 277. *Tour.* 397.
HABITAT à la Valette, la Colombiere, Castelnau. Pedunculi interdum quadriflori longitudine foliorum. Foliola linearia utrinque acuminata. Variat pedunculis unifloris, leguminibus pentaspermis.
Obs. Utrum ad istam speciem vel viciam onobrychioidem pertineat synonymia Magnolii, decident oculatores.
- Hirsutum.* 3. ERVUM pedunculis multifloris, seminibus globosis binis. *Linn. sp.* 738.
Cicer pedunculis unifloris vel multifloris, seminibus globosis. *Sauv.* 233.
Vicia segetum cum siliquis plurimis hirsutis. *Bot. Mons.* 277. *Tour.* 397.
HABITAT cum priori. Pedunculi quadriflori. Foliola duplo breviora quam in specie supra laudata, linearia integerrima. Legumina etiam sæpè trisperma & tetrasperma.
- Ervilia.* 4. ERVUM germimibus undato-plicatis. *Linn. sp.* 738.
Sauv. 237.
Orobus receptus herbariorum. *Bot. Mons.* 196.
Ervum verum. *Tour.* 398.
Les Ers; vernaculè, *lous Effes*.
HABITAT in arvis. Folia utrinque 10-16. ovata, apice emarginata. Stipulæ sagittatæ minimæ. Pedunculi quadriflori. Flores distantes. Legumina majora quam in præcedentibus, tetrasperma vel trisperma.
- Solanense.* 5. ERVUM pedunculis subbifloris cirrhosis, petiolis acuminatis, foliis obtusis. *Linn. syst.* 1167.
HABITAT à Montferrier, la Colombiere, au Terrail.

CYTISUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 699.

Char. secund. Rad. lignosa ramosa. Caul. fruticulosa vel arborea. Fol. alterna petiolata vel sessilis, ternata; foliolis integerrimis æqualibus. Flor. nunc racemosa terminalis, nunc axillaris pedunculata, pedunculis unifloris multiflorisve, solitariis aut aggregatis. Fulc. stipulæ geminæ solutæ simplices integerrimæ. (Bractæ in quibusdam speciebus ad basin calycum.)

1. CYTIS. racemis simplicibus pendulis, foliolis ovato-oblongis. Linn. sp. 739. Sauv. 190. *Laburnum.*

Cytisus alpinus latifolius, flore racemoso pendulo. Tour. 648.

Le Cytise des Alpes.

HOSPITATUR sub dio, in frigidario. Arbor humanam bis excedens altitudinem. Foliorum petioli longissimi.

2. CYTIS. racemis simplicibus erectis, foliolis ovato-oblongis. Linn. sp. 739. Sauv. 190. *Nigricans.*

Cytisus glaber nigricans. Tour. 649.

HABITAT à Lesperou.

3. CYTIS. racemis erectis, calycibus bractea triplici auctis, foliis floralibus sessilibus. Linn. sp. 739. *Sessilifolia.*

Cytisus foliis sæpius sessilibus, calycibus squama triplici auctis. Sauv. 191. n° 128. & 131.

Cytisus glaber foliis subrotundis, pediculis brevissimis. Tour. 648.

Cytisus glaber filiqua lata. Bot. Mons. 84.

Le Cyrise.

HABITAT à Viols, Grabels, Valene.

4. CYTIS. floribus capitatis, ramis decumbentibus. Linn. *Supinus.* sp. 740. Sauv. 190.

Cytisus hirsutus. Tour. 648.

HABITAT à Lesperou, Lamalou.

5. CYTIS. floribus lateralibus, foliis hirsutis, caule erecto striato. Sauv. 191. Linn. sp. 740. *Monspessulana.*

Cytisus Monspessulanus, medicæ folio, filiquis dense congestis & villosis. Tour. 648.

HABITAT à Gramont, Montferrier. Pedunculi sæpius quaterni, quini æquales, uniflori.

6. CYTIS. floribus pedunculatis subsessilibusque, foliis *Argentens.*

tomentosis conduplicatis, caulibus fruticosis. *Linn. Syst.* 1167.

Cytisus floribus subsessilibus, foliis tomentosis, caulibus herbaceis. *Linn. sp.* 740.

Cytisus acaulis, floribus solitariis, foliis sericeis lanceolatis. *Sauv.* 191.

Trifolium argenteum floribus luteis. *Bot. Monf.* 267.

Cytisus humilis angustifolius argenteus. *Tour.* 648.

Le Cytise argenté de Montpellier.

HABITAT à la Colombière, Lavalette, Montferrier, Castelnau; & vicinis inter Saxa. Petioli longissimi, Stipulae subulatae integerrimae. Bractea triplex ad quemlibet calycem. Tota planta incana splendens. Pedunculi saepius quadriflori quandoque oppositifolii,

A R A C H I S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 723.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea striata; *Fol.* alterna petiolata abruptè pinnata tetraphylla, foliolis integerrimis. *Flor.* axillaris solitaria pedunculata. *Fulc.* stipulae adnatae geminae amplexicaules integerrimae subulatae.

Hypogae. 1. ARACHIS. *Linn. sp.* 741.

Lupinus quadrifolius luteus. *Barr. Icon.* 1215.

Le Pistachier de terre.

HOSPITATUR sub dio. Apricatur. Foliola subaequalia ovalia nervosa. Pedunculi villosi. Stipulae longissimae, Petioli villosi canaliculati.

GLYCYRRHIZA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 726.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea striata ramosa. *Fol.* alterna impari-pinnata, foliolis oppositis integerrimis. *Flor.* axillaris pedunculata subcapitata. *Fulc.* stipulae geminae solutae integerrimae. Bractea ad basim singuli floris, integerrima.

Echinata. 1. GLYCYRR. leguminibus echinatis, foliolis imparibus sessilibus. *Linn. Syst.* 1168.

Glycyrrhiza leguminibus echinatis. *Linn. sp.* 741. *Sauv.* 233.

Glycyrrhiza capite echinato: Tour. 389.

HOSPITATUR sub dio. Foliola subsessilia. Capitulis vix foliolo longioribus. Stipulæ & bractæ subulatæ.

2. GLYCYRR. leguminibus glabris, foliolis imparibus *glabra* petiolatis. *Linn. Syst. 1168.*

Glycyrrhiza leguminibus glabris, Linn. sp. 742. Sauv. 232.

Glycyrrhiza glabra & Germanica, radice repente. Bot. Monf. 110. Tour. 389.

La Reg'isse; vernaculè, la Regaluffie.

HABITAT à Vic, Mézès. Foliola omnia ovalia acuminata, ut in priori.

CORONILLA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 732.*

Char. secund. Rad. ramosa lignosa. Caul. fruticosa vel herbacea, teres vel angulata. Fol. impari-pinnata, foliolis integerrimis petiolatis oppositis. Flor. axillaris pedunculata dimidiato-capitata. Fulc. stipulæ nunc geminæ solutæ laterifoliæ, nunc solitariae oppositifoliæ.

1. CORON. fruticosa, pedunculis subtrifloris, corollarum unguibus calyce duplo longioribus, caule angulato. *Linn. Syst. 1168. Emerus.*

Coronilla fruticosa, corollarum unguibus calyce duplo longioribus. Linn. sp. 742.

Emerus. Tour. 650.

Colutea filiquosa vel scorpioides major. Bot. Monf. 76.

Le Colutea des Jardiniers Fleuristes.

HABITAT juxta amnem; à Castelnau, Lavalette. Variat pedunculis sexfloris. Stipulæ deciduæ. Foliola obversè ovata.

2. CORON. fruticosa, foliolis quinatis ternatisque linearilanceolatis subcarnosis obtusis. *Linn. Syst. 1168. Juncea.*

Coronilla fruticosa, foliolis quinis sub lanceolatis, stipulis lanceolatis. Linn. sp. 742.

Colutea caule genistæ fungoso. Bot. Monf. 72.

Coronilla caule genistæ fungoso. Tour. 650.

HOSPITATUR sub dio. Nondum vidi in agro Monspessulano.

3. CORON. fruticosa, foliolis subnoventis, stipulis *Valentina* suborbiculatis. *Linn. Syst. 1168.*

378 DIADELPHIA DECANDRIA.

Coronilla fruticosa stipulis subrotundis. *Linn. sp.* 742.
Coronilla fruticosa, leguminibus teretibus, pedunculis mult. floris. *Sauv.* 233.

Polygala Valentina. *Bot. Mons.* 303.

Coronilla sive *colutea minima*. *Tour.* 650.

HABITAT à Valene, au Capouladou.

Glauc. 4. CORON. fruticosa, foliolis suborbiculatis, stipulis ovatis, pedunculis complanatis.

Coronilla foliolis septenis, stipulis lanceolatis. *Linn. Syst.* 1168. *Cent.* 68.

Colutea scorpioides coronata. *Bot. Mons.* 72.

Coronilla maritima glauco folio. *Tour.* 650.

Colutea scorpioides coronata glauco folio, maritima. *B. Pin.* 397.

HOSPITATUR sub dio. A Cette vers le Nazareth, à Valene. Folia interdum quinque, septem vel novem obcordata

Minima. 5. CORON. suffruticosa procumbens, foliolis lanceolatis novenis, stipula opposit. folia emarginata. *Linn. Syst.* 1168. *Cent.* 186.

Ferrum equinum Gallicum. *Bot. Mons.* 97.

Coronilla minima. *Tour.* 650.

HABITAT à Montferrier; in pinetis, au Martinet de Mr. Boulet, près Lavalette. Foliola omnia interdum obverse ovata, inferioribus ad basim petioli juxta caulem, in omnibus vel à speciebus, petioli ad basim denudati. Stipula minima.

Securidaca. 6. CORON. herbacea leguminibus falcato-gladiatis, foliolis plurimis. *Linn. Syst.* 1168. *Sp. pl.* 743. *Sauv.* 235.
Securidaca lutea major. *Tour.* 399.

HOSPITATUR sub dio. Folia pinnata, foliolis utrinque 9 vel 11 obovatis. Caulis fistulosus. Pedunculi foliis duplo longiores.

Varia. 7. CORON. herbacea, leguminibus erectis teretibus torosis numerosis, foliolis plurimis glabris. *Linn. Syst.* 1168. *Sp. pl.* 743.

Coronilla flore vario. *Tour.* 650.

Securidaca dumetorum major, flore vario, siliquis articulatis. *Bot. Mons.* 235.

HABITAT au Capouladou, à Valene, St. Guillin le Désert. Rami striati humifusi. Foliola utrinque 9 vel 11 stylo terminata. Pedunculi foliis æquales. Petioli ad basim foliosi ut in specie 5^a.

ORNITHOPUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 731.

Char. secund. Rad. tenuis subsimplex. Caul. herbacea teres ramosa. Fol. alterna ternata vel impari-pinnata, foliolis oppositis subsessilibus integerrimis. Flor. axillaris pedunculata, pedunculis solitariis multifloris nudis vel apice foliosis. Fulc. nulla, (in unâ specie stipula oppositifolia emarginata.)

1. ORNITH. foliis pinnatis, leguminibus subarcuatis. *Perjussillur.*
Linn. sp. 743. Sauv. 236.

2. Ornithopus foliis pinnatis, leguminibus articulatis, radice tuberosa. Sauv. 236.

3. Ornithopus... articulatis leguminum subrotundis laevibus. Sauv. 236.

HABITAT aux Maseles, à Prades, Rouquet.

2. ORNITH. foliis pinnatis, leguminibus compressis rugosis, pedunculis folio terminatis. *Compressus.*

Ornithopus... leguminibus compressis rugosis. Linn. sp. 744.

Ornithopodium scorpioides siliqua compressa. Tour. 400.

Ornithopodio affinis hirsuta scorpioides. Bot. Monf. 194.

Le Pied d'aïseau.

HABITAT à Gramont, Montferrier. Procumbens. Pedunculi terminati, folio pinnato, foliolis quinque septenis vel novenis.

3. ORNITH. foliis inferioribus simplicibus summis ternatis, impari maximo, stipula oppositifolia emarginata. *Scorpioides.*

Ornithopus foliis ternatis subsessilibus, impari maximo. Linn. sp. 744.

Ornithopus foliis ternatis appendiculatis. Sauv. 190.

Scorpioides an grævez telephium. Bot. Monf. 232.

Vernaculè, les Amaréles.

HABITAT in arvis copiosè. Caulis erectus. Stipula semivaginata. Pedunculi subquadriflori nudi.

380 DIADELPHIA DECANDRIA.

HIPPOCREPIS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 729.

Char. secund. *Rad.* tenuis subsimplex lignosa.
Caul. herbacea angulata ramosa. *Fol.* alterna
 impari-pinnata: foliolis subsessilibus integerrimis.
Flor. axillaris, nunc sessilis solitaria, nunc
 pedunculata dimidiato-capitata. *Fulc.* stipulæ
 geminæ solutæ.

Unifiliquosa. 1. HIPPOC. leguminibus solitariis subsessilibus. *Linn. sp.*
 744. *Sauv.* 236.

Ferrum equinum siliqua singulari. *Bot. Mons.* 96.
Tour. 400.

Le Fer à cheval.

HABITAT à Lavalette, au Terrail, Castelnau, Bou-
 tonet. Humifusa. Folia pinnata foliolis 7-gemargi-
 natis subovatis. Legumina foliis æqualia.

*Multifili-
 quosa.* 2. HIPPOC. leguminibus pedunculatis confertis, mar-
 gine interiore sinuatis. *Linn. Syst.* 1169.

Hippocrepis leguminibus pedunculatis, margine al-
 tero lobatis. *Linn. sp.* 744. *Sauv.* 236.

Ferrum equinum siliqua multiplici. *Bot. Mons.* 96.
Tour. 400.

HABITAT cum priori. Pedunculi foliis triplo longio-
 res. Folia lineari-lanceolata.

Comosa. 3. HIPPOC. leguminibus pedunculatis confertis, mar-
 gine exteriori repandis. *Linn. sp.* 744.

Hippocrepis siliquis umbellatis utrinque emarginatis.
Sauv. 236.

Ferrum equinum Germanicum siliquis in summitate.
Bot. Mons. 96. *Tour.* 400.

HABITAT cum præcedentibus, & à Lattes. Facies
 antecedentis.

SCORPIURUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 730.

Char. secund. *Rad.* lignosa subsimplex. *Caul.* her-
 bacea ramosa subangulata. *Fol.* alterna attenua-
 to-petiolata simplex integerrima. *Flor.* axilla-
 ris pedunculata, pedunculis subtriquetris soli-
 tariis apice multifloris. *Fulc.* stipulæ geminæ
 adnatæ subulatae.

DIADELPHIA DECANDRIA. 381

1. SCORP. pedunculis unifloris, leguminibus tectis un- *vermiculata.*
dique squamis obtusis. *Linn. sp. 744.*
Scorpioides filiqua crassa Boëli. *Tour. 402.*
La Chenille.
HABITAT à la Colombiere. Procumbens.
2. SCORP. pedunculis subquadrifloris, leguminibus ex- *subvillosa.*
trorsum spinis confertis acutis. *Linn. sp. 745.*
Scorpioides repens bupleuri folio. *Bot. Mons. 233.*
Scorpioides bupleuri folio, corniculis asperis magis
in se contortis & convolutis. *Tour. 402.*
Scorpiurus. *Sauv. 61.*
HABITAT à Castelnau, la Peissine, Lavaudet, Lava-
lette. Pedunculi foliis triplo ferè longiores.
3. SCORP. pedunculis subtrifloris, leguminibus extror- *Sulcata.*
sum spinis distinctis acutis. *Linn. sp. 745.*
Scorpioides repens bupleuri folio. *Bot. Mons. 233.*
Tour. 402.
HABITAT au Terrail, Lavalette.

H E D Y S A R U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 727.*

Char. secund. *Rad.* tenuis simplex aut ramosa;
Caul. herbacea striata ramosa, procumbens
aut erecta. *Fol.* alterna, nunc ternata foliolis
petiolatis integerrimis, nunc impari-pinnata
foliolis sessilibus integerrimis. *Flor.* peduncu-
lata, axillaris aut terminalis, racemosa vel
subspicata. *Fult.* stipulæ geminæ solutæ inte-
gerrimæ. Bractææ ad basim florum. (Filum ad
basim foliolorum in trifoliatis; aculei in paucis
supra legumina.)

* *Foliis ternatis.*

1. HEDYS. foliis simplicibus ternatisque, floribus race- *Canadense.*
mosis. *Linn. sp. 748.*
Hedysarum triphyllum Canadense. *Tour. 401. Barr.*
Icon. 1140.
Hedysarum foliis inferioribus simplicibus, caulibus
ternatis, floribus laxè spicatis, leguminibus undu-
latis. *Sauv. 191.*
Le Sainfoin de Canada.

HOSPITATUR sub dio. Radix perennis. Caulis tripedalis erectus. Foliola ovato-lanceolata. Stipulae setaceae. Racemi axillares, ad basim bractea gemina setacea minima instructi inter stipulas. Bractea summae ad basim florum ovatae acuminatae. Racemus terminalis longissimus. Legumina articulis quatuor vel quinque. Petiolorum basis incrassata.

Canescens. 2. HEDYS. foliis ternatis subtus scabris, caule hispido, floribus racemosis conjugatis. *Linn. sp.* 748.

Hedysarum fruticosum supinum triphyllum flore purpureo. *Tour.* 401.

HOSPITATUR sub dio. Racemi subpaniculati. Bractea stipulaeque ut in priori.

* *Foliis pinnatis.*

Coronarum. 3. HEDYS. foliis pinnatis, leguminibus articulatis aculeatis nudis erectis, caule diffuso. *Linn. sp.* 750.

Hedysarum clypeatum flore suaviter rubente. *Tour.* 401.

Hedysarum foliis pinnatis, leguminibus articulatis. *Sauv.* 233.

Le Sainfoin d'Espagne.

HOSPITATUR sub dio. Pedunculi foliis longiores. Foliola ovalia carnosia, impari majori.

Onobrychis. 4. HEDYS. foliis pinnatis, leguminibus monospermis aculeatis, corollarum alis calyce brevioribus. *Linn. sp.* 751.

Hedysarum foliis pinnatis, leguminibus monospermis aculeatis. *Sauv.* 233.

Onobrychis folio viciae, fructu echinato major. *Bot. Mons.* 191. *Tour.* 390.

Le Sainfoin; vernaculé, l'Esparset.

HABITAT in arvis. Pedunculi longissimi. Bractea binae ad florem singulum. Stipulae acuminatae duplo majores quam in priori. Foliola stylo terminata, ovali-lanceolata. Denticulus calycinus inferior minimus.

Caput-galli. 5. HEDYS. foliis pinnatis, pedunculis subtrifloris, floribus alterdis sessilibus subspicatis.

Hedysarum foliis pinnatis, leguminibus monospermis aculeatis, petalis aequalibus. *Linn. sp.* 751.

Onobrychis fructu echinato minor. *Bot. Mons.* 191. *Tour.* 390.

HABITAT au-delà de Cannelles vers St. George, & à

DIADELPHIA DECANDRIA. 384

St. Jean de Vedas. Cauliculi procumbentes striati angulati. Pedunculi floriferi foliis breviores; fructiferi longiores. Calycum denticuli inferiores longissimi. Foliola ovata vel obcordata. Petioli ad basim foliolosi, in prioribus autem nudi. Legumina disperma. Corollæ magnitudine calycum. Aculei plurimi supra legumen; ærista composita denticulis foliaceis compressis latioribus, ternis vel quaternis incis. Hamil.

6. HEDYS. foliis pinnatis, leguminibus articulatis asperis, corollæ alis obsoletis, spicis hirsutis, caulibus depressis. *Linn. Syst.* 1171.

Onobrychis clypeata aspera minor. Bot. Monf. 191.

Hedysarum clypeatum minus, flore purpureo. Tour. 401.

HABITAT in saxosis; à *Rouquet, Valene, les Matèles.* Pedunculi spicati multiflori. Illud nunquam vidimus ubi notat Magnol; à *Fonsfrede.*

INDIGOFERA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 1065.

Char. secund. *Rad.* ramosa lignosa. *Caul.* fruticulosa ramosa. *Fol.* alterna impari-pinnata: foliolis oppositis petiolatis integerrimis. *Flor.* racemosa axillaris solitaria subsessilis. *Fule.* stipulæ geminæ minimæ subadnatæ. Bractæa floribus interjectæ setaceæ.

1. INDIG. leguminibus arcuatis incanis, racemis folio *Tindoria.* brevioribus. *Linn. sp.* 751.

L'Indigo.

HOSPITATUR hyeme in caldario. Triennis. Altitudinem humanam excedens. Foliola stylo terminata ovata vel lanceolata. Flores minimi. Racemi densi. Legumina foliolis subæqualia.

ASTRAGALUS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 717.

Char. secund. *Rad.* ramosa vel simplex tenuis. *Caul.* scaposa vel foliosa, ærecta vel procumbens. *Fol.* impari-pinnata: foliolis subpetiolatis oppositis integerrimis, radicalis aut caulina alterna. *Flor.* racemosa vel spicata, radicalis

vel caulina axillaris sessilis aut pedunculata;
Fulc. stipulæ geminæ, solutæ vel adnatæ. Brac-
 tæ ad basim florum setaceæ.

* *Caulibus foliosis erectis nec prostratis.*

- Alopecuroides.* 1. ASTRAG. caulescens, spicis cylindricis subsellibus,
 calycibus leguminibusque lanatis. *Linn. sp.* 755.
Astragalus Alpinus alopecuroides. Tour. 416.
 HOSPITATUR sub dio. Floret secundo anno. Perennis.
 Folia cubitalia pinnata foliolis utrinque 21 23 ova-
 ris maximis. Spicæ densæ.
- Galegiformis.* 2. ASTRAG. caulescens strictus glaber, floribus racemosis
 pendulis, leguminibus triquetris utrinque mucronatis. *Linn. sp.* 756.
Astragalus Orientalis alussimus galegæ foliis angustioribus,
flore minimo. Tour. cor. 29.
 HOSPITATUR sub dio. Altitudo & facies galegæ. Racemi
 axillares longitudine foliorum. Stipulæ solutæ.
 Foliola ovalia.

* *Caulibus foliosis diffusis.*

- Cicer.* 3. ASTRAG. caulescens prostratus, leguminibus subglobosis
 inflatis mucronatis pilosis. *Linn. sp.* 757.
Astragalus luteus perennis siliqua gemella rotunda,
vesicam referente. Tour. 416.
 HOSPITATUR sub dio. Racemi pauciflori. Pedunculi
 longitudine foliorum. Stipulæ solutæ subulatæ.
 Bractæ geminatæ inæquales. Capsulæ scrotum referentes.
 Flores lutei.
- Glycyphyllos.* 4. ASTRAG. caulescens prostratus, leguminibus sub-
 triquetris arcuatis, foliolis ovalibus pedunculo longioribus.
Linn. sp. 758.
Astragalus luteus perennis procumbens. Tour. 416.
 HABITAT à *Lesperon.* Stipulæ magnæ solutæ ovato-acuminatæ.
 Bractæ longiores quam in priori. Pedunculi foliis duplo breviores.
- Hamosus.* 5. ASTRAG. caulescens procumbens, leguminibus subulatis
 glabris recurvatis. *Linn. sp.* 758. *Savv.* 237.
Astragalus annuus Monspeffulanus procumbens. Tour. 416.
Securidaca lutea minor corniculis recurvis. Bot. Monf. 235.

Hedysarum

Hedysarum alterum. *Dod. Pempt. 536.*

HABITAT à Castelnau, Selleneuve, la Colombiere; à St. Martin de Pranes. Foliola subtus villosa ovalia emarginata vel obversè cordata. Legumina sursum arcuata. Pedunculi foliis æquales. Spicæ paucifloræ. Stipulæ solutæ.

6. ASTRAG. caulescens procumbens, spicis pedunculatis, leguminibus prismaticis rectis triquetris apice uncinatis. *Linn. sp. 758.* *Berlicet.*

HOSPITATUR sub dio.

7. ASTRAG. caulescens diffusus, capitulis subsessilibus lateralibus, leguminibus erectis subulatis acumine reflexis. *Linn. sp. 759.* *Sesamum.*

Astragalus annuus angustifolius, flosculis subcæruleis cauliculis adhærentibus. *Tour. 416.*

Ornithopodio affinis hirsuta stella leguminosa. *Bot. Mons. 184. Secunda species qua designatur à Magnolio; leguminibus cauliculis adhærentibus.*

8. Astragalus capitulis pedunculatis, pedunculis longitudine foliorum.

Astragalus annuus angustifolius, flosculis pediculis insidentibus. *Tour. 416.*

Ornithopodio affinis hirsuta stella leguminosa. *Bot. Mons. 194. Prior species.*

HABITAT au Terrail, à Monteils. Cum varietate β. Cujus foliola sæpius lineari-lanceolata.

* Scapo nudo, absque caule folioso.

8. ASTRAG. acaulis, scapis declinatis, longitudine foliorum, leguminibus subulatis teretibus subarcuatis glabris. *Linn. sp. 761. Sauv. 238.* *Monspessulanus.*

Astragalus Monspessulanus. *Bot. Mons. 33. Tour. 416.*

L'Astragal de Montpellier.

HABITAT in saxosis & herbidis. A Lavalette & vicinis. A Castelnau, Caupelles. Scapi sæpè foais duplo longiores. Stipulæ adnatæ. Vexillum longissimum. Petioli ad basim foliolis destituti. Bactæ sæpius solitariæ. Florum racemi laxi.

2. ASTRAG. acaulos, scapis declinatis longitudine foliorum, foliis tomentosis, leguminibus subulatis subarcuatis incanis. *Linn. Syst. 1175.* *Incanus.*

Astragalus incanus siliqua incurva. *Bot. Mons. 33. Icon. 32. Tour. 416.* *Bb*

386 DIADELPHIA DECANDRIA.

Onobrychis incana siliquis longioribus. *B. Pin.* 350.
Prod. 149.

HABITAT in locis à Magnolio designatis. *A Fonta-
nès, Affas, à Coulondres à droite, au mont St.
Loup vers Valene.*

Montanus. 10. ASTRAG. subacaulos, scapis folio longioribus, flo-
ribus laxè spicatis erectis. *Linn. sp.* 760.
Astragalus quidam *montanus* vel *onobrychis* aliis.
Tour. 416.

HABITAT à *Lesperou, à Viols, au mont St. Loup,
à Lamalou.* Stipulæ adnatæ. Petioli ad basim nudi.
Bractææ solitariae. Pedunculi axillares longitudine
foliorum.

* *Caule lignoso.*

Tragacantha. 11. ASTRAG. caudice arborecente, petiolis spinescen-
tibus. *Linn. sp.* 762.
Tragacantha Massiliensis. *Tour.* 417. *Sauv.* 237.
L'Adragant; Barbe-renard.
HOSPITATUR sub dio. Frequens Massiliæ. Stipulæ
adnatæ. Foliola & tota planta tomentosa.

BISERRULA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 718.

Char. secund. *Rad.* tenuis subsimplex. *Caul.* her-
bacea teres striata ramosa. *Fol.* alterna im-
pari-pinnata: foliolis oppositis subsessilibus in-
tegerrimis. *Flor.* axillaris solitaria pedunculata
dimidiato-capitata. *Fulc.* stipulæ solutæ gemi-
næ integerrimæ. Bractææ minimæ subsolitariae
ad basim floris singuli.

Pelecinus. 1. BISERRULA. *Linn. sp.* 762. *Sauv.* 237.

Pelecinus. *Tour.* 417.

La Scie.

HABITAT au-delà de la Colombiere in loco dicto les
mas de Garimond. Foliola obcordata. Pedunculi
foliis aequales.

PSORALEA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 716.

Char. secund. *Rad.* simplex vel ramosa lignosa.
Caul. herbacea ramosa vel fruticosa. *Fol.* al-

terna petiolata, nunc simplex integerrima, nunc ternata aut impari-pinnata: foliolis integerrimis. *Flor.* axillaris, nunc sessilis solitaria, nunc capitata pedunculata. *Fulcr.* stipulæ geminæ solutæ integerrimæ. Bractea ad basim capitulorum.

1. PSOR. foliis pinnatis, floribus axillaribus. *Linn. sp. 762. Pinnata.*
HOSPITATUR sub dio. Hyeme in caldario. Caulis villosus fruticosus. Folia conferta pinnata foliolis sæpius quinque linearibus acuminatis canaliculatis, inferioribus duobus longioribus. Flores sessiles solitarii. Vexillum cærulescens; alæ pallidæ; carina albicans, apice atro-purpurea.
2. PSOR. foliis omnibus ternatis, pedunculis spicatis *Bituminosa.*
folio longioribus. *Linn. sp. 763.*
Trifolium bitumen redolens. *Tour. 405.*
Trifolium asphaltis sive bituminosum odoratum. *Bot. Monf. 260.*
Pforalea foliis omnibus ternatis. *Sauv. 190.*
HABITAT à *Castelnau, Gramont.* Altitudo humana. Foliola glaberrima lanceolata. Bractææ ovatæ. Legumina stylo ensiformi terminata.
3. PSOR. foliis ovatis simplicibus. *Linn. sp. 764. Corylifolia.*
HOSPITATUR sub dio. Caulis pedalis. Petioli foliis duplo breviores canaliculati. Pedunculi foliis æquales. Corollæ cærulescentes. Vexillum dilute violaceum. Calyx pilis nigris adspersus. Folia sinuata. Legumina subrotunda. Floret augusto. Annua.

TRIFOLIUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 713.*

Char. secund. *Rad.* horizontalis repens vel perpendicularis. *Caul.* herbacea teres ramosa, repens vel erecta. *Fol.* alterna petiolata ternata: foliolis subæqualibus integris, sessilibus vel petiolatis, terminali sæpius petiolato. *Flor.* pedunculata (in una specie sessilis). axillaris vel terminalis, nunc racemosa aut spicata, nunc capitata. *Fulc.* stipulæ geminæ adnatæ vaginantes. Bractææ situ numero & figura variæ.

* *Meliloti leguminibus nudis polyspermis, foliolo impari petiolato.*

Melilotus 1. **TRIFOL.** spicis oblongis, leguminibus seminudis mucronatis, caule erecto. *Linn. sp. 764. Sauv. 185.*

Melilotus major odorata violacea. Tour. 407.

Le Melilot odorant.

HOSPITATUR sub dio. Stipulae minimae. Foliola ovalia denticulata. Bractae nullae. Racemi longitudine foliorum, densi pauciflori.

Melilotus 2. **TRIFOL.** leguminibus racemosis nudis dispermis, caule erecto. *Linn. sp. 765. Sauv. 185.*

Officinalis.

Melilotus Officinarum luteo flore. Bot. Mons. 175. Tour. 407.

β. *Melilotus major candida. Bot. Mons. 175.*

Melilotus Officinarum flore albo. Tour. 407. & altissima. Ibid.

Melilotus frutescens siliquis brevibus turgidis minus rugosis. Sauv. 185.

Le Melilot d'usage.

HABITAT aux prés d'Arene, Laverune, Castelnau.

β. Altitudo humana. Racemi laxi multiflori longiores. Flores penduli. Bractae vix conspicuae. Foliola ovalia serrata.

Melilotus 3. **TRIFOL.** leguminibus racemosis nudis dispermis rugosis obtusis, caule erecto, foliolis integris. *Linn. sp. 765.*

Italica.

Trifolium erectum, foliolis obtusè quadrangulis, leguminibus sphaericis. *Sauv. 186.*

Melilotus Italica folliculis rotundis. Tour. 407.

HABITAT à Gramont, Montferrier. Racemi pauciflori. Folia subsessilia.

Melilotus 4. **TRIFOL.** leguminibus racemosis nudis dispermis membranaceis, caule erectiusculo. *Linn. sp. 765.*

Cretica.

Melilotus Cretica fructu maximo. Tour. 407.

HOSPITATUR sub dio. Foliola obcordata. Legumina ad siliquas lunariae accedunt. Pedunculi pauciflori, breves.

* *Lotoidea leguminibus testis polyspermis, foliolis sessilibus.*

Repens. 5. **TRIFOL.** capitulis umbellaribus, leguminibus tetraspermis, caule repente. *Linn. sp. 767.*

Trifolium pratense album. *Bot. Mons.* 261. *Tour.* 406.

Trifolium capitulis subrotundis, flosculis pedunculatis, leguminibus tetraspermis, caule repente. *Sauv.* 184. procumbente.

Le Tressle des prés.

HABITAT in pratis & herbidis. Folia interdum maculata. Foliola ovali-orbiculata emarginata.

6. TRIFOL. scapo nudo, leguminibus dispermis pendulis, foliolis lineari-lanceolatis. *Linn. sp.* 767. *Alpinum.*

Trifolium caule nudo simplicissimo, foliis lineari-lanceolatis. *Sauv.* 185.

La Reglisse de montagne.

HABITAT à Lesperou, Villemagne. Foliola integerrime glaberrima.

* *Lagopoda calycibus villosis, foliolis sessilibus.*

7. TRIFOL. capitulis villosis quinquefloris, involucri centrali reflexo rigido, fructum involvente. *Linn. sp.* 767. *Sahterra: num.*

Trifolium subterraneum sive folliculos sub terram condens. *Bot. Mons.* 265.

Trifolium semen sub terram condens. *Tour.* 406.

HABITAT à l'entrée du bois de Gramont. in herbidis. Cauliculi repentes. Foliola obcorlata. Corollæ ex flavo albidæ. Pedunculi longitudine foliorum.

8. TRIFOL. capitulis villosis hemisphæricis terminalibus solitariis, calycibus omnibus fertilibus. *Linn. Syst.* 1177. *Charleri.*

Trifolium capitulis villosis globosis terminalibus, bractea orbiculata vestitis. *Sauv.* 184.

Trifolium glomerulis personatæ cherleri. *Bot. Mons.* 266.

Trifolium globosum repens. *Tour.* 405.

La Houpe.

HABITAT à Gramont, Rouquet, à la source du Lès, Valene. Cauliculi tomentosi. Bractea sæpius triplex maxima cordata ad margines colorata. Stipulæ magnitudine foliorum, nervosæ.

9. TRIFOL. spicis villosis longis, corollis monopetalis, caule erecto, foliis serrulatis. *Linn. sp.* 768. *Sauv.* 184. *Rubum*

Trifolium montanum spica longissima rubente. *Bot.*

Mons. 261. *Tour.* 405.

B b iij

HABITAT à Valene, Grabels. Folii nervorum apices denudati; unde serraturæ foliolorum. Foliola lanceolata glaberrima. Stipulæ longissimæ glaberrimæ. Spicæ densæ. Denticuli calycini longissimi.

Pratense. 10. TRIFOL. spicis subvillosis, cinctis stipulis (bracteis) oppositis membranaceis, corollis monopetalis. *Linn. sp.* 768.

Trifolium pratense purpureum. *Bot. Mons.* 261.

Trifolium pratense flore monopetalo. *Tour.* 404.

HABITAT in pratis. Stipulæ omnes membranaceæ nervosæ. Foliola ovalia integerrima vel subserrulata, stylo terminata, sæpè maculata.

Glomeratum. 11. TRIFOL. capitulis sessilibus globosis, calycibus striatis æqualibus patulis. *Linn. sp.* 770.

Trifolium capitulis sessilibus lateralibus subglobosis. *Sauv.* 183.

HABITAT à Grabels, Valene, Rouquet.

Lappaceum. 12. TRIFOL. spicis subglobosis, calycibus setis rigidis obvallatis, caule erecto. *Linn. sp.* 768.

Trifolium capitulo glomerato. *Bot. Mons.* 267.

Trifolium globosum seu capitulo lagopi rotundiore. *Tour.* 405.

Trifolium spicis globosis subsessilibus terminalibus, caule diffuso. *Linn. Syst.* 1177.

Trifolium nemorosum capite ovato rufescente. *Barr. Icon.* 871.

HABITAT juxta sepes, à la Peissine, au petit chemin de Sellenneuve. Stipulæ subulatae. Foliola ovalia vel obversè ovata integerrima. Caulis pedalis erectus vel procumbens villosus. Corollæ albæ vel roseæ. Absoluta florescentia calycum denticuli rigidi sunt.

Angustifolium. 13. TRIFOL. spicis villosis conico-oblongis, dentibus calycinis setaceis subæqualibus, foliolis linearibus. *Linn. sp.* 769.

Trifolium montanum angustifolium spicatum. *Bot. Mons.* 261. *Tour.* 405.

HABITAT au chemin des près d'Arene, Lattes, Lamousson, Laverne. Denticuli calycini setis rigidis ciliati. Foliola longissima integerrima. Stipulæ basi dilatatae venosæ acuminatae, petiolis longiores. Spicæ triunciales, terminales & axillares.

Arvensis. 14. TRIFOL. spicis villosis ovalibus, dentibus calycinis

setaceis æqualibus. *Linn. sp. 769. Sauv. 184.*

Trifolium arvense humile spicatum sive lagopus. *Bot. Monsf. 262. Tour. 405.*

Lagopus angustifolia minor erectior. *Barr. Icon. 901.*

β. Lagopus altera. *Barr. Icon. 902.*

La Patte de lièvre.

HABITAT à Gramont, Castelnau, Selleneuve & vicinis. Foliola obovata longa emarginata.

15. TRIFOL. spicis pilosis, calycibus patentibus, caule *stellatum.* diffuso, foliis cuneiformibus. *Linn. sp. 769.*

Trifolium spicis ovatis pilosis, denticulis calycinis patentibus lanceolaris. *Sauv. 184.*

Trifolium stellatum purpureum Monspessulanum. *Bot. Monsf. 262. Tour. 405.*

Le Trefle étoilé.

HABITAT à Castelnau, Lavalette, Gramont. Capitula terminalia longè pedunculata. Bractææ ovatæ obtusæ vaginantes connatæ.

16. TRIFOL. capitulis sessilibus ovatis, calycibus villosis inæqualibus. *Linn. sp. 770. Scabrumq*

Trifolium spicis sessilibus lateralibus ovatis scabris. *Sauv. 183.*

Trifolium minus villosum. *Barr. Icon. 869. & 870.*

Trifolium cujus caules ex geniculis glomerulos oblongos proferunt. *Bot. Monsf. 266.*

Trifolium capitulo oblongo aspero. *Tour. 406.*

β. Trifolium capitulo spumoso aspero minus. *Bot. Monsf. 267. Tour. 406.*

HABITAT au chemin des prés, d'Arene, à Laverune, & cum priori. A Bonzonet. Foliola obversè ovata ferrulata, glabra duriuscula, ut folia myrti.

17. TRIFOL. capitulis terminalibus, corollarum vexillis *montanum.* subularis, caule erecto, foliis lanceolatis serratis. *Linn. sp. 770.*

Trifolium montanum album. *Bot. Monsf. 261. Tour. 405.*

HABITAT à Grabels, Valene, Rouquet, Lamalou. Tota planta glaberrima. Foliola ad basim integerrima, emarginata.

392 DIADELPHIA DECA'NDRIA.

* *Vesicaria calycibus inflatis ventricosus, foliolis sessilibus.*

Spumosum. 18. TRIFOL. spicis ovatis, calycibus inflatis glabris quinquedentatis, involucris universalibus pentaphyllis. *Linn. sp.* 771.

Trifolium spicis densis quasi radicatis humi appressis. *Sauv.* 183.

Trifolium fragiferum majus & minus. *Barr. Icon.* 851. & 852.

HABITAT in ambulacris. *Sur le Perou, à l'Esplanade, à Caunelles, Castelnaud.* Foliola glaberrima suborbiculata emarginata, serraturis vix conspicuis. Pedunculi foliis longiores sesquunciales vel biunciales. Bractear ovata parvæ acuminatæ.

Resupinatum 19. TRIFOL. spicis subovatis, calycibus inflatis dorso gibbis, caulibus prostratis. *Linn. sp.* 773. *Sauv.* 183. absque synonymia.

Trifolium pratense folliculatum. *Bot. Mons.* 263. *Tour.* 404.

HABITAT ad mare. *A Villeneuve, Perault, Cette.*

Tomentosum. 20. TRIFOL. capitulis sessilibus globosis hirsutis, calycibus inflatis reflexis. *Linn. sp.* 771.

Trifolium . . . calycibus inflatis obtusis. *Sauv.* 175.

Trifolium fragiferum tomentosum. *Bot. Mons.* 265. *Icon. Tour.* 406.

Trifolium luteum capite rotundo. *Barr. Icon.* 864. Ad hanc speciem rectius pertinet quam ad trifolium capite spumoso *Levi. B. Pin.*

HABITAT à Viols, Grabels & vicinis.

Fragiferum. 21. TRIFOL. capitulis subrotundis, calycibus inflatis bidentatis reflexis, caulibus repentibus. *Linn. sp.* 774.

Trifolium capitulis subrotundis. 8. *Sauv.* 175.

Trifolium fragiferum frificum. *Bot. Mons.* 265. *Tour.* 406.

HABITAT cum priori, & à Gramont, Salason, ad dexteram.

* *Lupulina vexillis corollæ inflexis.*

Agrarium. 22. TRIFOL. spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, calycibus nudis, caule erecto. *Linn. sp.* 772. *Sauv.* 183.

Trifolium pratense luteum capitulo lupuli five agrarium. *Bot. Monf.* 262. *Tour.* 404.

HABITAT in pratis. Foliola subcordata, vel orbiculata, ad basim integerrima, impari petiolato. Stipulæ minimæ.

23. TRIFOL. spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, calycibus pilosis, caule erecto. *Montanum.*
Linn. sp. 772.

Trifolium montanum lupulinum. *Tour.* 406.

Lotus montanus aureus amplo lupuli capitulo. *Barr.*
Icon. 1024.

HABITAT au mont St. Loup, à Valene. Foliola ovalia obtusa ad basim integerrima, glaberrima. Stipulæ longæ lanceolatae acutæ.

LOTUS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 710.

Char secund. *Rad.* tenuis simplex, debilis vel lignosa ramosa. *Caul.* teres ramosa, herbacea vel fruticosa. *Fol.* alterna petiolata ternata: foliolis æqualibus integerrimis sessilibus. *Flor.* axillaris pedunculata, nunc solitaria, nunc capitata vel capitato-dimidiata. *Fulc.* stipulæ geminæ foliaceæ solutæ, foliolis subæquales. Bractea sæpius triplex foliacea in apice pedunculi, floribus subjecta (in unâ specie nulla.)

* *Leguminibus rarioribus nec capitulum constituentibus.*

1. LOTUS leguminibus solitariis membranaceo-quadrangulatis, bracteis lanceolatis. *Linn. sp.* 775. *Maritima.*
Sauv. 188. foliis floralibus lanceolatis.

Lotus maritima lutea siliquosa, folio pingui glabro. *Bot. Monf.* 165. *Tour.* 403.

2. Lotus siliquosa cytisi facie. *Barr. Icon.* 1031.

HABITAT ad mare, & à Castelnau le long de la rivière. Glabra aut hirsuta. Pedunculi foliis triplo longiores. Bractea longitudine calycum, intermedia longiore. Foliola obversè ovata. Stipulæ ovatae adnatæ. Legumina foliolis duplo longiora.

- Conjugata.* 2. LOTUS leguminibus conjugatis membranaceo-quadrangulis, bracteis oblongo-ovatis. *Linn. sp.* 774.
HABITAT à Salason, Montferrier, Prades.
- Siliquosa.* 3. LOTUS leguminibus solitariis quadrangulis, caulibus procumbentibus, foliis hirsutis. *Linn. Syst.* 1178.
Lotus leguminibus solitariis rectis teretibus terminabilibus, caule erecto. *Sauv.* 189. *Linn. sp.* 774. erecta. n°. 4.
Lotus pratensis siliquosus minor & mollior. *Tour.* 403.
Lotus pratensis siliquosa lutea. *Bot. Mons.* 165.
HABITAT in pratis.
- Paragrina.* 4. LOTUS leguminibus subbinatis linearibus compressis nutantibus. *Linn. sp.* 774. *Sauv.* 188.
HOSPITATUR sub dio. Pedalis. Folia pingua glabra. Flores stipulis triplo minores. Pedunculi foliis longiores. Corollæ magnitudine fere calycum, dilutè rosæ. Legumina immatura cylindrica, matura verò compressa. Bractea media longior.
- Angustifolia.* 5. LOTUS leguminibus subbinatis linearibus strictis erectis, caule erecto, pedunculis alternis. *Linn. sp.* 774.
Lotus leguminibus sæpius ternatis linearibus strictis erectis. *Sauv.* 188.
Trifolium corniculatum minus pilosum. *B. Prod.* n°. 21.
Lotus pentaphyllos minor hirsutus siliqua angustissima. *Bot. Mons.* 164. *Tour.* 403.
HABITAT à Gramont, Mauguio, à la source du Lès. Pedunculi foliis æquales sæpius uniflori. Bractææ quandoque solitariæ. Foliola & stipulæ ejusdem magnitudinis.
- Ornithopodoides.* 6. LOTUS leguminibus subquinatis arcuatis compressis, caulibus diffusis. *Linn. sp.* 775.
Lotus leguminibus arcuatis subquinatis. *Sauv.* 188.
Lotus siliquis ornithopodii. *Tour.* 403.
HOSPITATUR sub dio. Cauliculi debiles. Foliola subcuneiformia acuminata; stipulæ triplo minores. Pedunculi foliis longiores. Bractææ corollis majores. Legumina pedunculis longiora stylo terminata.
- Jacobæus.* 7. LOTUS leguminibus subternatis, caule herbaceo erecto, foliolis linearibus. *Linn. sp.* 775.
Le Lotier de St. Jacques.
HOSPITATUR sub dio. Apud nos fruticulus semper-

DIADELPHIA DECANDRIA. 395

virens. Stipulæ foliolaque lanceolato-linearia. Pedunculi foliis æquales. Vexillum corollæ atropurpureum uti & alæ; carina lutescens alis paulo longior. Legumina teretia.

* *Pedunculis multifloris in capitulum.*

8. LOTUS capitulis hirsutis, caule erecto hirsuto, le- *Hirsuta.*
guminibus ovatis. *Linn. sp. 775. Sauv. 188.*

Lotus pentaphyllos filiquosus villosus. *Bot. Monsf. 165. Tour. 403.*

Lotus hemorrhoidalis. *Tour. 403.*

Le Lotier ou Trefle hémorroïdal.

HABITAT juxta amnem. Folia sessilia stipulis æqualia.

Flores 7. vel 9. Stipulæ floribus æquales lanceolatæ.

Calyces supernè rubri; lacinia inferiore longiore.

Vexillum helvulum. Alæ albidæ; carina apice nigricans.

9. LOTUS capitulis subglobosis, caule erecto angu- *Rufa.*
lato, leguminibus rectis glabris. *Linn. sp. 775.*

Lotus caule fruticoso florum capitulis globosis. *Sauv. 188.*

Lotus filiquosus glaber flore rotundo. *Bot. Monsf. 166.*

Lotus altissimus flore glomerato. *Tour. 403.*

Lotus coronatus latifolius filiquis nigris. *Barr. Icon. 544.*

HABITAT cum priori. Altitudo humana. Foliola obversè ovata acuminata. Stipulæ subcordatæ foliolis duplo minores. Pedunculi foliis longiores. Bractæ minimæ, à capitulo remotæ. Legumina longitudine stipularum.

10. LOTUS capitulis depressis, caulibus decumbenti- *Corniculata.*
bus, leguminibus cylindricis. *Linn. sp. 775.*

Lotus caule herbaceo, florum capitulo depresso, leguminibus teretibus. *Sauv. 188.*

Lotus corniculata & hirsuta minor. *Tour. 403.*

Lotus corniculata glabra & hirsuta minor. *Bot. Monsf. 164.*

11. Lotus pentaphyllos tenuissimis glabris foliis. *Bot. Monsf. 164. Sauv. 189.*

HABITAT à Castelnau, Lavalette, au Martinet de Mr. Alar.

11. LOTUS capitulis ebracteatis, foliolis stipulisque *Dorynium.*

396 DIADELPHIA DECANDRIA.

sessilibus æqualibus lanceolato-linearibus.

Lorus capitulis aphyllis, foliolis sessilibus quinatis.

Linn. sp. 776.

Dorycnium folus sessilibus digitatis. *Sauv. 214.*

Trifolium album angustifolium, floribus veluti in capitulum congestis. *Bot. Monf. 267.*

Dorycnium Monspeliensium. *Tour. 391.*

HABITAT à la Colombiere, Lavalette, Laverune, la Peissine. Pedunculi longissimi stricti rigidi. Bractæ sæpius nullæ vel unica minima in medio pedunculi. Flores albi minimi. Carina nigricans.

TRIGONELLA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 714.*

Char. secund. Rad. simplex vel ramosa. Caul. herbacea ramosa, repens vel erecta. Fol. alterna petiolata ternata, foliolis integris, impari petiolato. Flor. axillaris nunc solitaria vel aggregata sessilis nunc pedunculata subracemosa. Fulc. stipulæ geminæ adnatæ.

Polyceratium. 1. TRIG. leguminibus peduncularis sessilibusque congestis erectis rectis parallelis linearibus. *Linn. sp. 777.*

Trigonella leguminibus subsessilibus congestis erectis subrectis longis. *Linn. Syst. 1179.*

Medicago leguminibus sessilibus confertis. *Sauv. 187.*

Fœnum græcum sylvestre alterum polyceratium. *Bot. Monf. 99. Tour. 409.*

HABITAT à Boutonnet, Caunelles.

Monspeliaca. 2. TRIG. leguminibus congestis sessilibus arcuatis divaricatis inclinatis brevibus. *Linn. Syst. 1180.*

Trigonella leguminibus congestis peduncularis declinatis subfalcatis, pedunculo communi inermi foliis longiore. *Linn. sp. 777.*

Medicago leguminibus confertis sessilibus arcuatis inclinatis. *Sauv. 187.*

Fœnum græcum sylvestre siliquis pluribus. *Tour. 402.*

HABITAT circa Urbem, & cum priori. Foliola obcordata, aut cuneiformia.

Fœnum gra- 3. TRIG. leguminibus sessilibus strictis erectiusculis subfalcatis & acuminatis. *Linn. sp. 777.*

Trigonella leguminibus sessilibus. *Sauv.* 187.

Fœnum græcum sylvestre. *Bor. Monf.* 98. *Tour.* 409.

Le Fenu Grec.

HABITAT in arvis, au prés Darene, à Lamousson, Castellan. Foliola cuneiformia ad apicem serrulata.

Legumina foliolis longiora.

4. TRIG. leguminibus pedunculatis congestis declinatis *Corniculata*, falcatis compressis, pedunculo communi longo sub-spinoso, caule erecto. *Linn. Syst.* 1180.

Trifolium (corniculatum) floribus spicatis, leguminibus nudis mucronatis falcatis declinatis. *Linn. sp.* 766.

Fœnum græcum sylvestre meliori facie. *Tour. cor.* 28.

HOSPITATUR sub dio. Foliola apice denticulata obcordata. Stipulæ minutissimæ. Pedunculi foliolis triplo longiores. Corollæ luteæ odoratissimæ incumbentes.

M E D I C A G O.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 715.

Char. secund. *Rad.* tenuis subsimplex perpendicularis vel repens. *Caul.* herbacea teres ramosa, *Fol.* alterna petiolata ternata, foliolis integris, impari petiolato; (in unâ specie impari-pinnata: foliolis integris sessilibus.) *Flor.* axillaris pedunculata, pedunculis unifloris multiflorisvè aut racemiferis. *Fulc.* stipulæ geminæ adnatæ integræ. Filum pedunculos terminans. (Spinulæ suprâ fructum in quibusdam. Bractea in apice pedunculi in unâ specie.)

1. MEDIC. leguminibus reniformibus margine dentatis, *Radiata*, liis ternatis. *Linn. sp.* 778.

Medicago annua trifolii facie. *Tour.* 412.

Lunaria radiata Italicorum. *Lob. Icon.* 38.

HOSPITATUR sub dio. Foliola obcordata apice denticulata.

2. MEDIC. leguminibus reniformibus margine dentatis, *Circinnata*, foliis pinnatis. *Linn. sp.* 778.

Medicago vulnerariæ facie Hispanica. *Tour.* 412.

Anthyllis lunaria flore luteo. *Barr. Icon.* 576.

HOSPITATUR sub dio. Caulis humifusus. Folia pin-

nata foliolis sæpiùs quinque integerrimis, impari maximo obovato. Pedunculi foliis longiores subquadriflori, bractea ovata floribus majore, terminati.

- Sativa.* 3. MEDIC. pedunculis racemosis, leguminibus contortis, caule glabro erecto. *Linn. sp.* 778.

Medicago major erectior floribus purpureis. Tour. 410.

Medicago sativa pedunculis laxè spicatis, leguminibus contortis, caule erecto glabro. Sauv. 186.

La Luzerne; vernaculè la Luserna.

HABITAT in arvis. Racemi foliis duplo longiores, foliola ovalia vel ovali-lanceolata ad apicem serrulata.

- Falcata.* 4. MEDIC. pedunculis racemosis, leguminibus lunatis, caule prostrato. *Linn. sp.* 779.

Medica sylvestris flore croceo. Tour. 410.

Trifolium sylvestre luteum siliquâ cornutâ. Bot. Monf. 171.

Autre Luzerne.

HABITAT cum priori.

- Lupulina.* 5. MEDIC. spicis ovalibus, leguminibus reniformibus monospermis, caule procumbente. *Linn. sp.* 779. *Sauv.* 185.

Melilotus capsulis reni similibus in capitulum congestis. Tour. 407.

Trifolium pratense luteum. Bot. Monf. 262.

HABITAT cum prioribus & aux prés d'Arene. Foliolis suborbiculatis; vel radicalibus obcordatis, summis subovalibus. Stipulæ subintegerrimæ acuminatæ ovatæ. Pedunculi subquadriflori.

- Marina.* 6. MEDIC. pedunculis racemosis, leguminibus cochleatis spinosis, caule procumbente tomentoso. *Linn. sp.* 779. *Sauv.* 186.

Trifolium cochleatum marinum tomentosum. Bot. Monf. 779.

Medica marina. Tour. 410.

La Luzerne de mer.

HABITAT ad littora maris. Foliola obcordata vel cuneiformia integerrima. Stipulæ integerrimæ. Pedunculi foliis duplo longiores.

- Polymorpha.* 7. MEDIC. leguminibus cochleatis, stipulis dentatis, caule diffuso. *Linn. sp.* 779.

4. Medicago leguminibus solitariis cochleatis inermibus Orbicularis.
compressis planis, stipulis ciliatis, caule diffuso.
Linn. Syst. 1180. *Sauv.* 186.
Trifolium cochleatum vel scutellatum, fructu latiore,
folio minuto obtuso. *Bot. Monf.* 267.
Medica orbiculata. *Tour.* 410.
5. Medicago cochleata major dicarpos, capsula rotunda Scutellata.
globosa scutellata. *Linn. sp.* 779.
Trifolium cochleatum fructu latiore. *Bot. Monf.* 267.
Medica scutellata. *Tour.* 410.
Medicago leguminibus cochleatis, stipulis dentatis,
caule diffuso. *Sauv.* 186.
6. Medicago fructu turbinato. *Sauv.* 187.
Trifolium cochleatum turbinatum, sive fructu com- Turbinata.
presso oblongo. *Bot. Monf.* 268.
Medica magna turbinata. *Tour.* 410.
7. Medica cochleata spinosa major dicarpos, capsula Intertexta.
spinis longioribus sursum & deorsum tendentibus.
M. Linn. sp. 780.
8. Medica cochleata minor annua polycarpos, cap- Arabica.
sula majore alba, folio cordato macula fusca. *M.*
Linn. sp. 780.
Trifolium cochleatum folio cordato maculato. *Bot.*
Monf. 268.
Medica echinata glabra cum maculis fuscis. *Tour.* 410.
& sine maculis *Tour. ibid.*
9. Medicago fructu minimo coronulam utrinque denta- Coronata.
tam referente. *Sauv.* 187.
Medicago folliculis coronæ similibus. *Bot. Monf.* 269.
Medica coronata Cherleri parva. *Tour.* 411.
10. Medicago leguminibus congestis globosis hispidis, Ciliaris.
stipulis ciliatis. *Sauv.* 187.
Trifolium fructu cochleato ciliari. *Bot. Monf.* 269.
Medica annua fructu ciliari. *Tour.* 410.
11. Medicago leguminibus solitariis globosis brevissimè Hirsuta.
echinatis, stipulis serratis. *Sauv.* 186.
Medica echinata hirsuta. *Tour.* 410.
Trifolium arvense echinatum. *Bot. Monf.* 271.
12. Medicago triphylla, leguminibus cochleatis spinosis, Rigidula.
foliolis inferioribus cuneiformibus retusis, superio-
ribus subrotundis. *D. Linn. sp.* 780.
Medica hirsuta echinata, echinis rigidioribus. *Tour.*
401.

400 **DIADELPHIA DECANDRIA.**

Medicago fructu compresso spinis horrido. *Bot. Monsf.*
268.

Laciniata. *. *Medicago* fructu echinato, foliis linearibus dentato-
pinnatifidis. *Sauv.* 187.

Trifolium fructu echinato, foliis eleganter dissectis.
Bot. Monsf. 271. *Icon.* 270.

HABITAT in arvis & pratis.... d. à Lavalette, au
Terrail.... *. à la Peissine & in Urbis fossis....
*. à la Colombiere, Montferrier. Folia emarginata
denticulis utrinque duobus longioribus instructa.
Pedunculi subbiflori foliis breviores. Stipulæ pro-
fundè laciniatæ. Filum terminans pedunculos, lon-
gitudine calycum.



Classis

Classis XVIII.

POLYADELPHIA

ICOSANDRIA.

CITRUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 735.

Char. secund. *Rad.* ramosa lignosa. *Caul.* arborea:
Fol. alterna petiolata simplex subintegerrima.
Flor. pedunculata aggregata subterminalis. *Fru.*
 nulla. (Aculei in caule, ubi species incultæ &
 neglectæ, depravatæ & quasi degeneres evase-
 runt.)

1. CITRUS petiolis linearibus. Linn. sp. 782. Sauv. 60. *Medica.*
Citrum vulgare. Tour. 521. .

β. Limon vulgaris. Tour. 521.

Le Citronier, le Limonier; vernaculè lou Citroun, las
Limounas.

HOSPITATUR in hybernaculo.

2. CITRUS petiolis alatis. Linn. sp. 782. Sauv. 60.

Aurantium.

Aurantiam acri medulla. Tour. 610.

Les Orangers, les Chinois; vernaculè l'Orangé, lou
Chinois.

HOSPITATUR sub dio & in hybernaculo.

POLYANDRIA.

HYPERICUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 636.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea vel
 fruticosa, teres vel angulata. *Fol.* opposita
 sessilis simplex integerrima. *Flor.* axillaris &
 terminalis pedunculata: pedunculis simplicibus
 vel ramosis, unifloris multiflorisvè. *Falc.* glan-
 dulæ in quibusdam ad margines foliolorum
 calycis.

* *Trigyna.*

- Androsæmum.* 1. HYPER. floribus trigynis, fructu baccato, caule fruticoso ancipiti. *Linn. sp. 784.*
Androsæmum maximum frutescens. Bot. Monsf. 19. Tour. 251.
Hypericum... foliis ovatis pedunculo longioribus. Sauv. 149.
La route Sainie.
HABITAT à la Serane, au Capouladon. Folia maxima.
Flores terminales sæpius quinque vel 7. subumbellati.
- Bircinum.* 2. HYPER. floribus trigynis, staminibus corolla longioribus, caule fruticoso ancipiti. *Linn. sp. 784. Sauv. 150.*
Hypericum foetidum frutescens. Tour. 255.
HOSPITATUR sub dio. Variat caule ramisque teretibus.
Pedunculi axillares, foliis breviores subquadriflori.
Petala lineari-lanceolata.
- Quadrangulum.* 3. HYPER. floribus trigynis, caule quadrato herbaceo. *Linn. sp. 785. Sauv. 149.*
Ascyron. Bot. Monsf. 30.
Hypericum ascyron dictum caule quadrangulo. Tour. 255.
HABITAT à Lamalon, Lamousson, Laverune. Folia ovata. Flores terminales subcorymbosi. Petala exigua. Altitudo tripedalis.
- Perforatum.* 4. HYPER. floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obrutis pellucido-punctatis. *Linn. sp. 785.*
Hypericum vulgare. Bot. Monsf. 135. Tour. 254.
Le Millepertuis.
HABITAT in arvis, fossis. A Selleneuve & circa Urbem.
- Hirsutum.* 5. HYPER. floribus trigynis: calycibus serrato glandulosis, caule erecto, foliis ovalibus. *Linn. sp. 786.*
Hypericum elegantissimum non ramosum foliolato. Tour. 255.
Androsæmum glabrum non ramosum. Bot. Monsf. 20.
HABITAT à Lesperou, au mont Saint Loup. Caulis teres hirsutus. Folia glaberrima. Pedunculi oppositi axillares, subquinqueflori foliis breviores. Flores terminantes conferti. Bractææ duæ foliaceæ oppositæ, floribus æquales.
- Tomentosum.* 6. HYPER. floribus trigynis: calycibus serrato-glandu-

POLYADELPHIA POLYANDRIA. 403

lofis, foliis subovatis hirsutis. *Linm. sp.* 786.

Hypericum supinum tomentosum minus & *Monspeliacum. Bot. Mons.* 135. *Tour.* 255.

Hypericum floribus trigynis, calycum serraturis capitis. Sauv. 149.

HABITAT à *Boutonnet, Lattes, Selleneuve.* Caulis teres. Rami teretes subdichotomi. Bractææ setaceæ.

7. HYPER. floribus trigynis: calycibus serrato-glandulosis, foliis cordatis glabris. *Linm. sp.* 786. *Pulchrum,*

Hypericum minus erectum. Tour. 255.

HABITAT à *Lesperou.* Folia quandoque obtusa.



Classis XIX.

SYNGENESIA

POLYGAMIA ÆQUALIS.

TRAGOPOGON.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 749.

Char. secund. Rad. fusiformis. Caul. herbacea simplex vel ramosa. Fol. alterna sessili-amplexicaulis, simplex integerrima vel integra vel incisa. Flor. terminalis solitaria pedunculata. Falc. nulla. (Pili rigidi in paucis.)

Pratense. 1. TRAGOP. calycibus corollæ radium æquantibus, foliis integris strictis. Linn. sp. 789.

Tragopogon calycibus florem luteum superantibus, foliis gramineis. Sauv. 82.

Tragopogon pratense luteum majus. Bot. Mons. 259. Tour. 477.

Barbe de bouc.

HABITAT in pratis. A Gramont, Castelnau. Folia glaberrima ovato-acuminata.

Porri-folium. 2. TRAGOP. calycibus corollæ radiis longioribus, foliis strictis integris, pedunculis supernè incrassatis. Linn. sp. 789.

Tragopogon calycibus florem purpuro-cæruleum superantibus, foliis gramineis. Sauv. 82.

Tragopogon purpuro-cæruleum porri folio, quod Artifi vulgo. Bot. Mons. 259. Tour. 477.

Le Salsifix; vernaculè lou Sarfisi.

HABITAT cum priori.

Dalechampi. 3. TRAGOP. calycibus corolla brevioribus inermibus, foliis lyrato-sinuatis. Linn. sp. 790. Sauv. 295.

Hieracium magnum Dalechampi. Tour. 470.

Hieracium dentis leonis folio cichoraceo tomentoso. Bot. Mons. 58.

HABITAT in arvis & pratis. Folia summa sæpius integerrima. Pedunculi supernè incrassati. Variat foliis omnibus lanceolatis.

4. TRAGOP. calycibus corolla brevioribus aculeatis, *Picroides*, foliis pinnato-hastatis. *Linn. sp.* 790.
Picris calycibus simplicibus aculeatis, foliis inermibus hastato-sinuatis. *Sauv.* 295.
Sonchus asper laciniatus creticus. *Bot. Monsf.* 244. *Tour.* 474.
 HABITAT à Lavalette, Lacolombiere. Altitudo semipedalis. Tota planta pilis rigidis exasperata. Pedunculi supernè crassiores. Nervi foliorum quandoque aculeati.
5. TRAGOP. calycibus corolla brevioribus hispidis, foliis integris, caulibus oblongis. *Sauv.* 82. *Linn. sp.* 790. *Aspernum*.
Sonchus asper folio subrotundo. *Bot. Monsf.* 244.
Sonchus asper non laciniatus displaci vel lactucæ folio. *Tour.* 474.
 HABITAT cum priori, & à Prades; au Terrail. Altitudo sæpius biuncialis, raro major. Folia ovata, lanceolata vel ovato-oblonga, quatuor vel quinque in eodem cauliculo.
6. TRAGOP. calycibus corollæ radio longioribus, foliis integris: radicalibus pedunculisque basi villosis. *Crocifolium*.
Linn. Syst. 1191.
Tragopogon purpureo-cæruleum crocifolium. *Bot. Monsf.* 307. *Tour.* 407.
 HABITAT entre Lamalou & Fongeres; & à la Louzère.

S C O R Z O N E R A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 748. Adde squamæ calycinæ inferiores cordatæ.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* teres herbacea simplex vel ramosa. *Fol.* alterna sessilis, simplex integra vel incisa. *Flor.* terminalis pedunculata solitaria. *Falc.* nulla (in quibusdam squamæ vagæ cordatæ, suprâ caulem & pedunculos.)

1. SCORZ. caule ramoso, foliis amplexicaulibus integris serrulatis. *Linn. sp.* 791. *Hispanicum*.
Scorzonera caule ramoso, foliis amplexicaulibus undulatis. *Sauv.* 82.
Tragopogon Hispanicum sive scorzonera. *Bot. Monsf.* 260.

406 SYNGENESIA POLYGAMIA ÆQUALIS.

Scorzonera latifolia sinuata. Tour. 476.

La Scorfonere.

HABITAT à *Viols*, *Grabels*. Folia radicalia sæpe lanceolata subintegerrima.

Angustifolia. 2. SCORZ. foliis subulatis integris, pedunculo incrassato, caule basi villosa. *Linn. sp. 791.*

Scorzonera angustifolia prima. Tour. 476.

HABITAT au bois de *Valene*, à *Valmagne* ubi variat caule toto lanato simplicissimo. Folia graminea angustissima longa, radicalia caulem adæquant. Squamæ calycinæ petalis æquales.

Laciniata. 3. SCORZ. foliis linearibus dentatis. *Linn. sp. 791.*

Scorzonera foliis laciniatis. Sauv. 692. Tour. 477.

Tragopogon tenuissimè laciniatum. Bot. Mons. 259.

Tragopogon resedæ minoribus foliis. Barr. Icon. 799.

HABITAT ad margines agrorum, circa Urbem.

Picroides. 4. SCORZ. foliis superioribus amplexicaulibus integerrimis, inferioribus lyratis. *Linn. sp. 792. pedunculis squamosis. Syst. 1192.*

Chondryllis affinis quædam laciniata. Bot. Mons. 64.

Sonchus lævis angustifolius. Tour. 475.

Sonchus lævis Matthioli. Lob. Icon. 236.

Crepis folio læviter dentato. Sauv. 81.

Vernaculè *la Terragrèpie.*

HABITAT in arvis. Variat foliis radicalibus linearibus, caulinis subulatis denticulatis. Caulis læpius simplex.

P I C R I S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 745.*

Char. secund. Rad. fusiformis. Caul. herbacea ramosa. Fol. alterna sessilis amplexicaulis simplex integra vel incisa. Flor. terminalis solitaria pedunculata. Fule. pili rigidi in tota planta. (Bractæ in una specie calycem singulum cingentes, subquaternæ, magnitudine calycis, foliaceæ ovatæ.)

Echioides. 1. PICRIS perianthiis involucri maximo cinctis. *Linn. sp. 792. Sauv. 82.*

Hieracium echioides capitulis cardui benedicti. Bot. Mons. 131. Tour. 470.

HABITAT à *Selleneuve*, *Gramont*. Altitudo bipedalis. Folia inferiora longa sinuato-dentata.

2. PICRIS perianthiis imbricatis ebracteatis. *Linn. sp. Hieracioides*, 792. *Sauv.* 81.

Hieracium asperum majori flore è limitibus agrorum.

Bot. Monf. 131. *Tour.* 469.

HABITAT in arvis & sterilibus circa *Castelnau*, *Salafon*, *Caunelles*. Folia summa nunc ovata integerrima, nunc sinuata vel pinnato-pinnatifida.

S O N C H U S,

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 751.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea fistulosa ramosa. *Fol.* alterna sessili-amplexicaulis simplex integra vel inciso-pinnatifida. *Flor.* terminalis pedunculata, pedunculis uni vel multifloris. *Falc.* nulla. (In paucis pili rigidi suprà caulem & folia. In aliis squamæ suprà caulem pedunculosque) . . . lactescentia alba.

1. SONC. pedunculis calycibusque hispida subumbellatis, foliis basi cordatis. *Linn. sp.* 793. *Arumfi.*

Sonchus calycibus pedunculisque hispida, floribus congestis. *Sauv.* 300.

Sonchus repens, multis *hieracium minus* & majus. *Tour.* 474.

Hieracium minus folio sonchi vel *hieracium sonchites*. *Bot. Monf.* 127.

HABITAT à *Caunelles*, *Laverune*, *Selleneuve*, *Bouzonet*, in arvis.

2. SONC. pedunculis tomentosis, calycibus glabris. *Oleraceus*. *Linn. sp.* 794.

Sonchus foliis lævibus & teneris, calycibus glabris. *Sauv.* 300.

Sonchus lævis laciniatus latifolius. *Bot. Monf.* 244. *Tour.* 474.

3. SONCHUS foliis rigidiusculis serratis, calycibus lævibus. *Asper*. *Sauv.* 300.

Sonchus asper laciniatus & non laciniatus. *Bot. Monf.* 244.

Sonchus asper. . . . foliis dentis leonis. *Tour.* 474. *Le Laitron*; vernaculè *la Lacheta*.

HABITAT cum oleribus.

3. SONC. pedunculis tomentosis, calycibus pilosis. *Linn. Tenerrimus*. *sp.* 794.

408 SYNGENESIA POLYGAMIA ÆQUALIS.

Sonchus lævis in plurimas & tenuissimas lacinias divilus. *Bot. Monf.* 245. *Tour.* 475.

HABITAT circa Urbem.

Alpinus. 4. *SONC.* pedunculis squamosis, floribus racemosis. *Linn. sp.* 794.

Sonchus floribus spicatis cæruleis, *Sauv.* 300.

Lactuca montana latifolia laciniata flore cæruleo. *Tour.* 474.

HABITAT à Lespinouse près de Saint Pons,

L A C T U C A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 739.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea ramosa. *Fol.* alterna sessili-amplexicaulis simplex integra vel inciso pinnatifida. *Fior.* terminalis subpaniculata. *Fule.* aculei in plurimis ad margines nervosque foliorum Squamæ supra pedunculos. . . lactescentia alba.

Sativa. 1. *LACT.* foliis rotundatis, caule corymbofo. *Linn. sp.* 795.

Lactuca romana longa dulcis. *Sauv.* 83.

La Laitue; vernaculè *la Lachuga.*

HABITAT in hortis oleraceis.

Virosa. 2. *LACT.* folus carina aculeatis dentatis. *Linn. sp.* 795.

Lactuca caule foliisque aculeatis. *Sauv.* 295.

Lactuca sylvestris odore viroso. *Bot. Monf.* 148. *Tour.* 473.

Lactuca foliis verticalibus carina aculeatis. *Linn. Syst.* 1193.

Laciniata. β. *Lactuca folus costa aculeatis pinnatifidis.* *Sauv.* 295.

Lactuca sylvestris folio laciniato dorso spinoso. *Bot. Monf.* 148. *Tour.* 473.

HABITAT à Cistelluan juxta amnem. Altitudo humana. Caulis albicans glaberrimus. Folia ciliato spinosa.

Seligna. 3. *LACT.* folus hastato - linearibus sessilibus carina aculeatis. *Linn. sp.* 796.

Lactuca folus imis pinnatifidis, cæteris ensiformibus basi hastatis dorso serratis. *Sauv.* 642.

Lactuca sylvestris angusto & laciniato folio. *Bot. Monf.* 298. *Tour.* 474.

HABITAT in maritimis.

4. LACT. foliis linearibus dentato-pinnatis, laciniis sursum dentatis. *Linn. sp. 796. Sauv. 196.* *Perennis.*

Lactuca perennis humilior flore cæruleo. *Tour. 473.*

Chondrilla cærulea altera, cichorii sylvestris folio. *Bot. Monf. 63.*

HABITAT à Lavalette, la Colombiere, & vicinis saxosis. Altitudo sesquipalmaris, raro major. Folia summa quandoque subulata integerrima.

CHONDRILLA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 740.*

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea rigida, basi ramosa. *Fol.* alterna sessilis, simplex, radicalis inciso-pinnatifida, caulina integerrima linearis graminea. *Flor.* axillaris sessilis aggregata. *Fulc.* nulla. Lactescencia alba.

1. CHOND. *Linn. sp. 796. Sauv. 300.*

Juncea.

Chondrilla juncea. *Bot. Monf. 62.*

Chondrilla juncea viscosa arvensis. *Tour. 475.*

La Condrole.

HABITAT ad agrorum margines. Altitudo sesquipedalis. Flores in alis foliorum tres quatuorve simul.

PRENANTHES.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 738.*

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea ramosa. *Fol.* alterna sessilis amplexicaulis simplex integra vel incisa aut pinnatifida. *Flor.* axillaris pedunculata subpaniculata. *Fulc.* nulla, (quandoque squamæ supra pedunculos.)

1. PREN. foliorum ramentis cauli adnatis. *Linn. sp. 797. Vimeæ.*

Prenanthes foliorum laciniis extrorsum dentatis, ramentis foliaceis cauli & ramis adnatis. *Sauv. 692.*

Chondrilla viscosa caule foliis obducto. *Bot. Monf. 63.*

Lactuca viscosa, caule foliis obducto. *Tour. 473.*

HABITAT à la Peissine, Selleneuve.

2. PREN. flosculis quinis, foliis lanceolatis denticulatis. *Linn. sp. 797. Sauv. 109.* *Питрнча.*

Chondrilla sonchi folio, flore purpurascente major. *Tour. 475.*

410 SYNGENESIA POLYGAMIA ÆQUALIS.

HABITAT à *Lesperou*. Folia glaberrima sagittato-lanceolata.

Muralis. 3. PREN. flosculis quinis, foliis lyrato-hastatis. *Linn. sp.* 797. *Sauv.* 696.

Chondrilla sonchi folio flore luteo pallescente. *Tour.* 475.

Sonchus alter folio profundè laciniato sinuato. *Bot. Monf.* 244.

HABITAT à *Valene*, à la Source du *Lés*; & quandoque circà urbem.

LEONTODON.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 747.

Char. secund. Rad. fusiformis vel bulbosa vel tuberosa fasciculata. Caul. scaposa uniflora fistulosa. Fol. radicalis attenuato-petiolata simplex pinnatifida. Flor. radicalis solitaria. Fulc. nulla, (in paucis squamæ supra pedunculos; in aliis, pili rigidi etiam supra folia.)

Taraxacum. 1. LEONT. calyce infernè reflexo. *Linn. sp.* 798.

Dens leonis vulgi sive urinaria. *Bot. Monf.* 85.

Dens leonis latiore folio. *Tour.* 468.

Taraxacum pinnis foliorum triangularibus. *Sauv.* 297.

2. Dens leonis latiore & rotundiore folio. *Bot. Monf.* 85. *Tour.* 468.

Dent de lion.

HABITAT in herbidis, pratis & arvis. Folia pinnatifida. 2. Folia ovalia latissima denticulata. Flores duplo majores. Frequens in horti regii ambulacris.

Bulbosum. 2. LEONT. foliis oblongo-ovatis subdentatis glabris, calycibus lævibus, pedunculis hirtis. *Linn. sp.* 798.

Taraxacum calyce toto erecto subhirsuto, radice bulbosa. *Sauv.* 297.

Dens leonis tuberosa radice. *Tour.* 468.

Chondrilla pusilla maritima bulbosa. *Bot. Monf.* 64.

HABITAT ad mare, & à *Laverune*, *Selleneuve*, *Salafon*, & à *Montferrier*, secùs amnem. Folia attenuato petiolata subspathulata.

Anthemalis. 3. LEONT. calycibus erectis, pedunculis squamosis, foliis glabris dentatis integerrimis. *Linn. sp.* 798.

Hieracium chondrillæ folio, radice succisa majus, folio glabro. *Bot. Monf.* 127. *Tour.* 470.

Crepis foliis longis, dentibus linearibus, caule declinato. *Sauv.* 298.

Scorzonera foliis semi-pinnatis, caule penè nudo, pappo sessili. *Sauv.* 296.

Taraxacum calycibus erectis, foliis glabris dentatis integerrimis. *Sauv.* 297.

HABITAT à *Lattes*, *Selleneuve*, *Salason*, ad dexteram in pratis.

4. LEONT. foliis dentatis hirsutis, calyce erecto acuto. *Taberosum.*
Linn. sp. 799.

Dens leonis Monspeliensium asphodeli bulbulis. *Bot. Monf.* 86.

Dens leonis asphodeli bulbulis. *Tour.* 468.

HABITAT cum prioribus. Frequens à *Salason*, & à *Sembrés*, in pratis domini Romieu regiae Societatis Scientiarum Socii, ubi variat foliis subromentolis, scapo sesquipedali hirsutissimo, vel etiam foliis linearibus integerrimis aut hastato-pinnatifidis.

5. LEONT. calyce toto erecto hispidus, foliis dentatis integerrimis hispidis, setis furcatis. *Linn. Syst.* 1194. *Hispidum.*

Dens leonis minor folio aspero. *Bot. Monf.* 86. *Tour.* 468.

Hieracium caule aphylo, hirsutum. *Bot. Monf.* 130.

Dens leonis foliis hirsutis & asperis. *Tour.* 468.

6. *Crepis* (*nudicaulis*) foliis lanceolatis dentato-sinuatis hispidis, setis subulatis, scapo unifloro. *Linn. sp.* 805.

Hieracium dentis leonis folio, hirsutis asperum, minus laciniatum. *Bot. Monf.* 130.

Dens leonis foliis hirsutis & asperis saxatile. *Tour.* 468.

HABITAT cum priori & à *la Colombiere*. Altitudo palmaris.

6. LEONT. calyce toto erecto læviusculo, foliis dentatis hirsutis, setis simplicissimis. *Linn. syst.* 1194. *Hirtum.*

Hieracium foliis triangulariter dentatis pilosis, calyce subhirsuto penè nudo. *Sauv.* 298.

Leontodon calyce erecto, foliis hispidis dentatis, dentibus integerrimis. *Sauv.* 388.

Hieracium hirsutum parvum, caule aphylo. *Bot. Monf.* 131.

Dens leonis foliis minimis hirsutis & asperis. *Tour.* 469.

Dens leonis minimus asper. *Tour.* 469.

HABITAT cum priori, à *Lavalette*. Variat foliis ova-

412 SYNGENESIA POLYGAMIA ÆQUALIS.

tis integerrimis vel linearibus, scapo vix triunciali, raro palmari.

HIERACIUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 741.

Char. secund. Rad. fusiformis vel ramosa, integerrima vel præmorsa, perpendicularis vel horizontalis stolonifera. Caul. nunc scaposa uniflora vel multiflora, nunc foliosa herbacea ramosa. Fol. simplex integerrima vel integra vel incisa, petiolata vel sessilis, radicalis vel caulina. Flor. pedunculata, pedunculis unifloris multiflorisve, radicalis aut caulina. Fulc. nulla.

* Scapo unifloro.

Hedysmeides. 1. HIERAC. foliis dentatis viscidis hirsutis subasperis, scapo unifloro, calyce hirto. Linn. sp. 800. Sauv. 292. Dens leonis foliis canescentibus villosis. Tour. 468. Hieracium montanum laciniatum lanuginoso folio. Bot. Mons. 298.

HABITAT à la Serane, Lamalou.

Alpinum. 2. HIERAC. foliis oblongis integris dentatis, scapo unifloro, calyce piloso. Linn. sp. 800.

HABITAT à Lespinouse, auprès de Lamalou. Scapus vix sesquuncialis, ad apicem foliolo quandoque unico vago instructus. Variat foliis glabris vel pilosis ovatis. Radices funiculiformes fibrosæ.

Pilosella. 3. HIERAC. foliis integerrimis ovatis, caule repente, scapo unifloro. Linn. sp. 800.

Hieracium . . . foliis subtus tomentosis. Linn. syst. 1194. Sauv. 14.

Pilosella major repens hirsuta. Bot. Mons. 204.

Dens leonis qui pilosella officinarum. Tour. 469.

La Piloselle, ou Oreille de souris.

HABITAT juxta amnem, à Castelnau, à Gramont; & in herbidis juxta urbem. Folia incana subtus villosissima, calyces lanati.

* Scapo multifloro.

Dulium. 4. HIERAC. foliis integris ovato-oblongis, stolonibus repentibus, scapo multifloro. Linn. sp. 800. Sauv. 14.

- Dens leonis qui pilosella folio minus villoso. *Tour.* 469.
 HABITAT in herbis juxta *Cannelles*, *Gramont*, le
Terrail. Scapus ramosus. Rami tres quatuorve diva-
 ricati uniflori.
5. HIERAC. foliis ovatis subdentatis, scapo racemoso *Præmorsum*.
 floribus superioribus primoribus. *Linn. sp.* 801.
 Hieracium pilosellæ folio erectum majus. *Tour.* 471.
 Pilosella major erecta. *Bot. Mons.* 204.
 Hieracium foliis integerrimis, caule repente, scapo
 multifloro. *Sauv.* 14.
 HABITAT au bois de *Gramont*, & au *Martinet* près de
Montferrier.
- * *Caule folioso.*
6. HIERAC. caule ramoso folioso, foliis radicalibus *Murorum*.
 ovatis dentatis, caulino minori. *Linn. sp.* 802. *Sauv.*
 100.
 Hieracium murorum folio pilosissimo. *Bot. Mons.* 131.
Tour. 471.
- 6. Pulmonaria Gallorum rotundifolia lævior. *Barr. Ic.* 342.
La Pulmonaire.
 HABITAT à *Gramont*, *Castelnau*, *Lavalette*, *Selle-
 neuve*. Folia subtus villosa atro-virentia.
7. HIERAC. caule erecto multifloro, foliis ovato-lan- *Sabaudum*.
 ceolatis dentatis semi-amplexicaulibus. *Linn. sp.* 804.
 Hieracium fruticosum latifolium hirsutum. *Tour.* 472.
 HOSPITATUR sub dio. Altitudo bipedalis & major.
 Folia caulina conferta. Caulis subrubens.
8. HIERAC. foliis linearibus subdentatis sparsis, floribus *Umbellatum*.
 subumbellatis. *Linn. sp.* 804.
 Hieracium fruticosum angustifolium majus. *Bot. Mons.*
 131. *Tour.* 472.
 Hieracium foliis lanceolato-linearibus obsoletè denti-
 culatis sparsis. *Sauv.* 83.
 Hieracium fruticosum latifolium dentatum glabrum.
Bot. Mons. 298.
 HABITAT à *Gramont*, *Salas*. Altitudo prioris. Folia
 caulina sæpius ovata, uno aut altero instructo den-
 ticulo.

C R E P I S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 742.

Char. secund. *Rad.* fusiformis vel ramosa. *Caul.*

414 SYNGENESIA POLYGAMIA ÆQUALIS.

herbacea ramosa striata. *Fol.* alterna sessilis simplex multifida. *Flor.* terminalis pedunculata ramosa. *Falc.* nulla, (in quibusdam bractæ involucriformes, ad singulum calycem.)

Barbata. 1. CREPIS bracteis calyce longioribus, squamis setaceis sparsis. *Linn. sp.* 805.

Hieracium calycibus setis longissimis distantibus parentibus obvallatis. *Sauv.* 83.

Hieracium proliferum falcatum. *Bot. Mons.* 119.

HABITAT à Gramont, vers Mauguio. Folia glabra lanceolata dentata vel laciniata.

Rubra. 2. CREPIS foliis amplexicaulibus lanceolatis, omnibus dentatis, radicalibus sinuatis. *Linn. sp.* 806. *Sauv.* 299.

Hieracium dentis leonis folio, flore suavè rubente. *Tour.* 469.

HABITAT au mont St. Loup, Prades, St. George.

Pulchra. 3. CREPIS foliis sagittatis dentatis, pedunculis superne turbinato-inflatis, calycibus pyramidatis. *Linn. Syst.* 1196. *sp.* 806.

Chondrilla hieracii folio annua. *Tour.* 238.

Hieracium pulchrum. *Bot. Mons.* 117.

4. Lapsana (*chondrilloides*) calycibus pyramidatis, seminibus papposis, foliis oblongis subdentatis scabris. *Linn. sp.* 812. *Sauv.* 83.

HABITAT in arvis, à Gramont, Laverune; & circa urbem.

Binnis. 4. CREPIS foliis pinnato-hastatis scabris, basi superne dentatis, calycibus muricatis. *Linn. sp.* 807.

Hirta. 6. Crepis (*hieracioides*) foliis variis subasperis, caule altissimo folioso & unifloro. *Sauv.* 299.

Crepis foliis hastato-lyratis, caule piloso. *Linn. sp.* 807.

Hieracium chondrillæ folio hirsutum. *Bot. Mons.* 127.

Tour. 470.

Glabra. 7. Crepis (*chondrilloides*) foliis variis glabris, caule ramosissimo. *Sauv.* 299.

Hieracium chondrillæ folio glabrum. *Tour.* 470.

HABITAT ad agrorum margines & in arvis, cum priori.

Fatida. 5. CREPIS foliis pinnatis angulatis, petiolis dentatis. *Linn. sp.* 807. *Sauv.* 298.

Hieracium foliis cichorii sylvestris villosis, odore castorei. *Bot. Mons.* 129. *Icon.* 118.

SYNGENESIA POLYGAMIA ÆQUALIS. 413

Hieracium amygdalas amaras olens. Tour. 469.

HABITAT in limitibus agrorum. Folia profundè pinnatifida.

ANDRYALA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 743.

Char. secund. Rad. subsimplex. Caul. herbacea ramosa teres. Fol. alterna simplex integerrima, sessili-amplexicaulis. Flor. terminalis pedunculata fastigiata. Fulc. nulla.

1. ANDR. foliis integerrimis. Linn. sp. 808. Sauv. 83. *Integrifolia.*
Tomentosis. Syst. 1196.

Sonchus villosus luteus major. Bot. Monsf. 245.

Hieracium villosum sonchus lanatus Dalechampii. Tour. 470.

HABITAT ad mare. Folia lanceolato-linearia.

2. ANDR. foliis dentato-hastatis. Linn. sp. 808. *Sinuata.*
Andryala foliis inferioribus dentatis, summis integris. Sauv. 696.

Andryala foliis lato-lanceolatis dentatis. Linn. syst. 1196.

HABITAT à Valence, & vicinis; à la source du Lés.

HYOSERIS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 796.

Char. secund. Rad. fusiformis vel ramosa. Caul. scaposa subsimplex vel foliosa herbacea ramosa. Fol. sessilis simplex integra vel pinnatifida, radicalis aut caulina alterna. Flor. pedunculata terminalis solitaria. Fulc. nulla.

* *Scapo uniflora, simplici, vel ramoso.*

1. HYOS. scapis simplicissimis unifloris, foliis pinnatifidis, seminibus nudis. Linn. sp. 808. *Fœtida.*

Dens leonis tenuissimo folio. Bot. Monsf. 86. Tour. 468.

HABITAT à Montferrier, Lavalette, Castelnau.

2. HYOS. scapis unifloris, foliis glabris lyrato-hastatis angulatis. Linn. sp. 808. *Radiata.*

Hyoseris foliis glabris hastato-pinnatis. Sauv. 300.

Dens leonis minor foliis radiatis. Bot. Monsf. 295. Tour. 468.

416 SYNGENESIA POLYGAMIA ÆQUALIS.

HABITAT in pratis, à Villeneuve, & à la mer; à Lavertune. Facies erysimi. Radix præmorsa.

Minima. 3. HYOS. scapo diviso nudo. Linn. sp. 809. Sauv. 14. Hieracium minus dentis leonis folio oblongo glabro. Tour. 470.

HABITAT in herb. dis, à Caunelles, St. George. Cauliculi vix sesquitunciales. Folia oblonga sinuata.

* *Caule folioso.*

Hedypnois. 4. HYOS. fructibus subglobosis glabris, caule ramoso. Linn. sp. 809.

Lapsana fructibus globosis glabris, seminibus disci caliculato-papposis. Sauv. 83.

Hieracium capitulum inclinans semine adunco. B. Pin. 128. Bot. Monf. 129.

Hedypnois annua. Tour. 478.

HABITAT in sterilibus, au chemin de Lavalette, à Castelnau; & cum priori. Pedunculi supernè incrassato-turbinati. Variat caule simplicissimo nudo; foliisque lanceolatis integris aut pinnatifidis.

HYPOCHÆRIS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 744.

Char. secund. Rad. fusiformis. Caul. scaposa vel foliosa herbacea ramosa. Fol. simplex sessilis integra vel incisa, radicalis aut caulina. Flor. pedunculata subsolitaria, radicalis vel caulina. Fulc. nulla, (in unâ specie spinulæ supra calyces foliaque.)

Achyropha. 1. HYPOCH. calycibus æqualibus hispidis. Linn. sp. 810. Sauv. 83.

Hypochæris foliolis calycinis æqualibus hispidis. Linn. syst. 1196.

HOSPITATUR sub dio. Folia caulina sæpiùs ovata dentata. Pedunculi longi un flori hispidi.

Maculata. 2. HYPOCH. caule subnudo, ramo solitario, foliis ovato-oblongis integris dentatis. Linn. sp. 810.

Hieracium primum latifolium. Bot. Monf. 131.

Hieracium alpinum latifolium hirsutie incanum, flore magno. Tour. 472.

HABITAT à Lespinouse, Villemagne. Variat foliis pinnatifidis.

3. HYPOCH.

3. HYPOCH. glabra, calycibus oblongis imbricatis, *Glabra*,
caule nudo, foliis dentato-sinuatis. *Linn. sp. 811.*
Sauv. 300.
Hieracium minus, dentis leonis folio oblongo glabro.
Tour. 471.
HABITAT in pratis, à *Lattes, Mangnio.*
4. HYPOCH. foliis dentato-sinuatis scabris, caule ra- *Radicata,*
moso nudo, pedunculis squamosis. *Linn. sp. 811.*
Sauv. 299.
Hieracium dentis leonis folio obtuso majus. *Bot. Monsf.*
130. Tour. 470.
Hypochaeris caulibus ramosis nudis, foliis lyrato-
oblongis, radice granulosa. *Sauv. 300.*
HABITAT à *Castelnau, Lavalette, secus amnem.*

L A P S A N A.

- Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 752.*
Char. secund. *Rad. fusiformis. Caul. herbacea*
ramosa. Fol. alterna sessilis simplex integra vel
pinnatifida. Flor. terminalis pedunculata, pe-
dunculis unifloris aut multifloris. Fulcr. nulla.
1. LAPS. calycibus fructus angulatis, pedunculis tenui- *Communis,*
bus ramosissimis. *Linn. sp. 811.*
Lampfana. Tour. 479.
Soncho affinis lapsana domestica. Bot. Monsf. 245.
HABITAT in humidis fossis. Altitudo tripedalis. Folia
lyrata, extimo subcordato sinuato. Florescentia pa-
nuculato-subcorymbosa.
2. LAPS. calycibus fructus rotulosis depressis obtusis ses- *Zacintha,*
silibus. *Linn. sp. 811.*
Lapsana calycibus fructus subrotundis angulatis, pe-
dunculis incrassatis, floribus erectis. Sauv. 301.
Cichorium verrucatum, zacintha. Tour. 476.
HABITAT à *Lattes, Salafon. Priori duplo minor.*
3. LAPS. calycibus fructus undique parentibus, radiis *Stellata,*
subulatis, foliis lanceolatis indivisis. *Linn. sp. 811.*
Sauv. 82.
Hieracium siliqua falcata. Bot. Monsf. 129.
Rhagadiolus alter Cæsalpini. Tour. 480.
HABITAT ad agrorum margines, circè urbem. Folia
sinuata, caulina subovata denticulata. Rami divari-

418 SYNGENESIA POLYGAMIA ÆQUALIS.

cati. Variat foliis inferioribus pinnatifidis. Pedunculi uniflori simplices etiam divaricati.

Capillaris. 4. LAPS. seminibus papposis, foliis radicalibus lanceolatis obtusis subdentatis, cauliculis hastatis, caule filiformi. *Linn. sp.* 812.

Hieracium minus glabrum foliis eleganter virentibus. *Sauv.* 298.

HABITAT au bois de Gramont, vers Manguio.

Rhagadiolus. 5. LAPS. calycibus fructus undique patentibus, radiis subulatis, foliis lyratis. *Linn. sp.* 812.

Rhagadiolus lapsanæ folio. *Tour. cor.* 36.

HOSPITATUR sub dio.

CATANANCHE.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 754.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea teres subsimplex. *Fol.* alterna sessilis simplex integerrima. *Flor.* pedunculata terminalis solitaria. *Falc.* nulla.

Cerulea. 1. CATAN. squamis calycinis inferioribus ovatis. *Linn. sp.* 812.

Chondrilla cerulea cyani capitulo. *Bot. Mons.* 64.

Catananche quorundam. *Tour.* 478.

β. Chondrilla cerulea sesamoides flore completo. *Bot. Mons.* 64.

Chondrilla cyanoides cerulea coronopi folio. *Barr. Icon.* 1134.

La Cupidone.

HABITAT in saxosis, à Montferrier, Lavalette, Gramont. Folia lineari lanceolata denticulo utrinque unico vel bino instructa.

Lutea. 2. CATAN. squamis calycinis inferioribus lanceolatis. *Linn. sp.* 812. *Sauv.* 308.

Chondrilla cyanoides lutea, folio non diviso. *Barr. Icon.* 1135.

Catananche flore luteo, latiore folio. *Tour.* 478.

HOSPITATUR sub dio. Folia lanceolata lubtrinervia. Petala extus villosa, ut in priori.

CICHORIUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 753.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea ra-

mosa. *Fol.* alterna sessilis simplex integra. *Flor.* pedunculata terminalis subramosa. *Fulc.* nulla. (In unâ specie spinulæ in caule ad basim ramorum.)

1. CICHOR. caule simplici, foliis dentato-sinuatis. *Linn. Intybus.* sp. 813. *Sauv.* 301.

Cichorium caule simplici ramoso, floribus confertis, omnibus sessilibus. *Linn. Syst.* 1197.

Cichorium sylvestre seu Officinarium. *Bot. Monf.* 65. *Tour.* 479.

La Chicorée; vernaculè, *la Chicourée*.

HABITAT in hortis.

2. CICHOR., caule spinoso dichotomo. *Linn. sp.* 813. *Spinosum*,

Cichorium spinosum. *Tour.* 479.

Cichorium spinosum Imperati. *Harr. Icon.* 1159.

HOSPITATUR sub dio.

SCOLYMUS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 750.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea ramosa. *Fol.* alterna decurrens simplex integra. *Flor.* axillaris solitaria sessilis. *Fulc.* spinulæ ad margines foliorum.

1. SCOLYM. foliis margine attenuatis. *Linn. sp.* 813. *Maculatus*.
Scolymus chrysanthemos annuus. *Bot. Monf.* 233. *Tour.* 480.

HABITAT à Lamalou, Villemagne, Fongeres.

2. SCOLYM. foliis margine incrassatis. *Linn. sp.* 813. *Hispanicus*.
Scolymus Theophrasti. *Bot. Monf.* 233. *Tour.* 480. *Sauv.* 294.

L'Épine jaune; vernaculè, *lous Cardouffès*.

HABITAT ad margines viarum & agrorum. Caulis sesquipedalis ramosus villosus. Folia subtus villosa.

ECHINOPS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 759.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea striata simplex vel ramosa. *Fol.* alterna sessilis simplex pinnatifida. *Flor.* terminalis peduncu-

420 SYNGENESIA POLYGAMIA ÆQUALIS.

lata capitata. *Fulc.* spinulæ supra ferraturas foliorum.

- Sphærocephalus*. 1. ECHIN. calycibus unifloris, caule multifloro, foliis spinosis supra nudis. *Linn. Syst.* 8.4.
Echinops floribus capitatis, calyculis unifloris. *Sauv.* 293.

Echinops major. *Tour.* 463.

Carduus sphærocephalus latifolius albus. *Barr. Ic.* 143.

HABITAT copiosè circa Molettrinas. Folia subtus tomentosa.

- Ricra*. 2. ECHIN. calyculis unifloris, caule unicapitato. *Linn. sp.* 815.

Echinops caule subunifloro. *Sauv.* 293.

Echinops minor. *Tour.* 463.

Carduus sphærocephalus cæruleus minor. *Bot. Monf.* 50. *Barr. Icon.* 411. 412.

HABITAT ad lævam à Salafon. Vix palmaris.

A R C T I U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 760.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea striata ramosa. *Fol.* alterna petiolata simplex integra. *Flor.* ramea axillaris solitaria. *Fulcr.* nulla.

- Lappa*. 1. ARCTIUM foliis cordatis inermibus petiolatis. *Linn. sp.* 816.

Arctium capitulis majoribus. *Sauv.* 118.

Lappa major seu arctium Diolcoridis. *Bot. Monf.* 150. *Tour.* 450.

La Bardane; vernaculè, de *Lappéras*.

HABITAT à Castelnau, Gramont, Perault & circa urbem.

S E R R A T U L A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 761.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea striata ramosa. *Fol.* alterna sessilis simplex pinnatifida. *Flor.* terminalis pedunculata, solitaria vel thyrsoides - spicata. *Fulc.* spinulæ in plurimis ad margines foliorum.

- Babilonica* 1. SERRAT. foliis tomentosis subintegerrimis, radica-

SYNGENESIA POLYGAMIA ÆQUALIS. 421

libus subcuneiformibus planis, caulinis decurrentibus concavis, floribus thyrsoideo-spicatis.

- β. *Serratula* foliis tomentosis, radicalibus lyratis, caulinis decurrentibus, floribus thyrsoideis. *Linn. Syst.* 1199.

Jacea Babilonica. *Bauh. Prod.* 129.

Jacea latissimo folio laciniato. *Bauh. Pin.* 272. *Tour.* 441.

HABITATUR sub dio. Caulis tomentosus humanam superans altitudinem, sæpius simplicissimus. Folia in petiolum attenuata sæpius integerrima. Florum thyrusus longissimus subspicatus. Pedicelli brevissimi subflori.

2. *SERRAT.* foliis pinnatifidis, pinna terminali maxima. *Linn. sp.* 816. *Inflores.*

Jacea quæ *serratula* vulgo. *Tour.* 444.

Serratula. *Bot. Monf.* 239. foliis pinnatifidis. *Sauv.* 239.

HABITAT ad mare, & à *Perants*, *Medafon*, *Mauguro*. Laciniæ foliorum dentato-spinosæ.

3. *SERRAT.* folus dentatis spinosis. *Linn. sp.* 820. *Sauv.* *Arvensis.* 292.

Carduus radice repente, foliis lanceolatis dentatis margine aculeatis. *Sauv.* 79.

Carduus vinearum repens sonchi folio. *Bot. Monf.* 49.

Cirsium arvense sonchi folio, radice repente, flore purpurascens. *Tour.* 448.

Vernaculè *las Caoussides*.

HABITAT in toto agro Monspessulano. Vitium in vineis & arvis.

C A R D U U S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 763.

Char. secund. *Rad.* ramosa vel tuberosa. *Caul.* herbacea ramosa. *Fol.* alterna sessilis decurrens vel amplexicaulis, simplex integra vel pinnatifida. *Flor.* terminalis pedunculata: pedunculis unifloris vel multifloris. *Falc.* spinulæ ad margines foliorum.

* *Foliis decurrentibus.*

1. *CARD.* foliis decurrentibus hastato-pinnatis spinosis, *Lanceolatus*, laciniis divaricatis, calycibus ovatis spinosis vilosis, caule piloso. *Linn. sp.* 821.

422 SYNGENESIA POLYGAMIA ÆQUALIS.

Carduus foliis sinuatis decurrentibus, denticulis superficiei que spinosis, capitulis turbinatis. *Sauv.* 291.

Carduus lanceolatus latifolius. *Tour.* 440.

Carduus lanceolatus sive *sylvestris.* *Bot. Mons.* 49.

HABITAT in arvis & viis.

- Nutans.* 2. *CARD.* foliis spinosis semidecurrentibus, floribus cernuis, squamis calycinis supernè patentibus. *Linn.* *sp.* 821. *Sauv.* 290.

Carduus nutans. *Bot. Mons.* 49. *Tour.* 440.

Onopyxus amplo capite. *Barr. Icon.* 1116.

HABITAT ad satorum margines.

- Acanthoides.* 3. *CARD.* foliis sinuatis decurrentibus margine spinosis, calycibus pedunculatis solitariis erectis villosis, *Linn.* *sp.* 821.

Carduus acanthoides. *Bot. Mons.* 49. *Tour.* 440.

Carduus foliis laciniatis subtus tomentosis margine spinosis, capitulis sessilibus congestis aculeatis. *Sauv.* 292.

HABITAT à la Colombiere, Montferrier.

- Crispus.* 4. *CARD.* foliis sinuatis decurrentibus, margine spinosis, flosculis aggregatis terminalibus nudis. *Linn.* *sp.* 821. *muticis.* *Syst.* 1199.

Carduus spinosissimus angustifolius vulgaris. *Bot. Mons.* 49.

Carduus caule crispato. *Tour.* 440.

Carduus cirsium dictus folio laciniato nigrius, *B.* *Hist.* 3. 44.

Le Charcon; vernaculè, *les Carchofas d'Asé.*

HABITAT in viis & arvis.

- Monspeliaca.* 5. *CARD.* foliis lanceolatis subrepandis glabris decurrentibus inæqualiter ciliatis, pedunculis alternis, calycibus inermibus. *Linn.* *sp.* 822.

Carduus foliis lanceolatis glabris integris ciliatis decurrentibus, calycibus inermibus. *Sauv.* 79.

C. sium Monspeliacum, folio longo glabro. *Bot. Mons.* 66.

Cirsium foliis non hirsutis, floribus compactis. *Tour.* 447.

HABITAT juxta amnem.

* *Foliis amplexicaulibus.*

- Maritimus.* 6. *CARD.* foliis amplexicaulibus hastato-pinnatifidis spinosis, calycibus aphyllis, spinis canaliculatis du-

SYNGENESIA POLYGAMIA ÆQUALIS. 423

plicato-spinosis. *Linn. sp.* 823.

Carduus squamis calycinis apice margineque spinosis.
Sauv. 291.

Carduus albis maculis notatus vulgaris. Bot. Monsf.
49. Tour. 440.

Le Chardon-Merle.

HABITAT circa hortos. *A Sellenewe, Lavanet.*

7. CARD. foliis sessilibus bifariam pinnatifidis, laciniis *Eriophorus.*
alternis erectis, calycibus globosis villosis. *Linn.*
sp. 823, *Sauv.* 290.

Carduus capite rotundo tomentoso. Bot. Monsf. 50.
Tour. 441.

HABITAT à Ronquet, Valene, & vicinis.

8. CARD. foliis pinnatifidis spinosis sessilibus, caule *Tuberosus.*
inermi, capitulis solitariis. *Linn. sp.* 824.

Cirsium pratense asphodeli radice latifolium. Tour. 448.

Carduus pratensis asphodeli radice latifolius. Bot.
Monsf. 48.

Carduus foliis semipinnatis, pinnis semibilobis, ca-
pitulis inermibus singularibus. Sauv. 292.

Occurrit in pratis & circa Moletrinas.

C N I C U S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 806.

Char. secund. *Rad.* fusiformis subramosa. *Caul.*
herbacea ramosa. *Fol.* alterna sessilis vel de-
currentis, simplex integra vel pinnatifida. *Flor.*
terminalis pedunculata, pedunculis multifloris.
Fulc. aculei ad margines foliorum.

1. CNICUS foliis lanceolatis decurrentibus indivisis, *Acarna.*
calycibus pinnato-spinosis. *Linn. Syl.* 1201.

Carduus (acarna) foliis lanceolatis dentatis dec-
currentibus: spinis marginalibus duplicibus. Linn.
sp. 820.

Carduus caule alato spinoso, foliis spinosis, spinis
duplicibus. Sauv. 291.

Cnicus polycephalus canescens, aculeis flavescentibus
munitus. Tour. 451.

Carduus lanceolatus ferocior. Bot. Monsf. 50.

Chamaeleon niger Salmanticensis. Bot. Monsf. 60.

Acarna Theophrasti. Barr. Icon. 1211.

424 SYNGENESIA POLYGAMIA ÆQUALIS.

HABITAT à Prades, à la source du Lés. Altitudinem humanam superans.

Benedictus. 2. CNICUS caule diffuso, foliis dentato-sinuatis. *Linn.* sp. 826.

Carduus Benedictus. *Tour.* 450.

Le Chardon bénit.

HOSPITATUR sub dio. Rarè semina maturans.

ONOPORDUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 762.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea ramosa. *Fol.* alterna decurrens simplex pinnatifida. *Flor.* terminalis & axillaris solitaria sessilis. *Fulc.* aculei ad margines foliorum.

Acanthium. 1. ONOP. calycibus squarrosis, foliis ovato-oblongis sinuatis. *Linn.* sp. 827.

Onopordum calycibus squarrosis squamis subulatis. *Linn. Syst.* 1201.

Carduus tomentosus acanthi folio vulgaris. *Tour.* 441.

Acanthium. *Bot. Mons.* 2. *Barr. Icon.* 502.

Onopordum foliis tomentosis obiter laciniatis, caule alato brachiato. *Sauv.* 80. 290.

Le Pet d'Asne, ou l'Epine blanche.

HABITAT à Castelnau, Montferrier.

Illyricum. 2. ONOP. calycibus squarrosis, squamis lanceolatis, foliis lanceolatis pinnatifidis. *Linn. Syst.* 1201.

Onopordum calycibus squarrosis, foliis linearibus pinnatifidis. *Linn.* sp. 827.

Onopordum foliis decurrentibus ligulatis pinnatifidis. *Sauv.* 290.

Acanthium Illyricum. *Bot. Mons.* 2.

Carduus tomentosus acanthi folio angustiori. *Tour.* 441.

Acanthium virens majoribus capitulis. *Barr. Icon.* 501.

HABITAT ad mare.

Arabicum. 3. ONOP. spinis divaricatis, calycibus imbricatis. *Linn.* sp. 827.

Carduus tomentosus acanthi folio altissimus Lusitanicus. *Barr. Icon.* 501.

HOSPITATUR sub dio. Apricatur, Altitudinem humanam superat.

C I N A R A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 764.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea ramosa. *Fol.* alterna semidecurrens simplex pinnato-pinnatifida, vel impari-pinnata. *Flor.* terminalis subsolitaria pedunculata. *Fulcr.* aculei in plurimis supra ferraturas foliorum.

1. CINARA foliis subspinosis pinnatis indivisisque, ca- *Scolymus*
lycinis squamis ovatis. Linn. sp. 827.
Cinara foliis pinnatis, foliolis ferratis. Sauv. 239.
Cinara sylvestris latifolia. Bot. Monf. 65. Tour. 442.
- β. Cinara foliis bipinnatis angustis, caule spinoso. Sauv.
263.
L'Artichaud; vernaculè, *l'Artichaut*; β. *la Cardoune* &c.
HABITAT in hortis. β. Ad mare. *A Peraults, Ville-*
neuve, au Terrail.
2. CINARA foliis spinosis, omnibus pinnatifidis, ca- *Cardunculus*
lycinis squamis ovatis. Linn. sp. 827.
Cinara foliis pinnatis, foliolis oblongis indivisis, caule
spinoso. Sauv. 239.
Cinara spinosa, cujus pediculi esitantur. Tour. 442.
HOSPITATUR sub dio.
3. CINARA foliis spinosis bipinnatifidis subtus tomen- *Humilis*.
tosis, calycibus squamis subulatis. Linn. sp. 828.
Cinara sylvestris Bætica. Tour. 442.
HOSPITATUR sub dio. Sempervirens. Folia palmaria,
vel sesquipalmaria bipinnatifida, foliorum laciniis
acutis.

C A R L I N A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 766.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea simplex vel ramosa. *Fol.* alterna sessilis simplex pinnatifida. *Flor.* terminalis vel lateralis, sessilis aut pedunculata: pedunculis unifloris multiflorisque. *Fulc.* spinæ ad margines foliorum.

1. CARL. caule unifloro flore brevior. Linn. sp. 828. *Acaulis*.
Carlina caulifera & acaulis. Bot. Monf. app. 292.
Carlina caule unifloro. Sauv. 293.
Carlina acaulos magno flore albo. Tour. 500.

426 SYNGENESIA POLYGAMIA ÆQUALIS.

Vernaculè *Cardonilla*.

HABITAT à *Lesperou*, à *Lespioune*.

Lanata. 2. CARL. caule subunifloro longiore lanato, radio calycis purpureo. *Linn. Syst.* 1201.

Carlina caule trifloro subdichotomo: intermedio sessili. *Sauv.* 293. *Linn. sp.* 828.

Carlina annua purpurea *Monspeliensium*. *Bot. Monsf.* 51. sive *Carlina Richeri de Belleval*.

Carlina annua flore purpureo-rubente patulo. *Tour.* 500.

Acarua attractylidis folio, amplo flore. *Barr. Icon.* 483.

HABITAT à la *Peffine*, *Sellenneuve*, *Laverune* & circa Urbem; folia caulina lanceolata.

Corymbosa. 3. CARL. caule multifloro subdiviso, floribus sessilibus, radio calycis sulphureo. *Linn. Syst.* 1202.

Carlina caule multifloro corymboso, floribus terminalibus. *Linn. sp.* 828.

Carlina caule ramoso, floribus umbellatis. *Sauv.* 293.

Carlina sylvestris vulgaris. *Bot. Monsf.* 51. *Tour.* 501.

β. *Carlina patula* attractylidis folio & facie. *Tour.* 500. *La Carlina*.

HABITAT cum priori.

Racemosa. 4. CARL. floribus sessilibus lateralibus paucissimis. *Sauv.* 293. *Linn. sp.* 829.

Carlina sylvestris minor Hispanica. *Bot. Monsf.* 51. *Tour.* 500.

HABITAT à *Villemagne & Fougères*, à *Rouquet & Valcner* ubi palmarem vidimus, caule simplicissimo, folisque ovatis sinuatis subinermibus.

A T R A C T Y L I S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 756.

Char. secund. *Rad.* fusiformis subramosa. *Caul.* herbacea ramosa. *Fol.* alterna sessilis simplex integerrima. *Flor.* terminalis pedunculata solitaria. *Falc.* spinulae ad margines foliorum. *Bractea* involucrifformes plurimae ad basin calycum, spinosae, laciniatae.

Cancellata. 1. ATRACT. bracteis cancellatis ventricosiss linearibus dentatis, calycibus ovaris, floribus flosculosis. *Linn. sp.* 830.

Attractylis foliis linearibus dentatis, calycibus conniventibus. *Sauv.* 293.

SYNGENESIA POLYGAMIA ÆQUALIS. 417

Cnicus exiguus capite cancellato, semine tomentoso.
Tour. 451.

La Fuselée.

HOSPITATUR sub dio. Apud nos facta indigena.
Occurrit à *Castelnau le long de la riviere*. Caulis
teres ramosus tomentosus. Rami erecti. Folia lineari-
lanceolata spinulis ciliata, obtusa, semiamplexi-
caulia. Bractæ calycibus longiores, apice latiores
spinosæ pinnatifido-dentatæ.

CARTHAMUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 765.

Char. secund. Rad. fusiformis. Caul. herbacea
simplex vel ramosa. Fol. alterna sessilis simplex
integra aut pinnatifida. Flor. terminalis solitaria
pedunculata. Fulc. aculei ad margines foliorum.

1. CART. foliis ovatis integris serrato-aculeatis. *Linn. Tinctorius.*
sp. 830. *Sauv.* 80.

Cnicus sativus seu carthamus officinarum. *Tour.* 457.
Le Cartame ou Safran bâtard.

- HOSPITATUR sub dio. Caulis tripedalis albicans.
Folia trinervia glabra. Tubi flosculorum longissimi
rubri vel croci.

2. CART. caule piloso supernè lanato, folus inferiori- *Lanatus.*
bus pinnatifidis, summis amplexicaulibus dentatis.
Linn. sp. 830. *Sauv.* 292.

Cnicus attractylis lutea dictus. *Tour.* 451.

Attractylis lutea. *Bot. Mons.* 34.

- HABITAT in arvis. Altitudo pedalis. Folia caulina
dentato-pinnatifida.

3. CART. foliis caulinis linearibus pinnatis longitudine *Carduncellus*
plantæ. *Linn. sp.* 831.

Carthamus foliis caule longioribus ligulatis pinnati-
fidis. *Sauv.* 292.

Carduncellus montis Lupi. *Bot. Mons.* 51.

- Cnicus cæruleus humilior montis Lupi. *Tour.* 451.

Carduncellus purpureus singulari flore tenuifolius.
Barr. Icon. 345.

- HABITAT au mont Saint Loup. Interdum acaulis vel
semipalmatis. Variat foliis caulinis lanceolatis inte-
gris vel pinnatifidis, calycibusque spinosis vel in-
ter-

B I D E N S .

Char. prim. Vid. Linn gen. pl. 776.

Char. secund. *Rad.* ramosa *Caul.* herbacea striata, teres vel angulata. *Fol.* opposita petiolata vel sessilis, simplex integra vel impari-pinnata: foliolis integris aut incis. *Flor.* terminalis pedunculata solitaria. *Fru.* nulla. (in una specie bractæ foliaceæ involucriformes ad basim calycis singuli.)

- Tripartita.* 1. **BIDENS** corollis flocculosis, calycibus subfoliosis, seminibus erectis, foliis trifidis. *Linn. sp.* 831.
Bidens coronis seminum retrorsum aculeatis serratis, seminibus erectis. *Sauv.* 195. 240.
Bidens folus tripartito-divisis. *Tour.* 462.
Eupatorium dictum cannabina aquatica folio tripartito. *Bot. Monf.* 296.
HABITAT in fossis inundatis, à la Roubine, à Lattea.
 Floret autumnus.
- Cernua.* 2. **BIDENS** seminibus erectis: foliis lanceolatis amplexicaulibus, floribus cernuis. *Linn. sp.* 832.
Eupatorium dictum cannabina aquatica folio non diviso. *Bot. Monf.* 295.
Eupatorium cannabinum chrysanthemum. *Harr. Icon.* 1209.
Bidens folio dissecto. *Tour.* 462.
HABITAT cum priori.
- Frondosa.* 3. **BIDENS** foliis pinnatis ternatisque serratis glabris, seminibus erectis, calycibus frondosis, caule laevi. *Linn. Syst.* 1203.
Bidens folus pinnatis serratis, seminibus erecto-distantibus, calycibus frondosis, corollis radiatis. *Linn. sp.* 832.
Bidens Canadensis latifolia flore luteo. *Tour.* 462.
HOSPITATUR sub dio. Frequens in horto regio. Semina obversè ovata compressa aristis quatuor terminata, alternis duabus brevissimis. Bractæ plurimæ inæquales ad basim ciliatæ. Variat folus summis simplicissimis integerrimisque.
- Bipinnata.* 4. **BIDENS** foliis bipinnatifidis incis, calycibus involucriatis, corollis semiradiatis, seminibus divergentibus. *Linn. Syst.* 1203.
Bidens Americana apii folio. *Tour.* 462.

SYNGENESIA POLYGAMIA ÆQUALIS. 429

HOSPITATUR sub dio. Semina linearia obsoletè tetragona, quadriaristata alternis aristis minimis.

C A C A L I A.

Char. prim. Vid. Linn. Syst. nat. 841.

Char. secund. Rad. funiculiformis vel fusiformis.

Caul. herbacea subsimplex vel fruticosa succulenta. Fol. alterna succulenta, sessilis aut petiolata, simplex integerrima aut integra. Flor. terminalis pedunculata corymbosa. Fulc. nulla.

* Frutescentes.

1. CACAL. caule fruticoso, foliis ovato-oblongis, petioli basi linea triplici deductis. Linn. sp. 834. *Antieuphorbium*.
Kleinia foliis carnosis planis ovato-oblongis. Sauv. 6. & 81.

L'Antieuphorbe.

HOSPITATUR in caldario. Succulenta glauca, florens autumnò absque fructu.

2. CACAL. caule fruticoso composito, foliis lanceolatis pluribus sessilibus, petiolorum cicatricibus obsoletis. Linn. sp. 834. *Kleinia*.

Cacalia foliis lanceolatis planis, caule lævi ventricoso. Sauv. 52.

HOSPITATUR cum priori. Florens eodem tempore absque fructu. Altitudo humana. Folia in petiolum attenuata.

* Herbacea.

3. CACAL. foliis reniformibus petiolatis acutis denticulatis Linn. sp. 836. *Alpina*.

Tussilago caule ramoso. Sauv. 113.

Cacalia foliis cutaneis acutioribus & glabris. Tour. 452.

Cacalia foliis crassis hirsutis. Tour. 452.

HABITAT à Lesperon. Folia subtus tomentosa, denticulis inæqualibus.

E U P A T O R I U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 772.

Char. secund. Rad. fusiformis vel Ramosa. Caul. herbacea teres ramosa. Fol. alterna petiolata

simplex integra vel opposita subsessilis ternata ;
foliolis integerrimis. *Flor.* terminalis peduncu-
lata paniculato-corymbosa conferta vel rara.
Fulc. nulla.

* *Calycibus quinquefloris.*

- Cannabinum** 1. EUPAT. foliis oppositis ternatis sessilibus integerrimis.
Eupatorium foliis digitatis. *Lin.* sp. 838. *Sauv.* 195.
Eupatorium cannabinum. *Bot. Mons.* 93. *Tour.* 456.
L'Eupatoire.
HABITAT à Laverune, Lattes, Selleneuve; variat à
Lesperon foliolis omnibus acutè serratis.

* *Calycibus multifloris.*

- Celestinum.** 2. EUPAT. foliis cordato-ovatis obtusè serratis petiola-
tis, calycibus multifloris. *Linn.* sp. 838.
HABITATUR sub dio. Caulis debilis pubescens. Pe-
dunculi pauciflori.

S T Æ H E L I N A.

Char. prim. Vid. *Linn.* gen. pl. 767.

Char. secund. Rad. lignosa ramosa. Caul. suffru-
ticosa ramosa. Fol. alterna sessilis simplex in-
tegra. *Flor.* pedunculata terminalis subsolitaria.
Fulc. nulla.

- Dubia.** 1. STÆH. foliis linearibus denticulatis, squamis caly-
cinis lanceolatis, pappo calycibus duplo longiore.
Linn. *Syst. nat.* 1205.
Stæhelina foliis linearibus denticulatis, squamis caly-
cinis lanceolatis. *Linn.* sp. 840.
Stæchas citrina altera inodora. *Lob. Icon.* 486.
Jacea capitata rorismarini folio. *Tour.* 444.
Helichrysum sylvestre flore oblongo. *Bot. Mons.* 125.
& 297.
Chamæchrysocome prælongis purpureisque jaceæ
capitulis. *Barr. Icon.* * 406.
HABITAT à Lacolombière. Freqüentior à Sembrés. Cau-
lis & folia subrustomentosa. Calycum squamæ pur-
purascentes. Foliorum nervi in caulem decurrunt.
Floret mense Septembri.

CHRYSOCOMA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 770.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea teres ramosa. *Fol.* sessilis simplex integerrima sparsa. *Flor.* ramea terminalis solitaria. *Fulc.* nulla.

1. CHRYYS. herbacea, foliis linearibus glabris, calycibus *Linofyrit.* laxis. *Linn. sp.* 841.

Conyza linearæ folio. *Tour.* 455.

Linofyris nuperorum. *Lob. Icon.* 409.

Conyza calycibus laxis. *Sauv.* 48.

Linaria folio capitulo. *Bot. Mons.* 159.

HABITAT à Fontfede, Lavalette, Mammaou. Floret autumno.

SANTOLINA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 769.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* teres ramosa fruticulosa. *Fol.* alterna sessilis simplex integerrima vel integra. *Flor.* terminalis pedunculata solitaria. *Fulc.* nulla (in una specie glandulæ epiphyllæ innumere.)

1. SANT. pedunculis unifloris, foliis quadrifariam dentatis. *Linn. sp.* 842. *Chamaecyparissus.*

Santolina foliis teretibus. *Tour.* 460.

Abrotanum foemina incanum Hispanicum. *Barr. Ic.* 463.

La Garderobe.

HOSPITATUR sub dio. Huc referatur *santolina* flore minore, foliis villosis incanis. *Tour.* 460.

2. SANT. pedunculis unifloris, foliis linearibus margine tuberculatis glandulosis. *Linn. Syst.* 1206. *Rorismarini-folia.*

Santolina pedunculis unifloris, foliis linearibus. *Linn. sp.* 842.

Santolina rorismarini folio major. *Tour.* 461.

Abrotanum foemina virens vermiculato folio. *Barr. Icon.* 464.

HOSPITATUR sub dio.



431 SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA.

TANACETUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 773.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* teres fruticulosa. *Fol.* alterna, nunc sessilis pinnata, nunc petiolata simplex integra. *Flor.* terminalis corymbosa. *Fulc.* nulla.

* *Fruticulosa.*

Vulgare. 1. TANAC. foliis bipinnatis incisis serratis. Linn. sp. 844. Tanacetum foliis pinnatis pinnis pinnatifidis incisis serratis. Sauv. 240. & 265.

Tanacetum vulgare luteum. Tour. 461.

La Taï assie.

HOSPITATUR sub diò.

Balsamita. 2. TANAC. foliis ovatis integris serratis petiolatis. Linn. sp. 845. Sauv. 81.

Tanacetum hortense foliis & odore menthæ. Tour. 461.

La Menthe-coq, le coq, ou l'herbe coq des jardins.

HOSPITATUR sub diò. Folia summa sessilia.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

ARTEMISIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 779.

Char. secund. *Rad.* lignosa vel fibrosa. *Caul.* teres striata, herbacea vel fruticulosa. *Fol.* alterna, petiolata vel sessilis, nunc simplex integerrima aut pinnatifida, nunc subbipinnata. *Flor.* axillaris pedunculata, pedunculis racemosis foliosis: floribus solitariis pedicellatis vel sessilibus aggestis. *Fulc.* nulla.

* *Fruticosa erecta.*

Abrotanum. 1. ARTEM. foliis ramosissimis setaceis, caule erecto suffruticoso. Linn. sp. 845.

Abrotanum mas angustifolium. Tour. 459.

Artemisia foliis multifidis setaceis, caule erecto. Sauv. 264.

L'Aurone mâle.

HABITAT ad margines agrorum & sepium. A Castelnau, Boutonet, &c.

* *Procumbentes*

* *Procumbentes ante florescentiam.*

2. ARTEM. foliis multifidis linearibus, caulibus pro- *Campestris.*
cumbentibus virgatis. *Linn. sp. 846. Sauv. 264.*
Abrotanum campestre cauliculis rubentibus. *Tour.*
459. & albicantibus. *Ibid.*
Artemisia tenuifolia. *Bot. Mons. 29.*
HABITAT cum priori.
3. ARTEM. foliis multipartitis tomentosis, racemis cer- *Maritima.*
nui, flosculis femineis ternis. *Linn. sp. 846.*
Artemisia foliis multifidis compositis, racemis sim-
plicibus alternis, floribus erectis sessilibus. *Sauv. 264.*
Absinthium seriphium gallicum. *Bot. Mons. 1.*
HABITAT ad mare vers Aiguemorte & Agde.

* *Erectæ herbacæ, foliis compositis.*

4. ARTEM. foliis multipartitis subtus tomentosis, flo- *Pontica:*
ribus subrotundis nutantibus : receptaculo nudo.
Linn. sp. 847. Sauv. 264.
Absinthium ponticum tenuifolium incanum. *Tour. 457.*
HOSPITATUR sub dio.
5. ARTEM. foliis compositis multifidis, floribus sub- *Absinthium.*
globosis pendulis : receptaculo villoso. *Linn. sp. 848.*
Sauv. 264.
Absinthium Ponticum seu Romanum. *Tour. 457.*
L'Absinthe ; vernaculè l'Absinta, l'Absin menut.
HABITAT à la Louzere, à Saint Guillin. Caulis &
folia incana. Lacinia foliorum lineares. Racemi
axillares secundi foliosi.
6. ARTEM. foliis pinnatifidis planis incisis : subtus to- *Vulgaris.*
mentosis, racemis simplicibus, floribus ovatis : ra-
dio quinquefloro. *Linn. sp. 848.*
Artemisia vulgaris major. *Bot. Mons. 28. Tour. 460.*
Artemisia foliis pinnatifidis planis laciniatis, floribus
erectis. *Sauv. 294.*
L'Armoise ; vernaculè l'Artemisa, l'Arcemisa.
HABITAT à Sellenneuve & Lamousson, au Terrail, à
Villeneuve.

* *Foliis simplicibus.*

7. ARTEM. foliis lineari-lanceolatis sessilibus glabris in- *Dracunculis*
tegerimis. *Linn. sp. 849.*
Abrotanum lini folio acriori & odorato. *Tour. 459.*

434 SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA.

Artemisia foliis lanceolato-linearibus alternis integerrimis. Sauv. 54.

L'Estragon.

HOSPITATUR sub dio.

GNAPHALIUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 778.

Char. secund. *Rad.* repens sarmentosa vel ramosa vel simplex tereti-attenuata. *Caul.* herbacea ramosa vel fruticulosa. *Fol.* alterna sessilis simplex integra vel integerrima. *Flor.* nunc terminalis capitata vel capitato-corymbosa vel solitaria, nunc lateralis sessilis; vel utraque simul. *Fulc.* nulla.

* *Argyrocomæ Calycibus albis.*

- Dioicum.** 1. GNAPH. caule simplicissimo, corymbo simplici terminali, sarmentis procumbentibus. *Linn. sp. 850.*
Gnaphalium montanum flore rotundioræ. Tour. 453.
& folio & flore longiore. Ibid.
Gnaphalium sexubus tota planta distinctis. Sauv. 80.
& 116.

Le pied de chat; vernaculè lou pé de cat.

HABITAT à Lesperou, à Lamalou. Variat foliis radicalibus spathulatis vel linearibus.

- Fetidum.** 2. GNAPH. foliis amplexicaulibus integerrimis acutis subtus tomentosis, caule ramoso. *Linn. sp. 851.*
Elichrysium Africanum lanuginosum latifolium, calyce floris argenteo & amplissimo. Tour. 453.
HOSPITATUR sub dio. Caulis bipedalis hispidus. Folia ovata oblonga. Squamæ calycinæ acuminatæ.

- Luteo-album** 3. GNAPH. foliis semi-amplexicaulibus ensiformibus repandis obtusis utrinque pubescentibus, floribus conglomeratis. *Linn. sp. 851.*

Elichrysium sylvestre latifolium, capitulis conglobatis. Tour. 452.

Gnaphalium ad strachadem accedens. Bot. Mens. 111.

HABITAT à Lamousson juxta aquas, à Castelnau, vers Lavalette; facies sequentis, altitudo major.

* *Chrysocomæ Calycibus luteis.*

4. GNAPH. foliis linearibus, caule fruticoso ramoso, *Stachas.*
 corymbo composito. *Linn. sp. 853.*
Gnaphalium foliis perangustis congestis, umbella exi-
 gua lutea caulem terminante. *Sauv. 49.*
Elichrysum seu *Stachas* citrina angustifolia. *Bot.*
Monf. 124. Tour. 452.
L'Immortelle jaune des jardiniers; vernaculé l'Immour-
sela jaune.
 HABITAT à Castelnau vers le moulin des Guilbans, à
 Lacolombière, à Caunelles, Selleneuve.
5. GNAPH. foliis linearibus alternis, caule frutescente, *Sordidum.*
 floribus paniculatis subternis terminalibus scissilibus,
Linn. sp. 853. Sauv. 49.
Elichrysum sylvestre angustifolium capitulis conglo-
 batis. *Bot. Monf. 125. Tour. 453.*
 HABITAT suprâ muros. Circâ Urbem, à Lavannes,
 sous le Perou. Folia semiamplexicaulia.

* *Filagines Calycibus cinereis.*

6. GNAPH. caule ramoso diffuso, floribus confertis *Uliginosum.*
 terminalibus. *Linn. sp. 856.*
Gnaphalio vulgari similis. *Bot. Monf. 110.*
Elichrysum aquaticum ramosum minus capitulis fo-
 liatis. *Tour. 452.*
Gnaphalium caule ramoso. *Sauv. 48.*
 HABITAT à Gramont, Castelnau, Lavalette. Squamæ
 calycinæ nigrescentes.
7. GNAPH. foliis alternis linearibus acutis planis, pe- *Saxatile.*
 dunculis unifloris longissimis. *Linn. sp. 857.*
Elichrysum sylvestre latifolium flore magno. *Tour.*
452. & parvo. Ibid.
Chrysocoma latifolia minima singulari flore. *Barr.*
Icon. 425.
 HOSPITATUR sub dio. Caulis pedalis teres tomento-
 sus. Folia denticulata semiamplexicaulia. Calycis
 squamæ apice membranacæ nigrescentes.

X E R A N T H E M U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 777.*

Char. secund. *Rad. tenuis subsimplex. Caul. her-*

E c ij

436 SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA.

bacea subramosa. *Fol.* alterna sessilis simplex integerrima. *Flor.* terminalis solitaria pedunculata. *Fulc.* nulla.

Annuum. 1. XERANTH. foliis lanceolatis patentibus. *Linn. sp.* 857.

Xeranthemum foliis lanceolatis, caule herbaceo. *Linn. Syst.* 1211.

Xeranthemum receptaculis paleaceis, seminum pappo quinqueseto. *Sauv.* 54. & 88.

Jacea oleæ folio, capitulis simplicibus. *Bot. Mons.* 298.

Jacea pumila oleæ folio purpureis & congestis floribus. *Barr. Icon.* 1126.

Xeranthemum flore simplici purpureo majori. *Tour.* 499.

HABITAT au mont Saint Loup, à Lesperou, Lavalette & vicinis. Rami paucissimi divaricati simplicissimi tomentosi. Squamæ calycinæ pellucidæ, linea purpurea notatæ.

C O N Y Z A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 780.

Char. secund. *Rad.* ramosa, *Caul.* herbacea ramosa. *Fol.* alterna sessilis simplex integra vel integerrima. *Flor.* terminalis fastigiato-corymbosa. *Fulc.* nulla.

Squarrosa. 1. CONYZA foliis lanceolatis acutis, caule annuo corymboso. *Linn. sp.* 861.

Conyza major vulgaris. *Bot. Mons.* 78. *Tour.* 454.

Conyza foliis ovato-lanceolatis floribus laxè umbellatis. *Sauv.* 80.

L'Herbe aux puces, ou la Conise.

HABITAT à Castelnau, Montferrier, la Peissine. Altitudo humana; folia integerrima.

Bifrons. 2. CONYZA foliis ovato-oblongis amplexicaulibus. *Linn. sp.* 861. *Sauv.* 80.

Conyza latifolia viscosa suavè olens flore aureo, à Gallo-Provincia. *Tour.* 455.

HOSPITATUR sub dio. In ista calyces quandoque squarrosi, foliaque decurrentia.

Chinensis. 3. CONYZA foliis lanceolato-ovatis serratis subtus to-

SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA. 437

mentosus, floribus terminalibus congestis. *Linn. sp.* 862.

HOSPITATUR sub dio. Folia inferiora in petiolum attenuata.

ERIGERON.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 782.

Char. secund. *Rad.* ramosa vel simplex, vel tuberosa. *Caul.* herbacea simplex vel ramosa. *Fol.* alterna sessilis simplex integra vel integerrima. *Flor.* pedunculata axillaris & terminalis solitaria vel aggesta vel paniculata. *Fulc.* nulla.

1. ERIG. pedunculis unifloris lateralibus, calycibus *viscosum*, squarrolis. *Linn. sp.* 863. *Sauv.* 55.

Erigeron pedunculis unifloris, foliis lanceolatis. *Linn. Syst.* 1213.

Conyza mas Monspelienfium odorata. Bot. Monf. 75.

Virga aurea major foliis glutinosis & graveolentibus. *Tour.* 484.

HABITAT ad margines sepium, à *Laverune, Sellenueve, &c.* Folia serrata. Altitudo bipedalis.

2. ERIG. ramis lateralibus multifloris, calycibus squar- *Graveolens* rolis. *Linn. Syst.* 1213.

Erigeron foliis lanceolato-linearibus, ramis lateralibus multifloris foliosis. *Sauv.* 55.

Virga aurea minor foliis glutinosis & graveolentibus. *Tour.* 484.

Conyza minor vera. Bot. Monf. 75.

HABITAT ad mare & stagna. Folia integerrima. Altitudo sesquipedalis.

3. ERIG. caule floribusque paniculatis, foliis lanceola- *Canadense* to-linearibus ciliatis confertis.

Erigeron floribus paniculatis. *Linn. sp.* 863. *Sauv.* 55.

Virga aurea annua Zanoni. *Tour.* 484.

4. *Conyza minor unicaulis pallido flore. Barr. Icon.* 1164.

HABITAT à *Salafon, Sellenueve*, & circa urbem. Altitudinem bipedalem superat. Pedunculi multiflori ramificationibus divaricatis. Folia integerrima, vel una aut altera serratura.

4. ERIG. caule multifloro, foliis lanceolatis subserratis, *Phila delphœ-*

438 SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA.

caulinis semiamplexicaulibus. *Linn. sp.* 863.

HOSPITATUR sub dio. Folia radicalia subspathulata vel ovata.

Acre. 5. ERIG. pedunculis alternis unifloris. *Linn. sp.* 863. *Sauv.* 55.

Aster arvensis cæruleus acris. Tour. 481.

Conyza cærulea acris. Bot. Monf. 78.

HABITAT ultra pontem, à Castelnau, Salafon, Fontfroide.

Siculum. 6. ERIG. squamis calycinis inferioribus laxis florem superantibus. *Linn. sp.* 864.

Conyza foliis lineari-lanceolatis, ramiferis majoribus. Sauv. 54.

Conyza caulibus rubentibus tenuioribus, flore luteo nudo. Bot. Monf. 77. *Icon.* 76.

HABITAT in maritimis, ad stagna. Floret autumnus. Altitudo bipedalis vel major.

Tuberosum. 7. ERIG. foliis lanceolatis, ramis unifloris, caule suffruticoso. *Linn. sp.* 864.

Erigeron caule subunifloro, foliis lanceolato-linearibus rigidis, radice tuberosa. Sauv. 55.

Aster maritimus tuberosus luteus. Tour. 483.

Conyza tuberosa lutea, foliis angustis & rigidis. Bot. Monf. 77.

Conyza maxima. Barr. Icon. 157.

HABITAT cum priori, & à Cette; au mont St. Loup vers Valene. Folia radicalia sæpius ovata obtusa. Radix præmorsa. Cauliculi vix palmares.

T U S S I L A G O.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 783.

Char. secund. Rad. fibrosa repens stolonifera.

Caul. scaposa uniflora vel foliosa simplex.

Fol. petiolata vaginans simplex integra vel integerrima, radicalis, aut caulina. Flor. terminalis, nunc solitaria radicalis, nunc caulina thyrsoides. Fulc. bractæ foliaceæ, aliæ amplexicaules sparsæ, aliæ ad basim florum solitariae.

Alpina. 1. TUSSIL. scapo subnudo unifloro, foliis cordato-obiculatis crenatis. *Linn. sp.* 865.

Tussilago montana minima. Lob. Icon. 590.

HABITAT à Lespinouse près de Lamalou. Scapus palmaris una aut gemina bractea munitus.

2. TUSSIL. scapo imbricato unifloro, foliis subcordatis *Farfara*, angularis denticulatis. Linn. sp. 865. Sauv. 30.

Tussilago vulgaris. Bor. Monf. 272. Tour. 487.

Le Tussilage; vernaculè, *lou Tussilage*.

HABITAT à Lesperou, le long de l'Herou. Scapus bracteis numerosis.

SENECIO.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 786.

Char. secund. Rad. fusiformis vel ramosa. Caul. herbacea angulata vel teres, simplex vel ramosa (in quibusdam fistulosa.) Fol. alterna sessilis (in nonnullis decurrens) simplex integra vel pinnatifida vel lineari-multifida. Flor. terminalis pedunculata, subfolitaria, aggregata, subcorymbosa vel paniculata. Fulc. nulla.

* *Floribus flosculosis.*

1. SENECE. corollis nudis, foliis pinnato-sinuatis ample- *Vulgaris*, xicaulibus, floribus sparsis. Linn. sp. 867. Sauv. 294.

Senecio minor vulgaris. Bor. Monf. 238. Tour. 456.

Le Senecion.

HABITAT in arvis & pratis. Caulis fistulosus.

* *Floribus radiatis : radio revolutis.*

2. SENECE. corollis revolutis, foliis pinnatifidis viscidis, *Viscosus*, squamis calycinis laxis longitudine perianthii. Linn. sp. 868.

Jacobæa prima panonica. Bor. Monf. 139. Tour. 486.

Senecio foliis pinguibus pinnatis, pinnis alternis brevissimis, radiis exiguis. Sauv. 241.

HABITAT in paludibus. Ad mare & stagna, & *au mont St. Loup*.

3. SENECE. corollis revolutis, foliis pinnatifidis denti- *Sylvaticus*, cularis, caule erecto corymboso. Linn. sp. 868.

Senecio foliis florum radiis revolutis linearibus. Sauv. 301.

Jacobæa senecionis folio. Bor. Monf. 139. Tour. 486.

HABITAT à *Manguio* & au mont *St. Loup*.

* *Floribus radiatis ; radio patente , foliis pinnatifidis :*

- Elegans*. 4. SENECA. corollis radiantibus , foliis pinnatifidis æqualibus patentissimis ; rachi infernè angustata. *Linn. sp.* 869.

Senecio Americanus purpureo cæruleo flore. *Tour.* 456.
HOSPITATUR sub dio & in caldario. Caulis glaucus sempervirens. Pedunculi subuniflori. Corollæ radius purpureus.

- Incanus*. 5. SENECA. corollis radiantibus , foliis utrinque tomentosis semipinnatis , laciniis subdentatis , corymbo subrotundo. *Linn. sp.* 869.

Senecio tomentosus foliis spathulatis pinnatifidis , pinnis subrotundis. *Sauv.* 302.

Jacobæa Alpina absinthii folio humilior. *Tour.* 486.

HABITAT à *Lespinouse* & à *Prucerd*, Facies *Orbonna maritima*. Laciniæ foliorum obtusæ integerrimæ. Pedunculi axillares plures corymbiferi , foliis longiores.

- Abrotanifolius*. 6. SENECA. corollis radiantibus , foliis pinnato-multifidis linearibus. *Linn. sp.* 869.

Senecio foliis ramosis , nervo & pinnulis planis & angustissimis , floribus umbellatis. *Sauv.* 265.

Jacobæa foliis ferulaceis flore minore. *Tour.* 486.

HABITAT à *Lesperou* , au mont *St. Loup* , & cum priori.

- Jacobæa*. 7. SENECA. corollis radiantibus , foliis pinnato-lyratis , laciniis lacinulatis , caule erecto. *Linn. sp.* 870. *Sauv.* 240. 301.

Jacobæa vulgaris laciniata. *Bot. Mons.* 138. *Tour.* 485.

Jacobæa major artemisiæ folio non repens. *Barr. Icon.* 267.

Senecio foliis lyratis , pinnulis dentatis , floribus umbellatis. *Sauv.* 302.

La Jacobée. L'Armoise des Herboristes.

HABITAT in fossis udis , à *Lavanet* , & circa urbem.

* *Floribus radiatis : radio patente , foliis indivisis :*

- Peria*. 8. SENECA. corollis radiantibus , floribus corymbosis , foliis lanceolatis serratis , superioribus sensim minoribus. *Linn. Syst.* 1215.

Senecio foliis lanceolatis serratis , floralibus ad pedunculum minimis. *Sauv.* 85. *Linn. Gmel. fib.* 2. p. 165.

SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA. 445

Virga aurea major vel doria. *B. Pin.* 268. *Bot. Monsf.* 279.

Jacobæa pratensis altissima limonii folio. *Tour.* 485.

HABITAT juxta amnem, & à Caunelles. Altitudinem humanam superat. Folia glaberrima sæpius decurrentia.

9. SENECA. corollis radiantibus octonis, foliis lanceolatis biferratis subtus villosis, caule ramofo. *Nemorensis.* *Linn. sp.* 870.

Senecio foliis ovato-lanceolatis subtus hirsutis, floribus umbellatis. *Sauv.* 85.

HABITAT à Valene, au Puy de St. Loup, à Lesperou.

10. SENECA. corollis radiantibus, floribus corymbosis, foliis lanceolatis ferratis glabriusculis. *Sarracenicus.* *Linn. sp.* 871.

Senecio foliis longè ellipticis acutè ferratis, floribus umbellatis. *Sauv.* 85.

Jacobæa Alpina foliis longioribus ferratis. *Tour.* 485.

HABITAT à Lesperou, & cum priori. Pedunculi plures axillares corymbiferi longitudine foliorum. Serraturæ foliorum minimæ.

11. SENECA. corollis radiantibus, caule indiviso unifloro, foliis integris, radicalibus ovatis subtus villosis. *Doronicum.* *Linn. Syst.* 1215.

12. Solidago foliis lanceolatis subdentatis, caulinis amplexicaulibus, caule subunifloro. *Doronicum.* *Linn. sp.* 880. *Sauv.* 84.

13. Doronicum foliis lanceolatis subtus tomentosis, caule unifloro. *Incanum.* *Linn. sp.* 886. *Sauv.* 184.

Doronicum integro & crasso hieracii folio. *Bot. Monsf.* 295.

Jacobæa integro & crasso hieracii folio. *Tour.* 486.

HABITAT à Lesperou, à Lespinouse. Palmaris vel sesquipalmaris.

A S T E R.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 787.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea simplex vel ramosa. *Fol.* alterna sessilis simplex integerrima, integra aut incisa. *Flor.* terminalis pedunculata: pedunculis unifloris, multifloris, corymbiferis, vel paniculatis. *Fulc.* nulla.

442 SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA.

* *Integrifolii, pedunculis nudis.*

Alpinus. 1. ASTER foliis lanceolatis hirtis, radicalibus obtusis, caule simplicissimo unifloro. *Linn. sp.* 872.
Aster montanus cæruleus magno flore foliis oblongis. *Tour.* 481.

2. Aster Atticus Alpinus. *Ibid.*

3. Aster hirsutus Austriacus cæruleus. *Ibid.*

HABITAT à *Lesperou*, à *Valene*, *Villemagne*. Vix palmaris. Folia radicalia sæpius spathulata. Caulina bina raro tria. Occurrit etiam à *Fougeres* ubi biuncialem vidimus.

Tripolium. 2. ASTER foliis lanceolatis integerrimis carnosissimis glabris, ramis inæquatis, floribus corymbosis. *Linn. sp.* 872. *Sauv.* 54.

Aster maritimus palustris cæruleus salicis folio. *Tour.* 481. & minor. *Ibid.*

Tripolium majus & minus. Bot. Mons. 271.

HABITAT ad mare & stagna. Floret augusto. Pedunculi uniflori nudi.

Amellus. 3. ASTER foliis lanceolatis obtusis scabris trinerviis integris, pedunculis nudiusculis corymbosis, squamis calycinis obtusis. *Linn. sp.* 873.

Aster foliis lanceolatis scabris semiamplexicaulibus parum serratis, calycibus laxis, squamis lanceolatis. *Sauv.* 108.

Aster atticus cæruleus vulgaris. *Tour.* 481.

HABITAT au *Capouladou*, à *St. Guillin le Désert*.

* *Integrifolii, pedunculis squamosis.*

Sedifolius. 4. ASTER foliis lanceolato-linearibus subcarnosis integerrimis planis, floribus corymbosis fastigiatis, pedunculis foliolosis. *Linn. sp.* 874.

Aster tripolii flore. *Tour.* 481.

Aster Atticus Monspeliensis purpureus, angustioribus foliis. *Bot. Mons.* 32.

Aster caule erecto umbellifero, ramis simplicibus, foliis ligulatis. *Sauv.* 54.

HABITAT à *Mauguio*, *Gramont*, à *la mer*. Folia rigida.

Nova Anglia. 5. ASTER foliis lanceolatis alternis integerrimis semiamplexicaulibus, floribus terminalibus. *Linn. sp.* 875.

Aster novæ Angliæ altissimus hirsutus, floribus om-

SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA. 443

nium maximis purpuro-violaceis. *Tour.* 482.

L'Astre de la nouvelle Angletterre.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo humana. Caulis hirsutus rubens. Folia undulata uninervia. Squamæ calycinæ laxæ patentēs.

* *Serratifolii*, *pedunculis squamosis*.

6. ASTER foliis lanceolatis sessilibus lavibus subserratis, *Lavis*.
pedunculis foliolosis sublividis. *Linn. sp.* 876.

HOSPITATUR sub dio. Florens autumnō. Pedunculi uniflori longissimi. Folia conferta; summa semiamplexicaulia integerrima, retrorsum scabra.

7. ASTER foliis lanceolato-linearibus medio serratis, *Tradescanti*.
pedunculis foliosis, caule ramoso, calycibus erectis.
Linn. sp. 876.

Aster serotinus procerior ramosus bellidis sylvestris flore. *Tour.* 482.

HOSPITATUR sub dio. Humanam excedit altitudinem; ramosissimus. Folia summa integerrima semiamplexicaulia. Pedunculi divaricati.

8. ASTER foliis ovatis angulatis dentatis petiolatis, calycibus terminalibus patentibus foliosis. *Chinensis*.
Linn. sp. 877.
Sauv. 302.

La Reine Marguerite.

HOSPITATUR sub dio. Caulis sesquipedalis ramosus villosus. Folia in petiolum decurrunt. Squamæ calycinæ ciliatæ oblongæ. Folia summa ciliata integerrima lanceolata.

SOLIDAGO.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 785.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* teres ramosa herbacea vel suffruticosa. *Fol.* alterna sessilis simplex integerrima aut integra. *Flor.* terminalis racemosa vel fastigiato-corymbosa. *Fulc.* nulla.

1. SOLID. paniculato-corymbosa, racemis recurvatis, *Canadensis*.
floribus adscendentibus, foliis trinerviis subserratis scabris. *Linn. sp.* 878. *Sauv.* 84.

Virga aurea angustifolia cespitosa exotica. *Barr. Icon.* 784.

444 SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA.

La Verge d'or de Canada.

HOSPITATUR sub dio. Perennis. Folia lanceolata semi-amplexicaulia supernè serrata, ferraturis utrinque 3. vel quatuor. Flores parvi.

Virga aurea. 2. SOLID. caule subflexuoso angulato, racemis panicularis erectis confertis. *Linn. sp.* 880.

Virga aurea latifolia vulgaris. Bot. Mons. 279. *Tour.* 484.

Solidago caule erecto, racemis alternis erectis. Sauv. 84. *La Verge d'or.*

HABITAT à *Lesperou*. Folia summa integerrima.

Egida. 3. SOLID. foliis caulinis ovatis scabris, ramis alternis fastigiatis, corymbis terminalibus. *Linn. sp.* 880.

HOSPITATUR sub dio. Folia integerrima. Altitudo prioris.

Montana. 4. SOLID. foliis lanceolatis serratis decurrentibus, caule angulato. *Linn. sp.* 831. *Sauv.* 84.

HABITAT à *Lesperou* & à *Lamaleu*. Folia ad basim sæpè integerrima.

Alpina. 5. SOLID. foliis cordatis petiolatis dentatis. *Linn. sp.* 880.

Jacobæa alpina foliis subrotundis serratis. Tour. 488.

Jacobæa tertia, latifolia prima Clusii. Bot. Mons. 139.

HABITAT cum priori. Nondum vidimus ubi notat *Magnolius*.

I N U L A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 1066.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. herbacea, teres vel angulata, ramosa vel simplex. Fol. alterna sessilis sæpè amplexicaulis simplex integra vel integerrima (in una specie succulenta.) Flor. terminalis & axillaris pedunculata, pedunculis unifloris multiflorisve. Fulc. nulla.

Helenium. 1. INULA foliis ovatis rugosis, subtus tomentosis, calycum squamis ovatis. *Linn. sp.* 881. *Sauv.* 85.

Aster omnium maximus. *Tour.* 483.

L'Enule campane.

HOSPITATUR sub dio. Folia radicalia lanceolata pedalia denticulata, caulina semi-amplexicaulia. Pedunculi axillares uniflori.

Oculus Christi. 2. INULA foliis oblongis integris hirsutis, caule piloso corymboso, floribus confertis. *Linn. sp.* 881.

SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA. 445

Aster caule supernè ramoso ampliato ; foliis lanceolatis integris amplexicaulibus , calycibus laxis terminalibus. *Sauv.* 87.

Aster Pannonicus lanuginosus luteus. *Tour.* 482.

HOSPITATUR sub dio.

3. INULA foliis oblongis , caule hirsuto paniculato , *Dysenterica.*
squamis calycinis setaceis. *Linn.* sp. 882. *Sauv.* 85.

Conyza media asteris flore luteo. *Bot. Monf.* 77.

Aster pratensis autumnalis conyzæ folio. *Tour.* 483.

HABITAT secus rivulos & in fossis udis circa urbem.

Folia integerrima amplexicaulia. Pedunculi uniflori.

4. INULA foliis undulatis amplexicaulibus , caule prof- *Pulicaria.*
trato. *Linn.* sp. 882.

Aster foliis lanceolatis , calycibus tomentosis , floribus luteis vix radiatis focaneis. *Sauv.* 108.

Aster palustris parvo flore globoso. *Tour.* 483.

Conyza minima. *Bot. Monf.* 77.

Vernaculè , l'Erba de St. Roch.

HABITAT in fossis inundatis , à Lattes , Cannelles , Salason , Montferrier.

5. INULA foliis lanceolatis recurvis serrato-ciliatis , floribus solitariis , ramis angularis. *Salicina.*
Linn. sp. 882. *Sauv.* 86.

Aster montanus luteus salicis glabro folio. *Bot. Monf.*

32. *Tour.* 483.

HABITAT in saxosis à Montferrier , Cannelles , Castelnau. Caulis pedalis rigidus. Folia conferta. Squamæ calycinæ laxæ.

6. INULA foliis linearibus carnosissimis tricuspidatis. *Linna.* *Chritmoides.*
sp. 883.

Aster flore terminatrice , foliis tricuspidatis. *Sauv.* 8.

Aster maritimus folio tereti crasso tridentato. *Tour.* 483.

Chritmum maritimum flore asteris attici. *Bot. Monf.* 80.

Vernaculè , las Limbardas.

HABITAT ad mare & stagna , & à Laverune. Altitudo humana.

7. INULA foliis lanceolatis pubescentibus integerrimis , *Montana.*
caule unifloro. *Linn.* sp. 884.

Aster montanus luteo magno flore. *Tour.* 482.

Aster atticus luteus montanus villosus , magno flore.
Bot. Monf. 32. *Tour.* 482.

Aster foliis lanceolatis sessilibus villosis , caule sæpius
unifloro. *Sauv.* 86.

446 SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA.

HABITAT au mont St. Loup, à Valene, à Lesperon.
Altitudo ferè pedalis. Squamæ calycinæ ovatæ. Folia
caulina tria vel quatuor, rarò quinque.

A R N I C A.

Char. prim. Vid. Linn. syst. pl. 861.

Char. secund. Rad. subtuberosa stolonifera. Caul.
teres herbacea subsimplex. Fol. sessilis simplex
integra, opposita vel alterna. Flor. terminalis
pedunculata solitaria. Fulc. nulla.

Montana. 1. ARNICA foliis ovatis integris, caulinis geminis oppo-
sitis. Linn. sp. 884.

Doronicum plantaginis folio alterum. Tour. 487.

Doronicum foliis caulinis oppositis. Sauv. 157.

HABITAT à Lesperon. Altitudo pedalis. Foliorum op-
positiones sæpius binæ. . . in frigidario.

Scorpioides. 2. ARNICA foliis alternis serratis. Linn. sp. 884.

Doronicum radice scorpi brachiata. Tour. 487.

HABITAT cum priori. Variat foliis subcordatis subin-
tegetrimis.

D O R O N I C U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 784.

Char. secund. Rad. subtuberosa stolonifera. Caul.
scaposa vel herbacea subsimplex. Fol. alterna
simplex integra, radicalis petiolata, caulina
sessili amplexicaulis. Flor. terminalis peduncu-
lata solitaria. Fulc. nulla.

Paritalian- 1. DORON. foliis cordatis obtusis, radicalibus petiola-
ches. tis, caulinis amplexicaulibus. Linn. sp. 885. Sauv.
119. n°. 270.

Doronicum foliis cordatis denticulatis, caule ramoso.
Sauv. 119. n°. 271.

Doronicum maximum folio caulem amplexante. Tour.
488.

Le Doronic.

HABITAT à Lesperon. Rami subbiflori. . . in frigidario.

Plantagi- 2. DORON. foliis ovatis acutis subdentatis, ramis alter-
neum. nis. Linn. sp. 885.

Doronicum plantaginis folio. Tour. 487.

Doronicum foliis ovatis acutis obsolete dentatis. Sauv.
107.

SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA. 447

HABITAT cum priori. Folia glaberrima amplexicaulia.

3. DORON. scapo simplicissimo unifloro.

Bellidias-
trum.

Doronicum caule nudo simplicissimo unifloro. *Linn. sp.* 886. *Sauv.* 13.

Bellis sylvestris media caule carens. *Bot. Monf.* 37. *Tour.* 490.

HABITAT à Valene, au mont St. Loup, à Montferrier.

BELLIS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 795.

Char. secund. *Rad.* fibrosa. *Caul.* scaposa vel foliosa subsimplex. *Fol.* simplex integra vel integerrima, nunc radicalis sessilis, nunc caulina sub-amplexicaulis. *Flor.* terminalis subsolitaria, nunc radicalis nunc caulina. *Fulcr.* nulla.

1. BELLIS scapo nudo simplicissimo unifloro, foliis spatulatis. *Perennis.*

Bellis scapo nudo unifloro. *Linn. sp.* 886. *Sauv.* 15.

Bellis sylvestris minor. *Bot. Monf.* 37. *Tour.* 491.

La Paquerette, ou la Marguerite; vernaculè, *la Margarideta.*

HABITAT in herbidis.

2. BELLIS caule subsimplici subquadrifloro, foliis obovatis denticulatis. *Annua.*

Bellis caule subfolioso. *Linn. sp.* 887.

HABITAT ad mare. *En Avril au-delà de Perauls, & à Villeneuve.* Folia parva serraturis utrinque duabus tribusve.

TAGETES.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 801.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea teres, ramosa vel simplex. *Fol.* alterna sessilis imparipinnata. *Flor.* terminalis pedunculata solitaria. *Fulcr.* nulla.

1. TAGET. caule subdiviso diffuso. *Linn. sp.* 887. *Perennis.*

Tagetes Indicus minor multiplicato flore. *Tour.* 488.

L'Œillet d'Inde.

HOSPITATUR sub dio. Foliola filo terminata, serrata lineari-lanceolata. Pedunculi apice incrassati fistulosi. Calyces turbinati.

Ereth. 2. TAGET. caule erecto simplici, pedunculis nudis unifloris. *Linn. sp.* 887.

Tagetes maximus rectus flore maximo multiplicato. *Tour.* 488.

Autre villet d'Inde.

HOSPITATUR cum priori. Folia filo etiam terminata.

CHRYSANTHEMUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 788.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea striata ramosa, vel suffruticosa. *Fol.* alterna sessilis, nunc simplex integra aut incisa, nunc pinnata. *Flor.* terminalis pedunculata solitaria vel corymbosa. *Fulc.* nulla.

* *Leucanthema, radio florum albo.*

Leucantha- 1. CHRYS. foliis amplexicaulibus oblongis, supernè
minus. ferratis, infernè dentatis. *Linn. sp.* 888. *Sauv.* 87.

Leucanthemum vulgare. *Tour.* 492.

Bellis sylvestris caule folioso major. *Bot. Monf.* 36.

0. Bellis montana folio obtuso crenato. *Bot. Monf. ibid.*

HABITAT à Lattes, Castelnau, Selleneuve. Folia radicalia sæpiùs spathulata, apice serrata, caulina verò utrinque serrato-dentata.

Montanum. 2. CHRYS. foliis imis spathulato-lanceolatis ferratis, summis linearibus ligulatis. *Sauv.* 87. *Linn. sp.* 888.

Leucanthemum montanum minus. *Tour.* 492.

Bellis montana minor. *Bot. Monf.* 36.

HABITAT à Lesperou, au mont St. Loup. Pedunculi longi uniflori nudi.

Graminifo- 3. CHRYS. foliis linearibus subintegerrimis. *Linn. sp.* 888.
linn. Chrysanthemum foliis ligulatis sæpiùs integerrimis.

Sauv. 87.

Bellis montana gramineo folio. *Bot. Monf.* 291. *Hort.* 31. *tab.* 31.

Leucanthemum folio gramineo. *Tour.* 493.

HABITAT à Prades, à la source du Lès. Caulis subsimplicissimus.

Monspeliense. 4. CHRYS. foliis imis palmatis, foliolis linearibus pinnatifidis. *Sauv.* 304. *Linn. sp.* 889.

Bellis montana major, foliis chrysanthemi cretici angustioribus. *Bot. Monf.* 306.

Leucanthemum

SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA. 449

Leucanthemum montanum foliis chrysanthem. *Tour.* 492.

HABITAT à *Lesperou*, à *Valene*, du côté de *Viols*.

5. CHRYS. foliis pinnatis inciso-ferratis, caule multi- *Corymbosum*,
floro. *Linn. sp.* 890. *Sauv.* 267.

Matricaria tanacetifolia, flore minore, semine umbilicato. *Tour.* 494.

Tanacetum montanum inodorum, minori flore. *Bot. Monf.* 248. *Barr. Icon.* 781. & 786.

HABITAT à *Lesperou*, à *St. George* & à *Corpouiran*.
Foliola profundè dentata.

* *Chrysanthema*, radio florum aureo.

6. CHRYS. foliis amplexicaulibus, supernè laciniatis, *Segetum*,
infernè dentato-ferratis. *Linn. sp.* 889.

Chrysanthemum segetum folio minus secto glauco.
Tour. 493.

Chrysanthemum, foliis amplexicaulibus oblongis
dentatis, pedunculis subnudis. *Sauv.* 88.

HOSPITATUR sub dio. Variat foliis apice trifidis.

7. CHRYS. foliis pinnatifidis incis, extrorsum latiori- *Coronarum*,
bus. *Linn. sp.* 890.

Chrysanthemum foliis matricariz. *Tour.* 491.

HOSPITATUR sub dio. Folia interdum obversè ovata
ferrato-dentata.

8. CHRYS. flosculis omnibus uniformibus hermaphro- *Flosculosum*,
ditis. *Linn. sp.* 890.

Bellis spinosa foliis agerati. *B. pin.* 162.

HOSPITATUR sub dio. Suffrutescens procumbens
sempervirens. Folia obovata in petiolum attenuata
sinuato-dentata rigidula. Flores parvi terminales soli-
tarii.

MATRICARIA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 789.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. herbacea teres
ramosa. Fol. alterna, sessilis vel petiolata, sim-
plex multifida vel impari-pinnata. Flor. termi-
nalis pedunculata, solitaria vel corymbosa.
Fule. nulla.

1. MATRIC. foliis compositis planis, foliolis ovatis in- *Parthenium*,
cis, pedunculis ramosis. *Linn. sp.* 890. *Sauv.* 266.

450 SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA.

Matricaria vulgaris seu *sativa*. *Tour.* 493.

La Matricaire.

HOSPITATUR sub dio. Pedunculi corymbosi. Folia subbipinnata petiolata. Squamæ calycinæ carinatæ.

Chamomilla. 2. MATRIC. receptaculis conicis, radiis patentibus, seminibus nudis, squamis calycinis margine æqualibus. *Linn. Syst.* 1222.

Chamæmelum vulgare seu *leucanthemum* Dioscoridis.

Bot. Monf. 60. *Tour.* 494.

La Camomille.

HABITAT ad mare.

Argentæa. 3. MATRIC. foliis bipinnatis, pedunculis solitariis. *Linn. sp.* 891.

Chamæmelum orientale incanum, millefolii folio, *Tour. cor.* 37.

Matricaria foliis duplicato-pinnatis. *Sauv.* 267.

La Camomille Orientale.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo sesquipedalis. Pedunculi longi terminales, foliola linearia serrata vel dentata.

Inodora. 4. MATRIC. receptaculis hemisphæricis, radiis patentibus, seminibus coronato-marginatis, squamis calycinis margine obsoletis. *Linn. Syst.* 1222. *Sauv.* 266.

Chamæmelum inodorum. *Bot. Monf.* 60. *Tour.* 494.

HABITAT ad satorum margines.

A N T H E M I S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 793.

Char. secund. Rad. ramosa. Caul. herbacea ramosa. Fol. alterna sessilis simplex multifida vel pinnata. Flor. terminalis pedunculata solitaria. Fulc. nulla.

* Radio dicotore seu albo.

Alcissima. 1. ANTH. erecta foliorum apicibus subspinosis. *Linn. sp.* 893.

Anthemis foliorum serraturis setaceis, radiis florum albis. *Sauv.* 255.

Chamæmelo affine *buphtalmum* *Italicum* segetum altissimum. *Bot. Monf.* 60.

2. *Chamæmelum leucanthemum* *Hispanicum minus*. *Tour.* 494.

HABITAT in arvis.

2. ANTH. foliis pinnatifidis denticulatis carnosis, caule *Maritima*.
ramoso. *Linn. sp.* 893.

Chamæmelum maritimum corula quibusdam. *Bot.*
Monf. 61. *Tour.* 494.

Anthemis foliis pinnatis denticulatis carnosis puncta-
tis, caule ramoso prostrato, calycibus tomentosis.
Linn. Syst. 1223.

Anthemis foliis pinnatifidis planis succulentis, pin-
nulis ovalibus, pedunculo nudo. *Sauv.* 303.

HABITAT ad mare. Floret Augusto.

3. ANTH. foliis pinnato-compositis linearibus acutis *Nobilis*.
subvillosis. *Linn. sp.* 894.

Matricaria receptaculis conicis, radiis deflexis, semi-
nibus nudis, squamis calycinis margine æqualibus.
Sauv. 266.

Chamæmelum nobile seu *leucanthemum odoratus*.
Tour. 494.

La Camomille de boutique.

HOSPITATUR sub dio.

4. ANTH. receptaculis conicis : paleis setaceis, semini- *Corula*.
bus nudis *Linn. sp.* 894.

Anthemis foliis pinnato-decompositis : laciniis linea-
ribus, caulibus diffusis, radice annua. *Sauv.* 266.

Chamæmelum fœridum. *Bot. Monf.* 61. *Tour.* 494.

HABITAT in maritimis. *Vers Frontignan, Balaruc,*
Ce s', Agde.

5. ANTH. receptaculis paleaceis conicis, paleis setaceis, *Arvensis*.
feminibus coronato-marginatis. *Linn. sp.* 894. *Sauv.*
266.

Chamæmelum inodorum. *Bot. Monf.* 60. *Tour.* 494.

HABITAT in arvis. Utrum ad hanc vel ad *matricariam*
inodoram pertineant synonymiæ *Magnolii* & *Tour-*
nefortii, decident oculatiores.

6. ANTH. caulibus simplicibus unifloris decumbenti- *Pyrethrum*.
bus, foliis pinnato-multifidis. *Linn. sp.* 895.

Euphrasium caulibus simplicibus, &c. *Sauv.* 265.

HABITAT à *Lesperou*.

* *Radio concolore seu luteo.*

7. ANTH. caule ramoso, foliis pubescentibus pinnato- *Valentina*.
multifidis sericeis, calycibus villosis pedunculatis.
Linn. sp. 895. Ff ij

452 SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA.

Bupthalmum, &c. *Sauv.* 265.

Cotula flore luteo radiato. *Tour.* 495.

Bupthalmum cotulæ folio. *Bot. Monf.* 41.

HABITAT ad mare vers *Aiguemorte*.

Tinctoria. 8. ANTH. foliis bipinnatis serratis subtus tomentosis, caule corymboso. *Linn. sp.* 896.

Bupthalmum Dioscoridis. *Bot. Monf.* 40.

Bupthalmum tanacetii minoris folio. *Tour.* 495.

Bupthalmum floribus nudis, foliis subtus incanis pinnatis, pinnis argutè serratis. *Sauv.* 265.

Chrysanthemum tanacetii folio. *Barr. Icon.* 465. & 466. *L'œil de bœuf.*

HABITAT cum priori & au-delà de Cette vers Meze.

A C H I L L E A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 794.

Char. secund. Rad. fusiformis vel ramosa. Caul. herbacea teres ramosa. Fol. alterna sessilis nunc simplex integra aut incisa, nunc multifido-pinnata. Flor. terminalis pedunculata arctè corymbosa. Falc. nulla.

* *Corollis flavis.*

Santolina. 1. ACHILL. foliis sericeis dentatis: denticulis subintegris subulatis reflexis. *Linn. sp.* 896.

Parmica orientalis santolinæ folio, flore majore. Tour. Cor. 37.

HOSPITATUR sub dio. Cauliculi semipedales.

Ageratum. 2. ACHILL. foliis lanceolatis obtusis, acutè serratis. *Linn. sp.* 897. *Sauv.* 88.

Ageratum foliis serratis. Bot. Monf. 5.

Parmica lutea suavè olens. Tour. 497.

HABITAT ad mare, à Lamousson.

Pubescens. 3. ACHILL. foliis pinnatis, foliolis lanceolatis incisis serratis subtus lanigeris. *Linn. sp.* 897. *Sauv.* 268.

Parmica orientalis, foliis tanacetii incanis, semiflosculis florum pallidè luteis. Tour. Cor. 37.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo sesquipedalis. Cauliculi simplicissimi.

* *Corollis radio albis.*

Clarena. 4. ACHILL. foliis pinnatifidis planis obtusis tomentosis. *Linn. sp.* 898.

SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA. 453

Ptarmica incana humilis foliis laciniatis, absinthii æmulis. *Tour.* 496. *Seg. ver. tom. II. p.* 230.

HOSPITATUR sub dio. Cauliculi vix triunciales. Calycinæ squamæ longæ ad margines nigre veluti spha-celatæ.

5. ACHILL. foliis lanceolatis acuminatis argutè ferratis. *Ptarmica*, *Linn. sp.* 898.

Ptarmica vulgaris folio longo ferrato, flore albo. *Tour.* 496.

Achillea foliis integris minutissimè ferratis. *Sauv.* 54. *L'Herbe à éternuer.*

HABITAT à Lesperou.

6. ACHILL. foliis bipinnatis nudis: laciniis linearibus *Millefolium* dentatis. *Linn. sp.* 899.

Millefolium vulgare album. *Bot. Monf.* 177. *Tour.* 496. Album.

Achillea foliis duplicato-pinnatis glabris, lacinis linearibus laciniatis acutis. *Sauv.* 267. & 268.

- β. *Achillea* pinnis foliorum semipinnatis & variè incis. *Purpureum.* *Sauv.* 267.

Millefolium purpureum majus. *Tour.* 496.

Le Millefeuille ou l'herbe au charpentier.

HABITAT au Pont Juvenal, Lattes, Laverune. In β. pinnulæ hinc tantum denticulatæ.

7. ACHILL. foliis bipinnatis, pinnis distantibus utrin- *Nobilis.* que subseptenis obtusiusculis. *Linn. sp.* 899. foliolis ovatis confertis. *Syst.* 1225.

Achillea pinnis confertis æqualibus tomentosis: pin-nulis capillariter divis. *Sauv.* 267.

Millefolium odoratum minus *Monspeliensium.* *Bot. Monf.* 177. *Tour.* 496.

HABITAT à Camelles, Sellenouve, Lamonsson, Ville-neuve. Cauliculi vix semipedales vel breviores. Pin-nulæ foliorum septem vel duodecim.

SIGESBECKIA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 798.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea ramosa teres. *Fol.* opposita petiolata simplex integra. *Flor.* terminalis pedunculata subdichotoma. *Fulc.* bractæae involucriformes plurimæ ad basim floris singuli. Glandulæ pedicellatæ suprâ calyces & bractæas.

F f iiij

454 SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA.

Orientalis. 1. SIGESB. petiolis sessilibus, calycibus bracteatis. *Linn. sp. 900.*

La Sigesbeck.

HOSPITATUR sub dio. Bipedalis ramosissima, folia in petiolum decurrunt subcordata, inaequaliter dentata. Bractearum spathulatarum glandulis hispidarum. Flosculi lutei quinquehidi. Semiflosculi vero longiores trifidi.

VERBESINA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 799.*

Char. secund. *Rad.* subfusiformis. *Caul.* herbacea ramosa teres. *Fol.* simplex integra vel integerrima, sessilis vel decurrens, opposita vel alterna. *Flor.* terminalis pedunculata solitaria, vel axillaris aggregata. *Falc.* nulla.

Alata. 1. VERBES. foliis alternis decurrentibus undulatis obtusis, floribus terminalibus. *Linn. sp. 901.*

Bidens indica hieracii folio alato caule. Tour. 462.

Cannabina indica foliis integris, alato caule. Mag. hort. 40. tab. 40.

HOSPITATUR sub dio. Sempervirens. Caulis pedalis obscure rubens: folia ovata. Pedunculi longissimi pubescentes. Calycinæ squamæ æquales lineares. Corollæ croceæ. Semina denticulis duobus armata, altero longiore hamato.

Alba. 2. VERBES. foliis oppositis lanceolatis sessilibus serratis, floribus axillaribus subquaternis.

Verbesina foliis oppositis lanceolatis serratis. Linn. sp. 902. floribus sessilibus & pedunculatis. Linn. Syst. 1226.

HOSPITATUR sub dio. Calycinæ squamæ ovatae. Pedunculi lanati.

BUPHTHALMUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 790.*

Char. secund. *Rad.* simplex vel ramosa. *Caul.* herbacea teres ramosa. *Fol.* alterna simplex integerrima sessilis. *Flor.* terminalis solitaria, pedunculata vel sessilis. *Falc.* nulla. (In una specie spinulæ ad apicem foliolorum calycis.)

SYNGENESIA POLYGAMIA FRUSTRANEA. 455

* Asterici. Tour.

1. BUPHTH. calycibus acutè foliosis spinosis, ramis *Spinosum.*
alternis, foliis lanceolatis amplexicaulibus integerri-
mis. *Linn. sp. 903. Sauv. 87.*
Aster luteus foliis ad florem rigidis. *Bot. Mons. 31.*
Asteriscus foliis ad florem rigidis. *Tour. 497.*
HABITAT in arvis à Gramont, Lavanet, Castelnau.
Caulis rigidus lanatus subpedalis. Folia villosa. Fo-
liola calycina inferiora latiora, radium superantia,
trinervia, rigida.
2. BUPHTH. calycibus obtusè foliosis sessilibus axilla- *Aquaticum.*
ribus, foliis oblongis obtusis. *Linn. sp. 903. Sauv. 87.*
Aster annuus aquaticus patulus. *Tour. 498.*
Aster annuus attico luteo similis, foliis ad florem
mollibus. *Bot. Mons. 32.*
HABITAT ad aquas. A Lamouffon, Caunelles, Mont-
ferrier, Villeneuve.

* Asteroidea. Tour.

3. BUPHTH. foliis lanceolatis subserratis villosis, caly- *Salicifolium.*
cibus nudis. *Linn. sp. 904. Sauv. 87.*
HABITAT à Lattes, & à la mer.
4. BUPHTH. foliis lanceolatis subdenticulatis glabris, *Grandiflo-*
calycibus nudis. *Linn. sp. 904. Sauv. 87.* *rum.*
Asteroidea alpina salicis folio. *Tour. Cor. 4.*
HOSPITATUR sub dio. Pedunculi longi uniflori ter-
minales. Caulis diffusus. Folia semiamplexicaulia.

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

HELIANTHUS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 802. Soltil.*

Char. secund. Rad. ramosa vel tuberosa. Caul.
teres herbacea ramosa. Fol. simplex integra,
sessilis aut petiolata, caulina inferior opposita;
summa alterna. Flor. terminalis pedunculata
solitaria. Fult. multa.

1. HELIANT. foliis omnibus cordatis: nervis pone *Annuus.*
basim unitis: extrorsum denudatis. *Linn. sp. 904.*
Corona solis maxima. *Tour. 488.*

456 SYNGENESIA POLYGAMIA FRUSTRANEA.

Vernaculè *lou Biz asourell.*

HOSPITATUR sub dio. Semina usta odorem coffeæ spirant; potus gratissimus.

- Multiformis.* 2. HELIANT. foliis inferioribus cordatis, nervis ponè basim unitis denudatis: superioribus ovatis, *Linn. sp. 905.*

Corona folis ramosa. *Tour. 488.*

HOSPITATUR sub dio. Altitudo humana, ut prior.

- Tuberosa.* 3. HELIANT. foliis ovato-cordatis, nervis intra folium unitis. *Linn. sp. 905.*

Corona folis parvo flore, tuberosa radice. *Tour. 489.*

Le Topinambour; vernaculè *lou rouspinambour.*

HOSPITATUR sub dio.

- Astro-rubens.* 4. HELIANT. foliis ovatis crenatis tinerviis scabris, squamis calycinis erectis longitudine disci. *Linn. sp. 906.*

HOSPITATUR sub dio. Squama calycina una aut altera, cæteris longior.

R U D B E C K I A.

Char. prim. Vid. *Lin. gen. pl. 803.*

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea sub-simplex. *Fol.* alterna sessilis simplex integra. *Flor.* terminalis solitaria pedunculata. *Fulc.* pili rigidi in tota planta.

- Hirta.* 1. RUDB. foliis indivisis spathulato-ovatis: radii petalis emarginatis. *Linn. sp. 907.*

La Rudbeck.

HOSPITATUR sub dio. Biennis, sempervirens. Cauliculi ferè pedales rigidi. Variat foliis decurrentibus.

C O R E O P S I S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 804.*

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea sub-simplex, teres vel tetragona, plena vel fistulosa. *Fol.* petiolata, opposita vel alterna, simplex integra vel ternata aut quinata foliolis simplicissimis. *Flor.* terminalis pedunculata sub-racemosa vel subcorymbosa. *Fulc.* nulla.

- Zenkarische.* 1. COREOPSIS foliis pinnatis serratis, radio florum diversicolore. *Linn. Syst. 1128.*

SYNGENESIA POLYGAMIA FRUSTRANEA. 457

Bidens Americana trifolia leucanthemi flore. Tour. 462.

HOSPITATUR sub dio. Folia ternata vel quinata : foliis ovatis.

2. COREOPSIS foliis subternatis quinafivè, foliolis *Tripteris*. lineari-lanceolatis integerrimis, caule fistuloso.

Coreopsis foliis subternatis integerrimis. Linn. sp. 908.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo humana. Pedunculi supernè incrassati. Folia summa opposita simplicissima.

3. COREOPSIS foliis lanceolatis ferratis alternis petiolis decurrentibus. *Alternifolia. Linn. sp. 909.*

Corona solis altissima alato caule. *Tour. 462.*

HOSPITATUR sub dio. Altitudinem humanam superat. Flores subracemosi.

CENTAUREA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 805.

Char. secund. *Rad.* simplex vel ramosa. *Caul.* simplex vel ramosa, herbacea vel suffruticosa.

Fol. alterna sessilis vel decurrens, nunc simplex integerrima, integra aut inciso pinnatifida, nunc impari-pinnata; vel etiam radicalis integerrima, caulina multifida. *Flor.* terminalis solitaria pedunculata. *Falc.* spinulæ in plurimis supra calyces & margines foliorum.

* *Jaceæ calycibus lævibus inermibus.*

1. CENT. calycibus inermibus, squamis lineari-subulatis, foliis pinnatis ferratis. *Linn. sp. 909. Sauv. 264. Crapina.*

Cyanus pulchro semine centaurii majoris. Bot. Monf. 82.

Jacea annua foliis laciniatis ferratis purpurascens flore. Tour. 444.

Chondrilla purpurascens tenuifolia, capite jaceæ, semine cardui. Barr. Icon. 1136.

HABITAT in sterilibus, à *Boutonet, Castelnau, Gramont.* Caulis striatus tripedalis subsimplicissimus. Foliola linearia scabra integerrima. Calyces ovati acuti, squamis apice purpurascens glaberrimis. Pappus feminum niger rigidus.

2. CENT. calycibus inermibus subrotundis glabris, squamis ovatis, foliis sinuatis. *Linn. sp. 909. Sauv. 287. Moschata.*

458 SYNGENESIA POLYGAMIA FRUSTRANEA.

Cyanus floridus odoratus turcicus. *Tour.* 441.

Jacea odora. *B. pin.* 272. n°. VI.

L' Ambrette.

HOSPITATUR sub dio. Flores albi odoratissimi. Folia sæpius pinnatifida.

* *Cyani calycinis squamis ferrato-ciliatis.*

Phrygia. 3. CENT. calycibus recurvato-plumosis, foliis indivisis. *Linn. sp.* 910.

Jacea cum squamis pennatis sive capite villoso. *Bot. Monf.* 136. *Tour.* 443.

HABITAT à Valene, Rouquet. Folia ovata dentata amplexicaulia.

Nigra. 4. CENT. calycibus ciliatis, squamula ovata, ciliis capillaribus erectis, foliis lyrato-angularis, floribus flosculosis. *Linn. syst.* 1229. *sp. pl.* 911.

Jacea nigra laciniata. *Tour.* 443.

Jacea cum squamis ciliis instar pilosis. *Bot. Monf.* 136. *Tour.* 443.

HABITAT à Lesperou, au mont St. Loup. Folia summa lanceolata integerrima.

Pullata. 5. CENT. calycibus ciliatis verticillato-foliosis, foliis lyrato-dentatis, caule foliis brevior. *Linn. sp.* 911. Foliis lyratis obtusis. *Syst. nat.* 1229.

Cyanus humilis albus hieracii folio. *Tour.* 446.

Jacea humilis alba hieracii folio. *Bot. Monf.* 136.

Centaurea inermis, calycum ciliis pinnatis, foliis oblongis villosis & humifusis, floralibus verticillatis ligulatis. *Sauv.* 288.

HABITAT à Castelnau, au chemin des près d'Arene, à Selleneuve. Interdum acaulis. Folia floralia lanceolata. Floret martio. Variat foliis omnibus integerrimis.

Montana. 6. CENT. calycibus ferratis, foliis lanceolatis decurrentibus, caule simplicissimo. *Linn. sp.* 911. *Sauv.* 78.

Cyanus montanus latifolius. *Bot. Monf.* 294.

Cyanus montanus latifolius seu verbasculum cyanoïdes. *Tour.* 445.

HABITAT à Lesperou & à la Serane. Caulis lanatus. Folia integerrima. Variat foliis decurrentibus vel sessilibus.

Cyanus. 7. CENT. calycibus ferratis, foliis linearibus integerrimis, infimis dentatis. *Linn. sp.* 911. *Sauv.* 288.

SYNGENESIA POLYGAMIA FRUSTRANEA. 459

Cyanus segetum. *Bot. Monf.* 82. *Tour.* 446.

Le Bluet, ou Casselunette; vernaculè, *las Blavéras*.

HABITAT in arvis.

8. CENT. calycibus ciliatis, foliis pinnatifidis lineari- *Paniculata.*
bus, caule paniculato. *Linn. sp.* 912.

Jacea vel stoebe Gallica & Austriaca elatior. *Bot. Monf.* 146.

Jacea foliis candicantibus laciniatis, calyculis non
splendentibus. *Tour.* 444.

HABITAT ad margines septum & agrorum. *A Castellan, Sellenenue.*

9. CENT. calycibus ciliatis, foliis lanceolatis serratis, *Sempervi-*
inferioribus hastatis. *Linn. syst.* 1230. *rens.*

Centaurea calycibus ciliatis, foliis lanceolatis, superne
serratis. *Linn. sp.* 913.

Jacea Lusitanica sempervirens. *Tour.* 444.

HOSPITATUR sub dio. Floret augusto.

10. CENT. calycibus margine ciliatis, foliis pinnatifidis, *Scabiosa.*
pinnis lanceolatis. *Linn. sp.* 913.

Jacea vulgaris laciniata flore purpureo. *Tour.* 443.

Scabiosa major squamatis capitulis. *Bot. Monf.* 304.

HABITAT à Lesperon, à St. Guillin le Désert.

11. CENT. calycibus squamosis, foliis lanceolatis, radi- *Jacea;*
calibus sinuato-dentatis, ramis angulatis. *Linn. sp.*
914. *Sauv.* 79.

Jacea vulgaris nigra capitata squamosa. *Bot. Monf.* 139.

Jacea pratensis nigra latifolia. *Tour.* 443.

La Jacée.

HABITAT à Montferrier, Lavalette; ubi variat fo-
liis linearibus integerrimis.

12. CENT. calycibus squamosis, foliis tomentosis, ra- *Conifera.*
dicalibus lanceolatis, caulinis pinnatifidis, caule
simplici. *Linn. sp.* 915. *Sauv.* 289.

Jacea montana incana capite pini. *Bot. Monf.* 136.

Centaurium majus humile capite pini. *Tour.* 449.

Stoebe pinea amplo capite. *Barr. Icon.* 138.

HABITAT cum priori. Vix palmaris, tomentosa. Fo-
lia radicalia integerrima, summa pinnatifida, laci-
nia terminali majore. Squamæ calycinæ splenden-
tes pellucidæ, superiores purpurascens. Radix
fusiformis.

460 SYNGENESIA POLYGAMIA FRUSTRANEA.

* *Stœbæ calycinis spinis palmatis.*

- Seridis.* 13. CENT. calycibus palmato-spinosis, foliis decurrentibus tomentosis oblongis, infimis sinuato-dentatis. *Linn. sp.* 915. *Sauv.* 228.

Carduus Hispanicus purpureus foliis cichorei. Tour. 442.

Jacea latifolia spinosis capitulis pulchris, flore purpureo. Bot. Monf. 137.

HABITAT à St. Jean de Vedas, Montels, Villeneuve. Pedunculi quidam axillares solitarii uniflori, breves, diphylli.

- Aspera.* 14. CENT. calycibus squamis palmato-quinquespinosis, foliis lanceolatis dentatis. *Sauv.* 289. *Linn. sp.* 916.

Carduus jaceæ folio capitulo minori cum squamis tricuspidatis. Tour. 442.

Jacea cum spinosis capitulis, purpurea tenuifolia. Bot. Monf. 138.

HABITAT ubique in satis. Ramosissima. Sepes mediocres constituit.

* *Calcitrapæ calycinis spinis compositis.*

- Calcitrapa.* 15. CENT. calycibus subduplicato-spinosis, foliis sessilibus lateralibus pinnatifidis linearibus dentatis, caule spinoso. *Linn. syst.* 1231. *sp. pl.* 917.

Centaurea calycibus subulato-spinosis sessilibus, foliis linearibus pinnatifidis. Sauv. 288.

Carduus stellatus seu calcitrapa. Tour. 440.

Carduus stellatus foliis papaveris erratici. Bot. Monf. 50.

La Chauffetrape, ou Chardon étoilé; vernaculè, l'Agriola masclan.

HABITAT ad viarum & agrorum margines.

- salsitalis.* 16. CENT. calycibus duplicato-spinosis, foliis rameis decurrentibus inermibus lanceolatis, caulinis lyrato-pinnatifidis. *Linn. sp.* 917. *Sauv.* 288.

Carduus stellatus luteus foliis cyani. Bot. Monf. 50. *Tour.* 440.

HABITAT in arvis, à Lavanet, Boutonet, Selleneuve.

- Melitenfis.* 17. CENT. calycibus duplicato-spinosis subrotundis lateralibus, foliis decurrentibus lanceolatis sinuosis inermibus. *Linn. sp.* 917. *Sauv.* 288.

Carduus Melitenfis capitulis conglobatis. Tour. 443.

SYNGENESIA POLYGAMIA FRUSTRANEA. 461

Jacea Melitenfis capitulis conglobatis. Bot. Monf. 1298.

HABITAT à Cannelles, à St. George, à Restinclières.

18. CENT. calycibus ciliato-spinosis, foliis lyratis inermibus incanis, capitulis terminalibus. *Sauv. 290. Linn. sp. 918.*

Carduus Melitenfis crucæ folio, luteo flore. Tour. 442.

Jacea sicula cichorii folio, flore luteo, capite spinoso. Bot. Monf. 138.

HABITAT ad mare & stagna. A Frontignan, Balaruc, au mont St. Loup.

19. CENT. calycibus subduplicato-spinosis, foliis amplexicaulibus lanceolatis indivisis ferratis. *Calceitrapoi. Linn. des. syst. 1231.*

Carduus stellatus foliis integris ferratis. Bot. Monf. 293. Tour. 440.

HABITAT à Nîmes, juxta rivulum dictum le Vistre.

20. CENT. calycibus ciliatis spinosis, foliis pinnatifidis, laciniis superioribus majoribus. *Centauroi. Linn. sp. 918. Sauv. des. 289.*

Foliis omnibus margine integris.

HABITAT juxta amnem, à Castelnau, Salafon, Clapiers.

21. CENT. calycibus ciliatis spinosis, foliis bipinnatifidis. *Collina. Linn. sp. 918.*

Jacea lutea capite spinoso. Bot. Monf. 138.

Carduus luteus centauroides segetum. Tour. 443.

HABITAT à Lavanet, Castelnau, la Peissine. Folia radicalia tantum bipinnatifida. Squamæ supremæ obtusæ ciliatæ.

* *Crocodiloidea spinis simplicibus.*

22. CENT. calycibus setula reflexa spinosis glabris, foliis dentato-pinnatifidis ferratis. *Salmantica. Linn. sp. 918. Sauv. 287.*

Jacea foliis cichoraceis villosis altissima, flore purpureo. Tour. 444.

Jacea intybacea sive stoebe Salmanticensis prior. Bot. Monf. 137.

HABITAT cum priori. Folia caulina ovato-lanceolata ferrata sessilia. Calyces ovati, squamis apice atropurpureis, spinula setacea minima terminatis. Folia summa lanceolata dentato-spinosa.

23. CENT. calycibus setaceo-spinosis, foliis decurrentibus sinuatis spinosis. *Galafron. Linn. sp. 919. Sauv. 289.*

462 SYNGENESIA POLYGAMIA NECESSARIA.

Carduus galactites. Bot. Monsf. 49. Tour. 441.

HABITAT au chemin de Selleneuve, à Lacolombière.
Folia subtus tomentosa, pinnatifida.

POLYGAMIA NECESSARIA.

SILPHIUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 812.

Char. secund. Rad. carnosæ subtuberosa. Caul. herbacea simplex tetragona. Fol. simplex integra, radicalis petiolata, caulina opposita connata. Flor. terminalis subdichotoma. Fulc. nulla.

Perfoliatum. 1. SILPH. foliis radicalibus cordato-ovatis inæqualiter dentatis, caulinis subintegerrimis.

Silphium foliis cordatis oppositis connato-perfoliatis. Linn. syst. 1232.

HOSPITATUR sub dio & in caldario. Caulis humanæ altitudinis, rubens. Folia radicalia longè petiolata. Petioli hinc canaliculati alati. Corollarum radii pedunculis longiores.

CALENDULA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 807.

Char. secund. Rad. fusiformis. Caul. herbacea teres ramosa. Fol. alterna sessilis simplex subintegerrima vel integra. Flor. terminalis solitaria pedunculata. Fulc. nulla, (in unâ specie aculei rigidiusculi supra capsulas.)

Officinalis. 1. CALEND. seminibus radii cymbiformibus echinatis, disci bicornibus. Linn. sp. 921.

Caltha arvensis. Bot. Monsf. 44. Tour. 498.
Le Souci.

HABITAT in arvis, à Monteils, Laverune, Lavanet, & circà urbem. Folia subintegerrima linearia, vel obversè-ovata, semi-amplexicaulia. Sempervirens & semperflorens.

Pluvialis. 2. CALEND. foliis lanceolatis denticulatis, pedunculis filiformibus. Linn. sp. 921. Sauv. 88. & 304.

Caltha Africana flore intus albo, foris violaceo. Tour. 498.

SYNGENESIA POLYGAMIA NECESSARIA. 463

HOSPITATUR sub dio. Squamæ calycinæ maximæ acuminatæ.

3. CALEND. foliis lanceolatis dentatis, pedunculis superne incrassatis. *Linn. sp. 921. Sauv. 304.* *Hybrida.*

HOSPITATUR sub dio. Folia sæpius ovata subcarnosa, apice denticulis duobus tribuive. Caulis pubescens. Pedunculi longè huiusculi. Floret Augusto.

ARCTOTIS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 808.*

Char. secund. *Rad.* subfusiformis. *Caul.* herbacea ramosa. *Fol.* alterna petiolata simplex pinnatifida. *Flor.* terminalis solitaria pedunculata. *Fulc.* nulla.

1. ARCT. flosculis radiantibus vixenis tripartitis. *Linn. sp. 922. Triplia.*

Arctoris foliis pinnatifidis, caule herbaceo, petalis radii profundè trifidis. *Sauv. 304.*

HOSPITATUR sub dio. Apricatur. Folia lyrato-pinnatifida crenata tomentosa. Variat scapo subunifloro, vel caule folioso ramoso.

OSTEOSPERMUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 809.*

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* fruticosa. *Fol.* alterna subsessilis simplex integra subcarnosa. *Flor.* terminalis pedunculata, pedunculis subquaternis. *Fulc.* nulla.

1. OSTEOSP. foliis ovalibus serratis subpetiolatis. *Linn. 809. sp. 923. steniliferum.*

Le Porte-collier.

HOSPITATUR hyeme in caldario. Sempervirens, bis florens in anno. Alitudo humana. Folia tenella incana. Nervi foliorum in caulem decurrentes. Petiolorum basis tumida. Semina maturans.

O'THONNA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 813.*

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea vel fruticosa repens vel erecta (in unâ specie radicans.) *Fol.* alterna sessilis vel petiolata, nunc

464 SYNGENESIA POLYGAMIA NECESSARIA.

simplex integerrima aut integra (in unâ specie succulenta ,) nunc pinnata , foliolis multifidis. *Flor.* terminalis pedunculata solitaria vel subcorymbosa. *Fulc.* nulla.

* *Herbacea.*

Helenitis. 1. OTHON. foliis lanceolatis integris villosis , floribus umbellatis. *Linn. sp.* 925.

Aster incanus verbasci folio villosus. Tour. 482. *Sauv.* 108. & 87.

Conyza helenitis incana mellita. Bot. Mons. 78.

HABITAT à St. George , à Selleneuve , au-delà du pont vers Cannelles , & à gauche dans un petit bois.

* *Fruticosa.*

Maritima. 2. OTHON. foliis pinnatifidis tomentosis , laciniis sinuatis , caule fruticoso. *Linn. sp.* 925. *Sauv.* 303.

Jacobea maritima. Tour. 486.

HABITAT ad mare ; à la Plage , vers Agde & Aigues-morte. Tota planta tomentosa. Flores corymbosi lutei.

Pedicularis. 3. OTHON. foliis pinnatifidis , laciniis linearibus parallelis. *Linn. sp.* 926.

Cotula Africana calyce eleganti caesio. Tour. 495.

HOSPITATUR sub dio. Pedunculi supernè incrassati fistulosi.

Chirifolia. 4. OTHON. foliis carnosiss lanceolatis integerrimis. *Linn. sp.* 926. *Sauv.* 88.

HOSPITATUR sub dio. Cauliculi humifusi radicanter glauci subsimplificissimi. Folia trinervia glabra glauca succulenta , ad margines cartilaginea semi-amplexicaulia ; flores lutei. Pedunculi solitarii terminales uniflori longi supernè incrassati fistulosi. Calyces sæpiùs quinque vel sexfidi. Pappus albus longus. Tota hyeme & æstate florens. Semina non maturans.

F I L A G O.

Char. prim. Vid. *Linn. Syst. pl.* 891.

Char. secund. Rad. subsimplex rigidiuscula. Caul. teres herbacea vel suffruticulosa. Fol. alterna sessilis simplex integerrima conferta. Flor. nunc terminalis subcorymbosa vel glomerata , nunc axillaris aut lateralis subsessilis , vel utraque simul. *Fulc.* nulla.

I. FILAGO

1. FILAGO floribus sessilibus terminalibus, foliis floralibus majoribus. *Linn. sp. 927.*
Filago marina capite folioso. Tour. 455.
Gnaphalium umbellatum minimum. Bot. Monsf. 111.
HABITAT ad mare, à Ceste, au Nazareth, & derriere le fort Richelieu, & derriere la montagne vers Meze.
Vix uncialis. Folia circa flores conferta, capitulo longiora, radium mentientia, tomento cinereo obfita. Occurrit in monte Lupo.
2. FILAGO tomentosa corymbo subramoso, foliis oblongis obtusis subcrenatis. *Linn. sp. 927.*
Gnaphalium corymbo terminali subdiviso, foliis oblongis integerrimis obtusis. Sauv. 80.
Gnaphalium maritimum. Bot. Monsf. 110. Tour. 461.
Le Coton de mer.
HABITAT in toto tractu ad mare. Floret augusto. Folia semiamplexicaulia. Tota planta tomentosa.
3. FILAGO calycibus pyramidalis pentagonis axillaribus, caule dichotomo erectiusculo. *Linn. Syst. 1235.*
Gnaphalium caule erecto dichotomo, capitulis globosis axillaribus terminalibusque. Linn. sp. 857.
Filago floribus pyramidalis pentagonis flosculis feminis serratis. Linn. sp. 1199.
Gnaphalium vulgare majus. Bot. Monsf. 110.
Filago impia Dodonæi. Tour. 454.
HABITAT in arvis, aux prés d'Arene, à Castelnau. Folia ferè decurrentia incana. Caulis quandoque trichotomus.
4. FILAGO floribus conicis terminalibus axillaribusque, caule erecto subdichotomo. *Linn. Syst. 1235.*
Gnaphalium caule erecto diviso, floribus pyramidalis axillaribus lateralibusque. Linn. sp. 857.
Gnaphalium minus repens. Bot. Monsf. 111.
Filago minor. Tour. 455.
HABITAT à Caunelles, à la Garrigue du Terrail, à Montferrier.
5. FILAGO floribus conicis lateralibus, caule paniculato. *Linn. Syst. 1235.*
Gnaphalium paniculatum hirsutum. Linn. sp. 856.
Gnaphalium caule erecto ramosissimo, glomerulis florum ad alas sessilibus. Sauv. 48.

Filago incana floribus per caulem sparsis. *Tour.* 455.
 HABITAT cum prioribus.

MONOGAMIA.

JASIONE.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 819.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea teres ramosa erecta. *Fol.* alterna sessilis simplex subintegerrima. *Flor.* terminalis pedunculata capitata. *Fulc.* nulla.

Montana. 1. JASIONE. Linn. sp. 918.

Jasione foliis lineari-lanceolatis obsoletè-ferratis. *Sauv.* 64.

Rapunculus scabiosæ capitulo cæruleo. *Bot. Monf.* 220. *Tour.* 113.

HABITAT à Gramont, Castelnau, monferrier. Caulis pedalis vilosus. Folia sæpius ciliata. Pedunculi nudi longissimi.

LOBELIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 820.

Char. secund. *Rad.* fibrosa subrepens. *Caul.* herbacea ramosa procumbens. *Fol.* alterna sessilis simplex subintegerrima. *Flor.* axillaris solitaria pedunculata. *Fulcr.* nulla.

Laurentia. 1. LOBELIA caule prostrato, foliis lanceolatis ovalibus crenatis, caule ramoso, pedunculis solitariis unifloris longissimis. Linn. sp. 931.

HOSPITATUR sub dio. Pedunculi longissimi. Variat foliis spathulatis.

VIOLEA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 821.

Char. secund. *Rad.* fibrosa sarmentosa stolonifera. *Caul.* nunc scaposa, nunc foliosa ramosa teres vel angulata. *Fol.* simplex intègra, nunc radicalis petiolata, nunc caulina petiolata vel sessilis. *Flor.* solitaria pedunculata, radicalis aut caulina axillaris. *Fulc.* stipulæ geminæ solutæ.

* *Acaulis.*

1. **VIOEA** acaulis, foliis cordatis, stolonibus reptantibus. *Oderat*;
bus. Linn. sp. 934.
Viola acaulis, stolonibus teretibus reptantibus, pedunculis radicalibus. *Sauv. 29.*
Viola martia purpurea, flore simplici odoro. *Bot. Monf. 278. Tour. 419.*
La Violette; vernaculè, *la Vioületa.*
HABITAT in herbidis, à *Castelnau, Lavalette, la Peissine, Lattes.*

* *Caulescentes.*

2. **VIOEA** caule demum adscendente, foliis oblongo-cordatis. *Linn. sp. 935.* *Canina.*
Viola caulibus adscendentibus floriferis, foliis cordatis. *Sauv. 111.*
Viola martia inodora sylvestris. *Bot. Monf. 278.*
Viola martia foliis majoribus & rotundioribus. *Tour. 419.*
Viola martia minor flore violaceo. *Barr. Icon. 695.*
HABITAT à *Lavalette, Montferrier.* Luxuriat in labyrintho horti regii. Stipulæ setaceæ. Folia crenata. Pedunculi longitudine petiolorum.
 3. **VIOEA** caule triquetto diffuso, foliis oblongis incisis, stipulis dematis. *Linn. sp. 935.* *Tricolor.*
Viola arvensis bicolor. *Bot. Monf. 278. Tour. 421.*
La Pensée; vernaculè, *la Panfée.*
HABITAT cum prioribus. Pedunculi foliis multo longiores: fructiferi recurvi.

I M P A T I E N S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 822.*

Char. secund. *Rad.* subfusiformis. *Caul.* herbacea ramosa. *Fol.* alterna simplex integra subsessilis. *Flor.* axillaris pedunculata: pedunculis unifloris aggregatis vel solitariis multifloris. *Fulc.* glandulæ plurimæ ad basim foliorum.

1. **IMPAT.** pedunculis aggregatis unifloris, foliis lanceolatis, nectariis flore brevioribus. *Linn. sp. 938.* *Balsamina.*

468 SYNGENESIA MONOGAMIA.

Impatiens pedunculis confertis unifloris. *Sauv.* 77.

Balsamina foemina. *Tour.* 418.

Le Balsamine; vernaculè, *la Balsamina*.

HOSPITATUR sub dio. Folia ferrata. Variat pedunculis solitariis, foliis multo brevioribus.

* *Pedunculis multifloris.*

Noli me tangere.

2. IMPAT. pedunculis multifloris solitariis, foliis ovatis, geniculis caulinis tumentibus. *Linn. sp.* 938. *Sauv.* 77.

Balsamina lutea. *Barr. Icon.* 1197.

La Balsamine jaune.

HOSPITATUR cum priorì. Pedunculi foliis longiores.



Classis XX.

GYNANDRIA
DIANDRIA.

ORCHIS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 823.

Char. secund. Rad. bulbosa solida geminata palmata vel fasciculato-aggregata. Caul. herbacea simplicissima. Fol. alterna vaginans integerrima. Flor. terminalis spicata. Fulc. bractea ad basim floris singuli.

* *Bulbis indivisis.*

1. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii cornu longo: la- *Pyramidalis.*
bio trifido æquali integerrimo, petalis lanceolatis.
Linn. Syst. 1242.

Orchis purpurea, spica congesta pyramidalis. *Seg.*
com. II. p. 129. tab. XV. fig. 11.

Orchis cynosorchis & testiculus canis major, flore dilute purpurascens sive incarnato. *Bot. Monf.* 192.

Orchis latifolia spica compacta. *Tour.* 433.

HABITAT in pratis. *A Prades, Viols, Grabels.*

2. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio trifido re- *Coriophora.*
flexo crenato: cornu brevi, petalis conniventibus.
Linn. sp. 940.

Orchis bulbis indivisis, labello trifido punctato: lacinula media longiore, cornu germinibus brevior.

Sauv. 23.

Orchis odore hirci minor. *Bot. Monf.* 192. *Tour.* 433.
Seg. 2. p. 128.

HABITAT à Gramont, Castelnau ultra amnem.

3. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido *Moria.*
crenulato, cornu obtuso, petalis omnibus conniventibus. *Linn. Syst.* 1242. *sp.* 940. *Sauv.* 23. n°. 113.

Orchis morio femina. *Bot. Monf.* 192. *Tour.* 433. *Seg.*
2. *tab. XV. fig. 7.*

- β. Orchis morio femina, calcari extuberante bifariamque
diviso. *Seg. ibid. fig. 8.*

G g iij

HABITAT à Lattes, Caunelles. β . Spica longa. Bractea latiusculæ longitudine germinis. Variat floribus unicoloribus vel variegatis.

- Mascula*. 4. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio quadrilobo crenulato: cornu obtuso, petalis dorsalibus reflexis.

Linn. Syst. 1242. *Sauv.* 23. n°. 110.

Orchis morio mas, floribus roseis, folio non maculato, *Seg. tom. II. p. 125. tab. XV. fig. VI.*

Orchis morio. *Tour.* 432. mas, foliis maculatis, vel non. *Ibid.*

- Utricularia*. 5. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio quadrifido punctulis scabro: cornu obtuso, petalis distinctis.

Linn. sp. 941.

Orchis pannonica quarta Clusii. *Bot. Monf.* 192.

Orchis radicibus subrotundis, spica densa, crasculis labelli ampliter divergentibus. *Sauv.* 23.

Orchis militaris pratensis humilior. *Tour.* 432. *Seg.* 2. p. 123. *tab. XV. fig. 4.*

HABITAT in herbidis, à Lavanet, la Peiffine, Montferrier.

- Militaris*. 6. ORCHIS bulbis indivisis, nectarii labio quinquefido punctis scabro: cornu obtuso, petalis confluentibus. *Linn. sp.* 941.

Orchis latifolia hiantе cucullo major. *Tour.* 432. *Seg.* 2. *tab. XV. fig. 2. & 4.*

Orchis parvis floribus multis punctis notatis. *Bot. Monf.* 303.

Orchis radicibus subrotundis ovoidæis, brachiolis labelli brevioribus, spinula ex divisione trunculi eminente. *Sauv.* 22.

HABITAT à Lattes, à St. George.

* *Bulbis palmatis.*

- Palmata*. 7. ORCHIS bulbis subpalmatis rectis, nectarii cornu conico: labio trilobo lateribus reflexo, bracteis flore longioribus. *Linn. sp.* 941.

Orchis radicibus palmatis, bracteis flore longioribus, nectarii labio trifido, cornu germinibus brevioribus. *Sauv.* 23. n°. 116-117. & 24. n°. 118.

Orchis palmata pratensis longis calcaribus. *Bot. Monf.* 193. *Seg.* 132. *tom. II.*

HABITAT cum priori.

8. ORCHIS bulbis palmatis, nectarii cornu recurvo, *Odoratissima.*
 labello ovato trilobo acuto, foliis linearibus. *Linn.*
Syst. 1243.

Orchis palmata angustifolia minor odoratissima.
Bot. Monf. 193 & 303. *Tour.* 435. *Seg. tom. III.*
tab. VIII. fig. 6.

Orchis palmata minor calcaribus oblongis. *Tour.*
 435. *Seg. tom. III. tab. VIII. fig. 7.*

Orchis bulbis palmatis, angustissimo folio, calcare
 gracili, ovario brevissimo. *Sauv.* 24.

HABITAT ad lœvam ultra pontem, à Sellenewve, &
 à Rouquet pres la source du Lés.

9. ORCHIS bulbis palmatis patentibus, nectarii cornu *Maculata.*
 germinibus brevioribus : labio plano, petalis dorsa-
 libus erectis. *Linn. sp.* 942. *Sauv.* 23. n^o. 117.

Orchis montana palmata maculata. *Seg. tom. II. p.*
 132. *tab. XV. fig. XVI. Tour.* 436.

HABITAT au mont St. Loup, & cum priori.

* *Bulbis fasciculatis*

10. ORCHIS bulbis fasciculatis filiformibus, nectarii *Abortiva.*
 labio ovato integerrimo. *Linn. sp.* 943.

Orchis radices cyndricis, bracteis flore brevioribus,
 labello trifido obtuso, seta germinibus brevioribus.
Sauv. 23.

Lymodorum Austriacum. *Tour.* 437. *Seg. tom. II.*
pag. 137.

HABITAT copiosè à la Peissine & in pinetis à Lavalette
 cum coronilla minima, astragalo Monspeli-
 lano & globularia.

SATYRIUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 824.

Char. secund. *Rad.* bulbosa, geminata vel fasciculata.
Caul. herbacea simplicissima. *Fol.* alterna vaginans integerrima.
Flor. terminalis spicata. *Falc.* bractea ad basim floris cuneifolia.

1. SATYR. bulbis indivisis, foliis lanceolatis, nectarii *Hircinum.*
 labio trifido, intermedia lineari obliqua præmorfa.
Linn. sp. 944.

Orchis barbata foetida. Bot. Monsf. 192.

Orchis barbata odore hirci, brevior & latior folio. Tour. 433. Seg. tab. XV. fig. 1.

Satyrion radicibus subrotundis, labello longissimo gracili, calcare brevissimo. Sauv. 24.

HABITAT à Lavalette juxta amnem. Caulis sæpè fistulosus, pedalis. Lacina nectarii intermedia contorta longissima. Bractæe subulatæ germinibus multo longiores.

OPHRYS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 828.

Char. secund. *Rad.* bulbosa solida, simplex vel ramosa. *Caul.* herbacea simplicissima. *Fol.* alterna simplex integerrima vaginans (in una specie opposita.) *F. or.* terminalis spicata. *Fulc.* bractæe ut in prioribus.

* *Bulbis ramosis.*

Nidus avis. 1. **OPHRYS** bulbis fibroso-fasciculatis, caule vaginato, nectarii labio bifido. *Linn. sp. 945.*

Neottia bulbis fasciculatis, nectarii labio bifido. Sauv. 25.

Nidus avis. Tour. 437.

Le Nid d'oiseau.

HABITAT in umbrosis, à Villemagne, Fougères, Lamalon.

Spiralis. 2. **OPHRYS** bulbis aggregatis oblongis, caule subflososo, floribus secundis, nectarii labio indiviso. *Linn. sp. 945.*

Orchistrum autumnale pratense spirale album odoratum. Seg. tom. III. tab. VIII. fig. 9.

Orchis spiralis odorata alba. Bot. Monsf. 193. Tour. 433.

Neottia bulbis fasciculatis, nectarii labio indiviso. Linn. sp. 945. Sauv. 25.

HABITAT à Laverune, à Montferrier & Lavalette ultra amnem. Floret autumnum. Odor suavissimus. Folia radicalia ovata latiuscula. Caulis à latere bulbi.

Ovata. 3. **OPHRYS** bulbo fibroso, caule bifolio, foliis ovatis, nectarii labio bifido. *Linn. sp. 946. Sauv. 128.*

Ophrys bifolia. Bot. Monsf. 191. Tour. 437. Seg. tom. II. p. 138.

Double-Feuille.

HABITAT au-delà du pont Juvenal à droite vers Souliers, & à la Font Pompiniane. Bractææ minimæ.

* *Bulbis rotundis.*

4. OPHRYS bulbis subrotundis, caule folioso, nectarii *Antropophora* labio lineari tripartito, medio elongato bifido. Linn. *sp.* 948.

Ophrys bulbis subrotundis, scapo folioso, &c. Linn. *Syst.* 1245.

Orchis flore nudi hominis effigiem repræsentans. Bot. *Monf.* 192. *Tour.* 433. *Seg. tom. II. p.* 126. *Sauv.* 23.

Neottia bulbis subrotundis, nectarii labio quadrifido. *Sauv.* 25.

HABITAT in pratis ad dexteram à Sembrès, Selleneuve.

5. OPHRYS bulbis subrotundis, caule folioso, nectarii *Insectifera* labio subquinelobo. Linn. *sp.* 948.

Cypripedium bulbis subrotundis, foliis oblongis caulinis. *Sauv.* 24.

6. Orchis muscam referens minor. Bot. *Monf.* 193. galea Myodes. & alis herbidas. *Tour.* 434.

Cypripedium radicibus subrotundis, calcare nullo, labello latiusculo bifido, brachiolis brevibus. *Sauv.* 25.

7. Orchis muscam referens major. Bot. *Monf.* 193. *Tour.* 434.

8. Orchis muscam referens lutea. Bot. *Monf.* 193. *Tour.* 434.

9. Orchis radicibus subrotundis, calcarî nullo, labello latissimo holosericeo unicolore integro obtuso. *Sauv.* 25. 26. n°. 127. *Seg. 2. Tab. XV. f. 2. p.* 131.

Orchis muscam referens, colore rubiginoso. Bot. *Monf.* 192. *Tour.* 434. *Seg. 2. p.* 131.

10. Orchis araneam referens. *Tour.* 434. *Tab.* 247. *fig. C.* Adrachnites *Seg. tom. III. Tab. 8. fig. 1.*

11. Orchis araneam referens, rostro recurvo. *Seg. tom. III. Tab. 8. fig. 2.*

HABITAT in pratis: α. à la Peissine, Caunelles. β. in iisdem locis & à Castelnau. γ. tantum ipsam vidimus à la Peissine dans le parc & à Laverune. δ. cum prioribus & à Lavanet. ε. A Caunelles, Gramont, au Terrail. Occurrit ultra annum à Castelnau.

S E R A P I A S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 825.

Char. secund. *Rad.* bulbosa carnosâ solida vel fibrosa. *Caul.* herbacea simplicissima. *Fol.* alterna vaginans simplex integerrima. *Flor.* terminalis laxè spicata. *Fulc.* ut in prioribus generibus.

- Helleborina.* 1. SERAP. bulbis fibrosis, nectarii labio obtuso crenato petalis brevior. *Linn. sp.* 1245.
- Latifolia.* 2. Serapias caule multifolio multiflora. *Sauv.* 107.
Helleborine latifolia montana. *Bot. Monf.* 126. *Tour.* 437. *Seg.* 2. p. 134.
- Purpurea.* 3. Helleborine montana angustifolia purpurascens. *Bot. Monf.* 126. *Tour.* 437. *Seg.* 136.
- Longifolia.* 4. Helleborine floribus albis. *Bot. Monf.* 126.
Serapias radicibus fibrosis, nectarii labio obtuso petalis brevior, foliis ensiformibus. *Linn. sp.* 950.
Helleborine flore albo vel damasorum montanum latifolium. *Tour.* 437. *Seg.* 2. p. 136.
- Palustris.* 5. Serapias angustifolia tomentosa, floribus herbaceis intus albis. *Sauv.* 42.
Helleborine angustifolia pratensis. *Bot. Monf.* 126. *Tour.* 436.
- HABITAT in umbrosis humidis. *Le long du Lés, & à Luttes.* 6. Bractææ germinibus longiores atque latiores lanceolatæ.
- Lingua.* 7. SERAP. bulbis subrotundis, nectarii labio trifido acuminato petalis longior. *Linn. sp.* 950.
Satyrium radicibus subrotundis, cucullo clauso monopetalo : labello ovato-lanceolato. *Sauv.* 24.
Orchis montana Italica flore ferrugineo, lingua oblonga. *Bot. Monf.* 303. *Tour.* 434. *Seg. tom. III.* p. 248. *tab.* 8. f. 4.
HABITAT cum priori, à Gramont; bractææ longissimæ & latissimæ.

C Y P R I P E D I U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 830.

Char. secund. *Rad.* bulboso-fibrosa. *Caul.* herbacea simplicissima. *Fol.* alterna subvaginans simplex integerrima. *Flor.* terminalis subsolitaria. *Fulc.* ut in præcedentibus.

1. CYPRIP. radicibus fibrosis, foliis ovato-lanceolatis *Calceolus*, caulinis. *Linn. sp. 951.*

Calceolus. Tour. tab. 249.

Cypripedium foliis ovato-lanceolatis. Sauv. 24.

Le Sabot de notre Dame.

HABITAT in herbidis humidis, à *la Peissine.*

Obs. anno 1760. studiosus Medicinæ, nomine *Salançon*, plantas quæsiturus hanc primus in agro Monspessulano detexerat. Anno sequenti ipsam in eodem loco vidimus, caule unifloro bifloroque. Bractææ magnæ.

TRIANDRIA.

SISYRINCHIUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 832.*

Char. secund. *Rad.* bulboso-fibrosa carnosæ *Caul.* herbacea anceps articulata ramosa. *Fol.* alterna vaginans simplex integerrima. *Flor.* terminalis & lateralis, pedunculata aggregata. *Falc.* bractææ floribus interjectæ spathæformes.

1. SISYR. caule foliisque ancipitibus. *Linn. sp. 954.* *Bermudianna.*

Bermudianna iridis folio, radice fibrosa. *Tour. 489.*

HOSPITATUR sub dio. Spatha subseptemflora, diphylla; foliolo inferiore minori: superiore flores superante. Corollæ violæ martiali paulo majores, ad basim petalorum intus luteæ.

PENTANDRIA.

PASSIFLORA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 834.*

Char. secund. *Rad.* repens sarmentosa stolonifera. *Caul.* fruticosa flexuosa angulata scandens. *Fol.* alterna petiolata simplex palmata. *Flor.* axillaris solitaria pedunculata. *Falc.* stipulæ solutæ geminæ. Cirrhus axillaris, ad latera pedunculi. Bractæa triplex ad quemlibet calycem, involucriformis. Glandula ad basim cujuslibet lacinie foliorum.

Cerulea. 1. PASSIF. foliis palmatis integerrimis. Linn. sp. 959.
La Grenadille ou Fleur de la Passion.

HOSPITATUR sub dio. Apricatur. Folia sæpius palmata quinque vel septempartita, laciniis lanceolato-ovatis integerrimis. Petioli foliis breviores. Pedunculi petiolis longiores. Bractæ cordatæ magnæ foliaceæ. Stipulæ reniformes dentatæ. Calix corollam mentiens foliolis infra apicem denticulo instructis, quâ notâ à corolla distinguitur; nectarium fibris in orbem positis constat, apice violaceis aut ceruleis in medio albis, ad basim atro purpureis. Puncta glandulosa ad basim filamentorum in medio nectarii.

HEXANDRIA.

ARISTOLOCHIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 835.

Char. secund. Rad. tuberosa : radiculis fibrosis lateralibus reptantibus stoloniferis. Caul. herbacea articulata angulata flexuosa striata simplex vel ramosa, repens vel erecta. Fol. alterna simplex integerrima vel integra, sessilis vel petiolata. Flor. axillaris solitaria vel aggregata, sessilis vel pedunculata. Fulc. nulla.

Pistolochia. 1. ARIST. foliis cordatis crenulatis petiolatis, floribus solitariis. Linn. sp. 962. Foliis subtus reticulatis. Syst. 1249.

Aristolochia caule infirmo ramoso, foliis cordatis obsolete ferratis, floribus solitariis erectis. Sauv. 111.

Aristolochia pistolochia dicta. Bot. Monf. 28. Tour. 162.

HABITAT in vineis. A Lacolombiere, Selleneuve, Lattes, flores pedunculati.

Rotunda. 2. ARIST. foliis cordatis subsessilibus obtusis, caule infirmo, floribus solitariis. Linn. sp. 962.

Aristolochia caule infirmo ramoso, foliis cordatis integerrimis, floribus solitariis erectis. Sauv. 111.

Aristolochia rotunda, flore ex purpura nigro. Bot. Monf. 27. Tour. 162.

2. *Aristolochia rotunda* flore ex albo purpurascente. *Bot.*
27. *Tour.* 162.
L'Aristolochie ronde.
HABITAT cum prior. Folia sæpius emarginata. Caulis subtrigonus.
3. ARIST. foliis cordatis petiolatis integerrimis obtusiusculis, caule infirmo, floribus solitariis. *Linn. sp.* 962. *Longa.*
Aristolochia caule infirmo ramoso, foliis cordatis longè petiolatis, floribus solitariis. *Sauv.* 111.
Aristolochia longa vera. *Bot. Mons.* 27. *Tour.* 162.
L'Aristolochie longue.
HABITAT ad mare, à Ceste, Bouzigues. Caulis quadrangulus.
4. ARIST. foliis cordatis, caule erecto, floribus axillaribus confertis. *Linn. sp.* 962. *Clematitis.*
Aristolochia caule erecto simplicissimo, foliis cordatis petiolatis, floribus lateralibus confertis *Sauv.* 111.
Aristolochia clematitis erecta. *Bot. Mons.* 28. *Tour.* 162.
Autre Aristolochie. Omnes suprà memoratz vocantur vernaculè *Faouïterna.*
HABITAT cum prioribus. Caulis striatus. Folia petiolata: flores longitudine ferè internodiorum.

POLYANDRIA.

ARUM.

- Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 840.
Char. secund. Rad. tuberosa. Caul. scaposa simplicissima. Fol. radicalis petiolata vaginans simplex integerrima vel pedata. Flor. terminalis clavato-spicata. *Falc.* nulla.

* *Acaulia, foliis compositis.*

1. ARUM foliis pedatis: foliolis lanceolatis integerrimis æquantibus spatham spadice longiorem. *Linn. sp.* 964. *Sauv.* 196. *Dracunculus*
Dracunculus polyphyllus. *Bot. Mons.* 87. *Tour.* 160.
La Serpenteaire.
HOSPITATUR sub dio. Non occurrit hodie in agro Monspeulano.

* *Acaulia foliis simplicibus.*

- Colocasia.* 2. ARUM acaule, foliis peltatis ovatis repandis : basi semibifidis. *Linn. sp.* 965. Margine integerrimis. *Sauv.* 121.
 Arum maximum Ægyptiacum quod vulgo colocasia. *Tour.* 759.
 Arum Ægyptiacum, *Barr. Icon.* 668. & varietates.
Le pied de veau d'Égypte.
 Hospitatur sub dio. Folia cubitalia reticulata.
- Maculatum.* 3. ARUM acaule, foliis hastatis integerrimis, spadice clavato. *Linn. sp.* 966.
 ARUM vulgare non maculatum. *Bot. Mons.* 29. *Tour.* 158.
 Arum maculatum maculis candidis & nigris. *Bot. Mons.* 29. *Tour.* 158.
Le pied de veau.
 HABITAT ad rivulorum margines circa Urbem. Et in umbrosis. *A la Peissine, Laverune, Lattes.*
- Arisarum.* 4. ARUM acaule, foliis cordato-oblongis, spatula bifida, spadice incurvo. *Linn. sp.* 966.
 Arisarum latifolium alterum. *Bot. Mons.* 27. *Tour.* 161.
 HABITAT à Valmagne; à Bouzigues au bord des étangs, & à Frontignan.

ZOSTERA.

- Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 1068.
 Char. secund. *Raa.* articulata nodosa subhorizontalis. *Caul.* nulla. *Fol.* fasciculata sessilis radicalis simplex integerrima florifera. *Flor.* pedunculata clavato-spicata epiphylla. *Fulc.* nulla.
- Marina.* 1. ZOSTERA. *Linn. sp.* 968.
 Alga angustifolia vitriariorum. *Bot. Mons.* 7. *Tour.* 569.
L'Algue marine, ou Foin de mer, vernaculè la Moussa.
 HABITAT in stagnis ubi floret Aprili; folia basi spadicem vaginantia.



Classis XXI.

MONOECIA

MONANDRIA.

ZANICHELLIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 844.

Char. secund. *Rad.* fibrosa articulata horizontalis. *Caul.* herbacea ramosa articulata. *Fol.* sessilis simplex integerrima; inferior alterna; summa opposita. *Flor.* axillaris solitaria sessilis. *Fulc.* nulla.

1. ZANICHELLIA. Linn. sp. 969. Sauv. 124. & 50. *Palustris.*
Potamogeton capillaceum capitulis ad alas trifidis.
Bot. Monf. 213.

HABITAT in amne. *A Salitate & aux Guilheins au-delà de la rivière.* Folia inferiora ad basim sæpe dilata, vaginantia.

DIANDRIA.

LEMNA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 960.

Char. secund. *Rad.* fibrosa perpendicularis filiformis simplicissima. *Caul.* nulla, vel herbacea radicans ramosa teres. *Fol.* alterna simplex integerrima (in unâ specie radicans) sessilis vel petiolata. *Flor.* axillaris pedunculata. *Fulc.* tubi vaginantes radicularum apicem.

1. LEMNA foliis petiolatis lanceolatis. Linn. sp. 970. *Trisulca.*
Lemna foliis lanceolatis: extremis decussatis. Sauv. 91.
Lenticula aquatica trifurca *Bot. Monf.* 301.
HABITAT à Lattes, & à ou mas de Fanguise.
2. LEMNA foliis sessilibus utrinque planiusculis, radicibus solitariis. Linn. sp. 970. Sauv. 31. *Minor.*
Lenucula palustris minor vulgaris. *Bot. Monf.* 152.

La Lentille d'eau.

HABITAT cum priori. Folia minima suborbiculata.

TRIANDRIA.

TYPHA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 850.

Char. secund. *Rad.* carnosa horizontalis nodosa stolonifera. *Caul.* culmosa plena simplicissima teres. *Fol.* alterna simplex vaginans integerrima. *Flor.* terminalis clavato-spicata, spicis geminis alternis. *Fulc.* nulla.

Latifolia. 1. TYPHA foliis subensiformibus, spica mascula femineaque approximatis. Linn. sp. 971.

Typha palustris major. Bot. Monf. 272. Tour. 530.

La Masse d'eau ou le Roseau.

HABITAT in arvis. A Castelnau.

Angustifolia. 2. TYPHA foliis semicylindricis, spica mascula femineaque remotis. Linn. sp. 971.

Typha palustris media. Bot. Monf. 273.

Typha palustris clava gracili. Tour. 530.

HABITAT cum priori. A Lattes.

SPARGANIUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 849.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* culmosa teres ramosa. *Fol.* alterna (graminea) simplex integerrima amplexicaulis. *Flor.* axillaris & terminalis pedunculata: pedunculis compresso planiusculis; amentis globosis alternis sessilibus lateralibus secundum longitudinem pedunculorum. *Fulc.* nulla.

Erectum. 1. SPARG. foliis erectis triquetris. Linn. sp. 971.

Sparganium ramosum. Bot. Monf. 245. Tour. 531.

Sparganium foliis assurgentibus triangularis. Sauv. 40.

Le Ruban d'eau.

HABITAT in amne, à Castelnau, Lamousson.

Z E A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 846.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* culmosa plena articulata. *Fol.* alterna (graminea) vaginans simplex integerrima. *Flor.* terminalis paniculata. *Falc.* nulla.

1. ZEA. Linn. sp. 971. Sauv. 40. Linn. Syst. 1260. Mays.
Mays granis aureis. Tour. 531.
Le Blé de Turquie; vernacu è *lou Blar d'Espagne*.
HOSPITATUR sub dio. Facta indigena, ubique occurrit in hortis.

C O I X.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 847.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* culmosa plena articulata. *Fol.* alterna (graminea) vaginans simplex integerrima. *Flor.* axillaris spicata spiculis solitariis. *Falc.* nulla.

1. COIX feminibus ovatis. Linn. sp. 972. Lachryma
Lachryma Jobi. Tour. 532. Jobi.
La Larme de Job.
HOSPITATUR sub dio. Altitudo sesquipedalis.

C A R E X.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 848.

Char. secund. *Rad.* fibrosa. *Caul.* culmosa plena simplex teres vel triquetra. *Fol.* alterna vaginans simplex integerrima. *Flor.* terminalis spicata, spiculis solitariis pluribusvè alternis sessilibus aut pedunculatis. *Falc.* nulla.

* *Spica unica simplici.*

1. CAREX spica dioica simplici. Linn. sp. 972. Dioica.
Cyperoides parvum, caulibus & foliis tenuissimis triangularibus, spicâ longiore. Seg. tom. II. p. 118.
Gramen cyperoides minimum spicâ simplici. Scheuc. 497. Tab. 11.
HABITAT in humidis à Prades, Montferrier. Culmi vix semipalmares simplicissiminec articulati subnudi.

* *Spicis androgynis.*

Leporina. 2. CAREX spica composita, spiculis ovatis sessilibus approximatis alternis androgynis nudis. *Linn. sp.* 973.
Gramen cyperoides parvum aquaticum. *Bot. Mons.* 118.
HABITAT à Lattes, Selleneneuve.

Vulpina. 3. CAREX spica supra decomposita infernè laxiore, spiculis androgynis ovatis sessilibus glomeratis, supernè masculis. *Linn. sp.* 973. *Sauv.* 21.
Gramen palustre cyperoides. *Lob. Icon.* 19.
Juncus repens grumosa & echinata spica. *Barr. Icon.* 114. n^o. 2.
HABITAT cum priori. Culmi vix sesquipalmares foliis longiores.

Auricata. 4. CAREX spiculis subovatis sessilibus remotis androgynis, capsulis acutis divergentibus spinosis. *Linn. sp.* 974.
Gramen spicis brevibus echinatis (androgynis) sessilibus distinctis. *Sauv.* 21.
HABITAT à Lattes & à la mer. Spiculæ subquinque-floræ.

* *Spicis sexu distinctis, femineis sessilibus.*

Flava. 5. CAREX spicis confertis subsessilibus subrotundis, mascula lineari, capsulis acutis recurvis. *Linn. sp.* 975.
Carex spicis ad apicem tribus sessilibus, femininis subrotundis. *Sauv.* 22.
Cyperoides palustre aculeatum capitulo brevior. *Tour.* 529.
HABITAT juxta rivulos. A Montferrier, Laverune, & à la mer.

Digitata. 6. CAREX foliis linearibus erectis, mascula brevior inferioreque, bracteis aphyllis, capsulis distantibus. *Linn. sp.* 975.
Gramen nemorosum caryophyllum spica multiplici. *Scheuchz. pag.* 450.
HABITAT à Lespiron.

* *Spicis sexu distinctis, femineis pedunculatis.*

Pseudo-cyper. 7. CAREX spicis pendulis, pedunculis geminatis. *Linn. sp.* 978.
Carex spicis pendulis, omnibus femineis, unica androgyna infernè mascula. *Sauv.* 22.

MONOECIA TETRANDRIA. 483

Cyperoides spica pendula brevior. *Tour.* 529.

HABITAT in aquis, à Lavalette, Castelnau.

* Spicis sexu distinctis, masculis pluribus.

8. CAREX spicis masculis pluribus, femineis subsessilibus, capsulis obtusiusculis. *Linn. sp.* 978. *Acuta.*
9. CAREX spicis erectis oblongis sessilibus alternis folio florali brevioribus, superioribus masculis. *Sauv.* 21. *Nigra.*
Cyperoides nigro-luteum vernum minus. *Tour.* 529.
10. CAREX spicis masculis superioribus numerosis, femineis inferioribus, intermedia unica androgyna. *Linn. sp.* 979. *Sauv.* 22. *Rufa.*
Cyperoides latifolium spica rufa sive caule triangulo. *Bot. Monf.* 117. *Tour.* 529.
- HABITAT à Castelnau, Gramont. Altitudo prioris sesquipedalis.
9. CAREX spicis masculis pluribus, femineis pedunculatis, capsulis inflatis acuminatis. *Linn. sp.* 979. *Vesicaria.*
Cyperoides polystachion spicis teretibus erectis. *Tour.* 529.
- HABITAT à Lesperou & au mont St. Loup.

TETRANDRIA.

BETULA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 855.

Char. secund. *Rad.* ramosa lignosa. *Caul.* arboresca. *Fol.* alterna petiolata simplex integra. *Flor.* axillaris pedunculata pedunculis solitariis ramosis. *Fulcr.* stipulæ geminæ solutæ deciduæ.

1. BETULA pedunculis ramosis. *Linn. sp.* 983. *Alnus.*
Alnus. Sauv. 306. *Linn. Fl. Suec.* 775. *Fl. Lapp.* 340.
Alnus rotundifolia glutinosa viridis. *Bot. Monf.* 11.
Tour. 587.
L'Aulne, ou Aune.
- HABITAT à Lavanet, à Lesperou. Folia obversè ovata duplicato-serrata.

BUXUS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 854.

Char. secund. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* fruticu-

losa, ramis subtetragonis. *Fol.* opposita sessilis simplex integerrima. *Flor.* sessilis opposita axillaris & terminalis. *Fulc.* nulla.

- Sempervirens.* 1. BUXUS. *Linn. sp.* 983. *Bot. Monf.* 44. *Tour.* 578.
Le Buis; vernaculè, *lou Boui*.
 HABITAT à Lavalette, Valene.

U R T I C A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 853.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea ramosa. *Fol.* petiolata simplex integra aut integerrima, opposita vel alterna. *Flor.* pedunculata axillaris, opposita vel alterna, pedunculis simplicibus confertis, vel ramosis solitariis. *Fulc.* pili pungentes in tota planta in plurimis speciebus.

* *Oppositifolia.*

- Pilulifera.* 1. URTICA foliis oppositis, amentis fructiferis globosis.
Linn. sp. 983. *Sauv.* 307.

Urtica urens pilulas ferens. *Bot. Monf.* 281.

Urtica prima Dioscoridis, semine lini. *Tour.* 535.

L'Ortie Romaine.

HABITAT in arvis. Folia profundè dentata. Pedunculi amentorum petiolis longiores.

- Urens.* 2. URTICA foliis oppositis ovalibus. *Linn. sp.* 984.
Sauv. 307.

Urtica urens minor. *Bot. Monf.* 282. *Tour.* 535.

L'Ortie grièche; vernaculè, *l'Ourtiga*.

HABITAT cum priori.

- Dioica.* 3. URTICA foliis oppositis cordatis, racemis geminis.
Linn. sp. 984.

Urtica foliis oblongo-cordatis. *Sauv.* 307.

Urtica urens maxima. *Bot. Monf.* 281. *Tour.* 534.

L'Ortie ordinaire.

HABITAT in hortis & ad agrorum margines.

- Parietaria.* 4. URTICA foliis oppositis lanceolatis integerrimis, hinc angustioribus. *Linn. sp.* 985.

Urtica altera pilulifera parietariae folio. *Tour.* 535.

HOSPITATUR sub dio. Caulis vix semipedalis. Racemi axillares gemini petiolis longiores. Folia obliquè lanceolata glabra.

* *Alternifoliae.*

5. URTICA foliis alternis cordato-ovatis, amenis ramosis distichis erectis. *Linn. sp. 985.* *Canadensis.*

Urtica maxima racemosa Canadensis. *Tour. 536.*

HOSPITATUR sub dio. Caulis glaber bipedalis ramosissimus. Folia serrata acuminata petiolo brevissimo. Amenta foliis breviora axillaria solitaria paniculato-ramosa.

M O R U S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 857.*

Char. secund. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* arboorea. *Fol.* alterna petiolata simplex integra. *Flor.* axillaris pedunculata subsolitaria. *Fulc.* nulla.

1. MORUS foliis obliquè cordatis lævibus. *Linn. sp. 986.* *Alba.*
Sauv. 117.

Morus fructu albo. *Bot. Monf. 178. Tour. 589.*

Le Murier blanc; vernaculè, l'Amourie.

HABITAT in arvis. Folia bombycam pabula.

2. MORUS foliis cordatis scabris. *Linn. sp. 986.* *Nigra.*

Morus fructu nigro. *Bot. Monf. 178. Tour. 589.*

Le Murier noir; vernaculè, les Amouras de Dame.

HABITAT cum priori. Variat foliis quinquelobis.

PENTANDRIA.

XANTHIUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 858.*

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* herbacea ramosa. *Fol.* alterna petiolata simplex integerrima vel integra. *Flor.* axillaris sessilis solitaria vel conferta. *Fulc.* aculei supra capsulas (spinæ geminae loco stipularum in unâ specie.)

1. XANTH. caule inermi, foliis cordato-lobatis, floribus aggregatis. *Gen. et Spec. 1201.*

Xanthium caule inermi. *Linn. sp. 987.*

Xanthium. *Tour. 439.*

Lappa minor sive Xanthium Dioscoridis. *Bot. Monf. 150.*

Le petit Glouteron; vernaculè, lous Tirapanssés.

Hh . j

HABITAT in arvis. Folia longè petiolata duplicato-fer-
rata. Flores tres quatuorve simul.

Spinosum. 2. XANTH. spinis tridentatis, foliis subsessilibus hastato trilobis integerrimis, floribus solitariis.

Xanthium spinisternatis. *Linn. sp.* 987.

Xanthium laciniatum validissimis aculeis munitum,
Tour. 439.

HABITAT ubique in arvis, & ad margines sepium.
Folia subtùs incana. Facta indigena.

AMBROSIA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 859.

Char. secund. *Rad.* subfusiformis. *Caul.* herbacea
ramosa. *Fol.* alterna petiolata simplex multi-
fida. *Flor.* feminea axillaris conferta sessilis,
mascula terminalis spicata. *Falc.* denticuli supra
capsulas.

Maritima. 1. AMBR. foliis bipinnatifidis, racemis solitariis pilosis,
Linn. sp. 988.

Ambrosia maritima. *Tour.* 439.

Ambrosia foliis tripartitis multifidis. *Sauv.* 294.

Ambrosia vulgaris. *Barr. Icon.* 1144.

L'Ambrosie.

HOSPITATUR sub dio. Caulis racemi, foliaque pu-
bescentia. Folia sæpè opposita. Racemi subsessiles.

PARTHENIUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 860.

Char. secund. *Rad.* subfusiformis tenuis. *Caul.*
herbacea teres subsimplex. *Fol.* alterna petio-
lata simplex multifida. *Flor.* terminalis panicu-
lato corymbosa. *Falc.* nulla.

Elyterophag- rui. 1. PARTH. foliis composito-multifidis. *Linn. sp.* 988.

HOSPITATUR sub dio. Facies & altitudo ambrosiæ.
Caulis striatus. Lacinia foliorum inferiores mino-
res, superiores lanceolatae incisæ acuminatae.

AMARANTHUS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 861. *L'Amaranti.*

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea
striata ramosa. *Fol.* alterna petiolata simplex

integerrima. *Flor.* terminalis vel axillaris, glomerata vel racemosa, sessilis aut petiolata. *Fulc.* nulla, (in unâ specie spinæ geminæ axillares.)

* *Triandri.*

1. AMAR. capitellis seu glomerulis triandris subrotundis *Tricolor.*
 amplexicaulibus, foliis lanceolatis acuminatis. *Linn. sp.* 989. *Lanceolato-ovatis. Syst.* 1268.
Amaranthus folio variegato femina. Tour. 236.
Amaranthus tricolore folio. Barr. Icon. 647.
L' Amarante.
 HOSPITATUR sub dio.
2. AMAR. glomerulis triandris axillaribus sessilibus, foliis lanceolatis acuminatis. *Linn. syst.* 1268. *Melancholi-*
cus.
Amaranthus capitellis triandris subrotundis sessilibus,
foliis lanceolatis sparsis. Linn. sp. 989.
Amaranthus folio obscuriore variegato seu mas. Tour.
 236.
 HOSPITATUR sub dio.
3. AMAR. glomerulis triandris axillaribus, foliis lanceolatis repandis obtusis. *Linn. syst.* 1268. *Gracilans,*
Amaranthus floribus triandris conglomeratis axillari-
bus, foliis lanceolatis obtusis. Linn. sp. 990.
 HOSPITATUR sub dio.
4. AMAR. floribus triandris erectiusculis, foliis ovatis *Blitum.*
 retusis. *Linn. syst.* 1268.
Amaranthus floribus glomeratis lateralibus, foliis ova-
tis retusis, caule diffuso. Linn. sp. 990.
Blitum sylvestre spicatum. Tour. 507.
Blitum album minus. Bot. Mons. 38.
 HABITAT in cultis & hortis.

* *Pentandri.*

5. AMAR. racemis pentandris simplicibus pendulis longissimis. *Linn. Syst.* 1269. *Candatus.*
Amaranthus maximus. Tour. 254.
L' Amarante ; vernaculè, la Cresta de Gal.
 HOSPITATUR sub dio. Altitudo humana.
6. AMAR. racemis pentandris compositis congestis nudis, spiculis conjugatis. *Linn. Syst.* 1268. *Hybridus.*

468 MONOECIA POLYANDRIA.

- . *Amaranthus* racemis pentandris cylindricis horizontalibus, caule inermi. *Linn. sp.* 990.
 . *Amaranthus* inermis, floribus lateralibus sessilibus confertis, foliis ovatis. *Sauv.* 103.
 . HOSPITATUR sub dio.
Hydrocondria. 7. AMAR. racemis pentandris compositis erectis, foliis oblongo-ovatis. *Linn. Syst.* 1269.
 . *Amaranthus* racemis pentandris cylindricis erectis, caule inermi. *Linn. sp.* 991.
 . *Amaranthus* sylvestris maximus novæ Angliæ, spicis purpureis. *Tour.* 1235.
 . HOSPITATUR sub dio. Altitudo priorum.
Spinosus. 8. AMAR. racemis pentandris, axillis spinosis. *Linn. Syst.* 1269.
 . *Amaranthus* racemis cylindricis erectis, axillis spinosis. *Linn. sp.* 991.
 . *Amaranthus* Indicus spinosus, spica herbacea. *Tour.* 236.
 . HOSPITATUR sub dio. Spinæ longiusculæ erectæ.

POLYANDRIA.

CERATOPHYLLUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 871.

Char. secund. *Rad.* articulata horizontalis stoloni-
 nifera. *Caul.* herbacea articulata ramosa. *Fol.*
 verticillata sessilis simplex dichotoma. *Flor.*
 axillaris solitaria sessilis. *Fulc.* nulla.

Demersum. 1. CERATOPH. *Linn. sp.* 992.

Ceratophyllum foliis asperis bis bifurcatis. *Sauv.* 160.
L'Hydre cornu.

HABITAT in aquis. *A Castelnau, Caunelles.* Folia sæpius sena.

MYRIOPHYLLUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 870.

Char. secund. *Rad.* articulata horizontalis stoloni-
 nifera. *Caul.* herbacea articulata ramosa. *Fol.*
 verticillata sessilis lineari-pinnata. *Flor.* verti-
 cillata axillaris sessilis aut verticillato - spicata
 terminalis pedunculata. *Fulc.* nulla.

1. MYRIOPH. floribus masculis interruptè - spicatis. *Spicatum*.
Linn. sp. 992.

Potamogeton foliis pennatis. *Tour.* 233.

Millefolium aquaticum pennatum spicatum. *Bot.*

Monf. 138.

Le Volant d'eau.

HABITAT in amne. Folia quina vel sena.

2. MYRIOPH. floribus omnibus verticillatis. Linn. sp. *Verticillatum*
992. *Sauv.* 167.

Potamogeton floſculis ad foliorum nodos. *Tour.* 233.

Millefolium aquaticum floſculis ad foliorum nodos.

Bot. Monf. 178.

HABITAT cum priori.

SAGITTARIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 869.

Char. secund. *Rad.* horizontalis fibrosa stolonifera. *Caul.* scaposa ramosa. *Fol.* radicalis petiolata simplex integerrima, basi vaginans. *Flor.* terminalis verticillato-subracemosa. *Fulc.* nulla.

1. SAGIT. foliis sagittatis acutis. Linn. sp. 993. *Sagittifolia.*

Ranunculus aquaticus folio sagittato minor. *Tour.* 292.

Sagitta aquatica minor latifolia. *Bot. Monf.* 228.

Sagittaria foliis sagittatis ligulatis. *Sauv.* 27. & 77. *Angustifolia.*

2. Sagittaria foliis sagittatis ligulatis. *Sauv.* 29. *Latifolia.*

La Flèche d'eau.

HABITAT à la Roubine, à Lattes. B. A Nîmes dans le Vistre.

THELIGONUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 864.

Char. secund. *Rad.* horizontalis stolonifera. *Caul.* teres herbaea articulata subsimplex. *Fol.* alterna petiolata simplex integerrima succulenta. *Flor.* sessilis, feminea axillaris solitaria, mascula folio & flore femineo opposita subsolitaria. *Fulc.* nulla.

1. THELIG. *Sauv.* 129. Linn. sp. 993. *Cynocrambe.*

Alfene parietariae foliis. *Bot. Monf.* 15.

Cynocrambe Dioscoridis. *Mag. ch. pl.* 150.

HABITAT in rupium fissuris. *A. Bouffigues, Frontignan*.
 Petioli ad basim dilatati semiamplexicaules auriculati. Folia in petiolum decurrentia ovata. Geniculi tumidi. Cauliculi procumbentes. Flores masculi non flores femineos oppositos sed inferiores verosimiliter fecundant. Folia interdum opposita.

P O T E R I U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 868.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* teres herbacea vel fruticulosa. *Fol.* alterna impari-pinnata: foliolis simplicibus integris. *Flor.* capitata solitaria terminalis & axillaris. *Fulcr.* stipulae geminae solutae foliaceae. Bractea ad basim floris singuli.

Sanguisorba. 1. **POTER.** inerme, caulibus subangulosis. Linn. sp. 994.
 Pimpinella sanguisorba minor hirsuta. *Bot. Mons.* 204. *Tour.* 157.

Poterium inerme filamentis longissimis. *Sauv.* 220.

La petite Pimprenelle; vernaculè, de rimprenelle.

HABITAT in arvis & incultis. Foliola petiolata incisa.

Hybridum. 2. **POTER.** caulibus teretibus strictis. Linn. sp. 994.

Poterium agrimonoides. *Sauv.* 220.

Pimpinella agrimonoides odorata. *Tour.* 157.

La Pimprenelle odorante ou musquée.

HOSPITATUR sub dio. Foliola ovalia dentata villosa, superiora majora.

Spinosum. 3. **POTER.** spinis ramosis. Linn. sp. 994.

Pimpinella spinosa seu sempervirens. *Tour.* 157.

Pimpinella spinosa. *Barr. Icon.* 631.

La Pimprenelle épineuse.

HOSPITATUR sub dio & in hybernaculo. Foliola superiora obversè-ovata, cuneiformia majora. Petioli dilatati amplexicaules seu vaginantes.

Q U E R C U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 872.

Char. secund. *Rad.* ramosa lignosa. *Caul.* arborea.

Fol. alterna simplex integerrima, integra vel incisa, sessilis aut petiolata. *Flor.* axillaris con-

ferta sessilis. *Falc.* spinulæ inermes retroflexæ
supra calyces femineos.

1. QUERCUS foliis ovato-oblongis indivisis serratisque *Ilex*,
subtus tomentosis, cortice integro. *Linn. Syst.* 1271.
Sauv. 96.
Ilex folio oblongo serrato. *Tour.* 583.
Ilex arbor. *Bot. Mons.* 141.
2. QUERCUS (*smilax*) foliis oblongo-ovatis subtus tomen-
tosis integerrimis. *Linn. sp.* 994. *Sauv.* 96.
Ilex folio angusto non serrato. *Tour.* 583.
L'Yeuve ou Chêne vert ; vernaculè , *l'Eonfé.*
HABITAT à *Valene.*
3. QUERCUS foliis oblongo - ovatis sinuato - spinosis *Gramontia*,
sessilibus subtus tomentosis, glandibus pedunculatis. *Sauv.* 96. *Linn. sp.* 995.
Ilex arbor foliis rotundioribus & spinosis. *Bot. Mons.*
141.
HABITAT à *Gramont*, *Lavalette*. Hanc superioris va-
rietatem habuerat *Gerard*. Vid. *Linn. Syst.* 1273.
quod falsum. In superiore folia petiolata.
4. QUERCUS foliis ovatis indivisis spinoso - dentatis *Coccifera*,
utrinque glabris. *Linn. sp.* 995.
Quercus foliis ovatis dentato-spinosis, glandibus sessilibus. *Sauv.* 96.
Ilex aculeata cocciglandifera. *Bot. Mons.* 140. *Tour.* 583.
Vernaculè , *lous Avaousés.*
HABITAT cum priori.
5. QUERCUS foliis deciduis oblongis supernè latiori- *Robur*,
bus, sinibus acutioribus, angulis obtusis. *Linn. sp.*
996. *Sauv.* 272.
Quercus latifolia mas quæ brevi pediculo. *Bot. Mons.*
215. *Tour.* 582.
Quercus foliis subtus tomentosis pinnato-sinuatis su-
pernè latioribus. *Sauv.* 271.
Le Chêne ; vernaculè , *lou Chainé*, *lou Rouvé.*
HABITAT juxta amnem , & à *Gramont.*
6. QUERCUS foliis oblongo-ovatis indivisis serratis sub- *Suber*,
tus tomentosis, cortice rimoso fungoso. *Linn. sp.*
995. *Sauv.* 96.
Suber latifolium perpetuovirens. *Tour.* 584.
Le Liège ; vernaculè , *lou Ciouré.*

492 MONOECIA POLYANDRIA.

HOSPITATUR sub dio. Nuper periit arbor quam propè Gramunium plantaverat Dominus Nissole.

JUGLANS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 872.

Char. secund. *Rad.* ramosa lignosa. *Caul.* arborea.

Fol. alterna impari - pinnata : foliolis sessilibus integerrimis. *Flor.* axillaris subsessilis conferta.

Fulc. stipulæ deciduæ geminæ solutæ.

Regia. 1. JUGLANS foliolis ovalibus glabris subserratis subæqualibus. Linn. sp. 997.

Nux juglans regia vulgaris. *Bot. Mons.* 187. *Tour.* 58.

Le Noyer ; vernaculè, *lou Nouguié*.

HABITAT in vineis & in ambulacris. Flores sæpè tres vel quatuor simul.

FAGUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 874.

Char. secund. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* arborea.

Fol. alterna petiolata simplex integerrima vel integra. *Flor.* axillaris sessilis conferta spicata vel capitata. *Fulc.* stipulæ geminæ deciduæ.

Spinulæ supra capsulas.

Castanea. 1. FAGUS foliis lanceolatis acuminato - serratis subtus nudis. Linn. sp. 997.

Castanea sativa. *Bot. Mons.* 55. *Tour.* 584.

Le Chataignier ; vernaculè, *lou Castanié*.

HABITAT à Lesperou, dans les Cévennes. Flores masculii spicati.

Sylvatica. 2. FAGUS foliis ovatis obsolete-serratis. Linn. sp. 998.

Fagus foliis ovatis undulatis serratis. *Sauv.* 98.

Fagus. *Tour.* 584.

Le Hêtre ou Fau ; vernaculè, *lou Faon*.

HABITAT cum priori. Foliorum margines villosi. Flores masculii glomerati.

CARPINUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 876.

Char. secund. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* fruticosa. *Fol.* alterna petiolata simplex integra.

Flor. ramea terminalis, amentis racemosis.

Fulc. stipulæ geminæ deciduæ solutæ.

1. CARP. squamis strobilorum planis. *Linn. sp.* 998. *Betulus.*

Carpinus. Bot. Monf. 50. *Tour.* 582.

Le Charme; vernaculè, *la Charmie*

HABITAT ubique. Folia duplicato-ferrata ovato-lanceolata. Squamæ strobilorum trilobæ: intermedio longiori oblongo apice ferrato.

C O R Y L U S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 875.

Char. secund. *Rad.* ramosa lignosa. *Caul.* arborea.

Fol. alterna petiolata simplex integra. *Flor.* ramea terminalis glomerata. *Fulc.* stipulæ geminæ deciduæ solutæ.

1. CORYLUS stipulis ovatis obtusis. *Linn. sp.* 998. *Avellana.*

Corylus sylvestris. Tour. 582.

Avellana sylvestris seu corylus sylvestris. Bot. Monf. 35.

Le Noisetier; vernaculè, *l'Abelanié.*

HABITAT à *Laverune*. Copiosissima à *Lamalou*. Folia duplicato-ferrata, petiolo brevissimo, ovata acuminata. Rami recti.

P L A T A N U S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 877.

Char. secund. *Rad.* ramosa lignosa. *Caul.* arborea.

Fol. alterna petiolata simplex integra. *Flor.* feminea pedunculata capitata; mascula. . . .

Fulc. stipula vaginans solitaria decidua.

1. PLATANUS foliis palmatis. *Linn. sp.* 999. *Orientalis.*

Platanus Orientalis verus. Tour. 590.

Le Platane d'Orient.

HOSPITATUR sub dio. Truncus incanus. Folia tenella subrus tomentosa.

2. PLATANUS foliis lobatis. *Linn. sp.* 999. *Occidentalis.*

Platanus Occidentalis. Tour. 590.

Le Platane d'Occident.

HOSPITATUR cum priori. Frequens in hortis.

MONADELPHIA.

PINUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 879.

Char. secund. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* arborea.
Fol. conferta sessilis simplex integerrima solitaria vel geminata. *Flor.* axillaris subsolitaria pedunculata. *Fulc.* stipula tubulosa solitaria vaginans foliorum basim, vel nulla.

* *Foliis pluribus ex eadem basi vaginali.*

Sylvestris. 1. PINUS foliis geminis, primordialibus solitariis glabris. Linn. sp. 1000. Sauv. 44.

Pinus vulgaris Genevensis. Tour. 586.

2. Pinus maritima altera. Bot. Mons. 205.

Le Pin sauvage.

HABITAT ad mare. *A Valene, au mont St. Loup, Lavalette, & vicinis.*

Pinea. 2. PINUS foliis geminis, primordialibus solitariis ciliatis. Linn. sp. 1000. Sauv. 44.

Pinus sativa. Bot. Mons. 205. Tour. 585.

Le Pin; vernaculè, lou Pin, las Pincas.

HABITAT à la Peissine, à Aiguemortes.

* *Foliis solitariis & basi distinctis.*

Picea. 3. PINUS foliis solitariis emarginatis. Linn. sp. 1001.
 Abies taxi folio, fructu sursum spectante. Tour. 585.
 Seg. 2. pag. 254.

Le Sapin; vernaculè, lou Sapin.

HOSPITATUR sub dio.

Abies. 4. PINUS foliis subulatis mucronatis lævibus bifariam versis. Linn. sp. 1001.

Abies tenuiori folio, fructu deorsum inflexo. Tour. 585. Seg. 2. p. 254.

Le faux Sapin.

HOSPITATUR sub dio.

THUJA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 882.

Char. secund. *Rad.* ramosa lignosa. *Caul.* fruti-

MONOECIA MONADELPHIA. 499

cosa. *Fol.* imbricata conferta integerrima. *Flor.*
. . . Fulc. . .

1. THUJA strobilis squarrosis, squamis acuminatis re- *Orientalis.*
flexis. Linn. sp. 1002.

L'Arbre de vie Oriental.

HOSPITATUR in caldario. Folia seminalia bina lanceolata. Folia radicalia quaterna verticillata subulata decidua; deinde bina opposita etiam decidua. Caulina verò persistentia ovata imbricata.

CUPRESSUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 881.

Char. secund. *Rad.* ramosa lignosa. *Caul.* arborea.
Fol. imbricata opposita conferta integerrima.
Flor. sparsa sessilis subsolitaria. *Fulc.* nulla.

1. CUPRESSUS foliis imbricatis, frondibus quadrangulis. *Linn. sp. 1002.*

Cupressus. Bot. Monsf. 81.

Cupressus meta in fastigium convoluta (*femina*) *Tour. Femina.*
587.

2. *Cupressus* ramos extra se expargens (*mas*) *Tour. 587. Mas.*
Le Cypres; vernaculè, lou Cipré.

HABITAT à Lavalette, Castelnau, la Peissine, &c.

CROTON.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 866.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea
ramosa. *Fol.* alterna petiolata simplex integra.
Fol. axillaris pedunculata conferta. *Fulc.* nulla.

1. CROTON foliis rhombeis repandis, capsulis pendulis, caule herbaceo. *Linn. sp. 1004.*

Heliotropium tricoccum. Bot. Monsf. 126.

Croton foliis ovatis plicatis scabris, capsulis pendulis, pedunculis ramosis. *Sauv. 305.*

Ricinoides ex quo paratur tournesol Gallorum. *Tour.*
655.

Le Tournesol; vernaculè, lou Tournesol.

HABITAT in arvis & incultis circa urbem. Folia longè petiolata sinuata. Rami & folia tenella pulverulenta.

RICINUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 883.

Char. secund. *Rad.* fusiformis subsimplex. *Caul.* herbacea ramosa teres fistulosa. *Fol.* alterna peltata simplex palmata petiolata: petiolis fistulosis. *Flor.* terminalis racemosa. *Fulc.* glandulæ petiolares. Spinulæ flexiles supra capsulas.

Vulgaris. 1. RICINUS foliis peltatis subpalmatis serratis. Linn. *Syst.* 1276.

Ricinus. Linn. *sp.* 1007. *Tour.* 532.

Le Ricin.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo humana. Caulis rubens glaber. Foliorum laciniae acuminatae serratae. Petioli longissimi. Glandulæ sæpius tres supra petiolum quemlibet, quarum duæ ad basim, altera verò ad apicem petioli. Calyx masculus fernineo multo major. Tota planta (exceptis radicibus fructibusque) fistulosa.

SYNGENESIA.

MOMORDICA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 885.

Char. secund. *Rad.* fusiformis subsimplex. *Caul.* herbacea ramosa procumbens aut volubilis. *Fol.* alterna petiolata simplex integerrima aut inciso-pinnatifida. *Flor.* axillaris petiolata: petiolis uni vel multifloris. *Fulc.* Bractea ad basim floris singuli. (In quibusdam cirrhi axillares ad latera pedunculorum: in aliis spinulæ inermes supra capsulas.)

Balsamina. 1. MOMORD. pomis angulatis tuberculatis, foliis glabris patenti-palmatis. Linn. *sp.* 1009.

Momordica vulgaris. *Tour.* 103.

La Pomme de Merveille.

HOSPITATUR sub dio. Pedunculi uniflori. Bractea in medio pedunculorum cordata sessilis amplexans pedunculum. Cirrhi simplices.

Luffa. 2. MOMORD. pomis oblongis, sulcis catenulatis, foliis incis. Linn. *sp.* 1009. Luffa

Luffa Arabum. *Prof. Alp.* de plantis Ægypti.

HOSPITATUR sub dio. Cirrhi ad apicem ramosi.

3. MOMORD. pomis hispids, cirrhis nullis. *Linn. sp. Elaterium;*
1010.

Cucumis sylvestris asininus dictus. *Bot. Mons.* 81.
Tour. 104.

Le Concombre d'âne; vernaculè *lou Concombré d'asé.*

HABITAT ad margines satorum. Circa Urbem: folia
cordato-angulata subtus villosa. Petiolis hispids.
Bractææ subulatæ.

CUCURBITA,

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 887.

Char. secund. *Rad.* fusiformis subsimplex. *Caul.*
herbacea volubilis ramosa. *Fol.* alterna petio-
lata simplex integra vel incisa. *Flor.* axillaris
pedunculata solitaria. *Falc.* cirrhus laterifolius.
(Glandulæ in quibusdam epiphyllæ.)

1. CUCURB. foliis subangulatis cordatis tomentosis *Lagenaria*
basi subtus biglandulosis. *Linn. sp.* 1010. Pomis
lignosis.

Cucurbita feminibus obsoletè bicornibus. *Sauv.* 112.

Cucurbita lagenaria. *Tour.* 107.

La Calabasse ou Courge de Pelerin; vernaculè *la Gourda.*

HOSPITATUR sub dio. Pedunculi longissimi stricti.

2. CUCURB. foliis lobatis, pomis lævibus. *Linn. sp. Pepo.*
1010.

Cucurbita feminum margine integro tumido. *Sauv.*
112.

Pepo oblongus. *Tour.* 105.

La Courge de Saint Jean.

HABITAT in hortis.

3. CUCURB. foliis lobatis, caule erecto, pomis depres- *Melopepo.*
so-nodosi. *Linn. sp.* 1010.

Melopepo clypeiformis. *Lob.* 642. *Tour.* 106.

Le Bonnet d'Electeur; vernaculè *lou Pastissou.*

HABITAT cum oleribus. Folia ad margines denticulata,
cordato-angulata.

4. CUCURB. foliis lobato-pinnatifidis; lobis obtusis. *Citrullus.*
Cucurbita foliis multipartitis. *Linn. sp.* 1010. *Sauv.*
198.

Anguria citrullus dicta. Tour. 106.

La Citrouille; vernaculè la Citrouia ou pastequa.

HABITAT cum prioribus.

CUCUMIS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 886.

Char. secund. *Rad.* fusiformis subsimplex. *Caul.* herbacea ramosa flexuosa. *Fol.* alterna petiolata simplex integra vel incisa. *Flor.* axillaris solitaria pedunculata. *Fulc.* cirrhus laterifolius.

Colocynthis. 1. CUCUMIS foliis multifidis, pomis globosis glabris. *Linn. sp. 1011.*

Colocynthus fructu rotundo major. Tour. 107.

La Coloquinte ordinaire.

HOSPITATUR sub dio.

Anguria. 2. CUCUMIS foliis palmato-sinuatis, pomis subovatis echinatis. *Linn. sp. 1011.*

Anguria Americana fructu echinato eduli. Tour. 107.

HOSPITATUR sub dio.

Melo. 3. CUCUMIS foliorum angulis rotundatis, pomis torulosis. *Linn. sp. 1011.*

Melo vulgaris. Tour. 104.

Le Melon; vernaculè le Meloun.

HOSPITATUR sub dio.

Sativus. 4. CUCUMIS foliorum angulis rectis, pomis oblongis scabris. *Linn. sp. 1011.*

Cucumis sativus vulgaris. Tour. 104.

Le Concombre; vernaculè le coucoumbres.

HOSPITATUR cum prioribus.

BRYONIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 889.

Char. secund. *Rad.* fusiformis. *Caul.* herbacea volubilis *Fol.* alterna petiolata simplex multifida. *Flor.* axillaris pedunculata; pedunculis multifloris. *Fulc.* cirrhus subaxillaris nisi laterifolium mavis.

Alba. 1. BRYON. foliis palmatis utrinque calloso-scabris. *Linn. sp. 1012.*

Bryonia alba baccis nigris. Tour. 103. Bot. Mons. 39.

La Bryoyne, Bryone ou Couleuvrée.

HABITAT à Castelnau, Lamousson. Folia cordato-palmata.

2. BRYON. foliis palmatis scabris : laciniis lanceolatis *Laciniosa*, serratis, lateralibus minimis. *Linn. sp. 1013.*

Bryonia zeylanica foliis in profundas lacinias divisis. *Tour. 103.*

HOSPITATUR sub dio. Folia subsessilia, laciniæ sæpius pinnatifidæ.

GYNANDRIA.

ANDRACHNE.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 862.*

Char. secund. *Rad.* tenuis simplex. *Caul.* herbacea procumbens teres ramosa. *Fol.* alterna secunda petiolata simplex integerrima. *Flor.* axillaris pedunculata solitaria. *Fulc.* stipulæ minimæ solutæ geminæ.

1. ANDRAC. procumbens herbacea. *Linn. sp. 1014. Telephioides.*
Telephioides græcum humifusum, flore albo. *Tour. Cor. 50.*

Andrachne pinnata, Sauv. 227.

HOSPITATUR sub dio. Folia ovata. Pedunculi superne incrassati petiolis longiores. Calyces capsulis subæquales persistentes.



Classis XXII.

DIOECIA
MONANDRIA.

NAJAS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 843.

Char. secund. *Rad.* horizontalis articulata. *Caul.* herbacea teres ramosa. *Fol.* opposita sessilis subconnata simplex integra. *Flor.* axillaris solitaria pedunculata. *Fulc.* aculei in caule sparsi.*Marina.* 1. NAJAS. Linn. sp. 1015. Sauv. 159. & 124.*La Nayade.*HABITAT in stagnis & in amne. Folia linearia sinuato-dentata, terna vel quaterna, sæpissimè bina. Pedunculi brevissimi. *A Semalen, & à Salicate.*

DIANDRIA.

SALIX.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 892.

Char. secund. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* fruticosa arborea. *Fol.* alterna petiolata simplex integerrima vel integra. *Flor.* ramea terminalis pedunculata: amentis subfolitariis cylindricis. *Fulc.* in quibusdam stipulæ solutæ geminæ, in aliis glandulæ suprâ petiolos vel ad margines foliorum.* *Foliis glabris ferratis.**Virellina.* 1. SALIX foliis ferratis ovatis acutis glabris: ferraturis cartilagineis, petiolis calloso-punctatis. Linn. sp. 1016.

Salix lento vimine & squama florali flavis, foliis elliptico-lanceolatis. Sauv. 58.

Salix sativa lutea, folio crenato. Tour. 590.

L'Ozier; vernaculè *l'Amarinié*, *las Amarinas*.

HABITAT à *Saint Guillin le Désert*, à *Lesperou*.

2. SALIX foliis ferratis glabris lanceolatis petiolatis, *Amygdalina*, stipulis trapæzi-formibus. *Linn. sp. 1016.*

Salix foliis glabris acutè ferratis, &c. Sauv. 172.

Salix folio amygdalino utrinque virente aurito. Tour.

591.

HABITAT à *Valmagne & vicinis*.

3. SALIX foliis integerrimis lanceolato-linearibus sessilibus strictis subtus tomentosis. *Linn. sp. 1020.* *Rorismarinifolia.*

Salix humilis angustifolia. Tour. 590.

HABITAT à *Lesperou*. Folia biuncialia.

4. SALIX foliis ferratis glabris ovato-lanceolatis, petiolis *Fragilis*, dentato-glandulosis. *Linn. sp. 1017.*

Salix foliis ferratis glabris lanceolatis acuminatis appendiculatis. Sauv. 172.

HABITAT à *Lespinouse pres de Saint Pont*.

* *Foliis subserratis villosis.*

5. SALIX foliis ovatis rugosis: subtus tomentosis undatis supernè denticulatis. *Linn. sp. 1020.* *Caprea.*

Salix latifolia infernè hirsuta. Bot. Mons. 228.

Salix latifolia rotunda. Tour. 591.

Salix foliis ovatis rugosis, subtus tomentosis, supernè dentatis. Sauv. 98.

Salix foliis obscure crenatis utrinque villosis ovato-oblongis. Sauv. 98.

Le Saule marceau.

HABITAT à *Castelnau, Salason, Selleneuve*.

6. SALIX foliis subintegerrimis lanceolato-linearibus *Viminalis*, longissimis acutis subtus sericeis, ramis virgatis. *Linn. sp. 1021.*

Salix oblongo incano acuto folio. Barb. Pin. 474.

Salix angustis & longissimis foliis crispis subtus albicantibus. Bot. Mons. 228.

Salix foliis lanceolato-linearibus subtus incanis sericeis supernè glabris. Sauv. 58.

HABITAT à *Selleneuve, Caunelles, Villeneuve*.

7. SALIX foliis lanceolatis acuminatis ferratis utrinque *Alba*, pubescentibus: ferraturis infimis glandulosis. *Linn. sp. 1021.*

Salix vulgaris alba arborescens. Tour. 591.

Salix alba pecticalis vulgaris. Bot. Mons. 228.

Le Saule; vernaculè lou Saoufé.

HABITAT juxtà rivulos circa Urbem.

TRIANDRIA.

OSYRIS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 893.

Char. secund. *Rad.* lignota ramosa. *Caul.* fruticosa teres striata. *Fol.* sessilis alterna simplex integerrima. *Flor.* ramica terminalis conferta pedunculata subracemosa. *Fulc.* nulla.

Alba. 1. **OSYRIS.** Linn. sp. 1022. *Sauv.* 56.

Casia poëtica Monspelensum. Bot. Mons. 54. Tour. 664.

Vernaculè lou rouvé.

HABITAT à Castelnau, Lavalette. Foliorum nervi decurrunt in caulem.

TETRANDRIA.

VISCUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 895.

Char. secund. *Rad.* nulla. *Caul.* dichotoma parafitica articulata teres suffruticosa. *Fol.* opposita sessilis simplex integerrima. *Flor.* axillaris spicata solitaria sessilis. *Fulc.* nulla.

Album. 1. **VISCUM** foliis lanceolatis obtusis, caule dichotomo, spicis axillaribus. Linn. sp. 1023. *Sauv.* 125.

Vilcum Baccis albis. Tour. 609.

La Gey de chéne.

HABITAT à Lamalou. Folia crassa.

PISTACIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 898.

Char. secund. *Rad.* ramosa lignosa. *Caul.* arborea. *Fol.* alterna petiolata impari vel abruptè-pinnata; foliolis simplicibus petiolatis. *Flor.* axillaris sessilis vel petiolata, amentis cylindricis simplicibus vel ramosis. *Fulc.* nulla.

1. PIST. foliis subternatis. *Linn. sp. 1025. Sauv. 219. Trifolia.*
Terebinthus seu pistacia trifolia. *Tour. 580.*
HOSPITATUR sub dio.
2. PIST. foliis ternatis pinnatisque suborbicularis. *Linn. Narbonensis.*
sp. 1025.
Pistacia foliis sæpius quinaris orbiculatis. *Sauv. 219.*
Terebinthus peregrina fructu majore pistacus similis
eduli. *Tour. 579.*
Terebinthus major pistaciæ folio. *Bot. Mons. 249.*
HABITAT au bois de Valene.
3. PIST. foliis impari-pinnatis : foliolis subovatis recur- *Verna*
vis. *Linn. sp. 1025.*
Terebinthus indica Theophrasti seu pistacia Dioscori-
dis. *Tour. 380.*
Le Pistachier ou Pistacier ; vernaculè lou Pistachié.
HOSPITATUR sub dio. Pedunculi ramosi. Fructus
maturat.
4. PIST. foliis impari-pinnatis : foliolis ovato-lanceola- *Terebinthus*
tis. *Linn. sp. 1025. Sauv. 219.*
Terebinthus vulgaris. *Bot. Mons. 248. Tour. 579.*
Le Terebinthe ou Terebinte ; vernaculè lou Pudis, lou
Terebinta.
HABITAT à Gramont, Castelnau, Lavalette, &c. Pe-
dunculi ramosi. Foliola vel integerrima vel serrata.
5. PIST. foliis abruptè-pinnatis. *Linn. sp. 1026. Sauv. Lentiscus.*
219. Foliis lanceolatis.
Lentiscus vulgaris. *Bot. Mons. 153. Tour. 580.*
Le Lentisque ; vernaculè lou restenle.
HABITAT circa Urbem & cum priori. Amenta ge-
minata sessilia brevia divergentia compacta. Foliola
sæpius utrinque 6. vel 5. integerrima. Petioli mar-
ginati.

CERATONIA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 899.*

Char. secund. *Rad. lignosa ramosa. Caul. fruti-*
cosa. Fol. alterna abruptè pinnata : foliolis
integerrimis subsessilibus. Flor. axillaris race-
mota solitaria sessilis. Fulc. nulla.

1. CERATONIA. *Linn. sp. 1026. Sauv. 219.* *Siliqua.*
Siliqua edulis. *Tour. 578.*

Le Couroubier ou Caroubier; vernaculè *las Couroubias*.
 HOSPITATUR in hybernaculo. Foliola suborbiculata
 vel obcordata integerrima sinuata quinquejuga,
 superiora majora; cæteris decreſcentibus. Calyces
 mâſculi pedunculati, feminei ſeſſiles.

S P I N A C I A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 900.

Char. ſecund. *Rad.* fuſiformis. *Caul.* herbacea
 ramaſa. *Fol.* alterna petiolata ſimplex integra.
Flor. ſubſpicata terminalis & axillaris. *Fulc.*
 nulla.

- Cracca.* 1. SPINACIA. Linn. ſp. 1027. *Sauv.* 273.
 Spina ia mas. *Tour.* 533. & femina. *Ibid.*
Les Fpinards; vernaculè *tous Eſpinars*.
 HABITAT in cultis.

C A N N A B I S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 901.

Char. ſecund. *Rad.* fuſiformis. *Caul.* herbacea
 ſtriata ramaſa. *Fol.* Alterna petiolata digitata;
 foliolis quinis integris. *Flor.* axillaris & termi-
 nalis, feminea glomerata; mâſcula ſubracemoſa.
Fulcr. nulla.

- Sativa.* 1. CANNABIS. Linn. ſp. 1027. *Sauv.* 172.
 Cannabis mas. *Bot. Monſ.* 47. *Tour.* 535.
 Cannabis femina. *Bot. Monſ.* 48. *Tour.* 535.
Le Chanvre; vernaculè *lou Canbé*.

HOSPITATUR ſub dio. Occurrit ſæpè à la Font Pu-
 tanella, au Verdunſan. In mare, foliola lanceolata
 dentata, inferioribus duobus integerrimis minimis.
 In femina foliola omnia anguſtiora dentata.

H U M U L U S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 902.

Char. ſecund. *Rad.* horizontalis ramaſa ſtoloni-
 fera. *Caul.* angulata herbacea volubilis. *Fol.*
 oppoſita petiolata ſimplex integra. *Flor.* oppo-
 ſita pedunculata axillaris glomerata ſubſtrobi-
 lifera. *Fulc.* ſtipulæ oppoſitæ interfoliacæ. Spi-
 nulæ in caule & petiolis.

1. HUMULUS. *Linn. sp. 1028. Sauv. 196.* *Lupulus.*
Lupulus mas & femina. Bot. Monf. 167. Tour. 535.
Le Houblon, vernaculè, l'Oubloun.
 HABITAT juxta amnem. Folia cordata vel triloba serrata. Stipulae emarginatae. Pedunculi petiolarum aequales. Squamae seu strobilorum foliola ovata.

HEXANDRIA.

TAMUS.

- Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 905.*
 Char. secund. *Rad. fusiformis subsimplex. Caul.*
herbacea teres ramosa volubilis. Fol. alterna
petiolata simplex integerrima. Flor. racemosa
terminalis & axillaris. Falc. nulla.
 1. TAMUS. *Linn. sp. 1028. Sauv. 113.* *Communis.*
Bryonica laevis sive nigra racemosa. Bot. Monf. 39.
Tamus racemosa flore minore luteo pallescente. Tour.
103.
Le Sceau de la Vierge.
 HABITAT à Rouquet, les Mateles, & vicinis. Folia longè petiolata cordata, interdum acuminata vel emarginata. Flores etiam axillares solitarii.

SMILAX.

- Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 904.*
 Char. secund. *Rad. ramosa stolonifera. Caul. her-*
bacea rigida striata volubilis infraeto-flexuosa.
Fol. alterna petiolata simplex integerrima. Flor.
axillaris glomerato-spicata, glomerulis juxta
pedunculum sessilibus. Falc. cirrhi gemini pe-
tiolares divergentes. Aculei in caule sparsi & ad
margines nervosque foliorum.
 1. SMILAX caule aculeato angulato, foliis dentato-aculeatis cordatis. *Linn. sp. 1028. Novemnerviis.* *Aspera.*
Smilax aspera rutilo fructu. Bot. Monf. 242.
Smilax aspera fructu rubente. Tour. 654.
 HABITAT ad margines sepium. Petioli breves. Cirrhi ad basim petiolorum.

OCTANDRIA.

POPULUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 909.

Char. secund. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* arbo-
rea. *Fol.* alterna petiolata simplex integra. *Flor.*
ramea pedunculata, pedunculis ramosis. *Fulc.*
nulla, (glandulæ quandoque ad basim foliorum.)

Alba, 1. POPUL. foliis subrotundis dentato-angulatis, subtus
tomentosis. Linn. sp. 1034. Sauv. 198.

Populus alba. Bot. Monf. 212. Tour. 598.

Le Peuplier blanc; vernaculè, l'*Aouba*.

HABITAT juxta amnem. Folia interdum lobata.

Nigra, 2. POPUL. foliis deltoidibus acuminatis serratis. Linn.
sp. 1034. Sauv. 99.

Populus nigra. Bot. Monf. 212. Tour. 591.

Le Peuplier noir; vernaculè, l'*ou Pibon*.

HABITAT cum priori.

RHODIOLA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 934.

Char. secund. *Rad.* subfusiformis. *Caul.* herbacea
simplex succulenta. *Fol.* sparsa sessilis simplex
integra succulenta. *Flor.* terminalis fastigiata.
Fulc. nulla.

Rosea, 1. RHODIOLA. Linn. sp. 1035. Sauv. 77. & 116.

Anacampteros radice rosam spirante major. Tour. 264.
Seg. Tom. II. p. 356.

Radix rhodia. Lob. Icon. 391.

HOSPITATUR sub dio. Folia ad apicem serrata ovato-
lanceolata.

ENNEANDRIA.

MERCURIALIS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 910.

Char. secund. *Rad.* fusiformis vel ramosa. *Caul.*
articulata herbacea vel fruticulosa, simplex vel
ramosa. *Fol.* opposita simplex integerrima vel

integra, sessilis aut petiolata. *Flor.* opposita axillaris, mascula pedunculata glomerato-spicata, feminea subsessilis subgeminata. *Fulc.* stipulæ geminæ solutæ.

1. MERCUR. caule simplicissimo, foliis scabris. *Linn. Perennis.*
sp. 1035.

Mercurialis montana spicata. *Bot. Monsf.* 176. *Tour.*
 534.

Mercurialis montana testiculata. *Tour.* 534.

La Mercuriale de montagne.

HABITAT *au Capouladou, Villemagne.* Luxuriat in labyrintho horti regii. Folia lanceolata ferrata. Stipulæ minux. Spicæ masculæ longitudine foliorum.

2. MERCUR. caule brachiato, foliis glabris. *Linn. sp. Annua.*
 1035.

Mercurialis testiculata seu mas. *Bot. Monsf.* 176. *Tour.*
 534.

Mercurialis spicata seu femina. *Bot. Monsf.* 176. *Tour.*
 534.

La Mercuriale mâle & femelle, ou la Foirelle; vernaculè, Cagaréla.

HABITAT *in arvis.* Folia ovata serrata. Flores feminei sessiles.

3. MERCUR. caule suffruticoso, foliis tomentosis sessilibus integerrimis. *Linn. sp.* 1035. *Tomentosa.*

Mercurialis fruticosa incana spicata. *Tour.* 534.

Phyllon testiculatum. *Bot. Monsf.* 203.

Mercurialis fruticosa incana testiculata. *Tour.* 534.

Phyllon spicatum. *Bot. Monsf.* 203.

HABITAT *à Gramont, Castelnau.* Folia ovata. Flores glomerati, masculi in apice pedunculorum. Pedunculi foliis longiores, flores feminei subternati, alto pedunculato.

HYDROCHARIS.

Char. prim. vid. *Linn. gen. pl.* 911.

Char. secund. *Rad.* funiculiformis repens stolonifera. *Caul.* scaposa triflora. *Fol.* radicalis petiolata simplex integerrima. *Flor.* axillaris solitaria. *Fulc.* stipulæ geminæ adnatæ scapum vaginantes.

Morsus rana. 1. HYDROCHARIS. Linn. sp. 1036. Sauv. 29.
Nymphæa alba minor. Bot. Monf. 188. & minima.
Ibid.

HABITAT in aquis, à Lattes, à la Roubine. Folia suborbiculata. Scapi plures, singuli ex alâ cujuslibet folii.

DECANDRIA.

SCHINUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 991. (Classe tantum mutandum genus proposita specie tenuis.)

Char. secund. Rad. lignosa ramosa. Caul. arborea, Fol. alterna impari-pinnata. Flor. terminalis paniculato racemosa. Fulc. nulla.

Molle. 1. SCHINUS foliis pinnatis, foliolis serratis, impari longissimo, petiolo æquali. Linn. sp. 388. *Decandria Monogynia.*

Molle Clusii. Tour. 661.

Le Poivrier du Pérou.

HOSPITATUR sub dio. Florens. Marem tantum in horto regio vidimus. Flores sæpè polyandri. Corollæ minimæ albæ. Rudimentum pistilli in quolibet flore.

CORIARIA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 458.

Char. secund. Rad. lignosa ramosa. Caul. fruticosa. Fol. opposita sessilis simplex integerrima. Flor. ramea terminalis racemosa. Fulc. bractea ad basim floris singuli.

Myrtifolia. 1. CORIARIA foliis ovato-oblongis trinerviis. Linn. sp. 1037. Sauv. 151.

Rhus myrtifolia Monspeliensium. Bot. Monf. 222.

Vernaculè, *lou Rédou.*

HABITAT ad margines sepium, à Castelnau, Boutonnet, Lattes, &c. Bractææ ovatæ. Racemi laxi.

DATISCA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 1072.

Char. secund. Rad. ramosa, Caul. herbacea ra-

DIOECIA MONADELPHIA. 509

mosa *Fol.* alterna petiolata impari-pinnata.
Fior. axillaris & terminalis, racemosa. *Fulc.*
bractæ floribus interjectæ.

1. DATISCA caule lævi. *Linn. sp.* 1037.
 Cannabina cretica florifera. *Tour. for.* 52.

Cannabina.

La Cannabine, ou faux Chanvre.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo humana. Foliola lanceolata ad basin serrata, acuminata. Floret absque fructu.

MONADELPHIA.

JUNIPERUS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 917.

Char. secund. *Rad.* lignosa ramosa *Caul.* fruticosa. *Fol.* simplex sessilis integerrima, nunc opposita patens vel imbricata, nunc terna. *Fior.* axillaris sessilis glomerata. *Fulcr.* nulla.

1. JUNIP. foliis ternis patentibus mucronatis, bacca *Oxycedrum* brevioribus. *Linn. syst.* 1297.

Juniperus foliis quaternis patentibus subulatis mucronatis. *Linn. sp.* 1038.

Juniperus major bacca rufescente. *Bot. Monsf.* 228. *Tour.* 589.

Juniperus foliis ternis patentibus pungentibus. *Sauv.* 169.

Le Cade; vernaculè, lou Cade.

HABITAT à Valene, Caravattes, Viols.

2. JUNIP. foliis ternis oblitteratis imbricatis obtusis. *Linn. Phænicea* *sp.* 1040. *Syst.* 1297. *Sauv.* 169.

Sabina major Montpelienfium. *Bot. Monsf.* 228.

Cedrus folio cupressi major fructu flavescente. *Bot. Monsf.* 56. *Tour.* 538.

L'Oxycedre.

HABITAT à Cette, vers Meze; & cum priori.

3. JUNIP. foliis ternis undique imbricatis obrutis ovatis. *Lycia* *Linn. sp.* 1039.

Cedrus folio cupressi media majoribus baccis. *Tour.* 588.

HABITAT à Lamatou, Villemagne.

Sabina. 4. JUNIP. foliis oppositis erectis decurrentibus opposi-
tionibus pyxidatis. *Linn. sp.* 1039.

Juniperus foliis infernè adnatis, oppositionibus conca-
tenatis. Sauv. 169.

Le Savinier, la Sabine; vernaculè, la Sabina.

HABITAT à *Alais*, & vicinis.

Communis. 5. JUNIP. foliis ternis patentibus mucronatis, bacca
longioribus. *Linn. sp.* 1040.

Juniperus vulgaris fruticosa. Bor. Monf. 145. *Tour.* 588.

6. *Juniperus vulgaris arbor. Tour.* 588.

7. *Juniperus montana folio latiore, fructu longiore. Tour.*
588.

Le Genievre; vernaculè, leu Géniebré.

HABITAT à *Montferrier, Laverunc*, & cum priori.

T A X U S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 918.

Char. secund. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* arborea.

Fol. alterna conferta subsessilis simplex integer-

rima. *Flor.* axillaris secunda solitaria sessilis.

Fule. nulla.

Baccata. 1. TAXUS foliis approximatis. *Linn. sp.* 1040.

Taxus foliis pinnatis. Sauv. 220. *Tour.* 589.

L'If; vernaculè, l'If.

HOSPITATUR sub dio. Sempervirens, fructus maturans.

Folia linearia.

E P H E D R A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 1040.

Char. secund. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* fruticosa

teres articulata. *Fol.* nulla. *Flor.* pedunculata so-

litaria opposita axillaris. *Fule.* stipulæ connatæ

vaginantes, ad quemlibet articulum è quarum

alis prodeunt pedunculi.

Distachia. 1. EPHEDRA pedunculis oppositis, amentis geminis

Linn. sp. 1040.

Ephedra marina minor. Tour. 663.

Polygonum bacciferum maritimum minus. Bor. Monf.
208.

Polygonum fruticans. Barr. Icon. 731.

Le Rasin de mer.

HABITAT ad mare. Ramis, pedunculis, stipulisque
oppositis.

SYNGENESIA.

RUSCUS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 920.

Char. secund. *Rad.* ramosa lignosa. *Caul.* fruticulosa vel fruticosa. *Fol.* alterna sessilis simplex integerrima. *Flor.* nunc solitaria sessilis epiphylla vel hypophylla, nunc ramea terminalis racemosa. *Fulc.* stipula solitaria ad basim folii cujuslibet, (in una specie spinula ad apicem foliorum, in altera bractea ad quemlibet florem.)

1. RUSCUS foliis supra floriferis nudis. Linn. sp. 1041. *Aculeatus*.
Ruscus. Bot. Monf. 226. *Barr. Icon.* 517.
Ruscus myrtifolius aculeatus. Tour. 79.
Ruscus folus nudis supinè floriferis. Sauv. 94.
Le Houx frêlon; vernaculè, ton Berbouisset.
 HABITAT à Castelnau, la Peissine, &c. Sepes horridas constituens. Rami sæpius terni, quaterni verticillati. Folia spinula terminantur.
2. RUSCUS foliis subtus floriferis nudis. Linn. sp. 1041. *Hypophyllum*.
Ruscus latifolius fructu folio innascente. Tour. 79.
Ruscus latifolius foliis nudis pronè floriferis. Sauv. 94.
Ruscus Alexandrina vera. Barr. Icon. 250.
Le Laurier Alexandrin.
 HOSPITATUR sub dio.
3. RUSCUS foliis subtus floriferis sub foliolo. Linn. sp. 1041. *Hypoglossum*.
Sauv. 94.
Ruscus angustifolius fructu folio innascente. Tour. 79.
Hypoglossum seu bisl'ngua. Barr. Icon. 249.
 HOSPITATUR sub dio. Folia ovata. Bractea lanceolata flores sæpius quinque fovens. Variat foliis oppositis.
4. RUSCUS racemo terminali hermaphrodito. Linn. sp. 1041. *Racemosus*.
Ruscus angustifolius fructu lammis ramulis innascente. Tour. 79.
Le Houx en grappe.
 HOSPITATUR sub dio. Folia ovato-lanceolata. Racemi subseptemflori.

Classis XXIII.

POLYGAMIA
MONOECIA.

C E L T I S.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 924.

Char. secund. Rad. lignosa ramosa. Caul. arbo-
rea. Fol. alterna petiolata simplex integra. Flor.
axillaris solitaria pedunculata. Fulc. nulla.

- Australis.* 1. CELTIS foliis obliquè ovatis ferratis acuminatis.
Celtis foliis ovato - lanceolatis. Sauv. 60. Linn.
sp. 1043.
Celtis fructu nigricante. Tour. 612.
Lotus arbor. Bot. Mons. 167.
Le Micocoulier; vernaculè, lou Micacoulié.
HABITAT à Gramont, Lavanet, Castelnau. Foliorum
lobus superior latior.

V E R A T R U M.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 923.

Char. secund. Rad. subtuberosa. Caul. herbacea
simplex. Fol. alterna sessilis simplex integerrima
subvaginans. Flor. terminalis ramoso-racemosa.
Fulc. bractea ad basim floris singuli.

- Album.* 1. VERAT. racemo supra decomposito, corollis erectis.
Linn. sp. 1044.
Veratrum flore subviridi. Tour. 273.
Veratrum. Sauv. 107.
L'Hellebore blanc; vernaculè, lou Varairé.
HABITAT à Lesperou, la Louzere. Folia ovata.

A N D R O P O G O N.

Char. prim. Vid. Linn. Syst. pl. 1014.

Char. secund. Rad. fibrosa. Caul. culmosa aricu-
lata. Fol. alterna (graminea) vaginans simplex
integerrima.

POLYGAMIA MONOECIA. 513

integerrima. *Flor.* terminalis paniculata vel spicato-digitata. *Fulcr.* nulla.

1. ANDROP. paniculæ pedunculis simplicissimis trifloris, flosculo hermaphrodito aristato ciliato basi barbato. *Linn. Syst.* 1304. *Gryllas*.
Gramen sparteum festuceum seu ægylops spartea villosa. *Barr. Icon.* 18. fig. 1.
Ægylops bromoides juba purpurascens. *Scheuc.* 267. *tab. VI. fig. 1. A. B.*
Gramen avenaceum locustis purpurascens longissimis pediculis donatis. *Seg. rom. l. p.* 355.
HABITAT à Gramont, Montferrier.
2. ANDROP. spicis digitatis plurimis, flosculis sessilibus: aristato muticoque, pedicellis lanatis. *Linn. sp.* 1047. *Ischamum*.
Gramen dactylon spicis villosis. *Bot. Mons.* 114. *Tour.* 520.
Ischamum spicis villosis. *Sauv.* 34.
Le Pied de poule.
HABITAT in saxosis circa Gramont, Lacolombiere, Lavalette, Castelnau, Salason. Altitudo sesquipedalis. Spiculæ purpurascens. Aristæ glumis triplo longiores. Spiculæ ternæ, quaternæ.

H O L C U S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 1047.

Char. secund. Rad. fibrosa. Caul. culmosa articulata plena. Fol. alterna (graminea) vaginans simplex integerrima. *Flor.* terminalis paniculata. *Fulcr.* nulla.

1. HOLCUS glumis villosis, feminibus aristatis. *Linn. Sorghum.* *sp.* 1047.
Milium arundinaceum subrotundo semine, sorgho nominatum. *Tour.* 514.
Milium . . . albo & plano semine. *Tour.* 514.
Le Miller d'Inde.
HOSPITATUR sub dio. Altitudinem humanam superat. Aristæ longæ. Panicula ramosissima pedalis.
2. HOLCUS glumis glabris, floribus hermaphroditis *Halapensis*, muticis, femineo aristato. *Linn. sp.* 1047.
Gramen arundinaceum paniculatum, locustis partim

514 POLYGAMIA MONOECIA.

muticis, partim aristatis. *Scheuc. 509. tab. XI. fig. 12. 13. 14. & 15.*

HOSPITATUR sub dio. Altitudo tripedalis. Panicula patens palmaris purpurascens.

- Lanatus.* 3. **HOLCUS** glumis villosis bifloris: hermaphrodito mutico: masculo arista recurva. *Linn. sp. 1048.*
Aira flosculo masculo aristato, femineo mutico. *Sauv. 309.*

Gramen pratense paniculatum molle. *Bot. Monsf. 112. Tour. 522.*

HABITAT-juxta amnem & agrorum margines. Panicula triuncialis viridis.

- Odoratus.* 4. **HOLCUS** glumis trifloris muticis glabris: hermaphrodito diandro. *Linn. sp. 1048.*
Aira foliis planis, floribus trifloris aristatis, flosculo intermedio mutico diandro. *Sauv. 36.*

Gramen paniculatum odoratum. *Scheuc. 236. tab. IV. fig. 26.*

HABITAT au mont St. Loup, Valene. Panicula nutans atro-purpurea simplex sesquiuncialis. Facies melicæ.

- Mollis.* 5. **HOLCUS** glumis bifloris nudiusculis: hermaphrodito mutico: masculo arista geniculata. *Linn. Syst. 1305.*

Gramen caninum longius radicans majus. *Bauh. Pin. 1.*

HABITAT cum priori, & in pascuis à Montferrier, Laverune. Panicula biuncialis subspicata. Calyces magis acuminati quam in prioribus.

CENCHRUS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 927.*

Char. secund. *Rad.* fibrosa. *Caul.* culmosa erecta teres enodis vel repens articulata ramosa radicans. *Fol.* alterna (graminea) vaginans simplex integerrima. *Flor.* terminalis spicata vel capitata. *Falc.* nulla. (Spinulæ supra glumas in una specie.)

- Racemosus.* 1. **CENCHRUS** panicula spicata, glumis muricatis, setis ciliatibus, foliis ciliatis. *Linn. sp. 1049. Sauv. 40.*
Gramen spicatum, locustis echinatis. *Tour. 519.*
Gramen spicatum maritimum spica echinata. *Bot. Monsf. 114.*

POLYGAMIA MONOECIA. 515

HABITAT ad margines sepium, viarum & agrorum. In sabulosis & ruderalis, *sous le Perou, à Salafon, au-delà du Lés vers Gramont.* Culmus teres radicans rufescens. Spica erecta simplicissima. Glumæ absoluta florescentia rubent.

1. **CENCHRUS** spica ovata simplici. *Linn. sp. 1049. Capitate.*
Gramen spica subrotunda echinata. *Bot. Mons. 116. Tour. 519.*

HABITAT à Montferrier, Camnelles, à Boutonet. Culmi vix biunciales simplicissimi enodes, vel ad basim semel tantum articulati.

ÆGILOPS.

Char. primi. Vid. *Linn. gen. pl. 926.*

Char. secund. *Rad.* fibrosa. *Caul.* culmosa articulata. *Fol.* alterna (graminea) vaginans simplex integerrima. *Flor.* terminalis spicata. *Falc.* nulla.

1. **ÆGIL.** spica ovata, aristis calycum ternis. *Linn. Syst. Ovata. 1307.*

Ægilops spica ovata aristis brevioribus. *Linn. sp. 1050. Sauv. 40.*

Gramen spicatum crassioribus & durioribus locustis, spica brevi. *Tour. 519.*

Gramen sive festuca altera capitulis duris. *Bot. Mons. 122.*

HABITAT in arvis & incultis.

2. **ÆGIL.** spica oblonga, aristis calycum inferiorum bi- *Trinucialis.*
nis. *Linn. Syst. 1307.*

Gramen spicatum crassioribus & durioribus locustis, spica longissima. *Tour. 519.*

Ægilops spica subulata scabra, aristis longitudine spicæ. *Linn. sp. 1051.*

HABITAT cum priori. Variat calycum inferiorum aristis ternis quaternis longitudine spicæ.

VALANTIA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 928.*

Char. secund. *Rad.* fibrosa simplex vel ramosa.

Caul. herbacea articulata tetragona ramosa.

Fol. sessilis simplex integerrima verticillata.

Flor. axillaris conferta pedunculata. Fulc. nulla.

- Muralis.* 1. VALANT. floribus masculis rufidis, hermaphroditici germi glabro insidentibus. *Linn. sp.* 1051. *Sauv.* 162.

Rubia quadrifolia verticillato semine. *Bot. Monf.* 126.

Valantia quadrifolia verticillata. *Tour. act.* 1706. p. 86.

Asperula obruso folio. *Barr. Icon.* 541. n°. 2.

HABITAT à Boutonnet, Caunelles. Inter rupium fissuras. Obs. Huc pertinet synonymia Magnolii non verò ad Sherardiam. *Vid. sup. Terrand.*

- Aparine.* 2. VALANT. floribus masculis trifidis hermaphroditici pedunculo insidentibus. *Linn. sp.* 1051. *Sauv.* 162.

Aparine fructu coriandri saccharati. *Bot. Monf.* 25. *Tour.* 114.

Aparine semine lævi. *Tour.* 114.

HABITAT à Lavalette, Mommau. Folia ciliata linearia. Pedunculi foliis subæquales.

- Articulata.* 3. VALANT. floribus masculis quadrifidis, pedunculis nudis. *Linn. sp.* 1052.

Cruciata orientalis latifolia erecta glabra. *Tour. cor.* 4.

HOSPITATUR sub dio. Cauliculi pedales. Flores sæpius hermaphroditi.

- Cruciata.* 4. VALANT. floribus masculis quadrifidis, pedunculis diphyllis. *Linn. sp.* 1052.

Cruciata hirsuta. *Tour.* 115.

La Croisette.

HABITAT in arvis. A Castelnau, la Peissine. Folia ovata hirsuta sæpius quaterna vel quina (sed raro.)

Flores pedunculo brevissimo donati.

P A R I E T A R I A.

Char. prim. *Vid. Linn. gen. pl.* 929.

Char. secund. *Rad.* subfusiformis. *Caul.* herbacea teres ramosa. *Fol.* alterna petiolata simplex integerrima. *Flor.* axillaris subsessilis conferta. *Fulc.* nulla.

- Officinalis.* 1. PARIET. foliis lanceolato-ovatis, pedunculis dichotomis, calycibus diphyllis. *Linn. Syst.* 1308.

Parietaria foliis lanceolato-ovatis alternis. *Linn. sp.* 1052.

Parietaria Officinarum & Dioscoridis. *Bot. Monf.* 199.

Tour. 509.

La Parietaire; vernaculè, *l'Erba de nostra Dama*.

HABITAT in muris. Folia longè petiolata ovata.

ATRIPLEX.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 930:

Char. secund. Rad. ramosa lignosa vel simplex fusiformis. Caul. ramosa herbacea vel fruticosa.

Fol. simplex subintegerrima (in una specie succulenta) alterna vel opposita, petiolata vel sessilis. Flor. glomerato-spicata terminalis & axillaris. Fulc. nulla.

1. ATRIP. caule fruticoso, foliis obovatis. Linn. sp. *Portulacoides*.
1053. oppositis.

Atriplex maritima angustissimo folio. Tour. 505.

Halimus seu *portulaca marina*. Bot. Mons. 124.

Le Pourpier de mer; vernaculè, *las Bouroulaignes de mar*.

HABITAT ad ripas maris & stagnorum. Rami teretes.

Folia carnosa in petiolum attenuata integerrima.

2. ATRIP. caule erecto herbaceo, foliis triangularibus. Hortenss.
Linn. sp. 1053.

Atriplex hortensis alba seu pallidè virens. Tour. 505.

Atriplex caule erecto annuo foliis triangularibus.

Sauv. 100. 128.

L'Arroche ou Bonne-Dame.

HABITAT in hortis. Folia alterna sinuata aut crenata.

3. ATRIP. caule herbaceo, foliis deltoideo-lanceolatis *Laciniata*.
obtusè dentatis subtus farinaceis. Linn. sp. 1053.

Sauv. 128. 271.

Atriplex maritima laciniata. Bot. Mons. 35. Tour. 505.

Atriplex foliis deltoideis dentatis subtus argenteis.

Linn. Syst. 1308.

HABITAT ad mare. Caulis procumbens striatus. Folia petiolo brevi, subtus argentea alterna succulenta.

4. ATRIP. caule herbaceo, valvulis femineis magnis *Hastata*.
deltoideis sinuatis. Linn. sp. 1053.

Atriplex sylvestris folio hastato seu deltoideo. Bot. Mons. 34. Tour. 505.

Atriplex caule erecto annuo, foliis in medio hastatis.

Sauv. 273.

HABITAT in arvis circa urbem. Altitudo sesquipedalis.

Patula. 5. *ATRIP.* caule herbaceo patulo, foliis subdeltoideo-lanceolatis, calycibus seminum disco dentatis. *Linn. sp.* 1053. *Sauv.* 125.

Atriplex angusto oblongo folio, *Bot. Monf.* 35. *Tour.* 505.

Atriplex erecta annua involucris seminum hastatis, foliis lanceolato-linearibus. *Sauv.* 126.

Atriplex Monspessulana cum pulchris involucris. *Bot. Monf.* 35.

HABITAT juxta hortos, & in cultis.

A C E R.

Char. prim. Vid. *Linn. Syst. pl.* 1023.

Char. secund. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* arborca. *Fol.* opposita petiolata simplex integra. *Flor.* ramea pedunculata terminalis racemosa vel subcorymbosa. *Fulc.* nulla.

Pseudo-platanus. 1. *ACER* foliis quinquelobis inæqualiter serratis, floribus racemosis. *Linn. sp.* 1054.

Acer montanum candidum, *Tour.* 615.

Acer majus. *Bot. Monf.* 3.

Acer foliis quinquelobis acutis obtusè serratis, petiolis canalicularis. *Sauv.* 212.

Le grand Erable ou faux Platan.

HABITAT au Capouladou, à Lespinouse. Frequens à la Peissine, Laverune.

Platanoides. 2. *ACER* foliis quinquelobis acuminatis acutè dentatis glabris, floribus corymbosis. *Linn. sp.* 1055. *Sauv.* 212.

Acer platanoides. *Tour.* 615.

Le faux Sycomore.

HOSPITATUR sub dio. Occurrit à la Peissine, Lamonsson.

Campestre. 3. *ACER* foliis lobatis obtusis emarginatis. *Linn. sp.* 1055.

Acer campestre & minus. *Bot. Monf.* 3. *Tour.* 615.

Acer foliis semitrilobis, lobis obtusè incis. Sauv. 212.

Le petit Erable.

HABITAT à Valene & vicinis. A St. Jean de Vedas, Monthasin.

Monspessulana. 4. *ACER* foliis trilobis integerrimis. *Linn. sp.* 1056. *Sauv.* 212.

Acer trifolium, Tour. 615.

Acer Monspessulanum, Bot. Monsf. 3.

L'Erable de Montpellier.

HABITAT à Gramont, Castelnau. Flores corymbosi.
Foliorum lobi acuminati.

MIMOSA.

Char. prim. Vid. Linn. Syst. pl. 1310.

Char. secund. Rad. lignosa ramosa. Caul. ramosa ;
herbacea vel fruticosa. Fol. alterna petiolata
abruptè-pinnata vel bipinnata. Flor. axillaris
pedunculata, capitata vel subspicata. Fulc. sti-
pulæ geminæ solutæ vel earum loco spinæ.
Glandulæ petiolares sessiles. (In una specie
spinulæ supra capsulas.)

* *Foliis conjugatis simulque pinnatis.*

1. MIMOSA aculeata, foliis conjugatis pinnatis : par- *Sensitive*,
tialibus bijugis, intimis minimis. Linn. sp. 518.
Mimosa altera spinis horridiuscula & sensitiva magis.
Tour. 606.

La Sensitive épineuse.

HOSPITATUR in caldario. Caulis erectus biennis.

2. MIMOSA aculeata foliis conjugatis pinnatis, caule *Pudica*;
hispido. Linn. sp. 518.
Mimosa seu frutex sensibilis. Tour. 606.

La Sensitive.

HOSPITATUR in caldario. Sub dio æstate florens,
valdè hirsuta, procumbens. Aculei suprà capsulas.

* *Foliis duplicato-pinnatis.*

3. MIMOSA inermis decumbens, foliis bipinnatis, *Pernambucan*
spicis cernuis, floribus pentandris ; inferioribus na.
castratis. Linn. sp. 519.

Mimosa pernambucana. Tour. 606.

La Sensitive de Pernambouc.

HOSPITATUR sub dio. Sponte in horto regio crescit.
Cauliculi recti simplices subquingulares. Glandula ad basim petiolorum concava rubra. Stipula filiformis ad apicem petioli. Stipulæ duæ laterifoliæ rigidæ. Legumina linearia plana sæpius quinque in apice pedunculorum.

Farnesiana. 4. MIMOSA spinis stipularibus distinctis, foliis bipinnatis partialibus octo-jugis, spicis globosis. *Linn. sp.* 561.

Acacia Indica Farnesiana. Tour. 605.

Acacia Aegyptia. Barr. Icon. 1138.

L'Acacia à bouton d'or. Sensitive du jardin de Farnèse.

HOSPITATUR sub dio. Florens autumnō & hyeme.

Pedunculi folius æquales. Flores crocei odori capitati. Legumina cylindrica succulenta.

D I O E C I A.

G L E D I T S I A.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 908.

Char. secund. *Rad.* horizontalis stolonifera & perpendicularis. *Caul.* arborea. *Fol.* primordialis conferta fasciculata abruptè-pinnata decidua; ramea abruptè - bipinnata persistens; *Flor.* racemosa pedunculata solitaria è medio foliorum primordialium. *Fulc.* spina ramosa caulina sparsa, suprâ regionem foliorum.

Tiæacanthos. 1. GLEDITSIA. *Linn. sp.* 1056.

La Gledits.

HOSPITATUR sub dio. E gemmis primo vere prodeunt folia sex vel septem pinnata foliolis ovatis integerrimis. Racemi foliis æquales. Absoluta florentia racemi & folia illa decidunt; tunc rami enascuntur, elongantur foliis bipinnatis, foliolis serratis, & spinis ramosis triuncialibus onerandi. Semina non maturat.

F R A X I N U S.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 933.

Char. secund. *Rad.* lignosa ramosa. *Caul.* arborea.

Fol. opposita impari-pinnata. *Flor.* terminalis ramea paniculato-racemosa. *Fulc.* nulla.

Excelsior. 1. FRAXINUS foliolis serratis, floribus apetalis. *Linn. sp.* 1057.

Fraxinus excelsior. Tour. 577.

Fraxinus. Bot. Monsf. 99.

POLYGAMIA POLYOECIA. 521

Le Fresne; vernaculè *lou Fraissé*.

HABITAT juxtà amnem. Petioli marginati. Foliola ovata: impari majori cuneiformi.

2. FRAXINUS foliolis ferratis, floribus corollatis. *Linn. Ornus*,
sp. 1057.

Fraxinus florida botryoides. Tour. 577.

Le Fresne à fleur.

HOSPITATUR sub dio. Petioli æquales. Foliola æqualia lanceolata.

DIOSPYROS.

Char. prim. Vid. *Linn. Syst. pl. 1027.*

Char. secund. *Rad. ramosa lignosa. Caul. arborea. Fol. alterna petiolata simplex integerrima. Flor. axillaris conferta sessilis. Fulc. nulla.*

1. DIOSPYROS foliorum paginis discoloribus. *Linn. Lotus*,
sp. 1057. Sauv. 59. & 132.

Guajacana. Tour. 600.

HOSPITATUR sub dio, in frigidario. *Au Labyrinthe du Jardin Royal.* Folia ovalia. Petioli brevissimi. Flores sæpius quaterni. Semina non maturat.

POLYOECIA.

FICUS.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl. 936.*

Char. secund. *Rad. lignosa ramosa. Caul. arborea: Fol. alterna petiolata simplex integra. Flor. aggregata in calyce communi turbinato fructiformi clauso sparso subsolitario sessili. Fulc. nulla. Lactescencia alba.*

1. FICUS foliis palmatis. *Linn. sp. 1059. Sauv. 196. Carica.*

Ficus sativa. Tour. 663. & varietates. Sauv. 196.

Ficus communis. Bot. Monf. 97.

- β. Caprificus. *Bot. Monf. 97.*

Caprificus.

Le Figuier; vernaculè *lou Figuié*. β. *la Figueira cabraon.*

HABITAT in vineis & arvis. β. in hortorum muris, sterilis.



Classis XXIV.

CRYPTOGAMIA

FILICES.

Obs. In hoc ordine, Autores plurimi florum fructuumque figuram & anatomiam nescientes, eorum situm pro nota generica *primaria* habuerunt; sed æqua lege eandem notam pro *secundaria* assumimus.

EQUISETUM.

Char. prim. . . .

Char. secund. *Rad.* horizontalis articulata stoloni-
nifera. *Caul.* articulata scaposa vel foliosa. *Fol.*
frondosa articulata verticillata. *Flor.* spicata:
spica *fructificationibus* peltatis, basi dehiscen-
tibus, multivalvi: radicali vel terminali. *Linn.*
Syst. nat. 1034. *Fulc.* nulla.

Obs. Caulis & frondium quilibet articulus apice
ferratus, basim superioris articuli vaginat.

Arvense. 1. EQUIS. scapo fructificante nudo, sterili frondoso.
Linn. sp. 1061.

Equisetum arvense longioribus setis. *Bot. Mons.* 89.
Tour. 532.

Equisetum setis simplicibus internodio multoties lon-
gioribus. *Sauv.* 158.

La Queue de cheval.

HABITAT in humidis. *A Castolneau, aux prés d'Arene.*

Palustre. 2. EQUIS. caule angulato, frondibus simplicibus. *Linn.*
sp. 1061.

Equisetum palustre. *Lob. Icon.* 795.

Equisetum setis simplicibus internodia vix superan-
tibus. *Sauv.* 158.

Equisetum palustre brevioribus setis. *Tour.* 532.

Autre Queue de cheval.

HABITAT cum priori & à Cannelles.

3. EQUIS. caule striato, frondibus subsimplicibus. *Linn. Flurziatila.*
sp. 1062.

Equisetum majus aquaticum. Bot. Mons. 89.

Equisetum caule non sulcato latissimo, verticillis densissimis. Sauv. 158.

Equisetum palustre longioribus setis. Tour. 533.

La préle; vernaculè las Cassouadas.

HABITAT in aquis.

4. EQUIS. caule nudo scabro basi subramoso. *Linn. sp. Hymale.*
1062.

Equisetum caule nudo simplicissimo. Sauv. 158.

Equisetum nudum minus variegatum. Tour. 533.

HABITAT à Castelnau, In aquis, A Salason, Montferrier.

OPHIOGLOSSUM.

Char. prim. . . .

Char. secund. *Rad.* fibrosa. *Caul.* nulla. *Fol.* frondosa radicalis petiolata simplex integerrima. *Flor.* spicata epiphylla: spica pedunculata articulata disticha: articulis transversim dehiscentibus. *Linn. Syst. 1035. Fulc.* nulla.

1. OPHIOG. fronde ovata. *Linn. sp. 1062. Sauv. 107. Vulgatum.*

Ophioglossum vulgatum. Bot. Mons. 191. Tour. 548.

Barr. Icon. 252. n° 1.

La Langue de serpent.

HABITAT in pratis inundatis, au-delà de la rivière à Castelnau à droite. Frons integerrima. Scapus fronde longior, ad basim ipsius.

OSMUNDA.

Char. prim. . . .

Char. secund. *Rad.* fibrosa. *Caul.* nulla. *Fol.* frondosa petiolata simplex bipinnatifida vel pinnatifida. *Flor.* epiphylla, pedunculata spicata ramosa, vel sessilis discum frondis tegens: fructificationibus globosis. *Linn. Syst. 1036. Fulc.* nulla.

* *Floribus spicatis pedunculatis.*

1. OSMUNDA spica caulina solitaria, fronde pinnatifida *Lunaria.*
solitaria.

Osmunda scapo caulino solitario, fronde pinnatifida solitaria. *Linn. sp.* 1064.

Osmunda foliis lunatis. *Tour.* 547.

Lunaria botrytes. *Barr. Icon.* 252. fig. 3.

Osmunda scapo caulino unico, fronde pinnata solitaria. *Sauv.* 218.

HABITAT à *Lesperou*. Laciniae frondis reniformes, imae subtrilobae. Spica fronde longior pauciflora.

* *Frondebz aliis foliaceis, aliis fructiferis, floribus sessilibus.*

Spicant. 2. *OSMUNDA* frondibus lanceolatis pinnatifidis, lacinii confluentibus integerrimis parallelis. *Linn. sp.* 1066.

Polypodium angustifolium folio variolo. *Tour.* 540.

Pteris fronde pinnata, foliolis linearibus parallelis. *Sauv.* 270.

HABITAT à *Lesperou*, à *la Serane*.

HOSPITATUR cum priori in frigidario. Frondes foliaceae fructiferis breviores: fructiferae ad basim rubent, foliolis strictioribus angustioribusque.

ACROSTICHUM.

Char. prim. . . .

Char. secund. *Rad.* carnosae nodosae horizontalis stolonifera. *Caul.* nulla. *Fol.* frondosa radicalis petiolata simplex integra vel bipinnata. *Flor.* epiphylla sessilis fructificationibus discum totum frondis tegentibus. *Linn. Syst.* 1036. *Fulc.* nulla.

* *Fronde simplici divisa.*

Septentrionalis. 1. *ACROST.* fronde nuda lineari-laciniata. *Linn. sp.* 1068.

Filicula saxatilis corniculata. *Tour.* 542.

Acrostichum fronde lineari laciniata. *Sauv.* 270.

HABITAT à *Lesperou*, *Saint Guillin le Désert*. Frondes vix biunciales filiformes.

* *Fronde subbipinnata.*

Ikelypteris. 2. *ACROST.* fronde pinnata, pinnis pinnatifidis integerrimis. *Linn. sp.* 1071.

CRYPTOGAMIA FILICES. 515

HABITAT à Lesperou, Lamalou.

* *Fronde bipinnata.*

3. ACROST. bipinnatum, pinnulis indivisis. *Sauv.* 246. *Pulchrum.*
Linn. sp. 1072.

Filicula quæ adiantum nigrum officinarum, pinnulis
 obtusioribus. *Tour.* 542.

HABITAT cum priori.

P T E R I S.

Char. prim. . . .

Char. secund. *Rad.* carnosa nodosa horizontalis
 stolonifera. *Caul.* nulla. *Fol.* radicalis petiolata
 frondosa subtripinnata. *Flor.* epiphylla sessilis :
fructificationibus in lineis marginalibus. *Linn.*
Syst. nat. 1038. *Fulcr.* nulla.

1. PTERIS fronde supradecomposita : foliolis pinnatis, *Aquilina.*
 pinnis lanceolatis : infimis pinnatifidis : superioribus
 minoribus. *Linn. sp.* 1075. *Sauv.* 244.

Filix ramosa major pinnulis obtusis non dentatis. *Bot.*
Monf. 98. *Tour.* 536.

La Fougere femelle.

HABITAT circa amnem & in arvis subjacentibus.
 Frondes maximæ. Variat foliolis inferioribus sinua-
 tis. Stipites rigidi glaberrimi.

A S P L E N I U M.

Char. prim. . . .

Char. secund. *Rad.* fibrosa vel nodosa carnosa
 horizontalis. *Caul.* nulla. *Fol.* radicalis petio-
 lata frondosa nunc simplex incisa vel integerri-
 ma, nunc impari-pinnata, bipinnata aut tripin-
 nata. *Flor.* epiphylla sessilis : *fructificationibus*
 in lineolis disci frondis sparsis. *Linn. Syst. nat.*
 1042. *Fulc.* nulla.

* *Fronde simplici.*

2. ASPLEN. frondibus simplicibus cordato-lingulatis in- *Scolopen-*
 tegerrimis, stipitibus hirsutis. *Linn. sp.* 1079. *drium.*
Asplenium frondibus ensiformibus integris : basi cor-

§26 CRYPTOGAMIA FILICES.

dati inflexis, petiolis hirsutis. *Sauv.* 27.
Lingua cervina officinarum. *Bot. Mons.* 159. *Tour.*
544.

La Scolopendre.

HABITAT in rupium fissuris, & puteis.

* *Fronde pinnatifida.*

Ceterach. 2. ASPLEN. frondibus pinnatifidis, lobis alternis confluentibus. *Linn. sp.* 1080.

Ceterach officinarum. Bot. Mons. 58.

Asplenium five *ceterach. Tour.* 544. *Barr. Icon.* 1052.
L'Herbe dorée; vernaculè *l'Erba daourada.*

HABITAT in muris humidis. *A Boutonet, Lavanet*
& cum priori. Frondes oblongæ: lobis obtusis.

* *Fronde pinnata.*

Trichomanes. 3. ASPLEN. frondibus pinnatis: pinnis subrotundis crenatis. *Linn. sp.* 1080.

Trichomanes seu *polytrichum officinarum. Bot. Mons.*
212. *Tour.* 549.

β. *Trichomanes* foliis eleganter incis. *Tour.* 539.

Le Politré; vernaculè *Capillaire.*

HABITAT in puteorum rimis. β. *A Lesperou, au*
Mont Saint Loup. Foliolis acutis pinnatifidis ovatis.
Frondes ovatæ.

* *Fronde decomposita.*

Adiantum
nigrum. 4. ASPLEN. frondibus duplicato-pinnatis: pinnis obovatis supernè crenatis: foliolis inferioribus majoribus. *Linn. sp.* 1081.

Adiantum nigrum. Bot. Mons. 5.

Filicula quæ *adiantum nigrum officinarum* pinnulis obtusioribus. *Tour.* 542.

■ *Le Capillaire ordinaire.*

HABITAT à Gramont, Castelnau, Lavalette.

Ruta mura-
ria. 5. ASPLEN. frondibus alternatim decompositis, foliolis cuneiformibus crenulatis. *Linn. sp.* 1081.

Ruta muraria. Bot. Mons. 227. *Tour.* 541.

HABITAT in muris hortorum. Au jardin de Mr.
Baron, à Lavanet; sous le Peron dans un puits. A
Selleneuve à gauche au-delà du pont. Frondes vix
biunciales.

6. ASPLEN. frondibus tripinnatis : foliolis alternis, *Oncopteris*,
pinnis lanceolatis inciso-ferratis. *Linn. sp.* 1081.

Asplenium frondibus duplicato-pinnatis, foliis inferioribus majoribus : foliolis ovatis supernè crenatis, *Sauv.* 245.

HABITAT à Valene, au mont Saint Loup.

POLYPODIUM.

Char. prim. . . .

Char. secund. *Rad.* carnosæ nodosæ horizontalis stolonifera. *Caul.* nulla. *Fol.* radicalis petiolata frondosa, simplex pinnatifida vel impari-pinnata, bipinnata, aut tripinnata. *Flor.* epiphylla sessilis : *fructificationibus* in punctis subrotundis, sparsis per discum frondis. *Linn. Syst. nat.* 1043. *Falc.* nulla.

* *Fronde pinnatifida : lobis coadunatis.*

1. POLYP. frondibus pinnatifidis, pinnis oblongis sub-ferratis obtusis, radice squamata. *Linn. sp.* 1085. *vulgare.*

Polypodium vulgare. *Bot. Monf.* 211. *Tour.* 540.

Polypodium fronde pinnata : foliolis lanceolatis integris ferratis alternis connato-sessilibus. *Sauv.* 218. *Le Polypode.*

HABITAT à Castelnau, Montferrier. Frondes oblongæ : pinnulis alternis. Frondes interdum lineares, angustæ.

2. POLYP. frondibus pinnatifidis : pinnulis lanceolatis lacero-pinnatifidis ferratis. *Linn. sp.* 1086. *Cambrium.*

Polypodium Cambro-Britannicum, pinnulis ad margines laciniatis. *Tour.* 540.

HABITAT à Lesperou, la Serane. Frondes subcordatæ. Pinnulæ oppositæ : summis lineari-lanceolatis dentatis.

* *Fronde pinnata simpliciter.*

3. POLYP. fronde pinnata, pinnis lunulatis ciliato-ferratis declinatis, petiolis strigosis. *Linn. sp.* 1088. *Lonchitis.*

Lonchitis mas seu latifolia aspera. *Barr. Icon.* 1121.

Lonchitis aspera. *Tour.* 538.

Lonkete.

HABITAT cum priori. Frondes lineari-lanceolatæ, stipites squamulis obducti.

- Phlegopteris.* 4. POLYP. frondibus subbipinnatis, foliolis infirmis reflexis, paribus pinnula quadrangulati coadunatis. *Linn. sp. 1089.*
 HABITAT à Lamalou, à Lesperou. Frondes subtriangulares. Pinnulae ovato-lanceolatae pinnatifidae, foliolis integerrimis. Stipitibus glabris villosis.
- Filix mas.* 5. POLYP. fronde bipinnata, pinnis obtusis crenulatis, stipite paleaceo. *Linn. sp. 1090. Sauv. 244.*
 Filix mas non ramosa dentata. *Tour. 536.*
La Fougere mâle.
 HABITAT au mont St. Loup. Frondes lanceolatae. Pinnae subpinnatae ovato-lanceolatae.
- Filix femina.* 6. POLYP. fronde bipinnata, pinnulis lanceolatis pinnatifidis acutis. *Linn. sp. 1090. Sauv. 244.*
 HABITAT cum priori, & à Lesperou.
- Cristatum.* 7. POLYP. frondibus subbipinnatis, foliolis ovato-oblongis, pinnis obtusiusculis apice acutè ferratis. *Linn. sp. 1090.*
 Polypodium fronde duplicato-pinnata, pinnulis obtusis coadunatis crenatis. *Sauv. 245.*
 HABITAT cum prioribus, & à Lamalou.
- Aculeatum.* 8. POLYP. fronde bipinnata, pinnis lunulatis dentatis, stipite strigoso. *Linn. sp. 1090.*
 Lonchitis aculeata major. *Tour. 538.*
 HABITAT cum prioribus.
- Rhacium.* 9. POLYP. fronde bipinnata, foliolis pinnisque remotis lanceolatis, ferraturis acuminatis. *Linn. sp. 1091.*
 Filix tenuissimè denticulata rhætica. *Tour. 537.*
 Adiantum filicinum aquaticum. *Barr. Icon. 432. n° 2.*
 Pessima.
 HABITAT cum priori. Pinnae lineares profundè dentatae. Stipites glaberrimi tenuissimi.
- Fragile.* 10. POLYP. fronde bipinnata, foliolis remotis, pinnis subrotundis incis. *Linn. sp. 1091.*
 Polypodium fronde duplicato-pinnata, pinnis ramosis, foliis incis subrotundis. *Sauv. 244.*
 Filicula marina minima segmentis rotundioribus. *Tour. 542.*
 HABITAT cum congeneribus, & à Lespinouse. Stipites glaberrimi.

* *Fronde supradecomposita.*

11. POLYP. fronde supradecomposita, foliolis ternis *Dryopteris*, bipinnatis. *Linn. sp.* 1093.

Filix ramosa minor, pinnulis dentatis. *Tour.* 536.

HABITAT cum prioribus, & dans un puits sous le Perou. Frondes palmares triangulares, stipitibus glaberrimis.

ADIANTUM.

Char. prim.

Char. secund. *Rad.* carnosâ horizontalis stolonifera. *Caul.* nulla. *Fol.* radicalis petiolata frondosa bipinnata. *Flor.* epiphylla sessilis, fructificationibus in maculis terminalibus sub replicato margine frondis. *Linn. syst. nat.* 1044. *Fulc.* nulla.

1. ADIANT. frondibus decompositis, foliis alternis, *Capillus* pinnis cuneiformibus lobatis pedicellatis. *Linn. sp. Veneris.* 1096.

Adiantum ramis pinnatis, foliis circuli sectorem referentibus. *Sauv.* 245.

Adiantum foliis coriandri. *Bot. Mons.* 4. *Tour.* 543. *Capillaire de Montpellier.*

HABITAT ad puteorum fissuras. Frondes bipinnatæ. Stipites glaberrimi atro-purpurascentes.

MARSILEA.

Char. prim.

Char. secund. *Rad.* filamentosa perpendicularis. *Caul.* horizontalis radicans. *Fol.* opposita frondosa sessilis simplex integerrima. *Flor.* mascula epiphylla sessilis conferta, feminea pedunculata solitaria radicibus involuta. *Fulc.* nulla.

1. MARSILEA foliis oppositis simplicibus. *Linn. sp. Nat.* 1099.

Lenticula palustris latifolia punctata. *Bot. Mons.* 301.

Lenticula palustris latifolia. *Bauh. prod.* 153.

HABITAT in aquis, à Mangnio, & au fonds de Lattes, à Maripas. Folia ovato-orbiculata, ad basin sæpius emarginata subpetiolata.

MUSCI.

LYCOPodium.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 953.

Char. secund. *Rad.* fibrosa. *Caul.* herbacea ramosa. *Fol.* sessilis conferta imbricata simplex integerrima. *Flor.* spicata sparsa pedunculata vel sessilis. *Fulc.* nulla.

Clavatum. 1. LYCOP. foliis sparsis filamentosis, spicis teretibus pedunculatis geminis. Linn. sp. 1101.

Muscus vulgaris squamosus repens clavatus. Tour. 553.

HABITAT à Valene, inter muscos; au Mont St. Loup.

Alpinum. 2. LYCOP. foliis quadrifariam imbricatis acutis, furculis erectis dichotomis, spicis sessilibus teretibus. Linn. sp. 1104.

Muscus squamosus cupressiformis. Tour. 555.

HABITAT in fagetis, à Lamalou, Lespinouse, vers St. Pons.

Denticulatum. 3. LYCOP. foliis bifariis, superficialibus imbricatis, furculis repentibus, floribus sparsis. Linn. sp. 1106.

Muscus denticulatus minor. Bot. Monf. 178. Tour. 556.

HABITAT in humidis, à Gramont, à droite vers Manguio.

SPHAGNUM.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 951.

Char. secund. *Rad.* fibrosa. *Caul.* herbacea ramosa. *Fol.* conferta imbricata, sessilis simplicissima. *Flor.* terminalis pedunculata solitaria. *Fulc.* nulla.

Palustre. 1. SPHAGNUM ramis deflexis. Linn. sp. 1106.

Sphagnum cauliferum ramosum palustre candicans, ramulis reflexis, foliis angustioribus. Sauv. 23.

HABITAT à Lesperou, ubi nihil vulgatius.

FONTINALIS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 952.

Char. secund. *Rad.* fibrosa. *Caul.* herbacea ramosa. *Fol.* alterna sessilis simplex integerrima. *Flor.* axillaris solitaria subsessilis, mascula & feminea in eadem planta. *Fulc.* nulla.

1. FONTINALIS foliis complicato-carinatis trifariis acutis, antheris lateralibus. *Linn. sp.* 1107. *Antipyretica.*
 HABITAT in aquis, à la source du Lés, à Lesperou.

POLYTRICHUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 948.

Char. secund. *Rad.* fibrosa. *Caul.* simplicissima herbacea. *Fol.* sessilis simplex integerrima conferta imbricata. *Flor.* solitaria terminalis pedunculata, mascula & feminea in distincta planta. *Fulc.* nulla.

1. POLYT. caule simplici. *Linn. sp.* 1109. Anthera parallelepipedata. *Linn. syst.* 133. *Commune;*

Muscus capillaris. *Bot. Monf.* 179.

Muscus capillaris minor capitulo longiore falcato. *Tour.* 551.

Polytrichum vulgare majus. *Seg. Tom. I. p.* 35. *Barr. Icon.* 251. n^o. 3.

Le Polytric.

HABITAT à Gramont, Valene, la source du Lés. Cauliculi biunciales ad basim foliosi supernè nudi.

MNIUM.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 1030.

Char. secund. *Rad.* fibrosa capillaris. *Caul.* scaposa vel foliosa. *Fol.* simplex integerrima sessilis, radicalis vel caulina. *Flor.* feminea sessilis terminalis, mascula pedunculata. *Fulc.* nulla.

1. MNIUM acaule, anthera nutante, calyptra reflexa tetragona. *Linn. sp.* 1110. *Hygrometricum.*

Bryum capsula nutante turbinato-ovata, calyptra reflexa quadrangulata. *Sauv.* 33.

Muscus capillaceus minor folio breviori, capitulo nutante. *Tour.* 550.

Muscus capillaris, altera species minor. *Bot. Monf.* 179.

HABITAT in umbrosis humidis. A Laverunc, Castelnau.

2. MNIUM antheris pendulis, foliis ovatis setiferis carinatis, pedunculis longissimis. *Linn. syst.* 1333. *Capillare.*

Bryum capillare. *Linn. sp.* 1121.

Muscus capillaris minor, capitulis erectis vulgarissimus. *Mich. gen.* 108. *tab.* 59. *fig.* 7.

HABITAT in muris humidis. Cauliculi ad basim foliis duobus tribusve instructi cæterum nudi. Calyptra longa acuminata.

- Fentannum.* 3. **MNIUM** caule simplici geniculis inflexo. *Linn. sp.* 1110. Muscus capillaris tenuissimus, pediculo longissimo purpurascente, capitulo rotundiore. *Tour.* 552. **HABITAT** à Gramont, Castelnau. Pedunculi masculi femineos longè superant.

B R Y U M.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 949.

Char. secund. *Rad.* fibrosa. *Caul.* scaposa vel foliosa. *Fol.* simplex integerrima sessilis, radicalis aut caulina. *Flor.* terminalis aut radicalis, solitaria; mascula pedunculata, feminea sessilis in eadem planta. *Fulc.* nulla.

* *Antheris pedunculatis erectis.*

- Extinctum.* 1. **BRYUM** anthera erecta oblonga minori calyptris laxis æqualibus. *Linn. sp.* 1116.

Bryum calyptra extensorii forma minus. *Sauv.* 32.

Muscus capillaris minimus calyptra longa conoidea nitida. *Tour.* 552.

HABITAT à Gramont, supra muros circa urbem.

- Murale.* 2. **BRYUM** antheris erectis, foliis piliferis rectiusculis, furculis simplicibus cespitosis. *Linn. sp.* 1117.

Muscus capillaris minor capitulis erectis, vulgarissimus. *Mch. tab.* 59. fig. 7.

Vernaculè de Morff.

HABITAT in rupibus & tectis humidis.

- Pomiforme.* 3. **BRYUM** antheris erectis sphaericis. *Linn. sp.* 1115.

Bryum caule erecto, foliis setaceis, capitulis globosis. *Sauv.* 32.

HABITAT in umbrosis cum prioribus. Frequens in labyrintho horu regu.

A L G Æ.

M A R C H A N T I A.

Char. prim. Vid. *Lin. gen. pl.* 954.

Char. secund. *Rad.* capillaris. *Caul.* nulla. *Fol.* frondosa lamellosa simplex radicans vegetabili.

bus aut mineralibus adhærens subarticulata.
Flor. epiphylla solitaria, mascula pedunculata,
 pedunculis tetragonis, feminea sessilis, in ea-
 dem planta. *Fule.* nulla.

Obs. Frondium pagina inferior è nervo longitu-
 dinali radices agit.

1. MARCH. calyce communi decemfido. *Linn. sp. Polymorpha*
 1137.

Mutcus saxatilis sive lichen petræus. *Bot. Mons.* 179.

L'Hépatique de fontaine.

HABITAT in puteis & fontibus; *sous le Perou, à la*
Pe'ssine, Lavanet, &c. Pedunculus ad apicem fron-
 dis cujuslibet.

2. MARCH. calyce communi quadripartito, laciniis *Cruciatæ*
 tubulosis. *Linn. sp.* 1137.

Marchantia floribus masculis cruciformibus, femineis
 sessilibus lunulatis. *Sauv.* 270.

HABITAT supra muros. *Au pont Juvenal, & dans le*
Labyrinthe du jardin du Roi.

3. MARCH. calyce communi quinquesido hemisphæ- *Hemisphæ-*
 rico, perichætio nullo. *Linn. sp.* 1138. *rica.*

HABITAT in puteis omnibus circa hortum regium.

4. MARCH. calyce communi quinqueloculari subovato. *Conica.*
Linn. sp. 1138.

Hepatica vulgaris major vel officinarum Italiæ. *Seg.*
Tom. I. 47.

HABITAT cum prioribus, &c. à *Castelnau.*

Obs. Omnes supra memoratæ species florent februario,
 aprili & maio.

L I C H E N.

Char. prim. Vid. *Linn. gen. pl.* 958.

Char. secund. *Rad.* nulla. *Caul.* nulla vel rigida
 ramosissima filamentosa parasitica. *Fol.* nulla vel
 crustacea vegetabilibus aut mineralibus adhæ-
 rens. *Flor.* sparsa sessilis caulina vel epiphylla.
Fule. nulla.

* Foliacei.

1. LICHEN foliaceus laciniatus obtusus glaber, supra *Pulmonaria-*
 lacunosus: subtus tomentosus. *Linn. sp.* 1145. *rica.*

Muscus pulmonarius sive pulmonaria arborea. *Tour.* 549.

Muscus pulmonarius. *Bot. Monsf.* 179.

Lichen foliis oblongis divisis, superficie reticulato-punctata. *Sauv.* 31.

La Pulmonaire de chêne.

HABITAT supra arbores, *A Montferrier, Castelnau.*

Furfuraceus. 2. LICHEN foliaceus decumbens furfuraceus, laciniis acutis, subtus lacunosis atris. *Linn. sp.* 1146.

HABITAT cum priori. Ramosissimus, supernè cinereus.

* *Scyphiferi.*

Pyxidatus. 3. LICHEN scyphifer simplex crenulatus, tuberculis fuscis. *Linn. sp.* 1151.

Lichen pyxidatus major. *Tour.* 549.

Fungus terrestris pyxidatus. *Magnol. Hort. Monsf. tab.* 83.

HABITAT à Gramont, supra arbores, Boletum & Agaricum.

* *Fruticulosi.*

Rangiferinus. 4. LICHEN fruticulosus perforatus ramosissimus, ramulis nutantibus. *Linn. sp.* 1153.

Sylvaticus. Coralloides corniculis rufescentibus. *Tour.* 567.

Muscus terrestris coralloides erectus, corniculis rufescentibus. *Bot. Monsf.* 179.

HABITAT à Gramont, Caunelles.

* *Filamentosi.*

Plicatus. 5. LICHEN filamentosus pendulus, ramis implexis, scutellis radiatis. *Linn. sp.* 1154.

Muscus arboreus usnea officinarum. *Bot. Monsf.* 179.

Lichen cinereus vulgaris capillaceus folio minori. *Tour.* 550.

Lichen capillaceus minor ex abiete pendens. *Tour. cor.* 40.

Lichen capillaceus ex cinereo rutilans, receptaculis florum subcinereis & barbatis. *Michx. gen.* 77. *tab.* 39. *fig.* 5.

L'Usnée commune.

HABITAT supra arbores, à Valene. Scutella ramulis strictis patentibus simplicibus radiata.

Barbatus. 6. LICHEN filamentosus pendulus subarticulatus, ramis patentibus. *Linn. sp.* 1155.

Lichen capillaceus ex fago & abiete pendens. *Tour.*
cor. 4c.

Musci capillaceus longissimus. *Bot. Mons.* 180.

HABITAT cum priori, & à Gramont, St. George.

C H A R A.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 692.

Char. secund. *Rad.* fibrosa. *Caul.* articulata ramosa herbacea. *Fol.* frondosa verticillata sessilis simplex. *Flor.* ad articulos solitaria sessilis.

1. CHARA caulibus lævibus, frondibus internè dentatis. *Vulgaris.*
Linn. sp. 1156.

Equisetum foetidum sub aqua repens. *Bot. Mons.* 89.
Le Lustre d'eau.

HABITAT in aquis, circa urbem, & à Castelnau, Lattes, Sellenewve.

T R E M E L L A.

Char. prim.

Char. secund. *Rad.* nulla. *Caul.* gelatinosa figuræ incertæ, vegetabilibus & mineralibus adhærens. *Fol.* nulla. *Flor.* inconspicua, frutificationibus in corpore gelatinoso vix manifestis. *Linn. syst. nat.* 1067. *Falc.* nulla.

1. TREM. plicata undulata. *Linn. sp.* 1157. *Nasæe.*
Musci fugax membranaceus pinguis. *Bot. Mons.* 180.
HABITAT in pratis post pluvias. *A la Peissine, Camnelles.* Magnitudo quoque indeterminata.
2. TREM. sessilis membranacea auriformis cinerea. *Linn. Auricula.*
sp. 1157.
Fungus membranaceus auriculam referens seu sambucinus. *Bauh. pin.* 372.
L'Oreille de Judas.
HABITAT supra arbores demortuas, salices præsertim. *A Lattes, Camnelles;* frequens à *Rouquet;* juxta rivulum.
3. TREM. tuberculosa solida rugosa. *Linn. sp.* 1158. *Verrucosa.*
HABITAT in stagnis; à *Bouzigues, Perauls;* vel radicibus zostæ marinæ demortuæ adhærens.
4. TREM. hemisphærica sparsa. *Linn. sp.* 1158. *Hemisphærica.*

HABITAT in mari & stagnis subjacentibus. Quandoque petiolata.

FUCUS.

Char. prim. Vid. Linn. syst. pl. 1168.

Char. secund. *Rad.* nulla vel fibrosa. *Caul.* nulla vel herbacea dichotoma ramosa funiculiformis radicata vel vaga. *Fol.* nulla vel frondosa alterna sessilis simplex integra, vel etiam mineralibus vegetabilibusve adhærens. *Flor.* nunc sparsa petiolata aut sessilis, caulina vel epiphylla, nunc terminalis. *Fulc.* nulla.

* *Dichotomi Frondescentes.*

Vesiculosus. 1. FUCUS fronde dichotoma integra, caule medium filum transcurrente, vesiculis verrucosis terminalibus. *Linn. sp.* 1158.

Fucus marinus seu quercus marina foliorum extremis tumidis. *Tour.* 566.

HABITAT in mare.

* *Ramosi foliis distinctis.*

Natans. 2. FUCUS caule tereti ramosissimo, foliis lanceolatis serratis, fructificationibus globosis pedunculatis subaristatis. *Linn. sp.* 1160.

Lenticula marina serratis foliis. *Lob. Icon.* 266.

Fucus folliculaceus serrato folio. *Bot. Monf.* 296. *Barr. Icon.* 1129.

HABITAT ad maris littora. In mari vagus ut species quarta.

* *Ramosi fronde unita.*

Siliquosus. 3. FUCUS caule tereti ramosissimo, pedunculis alternis, vesiculis oblongis acuminatis. *Linn. sp.* 1160.

Fucus fruticosus caudice verrucoso. *Bot. Monf.* 100.

Fucus tenuissimo folio siliquatus. *Ray. syn.*

HABITAT circa maris littora; au-delà du Nazareth, à Cette.

* *Fructificationibus non vesicariis.*

Cartilagineus. 4. FUCUS cartilagineus, caule teretiusculo compresso, frondibus supradecompositis pinnatis, laciniis linearibus coloratis. *Linn. sp.* 1161.

4. *Muscus marinus capillaceus multifido folio. Bot. Mons.*
180. *Albidus.*
Corallina capillaceo multifido folio, albida. Tour. 571.
HABITAT copiosè ad mare in toto tractu. *Vagus, ver-*
sicolor. Copiosè post tempestates occurrit à Perauls,
Maguelone.
5. *FUCUS fronde sessili reniformi decussatim striata. Pavoninus.*
Linn. sp. 1162.
Fucus maritimus gallo-pavonis pennas referens. Baub.
prod. 155.
Fucus maritimus gallo-pavonis plumas referens. Tour.
569.
La Plume de paon.
HABITAT supra lapides & testacea in fundo maris. *Au*
port de Cette. Frondes pollicem latæ orbiculato-reni-
formes versicolores compressæ.
6. *Fucus frondibus planis palmatis. Linn. sp. 1162. Palmatus.*
Fucus manum referens. Tour. 568.
La Main de mer.
HABITAT cum priori. *Saxis, conchis arctè adhærens;*
neritas turbines buccina eligit. Rubens vel cinereus.
7. *FUCUS dichotomus ramosissimus teres uniformis Fastigiatus.*
fastigiatus. Linn. sp. 1162.
HABITAT cum prioribus. *Rami sæpè complanati; ci-*
nerius.
8. *FUCUS filiformis simplex subfragilis opacus. Linn. Filum;*
sp. 1162.
Fucus lentus fœniculaceus, coralloides lenta fœnicu-
lacea. Bot. Mons. 100.
Corallina marina minima lendigera. Tour. 571.
HABITAT cum congeneribus.

U L V A.

Char. prim.

Char. sec. *Rad. nulla. Caul. nulla. Fol. frondosa*
membranacea sessilis conchis scopulis & zoo-
phytis adhærens, tubulosa vel complanata.
Flor. inconspicua, fructificationibus in mem-
brana diaphana. Linn. syst. nat. 1069. Fulc.
nulla.

1. *ULVA tubulosa simplex. Linn. sp. 1163, Intestinalis.*
Tremella marina tubulosa. Sauv. 4.

Fucus tubulosus intestinorum forma. *Tour.* 568.

Le Boyau de chat.

HABITAT ad mare. Cinerea & albida.

Lactuca. 2. *ULVA* palmata prolifera membranacea, ramentis infernè angustatis. *Linn. sp.* 1163.

Fucus lactucæ folio. *Tour.* 568.

Muscus marinus lactucæ folio. *Bot. Mons.* 180.

La Laitue de mer.

HABITAT ad mare & in stagnis subjacentibus inter fucos & zosteram ubicumque adhærens.

CONFERVA.

Char. prim.

Char. secund. *Rad.* nulla. *Caul.* filiformis ramosissima vaga libera. *Flor.* tuberculis inæqualibus, in fibris capillaribus. *Linn. syst. nat.* 1070. *Frutificatio* ? *Fol.* nulla. *Fulc.* nulla.

* *Filamentis simplicibus æqualibus.*

Bivularis. 1. CONF. filamentis simplicissimis æqualibus. *Linn. sp.* 1164.

HABITAT in aquis circà urbem.

* *Filamentis ramosis æqualibus.*

Bullosa. 2. CONF. filamentis ramosis æqualibus, bullas aëreas includens. *Linn. sp.* 1164.

Conferva filis ramosis æqualibus radicatis. *Sauv.* 11.

La Queue de renard.

HABITAT in aquis stagnantibus; à *Caunelles*, *Laverune*, *Lattes*.

* *Filamentis geniculatis.*

Egagropila. 3. CONF. filamentis geniculatis ramosissimis è centro confertissimis globum constituentibus. *Linn. sp.* 1167.

Alcyonium decimum quartum. *Bot. Mons.* 7.

La Pomme de mer, ou Egagropile de mer.

HABITAT ad mare. Ovo gallinaceo major, fusca vel nigrescens, filis rigidis.

SPONGIA.

Char. prim.

Char. secund. *Rad.* nulla. *Caul.* poris pertusa

ramosa : filis seu pilis intricatis intertextis.
Linn. Syst. nat. 1072. *Fol.* nulla. *Flor.* . . *Fulc.* . .

* *Tenaces.*

1. SPONGIA tenax subramosa, ramis difformibus per- *Officialis.*
 tuis. *Linn. sp.* 1169.

Spongia ad usum præstantissima. *Tour.* 575.

L'Eponge ordinaire; vernaculè, *l'Espounga*.

HABITAT in mare scopulis & conchis adhærens.

2. SPONGIA turbinata cava. *Linn. sp.* 1170.

Infundibuli-
formis.

Spongia infundibulum imitata. *Tour.* 575.

L'Estounoir de mer; vernaculè, *lou Bonnet de Neptune*.

HABITAT inter saxa ostreis scatentia. *A Cetta.* Pileo quadrato major.

F U N G I.

A G A R I C U S.

Char. prim. . . .

Char. secund. *Rad.* subbulbosa. *Caul.* rarius nulla : simplicissima nuda vel volvata : pileus terminalis subtus lamellosus orbiculatus vel dimidiatus.

Linn. Syst. nat. 1074. *Fol.* . . *Flor.* . . *Fulc.* . .

Obs. Obscurus & ignotus volvæ usus. An fulcrum involucriforme?

* *Stipitati, pileo orbiculato.*

1. AGAR. stipitatus, lamellis ramosis decurrentibus. *Chaetarellus.*
Linn. sp. 1171.

Agaricus caulescens, lamellis . . . *Samb.* 2.

Fungus luteus seu pallidus se contorquens esculentus.

Bot. Monf. 103.

Vernaculè, *Gerille*.

HABITAT in herbidis juxta amnem.

2. AGAR. stipitatus, lamellis ramosis omnibus magnitudine æqualibus. *Linn. sp.* 1171.

Fungus supernè saturatè ruber esculentorum 13. generis species. *Bot. Monf.* 103.

HABITAT à Laverune, Gramont, Mauquo.

- Campestris*. 3. AGAR. stipitatus, pileo convexo squamato albido, lamellis ruffis, *Linn. sp. 1173. Sauv. 1.*
Fungus campestris albus, infernè rubens, *Bot. Mons. 102.*
Fungus pileo lato & rotundo. *Baub. Pin. 373.*
Le Champignon, vernaculè, *de Boulets.*
HABITAT copiosè à la Peissine, Laverune.
- Georgii*. 4. AGAR. stipitatus, pileo flavo convexo, lamellis albis. *Linn. sp. 1173.*
Fungus pileo lato orbiculari candicante. *Bot. Mons. 103.*
HABITAT cum priori, & à Gramont.
- Extinctorius*. 5. AGAR. stipitatus, pileo campaniformi albido lacero, lamellis niveis, stipite subbulboso subulato nudo. *Linn. sp. 1174.*
HABITAT à Lattes, Gramont. Circa fimeta, & à Bonnet.
- Fimetarius*. 6. AGAR. stipitatus, pileo campanulato lacero, lamellis nigris lateraliter flexuosis, stipite fistuloso. *Linn. sp. 1174.*
Fungus venenatus sine striis, supernè cinereus, infernè luteus. *Bot. Mons. 105.*
HABITAT circa hortos in fimetis.

* *Parasitici acaules dimidiati.*

- Quercinus*. 7. AGAR. acaulis, lamellis labyrinthiformibus. *Linn. sp. 1176.*
Agaricus villosus lamellis sinuosis & invicem implexis. *Sauv. 2.*
L'Agaric de chêne.
HABITAT supra quercus. A Rouquet, Valene, Carnelles.

BOLETUS.

Char. prim.

Char. secund. Rad. nulla vel subbulbosa. Caul. nulla vel simplicissima nuda aut volvata : pileus terminalis subtus porosus. *Linn. Syst. nat. 1075.*
Fol. . . . Flor. . . . Fulcr. . . .

* *Acaules parasitici.*

- Crispatus*. 1. BOLETUS acaulis ramosissimus, lamellis reniformibus anastomosantibus, margine undulatis integerrimis.

Agaricus seu fungus ramosus cristatus medius. *Barr.*
Icon. 1271.

β. Agaricus præcox albo-gilvus cristatus. *Tour.* 562.

Fungus palmatus. *Barr. Icon.* 1267.

γ. Agaricus major dendroides cristatus. *Tour.* 562.

Fungus foliaceus major carnosior dendroides. *Barr.*
Icon. 1268.

δ. Agaricus major dendroides multifidus. *Tour.* 562.

Fungus ramosus cristatus lobis angustioribus crispis.
Barr. Icon. 1272.

HABITAT supra quercus demortuas, filiquastrum,
abietes. Luxuriat in horto regio; à la Peissine.
Magnitudo capitis humani. Albus. Lamellæ palma-
res complanatae. Odor teterrimus.

2. BOLETUS acaulis pulvinatus lævis, poris tenuissimis. *Igniarins.*
Linn. sp. 1176.

Boletus perennis supernè cinereus, infernè luteus.
Sauv. 2.

Agaricus pedis equini facie. *Tour.* 562.

HABITAT supra truncos antiquarum arborum. *A La-
verune, Lattes.*

* *Stipitati.*

3. BOLETUS stipitatus, pileo pulvinato subviscido, *Luscens.*
poris rotundatis convexis flavissimis, stipite albido.
Linn. sp. 1177.

HABITAT à la Peissine, Lavalette.

P H A L L U S.

Char. prim.

Char. secund. *Rad.* subbulbosa. *Caul.* simplicissima
nuda vel volvata: pileus terminalis supra reti-
culatus, subtus lævis. *Linn. Syst. nat.* 1077.
Fol. . . . *Flor.* . . . *Fulc.* . . .

1. PHALLUS pileo ovato, stipite nudo rugoso. *Linn. Esulentus.*
sp. 1178.

Boletus esculentus rugosus albicans quasi fuligine in-
festus. *Tour.* 561. *tab.* 329. *fig.* A.

Fungus porosus. *Bot. Monj.* 101.

Phallus petiolo nudo, pileo subtus undique annexo.
Sauv. 3.

Vernaculè, la Mourisa.

HABITAT à Laverune, Lamonsson.

Impudicus. 2. PHALLUS volvarius stipitatus, pileo celluloso. Linn. sp. 1179.

Phallus volvarius pileo apice clauso. Fl. Suec. 1101.

Phallus volva exceptus pilei apice pervio. Sauv. 3.

Fungus foetidus penis imaginem referens. Bot. Monf. 296.

Fungus phalloides Gallus. Barr. Icon. 1264.

Le Membre viril.

HABITAT à Lattes, & au bois près de Perauls; à Monteils.

CLATHRUS.

Char. prim. . . .

Char. secund. Rad. subbulbosa. Caul. ramosa: ramis convergentibus anastomosantibus, cancellata volvata. Fol. . . Flor. . . Fulc. . .

Cancellatus. 1. CLATHRUS acaulis subrotundus. Linn. sp. 1179.

Fungus coralloides cancellatus. Bot. Monf. 296.

Boletus cancellatus purpureus. Tour. tab. 329. fig. 6.

Fungus cancellatus purpureus. Barr. Icon. 1263. & 1265.

HABITAT à Montferrier, Prades, Manguio. Ovatus vel rotundus.

CLAVARIA.

Char. prim.

Char. secund. Rad. subbulbosa. Caul. ramosa: ramis liberis: pileo nullo. Fol. . . Flor. . . . Fulc. . . .

Coralloides. 1. CLAV. ramis confertis ramosissimis inæqualibus. Linn. sp. 1182.

Fungus ramosus albidus. Bot. Monf. 104.

Coralloides flava & albida. Tour. 564. tab. 332. fig. B.

HABITAT à Corpouiran, St. George.

LYCOPERDON.

Char. prim. . . .

Char. secund. Rad. nulla. Caul. globosa intus cava vel solida, terrestris vel subterranea, nuda vel volvata. Fol. . . Flor. . . Fulc. . .

* *Solida subterranea nuda.*

1. LYCOP. solidum muricatum radice destitutum. *Linn. Tuber.*
sp. 1183.

Lycoperdon solidum. Sauv. 1.

Tubera Matthioli. Bot. Monsf. 272.

La Trufe.

HABITAT à Laverune dans le Parc, à Pignan.

* *Pu'verulenta supra terram.*

2. LYCOP. subrotundum, lacerato dehiscens. *Linn. sp. Bovista.*
1183.

Lycoperdon vulgare. Tour. 563.

La Vesse de loup.

HABITAT in pratis. A la Peissine, Laverune, Lattes,
Gramont.

3. LYCOP. volva patente multifida, capitulo glabro, *Stellatum.*
ore dentato acuminato. *Linn. sp. 1184.*


Geaster major umbilico fimbriato. Mich. gen. tab.

100. fig. 1. 2. 3.

La Vesse de loup étoilée.

HABITAT à Gramont, Lattes, Caunelles; sed rarius.

Ovo columbino simile. Volva dura.



PALMÆ

FLABELLIFOLIÆ.

CHAMÆROPS.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 987.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* nulla. *Fol.* petiolata radicalis simplex palmata. *Flor.* radicalis sessilis axillaris. *Fulc.* spinæ ad margines petiolorum.

Humilis. 1. CHAMÆROPS frondibus palmatis plicatis, stipitibus spinosis. Linn. sp. 1187.

Le Palmier à balay; vernaculè, las Escoubas.

HOSPITATUR sub dio. Abscissis quolibet anno foliis, radix denudata elevatur supra terram instar trunci...

Aloe, Agave.

CORYPHA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 987.

Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* arborea. *Fol.* sparsa petiolata simplex palmata. *Flor.* . . . *Fulc.* . . .

Umbraculi-fera. 1. CORYPHA frondibus plicatis pinnato-palmatis filis interjectis. Linn. sp. 1187.

HOSPITATUR in hybernaculo.

PENNATIFOLIÆ.

PHŒNIX.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 986.


Char. secund. *Rad.* ramosa. *Caul.* arborea. *Fol.* sparsa petiolata pinnata; foliolis alternis sessilibus complicatis integerrimis. *Flor.* . . . *Fulc.* spina ad apicem singuli folioli.

Dactylifera. 1. PHŒNIX frondibus pinnatis, foliolis complicatis. Linn. sp. 1188.

Le Dattier; vernaculè, lous Datus.


HOSPITATUR sub dio. Apricatur. Petioli ad basim subtetragoni; ad apicem triquetri.

APPENDIX.



FESTUCA
A gluma
B gluma
ciliata. pag. 48.
aristata
ciliata

AGROSTIS
A gluma
B semen
ventricosa. pag. 39.
ventricosa



APPENDIX.

Triandria Monogynia post Gladiolum. pag. 25.

ANTHOLYZA.

Char. prim. Vid. Linn. gen. pl. 48.

Char. secund. Rad. nodosa carnosae horizontalis.

Caul. herbacea articulata simplicissima. Fol. disticha alterna simplex integerrima vaginans ensiformis. Flor. terminalis spicata. Fulc. bractea duplex ad basim floris singuli; interiore minore bifida.

1. ANTHOL. staminibus omnibus ascendentibus. Linn. *Canonis*, sp. 37.

Antholyza corollarum alis reflexis: labio inferiore minuto. Linn. Syst. 863.

HOSPITATUR sub dio. Altitudo pedalis. Flores coccinei. Spica disticha. Floret autumnis, absque fructu.

Triandria Digynia ad Phalarim. pag. 34.

4. PHALARIS panicula spicata, petalis arista articulata, *Utriculata*, vagina folii supremi spathiformi. Linn. Syst. 869.

Gramen pratense spica purpurea ex utriculo prodeunte. Bauh. Pin. 3. & Bot. Mons. 114.

Gramen sp. catum pratense, spica &c. Tour. 519.

Gramen spicam folio amplectens. B. hist. 3. p. 469.

HABITAT à Lattes, Gaunelles, Gramont.

Ad Panica spicata. pag. 34.

- * 1. PANICUM spica tereti, involucellis bifloris fasciculato-pilosis, seminibus undulato-rugosis. Linn. *Glaucum*, Syst. 871.

Panicum (*glaucum* v.) spica simplici, aristis aggregatis flosculo subjectis. Linn. sp. 56.

Gramen paniceum spica simplici. Bot. Mons. 116. & molliori. Tour. 515.

HABITAT in arvis & fossis.

Ad Agrostim. pag. 41.

- Alba.* 9. AGROSTIS panicula laxa, calycibus muticis æqualibus. *Linn. sp.* 63.
 HABITAT à Gramont, Montferrier. Altitudo fescupedalis. Glumæ maturæ albæ vel citrinæ.
- Viridis.* 10. AGROSTIS panicula interrupta laxa, calycibus muticis æqualibus ovatis.
 Gramen radice repente panicula spadiceo-viridi, locustis exiguis muticis. *Scheuc. Gram.* 130.
 HABITAT au mont Saint Loup. cum agrost. ventricosa. Altitudo prioris.

Triandria Trigynia ante Polycarpon. pag. 58.

MONTIA.

Char. prim. Vid. *Linn. gen.* pl. 82.

Char. secund. Rad. fibrosa. Caul. herbacea ramosa articulata radicans. Fol. opposita sessilis simplex integerrima. Flor. axillaris pedunculata aggregata. Fulc. nulla.

- Fontana.* 1. MONTIA. *Linn. sp.* 87. *Sauv.* 127.
 HABITAT in aquis. A Valnagne, Aniane & vicinis. Folia ovata vel oblonga vel obversè-ovata. Pedunculi terni quaterni uniflori; vel quandoque solitarii multiflori.

Polyandria Monogynia ad Cistum. pag. 254.

- Lavipes.* * 9. CISTUS suffruticosus ascendens exstipulatus, foliis alternis linearibus glabris, pedunculis ramosis. *Linn. Syst.* 1077. *Cent.* 38.
 Cistus humilis sive chamæcistus ericæ folio, luteus erectior. *Bot. Monf.* 69.
 Helianthemum tenuifolium glabrum erectum, flore luteo. *Tour.* 249.
 HABITAT à Lacolombiere, Lavalette, Montferrier.

Polyandria Polygynia ad Helleborum. p. 268.

- Hymalis.* 3. HELLEBORUS flore folio insidente. *Linn. sp.* 557.
 Helleborus niger tuberosus, ranunculi folio, flore luteo. *Tour.* 172.

HOSPITATUR in frigidario. Scapus uniflorus. Bractea florem superans involucriformis. Floret Januario & Februario.

4. HELLEBORUS caule folioso multifloro, foliis digitatis. *Viridis;* *Linn. sp. 558.*

Helleborus niger hortensis flore viridi. *Tour. 272.*

HOSPITATUR in frigidario. Eodem tempore florens.

Altitudo prioris, seu palmaris. Flores cernui.

SYNONYMA ADDENDA.

Triandria Monogynia.

3. IRIS, pag. 26. *Pumila.*
Iris minor lutea. *Bot. Mons. 142.*
Iris humilis flore luteo. *Tour. 362.*

6. SCIRPUS, pag. 31. *Setaceus.*
HABITAT à Gramont, Salason, Montferrier.

Triandria Digynia.

1. AGROSTIS, pag. 39. An potius ad milii genus *ventricosa* referenda? & dicenda
Milium panicula spicata, calycibus subulatis inferne ventricosus, floribus aristatis.
Gramen serotinum arvense paniculâ contractâ pyramidali. *Scheuc. Gram. 148. Tab. 3. fig. 11. C. Icon imperfecta.*
Panicum serotinum arvense spica pyramidali. *Tour. 515.*
1. FESTUCA, pag. 48. *Deleantur Synonyma; & sequentia substituantur.* *Ciliata.*
Bromus spiculis duabus erectis alternis. *Linn. cent. 104. Syst. 877.*
Gramen spica bryzæ minus. *Bot. Mons. 121.*
Gramen loliaceum minus spica bryzæ prælonga, aristis donata. *Tour. 517.*
Festuca gracilis paucis utriculis. *Barr. Icon. 83. n° 2.*
5. TRITICUM, pag. 57. *Repens?*
Gramen caninum arvense. *Bot. Mons. 112.*
M in ij

Tetrandria Monogynia.

- Maritima.* 12. SCABIOSA, pag. 63.
Scabiosa maritima parva. *Bot. Monsf.* 231. *Tour.* 465.

Tetradynamia filiculosa.

- Euræa.* 6. IBERIS, pag. 319.
Taliopi umbellatum nasturtii folio Monspeliacum.
Bot. Monsf. 250.
Nasturtium sylvestre Dalechampii. *Tour.* 213.

Monadelphia Decandria.

- Columbinum* 19. GERANIUM, pag. 343.
Geranium columbinum tenuius laciniatum. *Bot. Monsf.* 107.

Diadelphia Decandria.

- Hirsutus.* 2. LUPINUS, pag. 361.
Lupinus flore purpurascente latifolius hirsutus. *Bot. Monsf.* 167.

F I N I S.

INDEX GENERUM,

Cum subiectis eorum Speciebus.

A.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| A CANTHUS, pag. <u>309.</u> | Moschatellina. |
| Mollis. | Æ GILOPS, pag. <u>515.</u> |
| Spinosus. | Ovata. |
| A CER, pag. <u>518.</u> | Truncialis. |
| Pseudoplatanus. | Æ GOPodium, pag. <u>152.</u> |
| Platanoides. | Podagraria. |
| Campestre. | Æ SCULUS, pag. <u>191.</u> |
| Montepessulanum. | Hippocastanum. |
| A CHILLEA, pag. <u>452.</u> | Æ THUSA, pag. <u>145.</u> |
| Santolina. | Cynapium. |
| Ageratum. | A GARICUS, pag. <u>539.</u> |
| Pubescens. | Chantarella. |
| Clavenna. | Integer. |
| Parmica. | Campestris. |
| Millefolium. | Georgii. |
| Nobilis. | Extinctorius. |
| A CHYRANTHES, pag. <u>116.</u> | Fametrius. |
| Aspera. | Quercinus. |
| A CONITUM, pag. <u>259.</u> | A GAVE, pag. <u>181.</u> |
| Lycostomum. | Americana. |
| Napellus. | A GRIMONIA, pag. <u>228.</u> |
| Anthora. | Eupatoria. |
| A CORUS, pag. <u>182.</u> | A GROSTEMMA, pag. <u>222.</u> |
| Calamus. | Githago. |
| A CROSTICHUM, pag. <u>524.</u> | Coronaria. |
| Septentrionale. | A GROSTIS, pag. <u>39.</u> & <u>546.</u> |
| Thelypteris. | Ventricola. |
| Pulchrum. | Calamagrostis. |
| A CTÆA, pag. <u>251.</u> | Spica Venti. |
| Spicata. | Rubra. |
| A DIANTUM, pag. <u>529.</u> | Canina. |
| Capillus Veneris. | Stolonifera. |
| A DONIS, pag. <u>264.</u> | Capillaris. |
| Annua. | Minima. |
| Vernalis. | Alba. |
| A DOXA, pag. <u>200.</u> | Viridis. |

INDEX GENERUM.

- AIR A**, pag. 41. **ALOPECURUS**, pag. 37.
 Cespitosa.
 Montana.
 Canescens.
 Caryophyllza.
 Flexuosa.
 Cristata.
 Aquatica.
- AJUGA**, pag. 262.
 Reprans.
- ALCEA**, pag. 346.
 Rosea.
 Ficifolia.
- ALCHEMILLA**, pag. 73.
 Vulgaris.
 Alpina.
- ALISMA**, pag. 189.
 Plantago.
 Damalonium.
 Ranunculoides.
- ALLIUM**, pag. 166.
 Ampeloprasum.
 Porrum.
 Victorialis.
 Subhirsutum.
 Roseum.
 Sativum.
 Scorodoprasum.
 Sphærocephalon.
 Molchatum.
 Flavum.
 Vincale.
 Oleraceum.
 Angulosum.
 Ascalonicum.
 Ursinum.
 Ceba.
 Fistulosum.
 Schœnoprasum.
- ALOE**, pag. 172.
 Perfoliata.
 Variegata.
 Disticha.
 Spiralis.
 Retusa.
 Vitcosa.
 Pumila.
- ALSINE**, pag. 156.
 Media.
- ALTHÆA**, pag. 345.
 Officinalis.
 Cannabina.
 Hirsuta.
- ALYSSUM**, pag. 320.
 Spinosum.
 Saxatile.
 Clypearum.
 Sinuatum.
 Creticum.
 Alyssoides.
 Campestre.
- AMARANTHUS**, pag. 486.
 Tricolor.
 Melancholicus.
 Græcizans.
 Blitum.
 Caudatus.
 Hybridus.
 Hypochondriacus.
 Spinosus.
- AMARYLLIS**, pag. 165.
 Lutea.
 Formosissima.
 Sarniensis.
- AMBROSIA**, pag. 486.
 Maritima.
- AMMI**, pag. 136.
 Majus.
- AMORPHA**, pag. 357.
 Fruticosa.
- AMYGDALUS**, pag. 238.
 Persica.
 Communis.
 Nana.
- ANAGALLIS**, pag. 92.
 Arvensis.
- ANAGYRIS**, pag. 203.
 Fœtida.

INDEX GENERUM.

- ANASTATICA**, pag. 313.
 Hierocuntica.
ANCHUSA, pag. 81.
 Ollicinalis.
 Sempervirens.
ANDRACHNE, pag. 499.
 Telephuoides.
ANDROPYCON, pag. 512.
 Gryllus.
 Ilchamum.
ANDROSACE, pag. 87.
 Maxima.
 Septentrionalis.
 Lactea.
 Carnca.
ANDRYALA, pag. 415.
 Integrifolia.
 Sinuata.
ANEMONE, pag. 261.
 Hepatica.
 Pulsatilla.
 Coronaria.
 Hortensis.
 Virginiana.
 Trifolia.
 Nemorosa.
ANETHUM, pag. 142.
 Graveolens.
 Foeniculum.
ANGELICA, pag. 141.
 Archangelica.
ANTHEMIS, pag. 450.
 Altissima.
 Maritima.
 Nobilis.
 Cotula.
 Arvensis.
 Pyrethrum.
 Valentina.
 Tinctoria.
ANTHEICUM, pag. 175.
 Ramosum.
 Liliago.
 Frutescens.
 Calyculatum.
ANTHRIRINUM, pag. 299.
 Asarina.
 Cymbalaria.
 Eatine.
 Sparium.
 Triphyllum.
 Bipunctatum.
 Arvense.
 Pelisserianum.
 Organifolium.
 Sapium.
 Linaria.
 Montpeffulanum.
 Minus.
 Majus.
 Orontium.
 Bellidifolium.
ANTHOLYZA, pag. 545.
 Canonia.
ANTHOXANTHUM, p. 20.
 Odoratum.
ANTHYLLIS, pag. 360.
 Tetraphylla.
 Vulgeraria.
 Montana.
 Barba Jovis.
 Cytoides.
APHANES, pag. 74.
 Arvensis.
APHYLLANTHUS, pag. 165.
 Monspeliensis.
APIUM, pag. 151.
 Petroselinum.
 Graveolens.
APOCYNUM, pag. 120.
 Androsatifolium.
 Venenum.
AQUILEGIA, pag. 260.
 Vulgaris.
ARABIS, pag. 330.
 Alpina.
 Thaliana.
 Turrita.
ARACHIS, pag. 376.
 Hypogea.
ARBUTUS, pag. 207.
 Unedo.

INDEX GENERUM.

- Uva ursi.
ARCTIUM, *pag. 420.*
 Lappa.
ARCTOTIS, *pag. 463.*
 Tristis.
ARENARIA, *pag. 218.*
 Trinervia.
 Serpyllifolia.
 Rubra.
 Saxatilis.
 Tenuifolia.
 Lanceifolia.
 Ciliata.
ARGEMONE, *pag. 253.*
 Mexicana.
ARISTOLOCHIA, *pag. 476.*
 Piftolochia.
 Rotunda.
 Longa.
 Clematidis.
ARNICA, *pag. 446.*
 Montana.
 Scorpioides.
ARTEMISIA, *pag. 432.*
 Abrotanum.
 Campetris.
 Maritima.
 Pontica.
 Abfiathum.
 Vulgaris.
 Dracunculus.
ARUM, *pag. 477.*
 Dracunculus.
 Colocasia.
 Maculatum.
 Arifarium.
ARUNDU, *pag. 54.*
 Donax.
 Phragmites.
 Calamagrostis.
 Arenaria.
ASARUM, *pag. 226.*
 Europæum.
 Hypocitris.
ASCLEPIAS, *pag. 121.*
 Syriaca.
 Nivea.
 Incarnata.
 Curassavica.
 Vincetoxicum.
 Nigra.
 Fruticosa.
ASPARAGUS, *pag. 176.*
 Officinalis.
 Acutifolius.
ASPERUGO, *pag. 85.*
 Procumbens.
ASPERULA, *pag. 65.*
 Odorata.
 Arvensis.
 Taurina.
 Tinctoria.
 Cyaneica.
ASPHODELUS, *pag. 174.*
 Luteus.
 Fistulosus.
 Ramofus.
ASPLENIUM, *pag. 525.*
 Scolopendrium.
 Ceterach.
 Trichomanes.
 Adiantum nigrum.
 Ruta muraria.
 Onopteris.
ASTER, *pag. 441.*
 Alpinus.
 Tripolum.
 Amellus.
 Sedifolius.
 Novæ Angliæ.
 Lævis.
 Tradescanti.
 Chinenfis.
ASTRAGALUS, *pag. 383.*
 Alopecuroides.
 Galegitormis.
 Cicer.
 Glycyphyllos.
 Hamofus.
 Bæticus.
 Selameus.
 Monfpellanus.

INDEX GENERUM.

- Incanus.
 Montanus.
 Tragacantha.
ASTRANTIA, pag. 131.
 Major.
ATHAMANTA, pag. 138.
 Libanotis.
 Oreoselinum.
 Cretensis.
 Meum.
ATRACTYLIS, pag. 426.
 Cancellata.
ATRIPLEX, pag. 517.
 Portulacoides.
 Hortensis.
 Laciniata.
 Hastata.
 Patula.
ATROPA, pag. 106.
 Humifusa.
 Mandragora.
 Belladonna.
 Physalodes.
AVENA, pag. 52.
 Bromoides.
 Sativa.
 Elatior.
 Farua.
 Flavescens.
 Fragilis.
 Pratenfis.
- B.
- BALLOTA**, pag. 283.
 Nigra.
BASELLA, pag. 156.
 Rubra.
BELLIS, pag. 447.
 Perennis.
 Annua.
BERBERIS, pag. 184.
 Vulgaris.
BETA, pag. 126.
 Vulgaris.
- BETONICA**, pag. 276.
 Officinalis.
 Orientalis.
 Annua.
 Hirca.
BETULA, pag. 483.
 Ainus.
BIDENS, pag. 428.
 Tripartita.
 Cernua.
 Frondosa.
 Bipinnata.
BIGNONIA, pag. 305.
 Radicans.
BISCUTELLA, pag. 322.
 Auriculata.
 Didyma.
BISERRULA, pag. 386.
 Pelecinus.
BLITUM, pag. 3.
 Virgatum.
BOCCONIA, pag. 228.
 Frutescens.
BOERHAVIA, pag. 1.
 Scandens.
 Erecta.
BOLETUS, pag. 540.
 Cristatus.
 Ignarius.
 Luteus.
BOERHAGO, pag. 84.
 Officinalis.
 Indica.
 Orientalis.
BRASSICA, pag. 332.
 Orientalis.
 Napus.
 Rapa.
 Oleracea.
 Erucastrum.
 Eruca.
BRIZA, pag. 45.
 Monspessulana.
 Eragrostis.
 Minor.

INDEX GENERUM.

- Media.
Maxima.
- BROMELIA**, *pag. 162.*
Ananas.
- BROMUS**, *pag. 50.*
Serafinus.
Squarrosus.
Sterilis.
Arvensis.
Tectorum.
Pinnatus.
- BRUNELLA**, *pag. 294.*
Vulgaris.
Hystrofolia.
- BRYONIA**, *pag. 498.*
Alba.
Laciniosa.
- BRYUM**, *pag. 532.*
Extingtorium.
Murale.
Pomiforme.
- BUBON**, *pag. 143.*
Macedonicum.
- BUFFONIA**, *pag. 59.*
Tenuifolia.
- BUNIAS**, *pag. 334.*
Erucago.
Orientalis.
Cakile.
- BUNIUM**, *pag. 137.*
Bulbocastanum.
- BUPHTHALMUM**, *p. 454.*
Spinosum.
Aquaticum.
Salicifolium.
Grandiflorum.
- BUPLEURUM**, *p. 132.*
Rotundifolium.
Odontites.
Rigidum.
Tenuissimum.
Fruticosum.
- BUTOMUS**, *pag. 202.*
Umbellatus.
- BUXUS**, *pag. 483.*
Sempervirens.
- C.
- CACALIA**, *pag. 419.*
Antieuphorbium.
Kleinia.
Alpina.
- CACHRYS**, *pag. 139.*
Libanotis.
- CACTUS**, *pag. 236.*
Mammillaris.
Peruvianus.
Grandiflorus.
Decemangularis.
Triangularis.
Opuntia.
Ficus indica.
Tuna.
Cochenillifer.
Curassavicus.
- CALFENDULA**, *p. 462.*
Officinalis.
Pluvialis.
Hybrida.
- CALLITRICHE**, *p. 3.*
Autumnalis.
Verna.
- CALTHA**, *pag. 268.*
Populago.
- CAMPANULA**, *p. 96.*
Rotundifolia.
Rapunclus.
Persicifolia.
Pyramidalis.
Trachelium.
Glomerata.
Medium.
Canariensis.
Speculum.
Erinus.
Perfoliata.
- CAMPHOROSMA**, *p. 72.*
Monspeliaca.
- CANNA**, *pag. 1.*
Indica.

INDEX GENERUM

- CANNABIS**, pag. 504.
Sativa.
- CAPPARIS**, pag. 251.
Spinosa.
- CAPRARIA**, pag. 306.
Biflora.
- CAPSICUM**, pag. 111.
Annuum.
Frutescens.
- CARDAMINE**, p. 324.
Impatiens.
Hirsuta.
Pratenfis.
Amara.
Refedifolia.
Lunaria.
- CARDIOSPERMUM**, p. 122.
Halicacabum.
- CARDUUS**, pag. 421.
Lanceolatus.
Nutans.
Acanthoides.
Crispes.
Monfpellulanus.
Marianus.
Eriophorus.
Tuberosus.
- CAREX**, pag. 481.
Dioica.
Leporina.
Vulpina.
Muricata.
Flava.
Digitata.
Pleido-cyperus.
Acuta.
Veficaria.
- CARLINA**, pag. 425.
Acaulis.
Lanata.
Corymbofa.
Racemofa.
- CARPINUS**, pag. 492.
Betulus.
- CARTHAMUS**, p. 427.
Tinctorius.
Lanatus.
Carduncellus.
- CARUM**, pag. 150.
Carvi.
- CASSIA**, pag. 203.
Senna.
Occidentalis.
Planifolia.
- CATANANCHE**, p. 418.
Cerulea.
Lutea.
- CAUCALIS**, pag. 135.
Maritima.
Grandiflora.
Daucoides.
Platycarpus.
Leptophylla.
- CELOSIA**, pag. 117.
Argentea.
Cristata.
- CELTIS**, pag. 512.
Australis.
- CENCHRUS**, pag. 514.
Racemofus.
Capitatus.
- CENTAUREA**, p. 457.
Crepina.
Molchata.
Phrygia.
Nigra.
Pullata.
Montana.
Cyanus.
Paniculata.
Sempervirens.
Scabiofa.
Jacea.
Conifera.
Seridis.
Aspera.
Calcitrapa.
Solstitialis.
Melitenfis.
Sicula.
Calcitrapoides.
Centauroides.

INDEX GENERUM.

- Collina.
 Salmantica.
 Galactites.
CERASTIUM, p. 223.
 Viscosum.
 Arvense.
 Repens.
 Tomentosum.
 Latifolium.
CERATONIA, p. 503.
 Siliqua.
CERATOPHYLLUM, p. 488.
 Demorsum.
CERCIS, pag. 203.
 Siliquastrum.
CERINTHE, pag. 83.
 Major.
 Echiioides.
CHÆROPHYLLUM, p. 146.
 Sylvestre.
 Temulum.
 Hirsutum.
CHAMÆROPS, p. 544.
 Humilis.
CHARA, pag. 535.
 Vulgaris.
CHEIRANTHUS, pag. 328.
 Erysimoidea.
 Cheiri.
 Incanus.
 Annuus.
 Fruticulosus.
 Fenestralis.
CHELIDONIUM, pag. 251.
 Majus.
 Glaucium.
 Corniculatum.
 Hybridum.
CHENOPODIUM, pag. 123.
 Bonus Henricus.
 Rubrum.
 Album.
 Viride.
 Hybridum.
 Borrys.
 Ambrosioides.
 Vulvaria.
 Polyspermum.
 Scoparium.
 Maritimum.
 Fruticosum.
 Hirsutum.
CHONDRILLA, p. 409.
 Juncea.
CHRYSANTHEMUM, p. 448.
 Leucanthemum.
 Montanum.
 Graminifolium.
 Montpelienfe.
 Corymbosum.
 Segetum.
 Coronarium.
 Flosculosum.
CHRYSOCOMA, pag. 431.
 Linofyris.
CHRYSOSPLENIUM, p. 208.
 Oppositifolium.
CICER, pag. 373.
 Arietinum.
CICHORIUM, p. 418.
 Intybus.
 Spinofum.
CINARA, pag. 415.
 Scolymus.
 Cardunculus.
 Humilis.
CIRCEA, pag. 8.
 Lutetiana.
CISTUS, pag. 254. 546.
 Laurifolia.
 Ladanifera.
 Monspeliensis.
 Albida.
 Salvifolia.
 Crispa.
 Fumaria.
 Lavipes.
 Canus.
 Tuberaria.
 Guttatus.
 Leditolius.
 Nammularius.

INDEX GENERUM.

- Serpyllifolius.
Thymifolius.
Pilosus.
Helianthemum.
Hirtus.
- CITRUS**, pag. 401.
Medica.
Aurantium.
- CLATHRUS**, pag. 542.
Cancellatus.
- CLAVARIA**, pag. 542.
Coralloides.
- CLEMATIS**, pag. 262.
Vitalba.
Flammula.
Recta.
Integrifolia.
- CLEOME**, pag. 336.
Gynandra.
Ornithopodioides.
- CLINOPODIUM**, pag. 287.
Vulgare.
- CLYPEOLA**, pag. 322.
Jonthlaspi.
Maritima.
- CNEORUM**, pag. 23.
Tricoccus.
- CNICUS**, pag. 423.
Acarna.
Benedictus.
- COCHLEARIA**, pag. 317.
Officinalis.
Draba.
Coronopus.
Armoracia.
- COFFEA**, pag. 100.
Arabica.
- COIX**, pag. 481.
Lachryma Jobi.
- COLCHICUM**, pag. 189.
Autumnale.
- COLUTEA**, pag. 364.
Arborefcens.
Frutefcens.
- COMMELINA**, pag. 27.
Communis.
- CONFERRA**, pag. 538.
Rivularis.
Bulfofa.
Agagropila.
- CONIUM**, pag. 137.
Maculatum.
- CONVALLARIA**, pag. 176.
Majalis.
Bifolia.
Verticillata.
Polygonatum.
Multiflora.
- CONVOLVULUS**, pag. 93.
Arvensis.
Sepium.
Hederaceus.
Althæoides.
Cneorum.
Cantabrica.
Tricolor.
Soldanella.
- CONYZA**, pag. 436.
Squarrofa.
Bifrons.
Chinenfis.
- CORCHORUS**, pag. 257.
Siliquofus.
Oltorius.
- CORÆOPSIS**, pag. 456.
Leucanthema.
Tripteris.
Alternifolia.
- CORIANDRUM**, pag. 145.
Majus.
- CORIARIA**, pag. 508.
Myrsifolia.
- CORIS**, pag. 102.
Moufpelienfis.
- CORISPERMUM**, pag. 3.
Hyffopifolium.
- CORNUS**, pag. 71.
Mas.
Sanguinea.
- CORONILLA**, pag. 377.
Emerus.
Juncea.

INDEX GENERUM.

| | | | |
|-----------------------|--|------------------------|--|
| Valentina. | | Monspeliaca. | |
| Glauc. | | CUCUBALUS, pag. 215. | |
| Minima. | | Baccifer. | |
| Securidaca. | | Behen. | |
| Varia. | | Tataricus. | |
| CORRIGIOLA, pag. 155. | | Catholicus. | |
| Littoralis. | | Orites. | |
| CORYLUS, pag. 493. | | Reflexus. | |
| Avellana. | | CUCUMIS, pag. 498. | |
| CORYPHA, pag. 544. | | Colocynthis. | |
| Umbraculifera. | | Anguria. | |
| COTYLEDON, pag. 220. | | Melo. | |
| Orbiculata. | | Sativus. | |
| Hemisphaerica. | | CUCURBITA, pag. 497. | |
| Umbilicus. | | Lagenaria. | |
| Laciniata. | | Pepo. | |
| CRAMBE, pag. 336. | | Melopepo. | |
| Maritima. | | Citrullus. | |
| Orientalis. | | CUPRESSUS, pag. 495. | |
| Hispanica. | | Sempervirens. | |
| CRASSULA, pag. 160. | | CUSCUTA, pag. 74. | |
| Perfoliata. | | Europaea. | |
| Tetragona. | | CYCLAMEN, pag. 89. | |
| CRATÆGUS, pag. 240. | | Europæum. | |
| Aria. | | CYNANCHUM, pag. 120. | |
| Terminalis. | | Monspeliacum. | |
| Oxyacantha. | | Erectum. | |
| Azarolus. | | CYNOGLOSSUM, pag. 81. | |
| CREPIS, pag. 413. | | Officinale. | |
| Barbata. | | Cherisfolium. | |
| Rubra. | | Apenninum. | |
| Pulchra. | | Linifolium. | |
| Biennis. | | CYNOSURUS, pag. 47. | |
| Fœtida. | | Cristatus. | |
| CRESSA, pag. 126. | | Echinatus. | |
| Cretica. | | Indicus. | |
| CRITHMUM, pag. 139. | | Panicus. | |
| Maritimum. | | CYPERUS, pag. 28. | |
| CROCUS, pag. 24. | | Longus. | |
| Sativus. | | Flavescens. | |
| CROTON, pag. 495. | | Fuscus. | |
| Tinctorium. | | CYPRIPEDIUM, pag. 474. | |
| CRUCIANELLA, pag. 67. | | Calceolus. | |
| Angustifolia. | | CYTISUS, pag. 375. | |
| Larifolia. | | Laburnum. | |
| Maritima. | | Nigricans. | |

INDEX GENERUM

Sessilifolius.
Sapinus.
Monspessulanus.
Argenteus.

D

DACTYLIS, pag. 47.
Glomeratus.

DAPHNE, pag. 196.
Mezereum.
Thymelæa.
Laureola.
Gordium.

DATISCA, pag. 508.
Cannabina.

DATURA, pag. 104.
Stramonium.
Ferox.
Metel.

DAUCUS, pag. 136.
Carota.
Vilnaga.
Gingidium.

DELPHINIUM, pag. 258.
Consolida.
Ajacis.
Elatum.
Scaphisagria.

DENTARIA, pag. 323.
Pentaphyllos.

DIANTHUS, pag. 213.
Barbatus.
Carthusianorum.
Armeria.
Prolifer.
Caryophyllus.
Deltoides.
Chænensis.
Plumarius.
Arenarius.

DICTAMNUS, pag. 205.
Albus.

DIGITALIS, pag. 304.
Purpurea.
Lutea.

DIOSMA, pag. 113.
Rubra.

DIOSPYROS, pag. 521.
Lorus.

DIPSACUS, pag. 60.
Fullonum.
Laciniatus.

DOLICHOS, pag. 365.
Lablab.
Sinenlis.

DORONICUM, pag. 446.
Pardalanches.
Plantagineum.
Bellidiastrum.

DRABA, pag. 313.
Verna.

Muralis.
Nemorosa.
Incana.

DRACOCEPHALUM, pag. 121.

Canariense.
Ruyfchiana.
Moldavica.
Canescens.
Thymiflora.

DROSERA, pag. 160.
Rotundifolia.

E

ECHINOPHORA, p. 133.
Spinosa.

ECHINOPS, pag. 419.
Sphærocephalus.
Ritro.

ECHIVM, pag. 86.
Italicum.
Vulgare.
Creticum.

ELYMUS, pag. 56.
Arenarius.

EPHEBRA, pag. 510.
Dystachia.

INDEX GENERUM

- EPILOBIMUM**, pag. 193.
 Angustifolium.
 Hirsutum.
 Montanum.
 Tetragonum.
EQUISETUM, pag. 522.
 Arvense.
 Palustre.
 Fluviale.
 Hyemale.
ERICA, pag. 194.
 Vulgaris.
 Scoparia.
 Viridi-purpurea.
 Cinerea.
 Arborea.
 Multiflora.
ERIGERON, pag. 437.
 Viscosum.
 Graveolens.
 Canadense.
 Philadelphicum.
 Acre.
 Siculum.
 Tuberosum.
ERINUS, pag. 306.
 Alpinus.
ERIOPHORUM, p. 32.
 Vaginatum.
 Polystachion.
ERVUM, pag. 373.
 Lens.
 Tetraspermum.
 Hirsutum.
 Ervum.
 Solonense.
ERYNGIUM, pag. 130.
 Maritimum.
 Campefire.
 Amethystinum.
ERYSIMUM, pag. 327.
 Officinale.
 Barbarea.
 Alliaria.
 Cheiranthoides.
 Repandum.
EVONYMUS, pag. 113.
 Europæus.
EUPATORIUM, pag. 429.
 Cannabinum.
 Cælestinum.
EUPHORBIA, pag. 230.
 Canariensis.
 Officinarium.
 Neriofolia.
 Viminalis.
 Mauritanica.
 Tirucalli.
 Caput medusæ.
 Maculata.
 Chamælyce.
 Peplis.
 Peplus.
 Exigua.
 Lathyrus.
 Spinosa.
 Dulcis.
 Pithyusa.
 Paralias.
 Segetalis.
 Helioscopia.
 Serrata.
 Verrucosa.
 Platyphyllos.
 Pilosa.
 Esula.
 Cyparissias.
 Myrsinites.
 Amygdaloides.
 Sylvatica.
 Characias.
EUPHRASIA, pag. 296.
 Latifolia.
 Officinalis.
 Odonites.
 Lutea.

F

- FAGONIA**, pag. 206.
 Cretica.
FAGUS,

INDEX GENERUM

FAGUS, pag. 422.

Castanea.
Sylvarica.

FENULA, pag. 140.
Communis.

FESTUCA, pag. 48.

Ciliata.
Ovina.
Rubra.
Myuros.
Bromoides.
Fluitans.

FICUS, pag. 521.
Carica.

FILAGO, pag. 464.

Pygmaea.
Maritima.
Germanica.
Montana.
Arvensis.

FONTINALIS, pag. 530.
Antipyretica.

FRAGARIA, pag. 247.
Vesca.
Sterilis.

FRANKENIA, pag. 185.
Lævis.
Pulverulenta.

FRAXINUS, pag. 510.
Excelsior.
Ornus.

FRITILLARIA, p. 170.
Imperialis.
Persica.

FUCUS, pag. 536.
Vesiculofus.

Natans.
Siliquosus.
Cartilagineus.
Pavoninus.
Palmaris.
Fastigiatus.
Filum.

FUMARIA, pag. 353.

Bulbosa.
Capnoides.

Officinalis.
Spicata.
Capreolata.
Claviculata.

G

GALANTHUS, p. 163.
Nivalis.

GALFUA, pag. 358.
Officinalis.

GALIOPSIS, pag. 281.
Ladanum.
Tetraant.

Galeobdolon.

GALLIUM, pag. 66.
Palustre.

Verum.
Mollugo.
Glaucum.
Rotundifolium.
Aparine.

GARIDELLA, p. 219.
Nigellastrum.

GENISTA, pag. 356.
Sagittalis.

Tinctoria.
Pilosa.
Hispanica.
Germanica.

GENTIANA, pag. 128.
Lutea.

Atclepiadea.
Centaureum.
Campetris.
Cruciata.
Perfoliata.

GERANIUM, pag. 332.
Triste.

Inguinans.
Papilionaceum.
Acetosum.
Zonale.
Vitifolium.
Alchimiloides.
Cicutarium.

INDEX GENERUM.

- Malaroides.
 Grunum.
 Tuberosum.
 Phœum.
 Nodosum. *l*
 Sylvaticum.
 Pratenſe.
 Robertianum.
 Molle.
 Lucidum.
 Columbinum.
 Rotundifolium.
 Sanguineum.
 Dissectum.
G E U M, *pag. 242.*
 Urbanum.
 Rivale.
 Montanum.
GLADIOLUS, *pag. 21.*
 Communis.
GLECHOMA, *pag. 280.*
 Hederacea.
GLEDITSIA, *pag. 520.*
 Triacanthos.
GLOBULARIA, *pag. 60.*
 Alypum.
 Vulgaris.
GLYCYRRHIZA, *pag. 376.*
 Echinata.
 Glabra.
GNAPHALIUM, *p. 434.*
 Dioicum.
 Fœtidum.
 Luteo-album.
 Stœchas.
 Sordidum.
 Uliginosum.
 Saxatile.
GOMPHRENA, *pag. 127.*
 Globosa.
GOSSYPIUM, *pag. 350.*
 Herbaceum.
 Barbatenſe.
 Arboreum.
GRATIOIA, *pag. 13.*
 Officinalis.
- GUILLANDINA**, *p. 104.*
 Bonduc.
GYPHOPHILA, *p. 211.*
 Aggregata.
 Fastigiata.
 Rigida.
 Saxifraga.
- H**
- HEDERA**, *pag. 115.*
 Helix.
 Quinquifolia.
HEDISARUM, *p. 381.*
 Canadense.
 Canalicens.
 Coronarium.
 Onobrychis.
 Caput galli.
 Humile.
HELIANTHUS, *pag. 455.*
 Annuus.
 Multiflorus.
 Tuberosus.
 Atro-rubens.
HELYOTROPIMUM, *pag. 78.*
 Europœum.
 Curassavicum.
HELLEBORUS, *p. 268. & 546.*
 Niger.
 Fœtidus.
 Hyemalis.
 Viridis.
HEMEROCALLIS, *pag. 181.*
 Lilio-Asphodelus.
HERACLEUM, *p. 141.*
 Sphondylium.
 Alpium.
HERMANNIA, *p. 338.*
 Hyssopifolia.
HERNARIÀ, *pag. 123.*
 Glabra.
 Hirsuta.
HESPERIS, *pag. 329.*
 Tristis.

INDEX GENERUM.

- Matronalis.
 Africana.
 Provincialis.
 Verna.
 Sibirica.
HEUCHERA, pag. 128.
 Americana.
HIBISCUS, pag. 350.
 Syriacus.
 Trionum.
 Sabdariffa.
 Mambor.
 Abolmoschus.
 Esculentus.
HIERACIUM, pag. 412.
 Hedyroides.
 Alpium.
 Pilosella.
 Dubium.
 Præmorium.
 Marorum.
 Sabaudum.
 Umbellatum.
HIPPOCREPIS, p. 380.
 Unifiliquosa.
 Multifiliquosa.
 Comosa.
HIPPURIS, pag. 2.
 Vulgaris.
HOLCUS, pag. 513.
 Sorghum.
 Halepensis.
 Lanatus.
 Odoratus.
 Mollis.
HORDEUM, pag. 58.
 Vulgare.
 Distichon.
 Marinum.
HORMINUM, pag. 292.
 Virginicum.
HUMULUS, pag. 504.
 Lupulus.
HYACINTHUS, p. 178.
 Serotinus.
 Orientalis.
 Muscari.
 Comosus.
 Reruyoides.
HYDROCHARIS, pag. 507.
 Morlus ranz.
HYDROCOTYLE, pag. 130.
 Vulgaris.
HYOCYAMUS, pag. 105.
 Niger.
 Albus.
 Aureus.
HYOSERIS, pag. 415.
 Fœuda.
 Racata.
 Minima.
 Hedypnis.
HYPERICUM, pag. 74.
 Procumbens.
 Pendulum.
HYPERICUM, p. 401.
 Androsæmum.
 Hircinum.
 Quadrangulum.
 Perforatum.
 Hirsutum.
 Tomentosum.
 Pulchrum.
HYPOCHÆRIS, p. 416.
 Achyrophorus.
 Maculata.
 Glabra.
 Radicata.
HYSSOPUS, pag. 274.
 Officinalis.
 Lophantus.
 J
JASIONE, pag. 466.
 Montana.
JASMINUM, pag. 1.
 Officinale.
 Azoricum.
 Fruticans.
 Hamile.

INDEX GENERUM.

- I**RRIS, pag. 318.
 Semperflorens.
 Sempervirens.
 Umbellata.
 Amara.
 Nudicaulis.
 Pinnata.
- I**LIX, pag. 75.
 Aquifolium.
- I**LLECEBRUM, p. 117.
 Verticillatum.
 Cymosum.
 Patonica.
 Capitatam.
- I**MPATIENS, pag. 467.
 Balsamina.
 Nolimetangere.
- I**NDIGOFEA, p. 383.
 Tinctoria.
- I**NULA, pag. 444.
 Helenum.
 Oculus Christi.
 Dysenterica.
 Puberula.
 Salicina.
 Carminodes.
 Montana.
- I**POMEA, pag. 95.
 Quamoclit.
 Coccinea.
 Violacea.
 Trioba.
- I**RIS, pag. 25.
 Germanica.
 Florentina.
 Pumila.
 Pseudoacorus.
 Foetidissima.
 Tiberica.
 Alpina.
- I**SATIS, pag. 335.
 Tinctoria.
- I**SOPYRUM, pag. 267.
 Fumaroides.
- J**UGLANS, pag. 422.
 Regia.
- J**UNCUS, pag. 181.
 Acutus.
 Conlogmeratus.
 Effusus.
 Inflexus.
 Squarrosus.
 Articularis.
 Rafonius.
 Campestris.
 Pilosus.
 Spicatus.
- J**UNIPERUS, pag. 509.
 Oxycedrus.
 Phoenicea.
 Lycia.
 Sabina.
 Communis.
- J**USTICIA, pag. 13.
 Adliatoda.
- I**XIA, pag. 25.
 Chinensis.
- K**
- K**NAUTIA, pag. 64.
 Orientalis.
- L**
- L**ACTUCA, pag. 408.
 Sativa.
 Virgata.
 Saligna.
 Perennis.
- L**AGOECIA, pag. 116.
 Cuminoides.
- L**AGURUS, pag. 54.
 Ovatus.
- L**AMIMUM, pag. 280.
 Album.
 Porpureum.
 Amplex caule.
- L**ANTANA, pag. 305.
 Trifolia.
 Spinoza.
- L**APSANA, pag. 417.

INDEX GENERUM.

- Communis.
Zacintha.
Stellata.
Capillaris.
Rhiagadrolus.
LASERPITIUM, pag. 140.
Gallicum.
Siler.
Chironium.
LATHYRUS, p. 367.
Nissolia.
Aphaca.
Amphicarpos.
Cicera.
Sativus.
Setifolius.
Angulatus.
Oderatus.
Hirtatus.
Annuus.
Tuberosus.
Pratenfis.
Laciniolus.
Heterophyllus.
LAVANDULA, p. 275.
Stoechas.
Multifida.
Dentata.
Spica.
LAVATERA, p. 348.
Arborea.
Olibia.
Triloba.
Thuringiaca.
Trimestris.
LAURUS, p. 201.
Nobilis.
LEMNA, p. 479.
Trifolca.
Minor.
LEONTODON, p. 410.
Taraxacum.
Bulbosum.
Autumnale.
Tuberosum.
Hispidum.
Hirtum.
LEONURUS, p. 284.
Cardiaca.
Tataricus.
LEPIDIUM, p. 314.
Nudicaule.
Procumbens.
Cardaminace.
Petraeum.
Sativum.
Lanifolium.
Ruderaie.
Iberis.
LEUCOJUM, p. 163.
Autumnale.
LICHEN, p. 533.
Pulmonarius.
Fuscescens.
Pyxidatus.
Rangiferinus.
Pneatus.
Barbatus.
LIGUSTICUM, p. 141.
Levillicum.
LIGUSTRUM, p. 6.
Vulgare.
LILLIUM, p. 162.
Candidum.
Chalcedonicum.
Marsagon.
LINNEA, p. 307.
Borealis.
LINUM, p. 158.
Ultratissimum.
Perenne.
Narbonense.
Toenifolium.
Tegynum.
Flavum.
Strictum.
Campanulatum.
Maritimum.
Catharticum.
LITHOSPERMUM, p. 80.
Officinale.
Arvenle.
Purpureo-Ceruleum.

INDEX GENERUM.

- Tinctorum.
 Fracticolam.
LOBELIA, p. 466.
 Laureata.
LILIUM, p. 54.
 Perenne.
 Temulentum.
LONICERA, p. 101.
 Caprifoliata.
 Periclymenum.
 Xiloleum.
 Alpigena.
LOTUS, p. 393.
 Maritima.
 Conjugata.
 Siliquola.
 Pergrina.
 Angustifolia.
 Ornithopodioides.
 Jacobæus.
 Hirsuta.
 Recta.
 Corniculata.
 Dorycnium.
LUNARIA, p. 323.
 Rediviva.
LUPINUS, p. 362.
 Varius.
 Hirsutus.
 Luteus.
LYCHNIS, p. 223.
 Chalcedonica.
 Flos cuculi.
 Dioica.
LYCIUM, p. 111.
 Europæum.
LYCOPERDON, p. 542.
 Tuber.
 Bovilla.
 Stellatum.
LYCOPodium, p. 530.
 Clavatum.
 Alpinum.
 Denticulatum.
LYCOPASIS, p. 85.
 Vesicaria.
 Arvensis.
LYCOPUS, p. 15.
 Palustris.
LYSIMACHIA, p. 20.
 Vulgaris.
 Ephemèrum.
 Atropurpurea.
 Linum stellatum.
 Nemorum.
 Nammularia.
 Tenella.
LYTHRUM, p. 227.
 Salicaria.
 Hyssopifolium.
 Thymifolium.

 M.
MALLOPE, pag. 349.
 Malacoides.
MALVA, pag. 347.
 Coromandeliana.
 Peruviana.
 Capensis.
 Caroliniana.
 Rotundifolia.
 Sylvestris.
 Alcea.
 Moschata.
MARCHANTIA, p. 532.
 Polymorpha.
 Crucata.
 Hemisphærica.
 Conica.
MARRUBIUM, p. 285.
 Peregrinum.
 Hispanicum.
 Vulgare.
 Pseudo dictamnus.
 Acerabulosum.
MARSILEA, pag. 529.
 Natans.
MARTYNIA, pag. 302.
 Annua.
MATRICARIA, p. 442.
 Parthenium.

INDEX GENERUM.

- Chamomilla.
 Argentea.
 Inodora.
MEDICAGO, pag. 397.
 Radiata.
 Circinnata.
 Sativa.
 Falcata.
 Lupulina.
 Marina.
 Polymorpha.
MELAMPYRUM, pag. 297.
 Arvense.
 Pratense.
MELIA, pag. 106.
 Azedarach.
MELIANTHUS, p. 309.
 Minor.
MELICA, pag. 41.
 Nutans.
 Ciliata.
MELISSA, pag. 290.
 Officinalis.
 Grandiflora.
 Calamintha.
 Nepeta.
MELITTIS, pag. 293.
 Meliophyllum.
MELOTHRIA, p. 24.
 Pendula.
MENIANTHES, p. 89.
 Trifoliata.
MENISPERMUM, pag. 189.
 Virginicum.
MENTHA, pag. 278.
 Spicata.
 Aquatica.
 Gentilis.
 Pulegium.
 Cervina.
MERCURIALIS, pag. 506.
 Perennis.
 Annuua.
 Tomentosa.
MESEMBRIANTHEMUM,
 pag. 242.
 Crystallinum.
 Bellidiflorum.
 Deltoideum.
 Barbatum.
 Acinaciforme.
 Crassifolium.
 Scabrum.
 Glaucum.
 Dolabritorme.
MESPILUS, pag. 242.
 Germanica.
 Pyracantha.
 Amelanchier.
 Cotoneaster.
MILIUM, pag. 38.
 Paradoxum.
MIMOSA, pag. 519.
 Sensitiva.
 Padica.
 Pernambuco.
 Farnesiana.
MIRABILIS, pag. 102.
 Jalappa.
MNIUM, pag. 531.
 Hygrometricum.
 Capillare.
 Fontanum.
MOHRINGIA, p. 197.
 Muscosa.
MOLUCCELLA, p. 287.
 Lævis.
 Spinosa.
MOMORDICA, p. 496.
 Balsamina.
 Luffa.
 Elaterium.
MONARDA, pag. 16.
 Fistulosa.
MONOTROPA, p. 207.
 Hypopithys.
MONTIA, pag. 546.
 Fontana.
MORUS, pag. 485.
 Alba.
 Nigra.
MYAGRUM, pag. 311.
 N n iiij

INDEX GENERUM.

- Perenne.
 Perfoliatum.
 Sativum.
 Paniculatum.
 Saxatile.
MYOSOTIS, *pag.* 72.
 Scorpioides.
 Lappula.
 Apula.
MYOSURUS, *pag.* 161.
 Minimus.
MYRIOPHYLLUM, *p.* 488.
 Spicatum.
 Verticillatum.
MYRTUS, *pag.* 238.
 Communis.
- N.
- NAIAS**, *pag.* 500.
 Marina.
NAPAEA, *pag.* 345.
 Hermaphrodita.
 Dioica.
NARCISSUS, *pag.* 163.
 Poeticus.
 Pseudo-narcissus.
 Jonquilla.
 Tazetta.
NARDUS, *pag.* 32.
 Stricta.
 Incurva.
NEPETA, *pag.* 174.
 Cataria.
NEPRIMUM, *pag.* 119.
 Oleander.
NICOTIANA, *pag.* 105.
 Tabacum.
 Rustica.
 Paniculata.
 Glutinosa.
NIGELLA, *pag.* 260.
 Damascena.
 Sativa.
 Arvensis.
- Hispanica.
 Orientalis.
NYCTANTHES, *pag.* 5.
 Sambac.
NYMPHAEA, *pag.* 253.
 Lutea.
 Alba.
- O.
- OCYMUM**, *pag.* 293.
 Frutescens.
 Basilicum.
 Minimum.
OENANTHE, *pag.* 143.
 Fistulosa.
 Crocata.
 Pimpinelloides.
 Chærophyllæa.
OENOTHERA, *p.* 192.
 Biennis.
 Mollissima.
 Fruticosa.
OLEA, *pag.* 7.
 Europæa.
ONONIS, *pag.* 358.
 Spinosa.
 Arvensis.
 Minutissima.
 Alopecuroides.
 Natrix.
 Viscosa.
 Cherleri.
ONOPORDUM, *p.* 424.
 Acanthium.
 Illyricum.
 Arabicum.
OPHIOGLOSSUM, *pag.* 523.
 Vulgatum.
OPHRIS, *pag.* 472.
 Nidus avis.
 Spiralis.
 Ovata.
 Antropophora.
 Insectifera.
ORCHIS, *pag.* 462.

INDEX GENERUM.

- Pyramidalis.
 Coriophora.
 Morio.
 Malcula.
 Uitulata.
 Milnaris.
 Palmata.
 Odoratissima.
 Maculata.
 Abortiva.
ORIGANUM, *pag.* [188](#).
 Dictamnus.
 Creticum.
 Smyræum.
 Vulgare.
 Majorana.
ORNITHOGALUM, *p.* [171](#).
 Luteum.
 Minimum.
 Pyrenaicum.
 Arabicum.
 Umbellatum.
 Narbonense.
ORNITHOPUS, *p.* [372](#).
 Perapillus.
 Compressus.
 Scorpioides.
OROBANCHE, *p.* [308](#).
 Lævis.
 Major.
 Ramosa.
OROBUS, *pag.* [366](#).
 Vernus.
 Tuberosus.
 Niger.
 Pyrenaicus.
OSMUNDA, *pag.* [523](#).
 Lunaria.
 Sp. cant.
OSTEOSPERMUM, *p.* [463](#).
 Moniliferum.
OSYRIS, *pag.* [502](#).
 Alba.
OTHONNA, *pag.* [463](#).
 Helenus.
 Martima.
 Pectinata.
 Cheirifolia.
Oxalis, *pag.* [222](#).
 Corniculata.
 P.
PÆONIA, *pag.* [258](#).
 Officinalis.
PANCRATIUM, *p.* [164](#).
 Maritimum.
PANICUM, *p.* [34](#) & [545](#).
 Glaucum.
 Italicum.
 Crus galli.
 Sanguinale.
 Dactylon.
 Melaceum.
 Ægyptiacum.
PAPAVER, *pag.* [252](#).
 Hybridum.
 Argemone.
 Alpinum.
 Rhæas.
 Somniferum.
PARIETARIA, *p.* [516](#).
 Officinalis.
PARIS, *pag.* [200](#).
 Quadrifolia.
PARNASSIA, *p.* [156](#).
 Palustris.
PARTHENIUM, *p.* [486](#).
 Hysterophorus.
PASSIFLORA, *p.* [475](#).
 Cærulea.
PASTINACA, *p.* [142](#).
 Sativa.
 Opoponax.
PEDICULARIS, *p.* [298](#).
 Sylvatica.
 Rostrata.
 Verticillata.
 Tuberosa.
PEGANUM, *pag.* [226](#).
 Harmala.
PEUCEDANUM, *pag.* [138](#).
 Officinale.

INDEX G E N E R U M.

| | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------------|--|
| Silvus. | | PICRIS, p. <u>406.</u> | |
| PHALARIS, p. <u>33.</u> & <u>145.</u> | | Echioides. | |
| Canariensis. | | Hieracioides. | |
| Phleoides. | | PIMPINELLA, p. <u>150.</u> | |
| Arundinacea. | | Saxifraga. | |
| Utriculata. | | Anisum. | |
| PHALLUS, p. <u>141.</u> | | PINUS, p. <u>424.</u> | |
| Esculentus. | | Sylvestris. | |
| Impudicus. | | Pinea. | |
| PHASEOLUS, p. <u>164.</u> | | Picea. | |
| Vulgaris. | | Abies. | |
| Coccineus. | | PISTACIA, p. <u>502.</u> | |
| Farinolos. | | Trifolia. | |
| Caracalla. | | Narbonensis. | |
| PHELLANDRIUM, p. <u>145.</u> | | Vera. | |
| - Aquaticum. | | Terebinthus. | |
| PHILADELPHUS, p. <u>237.</u> | | Lentiscus. | |
| Coronarius. | | PISUM, p. <u>366.</u> | |
| PHILLIREA, p. <u>6.</u> | | Sativum. | |
| Angustifolia. | | Ockrus. | |
| Latifolia. | | PLANTAGO, p. <u>69.</u> | |
| PHLEUM, p. <u>36.</u> | | Major. | |
| Pratense. | | Media. | |
| Schoenoides. | | Lanceolata. | |
| Bulbosum. | | Lagopus. | |
| PHLOMIS, p. <u>185.</u> | | Albicans. | |
| Fruticosa. | | Alpina. | |
| Nissolia. | | Maritima. | |
| Lychnitis. | | Subulata. | |
| Herba venti. | | Coronopus. | |
| Tuberosa. | | Psyllium. | |
| Leonurus. | | Cynops. | |
| PHOENIX, p. <u>544.</u> | | PLATANUS, p. <u>493.</u> | |
| Dactylifera. | | Orientalis. | |
| PHYLLIS, p. <u>129.</u> | | Occidentalis. | |
| Nobla. | | PLUMBAGO, p. <u>92.</u> | |
| PHYSALIS, p. <u>107.</u> | | Europæa. | |
| Somnifera. | | Zeylanica. | |
| Alkekengi. | | POA, p. <u>42.</u> | |
| Pubescens. | | Aquatica. | |
| PHYTEUMA, p. <u>99.</u> | | Trivialis. | |
| Hemisphærica. | | Angustifolia. | |
| Orbicularis. | | Pratensis. | |
| Sp. cata. | | Annua. | |
| Comosa. | | Eragrostis. | |
| PHYTOLACCA, p. <u>225.</u> | | Compressa. | |
| Americana. | | Nemoralis. | |

INDEX GENERUM.

- Bulbosa.
POINCIANA, p. 204.
 Pulcherrima.
POLEMONIUM, p. 25.
 Cæruleum.
POLIANTHES, p. 178.
 Tuberosa.
POLYCARPON, p. 58.
 Tetraphyllum.
POLYCNEMUM, p. 24.
 Arvense.
POLYGALA, p. 354.
 Vulgaris.
 Monspeliaca.
POLYGONUM, p. 197.
 Bitorta.
 Virginianum.
 Amphibium.
 Maritimum.
 Hydropiper.
 Perficaria.
 Orientale.
 Aviculare.
 Tataricum.
 Fagopyrum.
POLYPODIUM, p. 527.
 Vulgare.
 Cambricum.
 Lonchitis.
 Phegopteris.
 Filix mas.
 Filix femina.
 Cristatum.
 Aculeatum.
 Rhæticum.
 Fragile.
 Dryopteris.
POLYTRICHUM, p. 531.
 Commune.
POPULUS, p. 506.
 Alba.
 Nigra.
PORTULACCA, p. 227.
 Oleracea.
 Filola.
POTAMOGETON, p. 75.
 Natans.
 Densum.
 Crispum.
 Setaceum.
 Pustillum.
POTERIUM, p. 490.
 Sangailorba.
 Hybridum.
 Spinosum.
POTENTILLA, p. 248.
 Anserina.
 Multifida.
 Rupestris.
 Recta.
 Argentea.
 Hirta.
 Alba.
 Reptans.
PRASIUM, p. 295.
 Majus.
PRENANTHES, p. 409.
 Viminea.
 Purpurea.
 Muralis.
PRIMULA, p. 88.
 Officinalis.
 Auricula.
 Farinosa.
 Vitaliana.
 Integrifolia.
PRUNUS, p. 239.
 Padus.
 Lusitanica.
 Lauro-cerasus.
 Mahaleb.
 Armeniaca.
 Cerasus.
 Domestica.
 Spinosa.
PSORALEA, p. 386.
 Pinnata.
 Bituminosa.
 Coriifolia.
PTELEA, p. 81.
 Trifoliata.

INDEX GENERUM.

| | |
|--|--|
| P TERIS, p. 525. | R ESEDA, p. 229. |
| Aquilina. | Luteola. |
| P YTHONARIA, p. 81. | <u>Scamoides.</u> |
| Officinalis. | Alba. |
| P UNICA, p. 238. | Lutea. |
| Granatum. | Phytocoma. |
| P YROLA, p. 208. | Odorata. |
| Rotundifolia. | R HAMNUS, p. 112. |
| P YRUS, p. 242. | Frangula. |
| Communis. | Alaternus. |
| Malus. | Catharticus. |
| Cydonia. | Palurus. |
| | Zizyphus. |
| | R HEUM, p. 201. |
| | Rhaponticum. |
| | Rhabarbarum. |
| | R HODIOLA, p. 506. |
| | Rosea. |
| | R HUS, p. 152. |
| | Comaria. |
| | Toxicodendra. |
| | Cornus. |
| | R IBES, p. 114. |
| | Rubrum. |
| | Alpinum. |
| | Nigrum. |
| | Uva crispa. |
| | R ICINUS, p. 496. |
| | Vulgaris. |
| | R INANTHUS, p. 296. |
| | Truxago. |
| | Crista galli. |
| | R IVINA, p. 72. |
| | Humilis. |
| | R OBINIA, p. 363. |
| | Pseudo-Acacia. |
| | Caragana. |
| | Pygmæa. |
| | R OSA, p. 245. |
| | Eglanteria. |
| | Villosa. |
| | Canina. |
| | Spinosissima. |
| | Centifolia. |
| R APHANUS, p. 334. | R OSMARINUS, p. 17. |
| Sativus. | Officinalis. |
| Raphanistrum. | |

Q

| |
|--|
| Q UERCUS, p. 490. |
| Ilex. |
| Gramuntia. |
| Coccifera. |
| Robur. |
| Suber. |

R

| |
|---|
| R ANUNCULUS, p. 264. |
| Flammula. |
| Lingua. |
| Amplexicaulis. |
| Ficaria. |
| Thora. |
| Auricomus. |
| Sceleratus. |
| Illyricus. |
| Monspeliacus. |
| Bulbosus. |
| Repens. |
| Acris. |
| Lanuginosus. |
| Charophyllos. |
| Arvensis. |
| Muricatus. |
| Falcatus. |
| Aquatilis. |
| R APHANUS, p. 334. |
| Sativus. |
| Raphanistrum. |

INDEX GENERUM.

- RUBIA**, p. 68. Vicellina.
 Tinctorum. Amygdalina.
RUBUS, p. 246. Rosmarinifolia.
 Idæus. Fragilis.
 Creticus. Caprea.
 Fruticosus. Viminalis.
 Saxatilis. Alba.
- RUDBECKIA**, p. 456. **SALSOLA**, p. 126.
 Hirta. Kali.
 Soda.
- RUFILIA**, p. 307. **SALVIA**, p. 17.
 Strepens. Lyrata.
 Officinalis.
- RUMEX**, p. 186. Pomifera.
 Parientia. Urticifolia.
 Sanguineus. Viridis.
 Crispus. Horminum.
 Acris. Sylvestris.
 Plebeius. Pratenfis.
 Bucephalophorus. Verbenaca.
 Aquaticus. Hispanica.
 Lanaria. Verticillata.
 Vesicarius. Glutinosa.
 Rotundus. Canariensis.
 Scutatus. Selarea.
 Spinosus. Ceratophylla.
 Acerola.
 Acetostella.
- RUPPIA**, p. 76. **SAMBUCUS**, p. 153.
 Maritima. Ebulus.
 Nigra.
- RUSCUS**, p. 511. Racemosa.
- RUTA**, p. 205. **SAMOLUS**, p. 100.
 Graveolens. Valerandi.
- S** **SANGUISORBA**, p. 71.
 Officinalis.
- SAGINA**, p. 77. **SANICULA**, p. 131.
 Procumbens. Officinalis.
- SAGITTARIA**, p. 489. **SANTOLINA**, p. 431.
 Sagittifolia. Chamæcyparissus.
 Rosmarinifolia.
- SALICORNIA**, p. 1. **SAPONARIA**, p. 212.
 Lurepra. Officinalis.
 Vaccaria.
- SALIX**, p. 500. **SATUREJA**, pag. 273.
 Thymbra.

INDEX GENERUM

| | | | |
|---------------------------|--|------------------------------|--|
| Hortensis. | | Fluitans. | |
| Montana. | | Lacustris. | |
| SATYRIUM, p. <u>471.</u> | | Holosœnus. | |
| Hircinum. | | Romanus. | |
| SAXIFRAGA, p. <u>209.</u> | | Setaceus. | |
| Cotyledon. | | Mucronatus. | |
| Geum. | | Maritimus. | |
| Aizoides. | | Sylvaticus. | |
| Rotundifolia. | | SCLERANTHUS, p. <u>211.</u> | |
| Granulata. | | Annuus. | |
| Tridactylites. | | SCOLYMUS, p. <u>419.</u> | |
| Cespitosa. | | Maculatus. | |
| Hypnoides. | | Hispanicus. | |
| Adscendens. | | SCORPIURUS, p. <u>380.</u> | |
| SCABIOSA, p. <u>61.</u> | | Vermiculata. | |
| Alpina. | | Subvillosa. | |
| Leucantha. | | Sulcata. | |
| Succisa. | | SCORZONERA, p. <u>405.</u> | |
| Syriaca. | | Hispanica. | |
| Integrifolia. | | Angustifolia. | |
| Arvensis. | | Laciniosa. | |
| Gramuntiana. | | Picroides. | |
| Columbaria. | | SCROPHULARIA, p. <u>303.</u> | |
| Atro-purpurea. | | Nodosa. | |
| Ochroleuca. | | Aquatica. | |
| Papposa. | | Scorodonia. | |
| Maritima. | | Vernalis. | |
| SCANDIX, p. <u>146.</u> | | Canina. | |
| Odorata. | | Peregrina. | |
| Pecten Veneris. | | SCUTELLARIA, p. <u>294.</u> | |
| Cerifolium. | | Orientalis. | |
| Australis. | | Cretica. | |
| SCHINUS, p. <u>508.</u> | | Galericulata. | |
| Molle. | | Peregrina. | |
| SCHOENUS, p. <u>27.</u> | | SECALE, p. <u>56.</u> | |
| Mariscus. | | Cereale. | |
| Mucronatus. | | Villosum. | |
| Nigricans. | | SEDUM, p. <u>220.</u> | |
| SCILLA, p. <u>173.</u> | | Telephium. | |
| Maritima. | | Anacampteros. | |
| Italica. | | Cepœa. | |
| Peruviana. | | Dasyphyllum. | |
| Amœna. | | Rupestris. | |
| Autumnalis. | | Album. | |
| Bifolia. | | Acre. | |
| SCIRPUS, p. <u>29.</u> | | Sexangulare. | |
| Palustris. | | | |

INDEX GENERUM.

- | | |
|---|--|
| SEMPERVIVUM, p. 235. | SILENE, p. 216. |
| Arboreum. | Quinquévulnera. |
| Tectorum. | Nutans. |
| Arachnoideum. | Fruticosa. |
| SENECIO, p. 439. | Conoidea. |
| Vulgaris. | Conica. |
| Viscolus. | Behen. |
| Sylvaticus. | Multipula. |
| Elegans. | Armeria. |
| Incanus. | Rupeltris |
| Abrotanifolius. | Saxifraga. |
| Jacobæa. | SILPHIUM, p. 462. |
| Doria. | Perfoliatum. |
| Nemorensis. | SINAPIS, p. 333. |
| Sarracenicus. | Arvensis. |
| Doronicum. | Nigra. |
| SERAPIAS, p. 474. | Alba. |
| Helleborine. | Lævigata. |
| Lingua. | SISON, p. 142. |
| SERRATULA, p. 420. | Amomum. |
| Babilonica. | Ammi. |
| Tinctoria. | Verticillatum. |
| Arvensis. | SISYMBRIUM, p. 325. |
| SESSELI, p. 147. | Nasturtium. |
| Montanum. | Sylvestre. |
| Glaucum. | Amphibium. |
| Tortuosum. | Polyceratium. |
| Annuum. | Murale. |
| SHERARDIA, p. 64. | Asperum. |
| Arvensis. | Sophia. |
| Muralis. | Alutissimum. |
| SIDA, p. 344. | Iris. |
| Spinosa. | Strictissimum. |
| Cordifolia. | SISYRINCHIUM, p. 475. |
| Abutilon. | Bermudiana. |
| Cristata. | SIUM, p. 142. |
| SIDERITIS, p. 277. | Latifolium. |
| Syriaca. | Nodiflorum. |
| Perfoliata. | Sifarum. |
| Montana. | SMILAX, p. 105. |
| Romana. | Aspera. |
| Hyslopifolia. | SMYRNIUM, p. 149. |
| Hirsuta. | Olusatrum. |
| Ocymastrum. | SOIANUM, p. 108. |
| SIGFSECKIA, p. 453. | Pseudo-capsicum. |
| Orientalis. | Dulcamara. |

INDEX GENERUM

- | | |
|---|---|
| <p>TAXUS, p. <u>110.</u> Baccata.</p> <p>TELESPIUM, p. <u>155.</u> Imperati.</p> <p>TICCRUM, p. <u>269.</u> Virginicum. Scorodonia. Monianum. Polium. Chamaepitys. Iva. Marum. Pseudo-chamaepitys. Botrys. Creticum. Multiflorum. Scordium. Chamaedrys. Flavum.</p> <p>THALICTRUM, p. <u>263.</u> Fetidum. Minus. Angustifolium. Flavum. Aquilegifolium.</p> <p>THAPSIA, p. <u>148.</u> Villosa. Foetida. Aclepium.</p> <p>THELIGONUM, p. <u>489.</u> Cynocrambe.</p> <p>THESIUM, p. <u>118.</u> Linophyllum.</p> <p>THLASPI, p. <u>316.</u> Peregrinum. Arvense. Saxatile. Perfoliatum. Hircum. Campestre. Montanum. Barba pastoris.</p> <p>THUJA, p. <u>494.</u> Orientalis.</p> <p>THYMRA, p. <u>274.</u> Spicata.</p> | <p>THYMUS, p. <u>289.</u> Serpillum. Vulgaris. Zygis. Acinos. Pulegioides.</p> <p>TILIA, p. <u>294.</u> Europaea.</p> <p>TILIAEA, p. <u>77.</u> Rubra. Muscosa.</p> <p>TORDYLIUM, p. <u>133.</u> Syriacum. Officinale. Maximum. Latifolium. Anthriscus. Nodolum.</p> <p>TORMENTILLA, p. <u>249.</u> Erecta.</p> <p>TRACHELIUM, p. <u>100.</u> Azureum.</p> <p>TRADESCANTIA, p. <u>164.</u> Virginiana.</p> <p>TRAGOPOGON, p. <u>404.</u> Pratenfe. Porrifolium. Dalechampi. Picroides. Asperum. Crocifolium.</p> <p>TREMELLA, p. <u>135.</u> Noctoc. Auricula. Verrucosa. Hemisphaerica.</p> <p>TRIBULUS, p. <u>207.</u> Terrestris.</p> <p>TRIFOLIUM, p. <u>387.</u> Melilorus caerulea. Officinale. Italica. Cretica. Repens. Alpinum. Subterraneum.</p> |
|---|---|

INDEX GENERUM

| | | | |
|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Cherleri. | | | |
| Rubens. | | | |
| Pratense. | | | |
| Glomeratum. | | | |
| Lappaceum. | | | |
| Angustifolium. | | | |
| Arvense. | | | |
| Stellatum. | | | |
| Scabrum. | | | |
| Montanum. | | | |
| Spumofum. | | | |
| Refupinatum. | | | |
| Tomentofum. | | | |
| Fragiferum. | | | |
| Agrarium. | | | |
| Montanum. | | | |
| TRIGLOCHIN, | <u>p. 188.</u> | | |
| Palufre. | | | |
| TRIGONELLA, | <u>p. 326.</u> | | |
| Policeraria. | | | |
| Monfpeliaca. | | | |
| Fœnum Græcum. | | | |
| <u>Corniculata.</u> | | | |
| TRITICUM, | <u>p. 37.</u> | | |
| Æftivum. | | | |
| Hybernium. | | | |
| Spelta. | | | |
| Monococcum. | | | |
| Repens. | | | |
| Caninum. | | | |
| TROPEOLUM, | <u>p. 191.</u> | | |
| Minus. | | | |
| TULIPA, | <u>p. 171.</u> | | |
| Sylveftris. | | | |
| Gefneriana. | | | |
| TURNERA, | <u>p. 155.</u> | | |
| Ulmifolia. | | | |
| TURRITIS, | <u>p. 331.</u> | | |
| Hirfuta. | | | |
| TUSSILAGO, | <u>p. 438.</u> | | |
| Alpina. | | | |
| Farfara. | | | |
| TYPHA, | <u>p. 480.</u> | | |
| Latifolia. | | | |
| Anguftifolia. | | | |
| | | V | |
| | | VACCINIUM, | <u>p. 122.</u> |
| | | Myrtillus. | |
| | | VALANTIA, | <u>p. 515.</u> |
| | | Muralis. | |
| | | Aparine. | |
| | | Articulata. | |
| | | Cruciata. | |
| | | VALERIANA, | <u>p. 21.</u> |
| | | Rubra. | |
| | | Calcitrapa. | |
| | | Officinalis. | |
| | | Phu. | |
| | | Tripteris. | |
| | | Locufta. | |
| | | Mixta. | |
| | | VELEZIA, | <u>p. 185.</u> |
| | | Rigida. | |
| | | VELLA, | <u>p. 312.</u> |
| | | Annua. | |
| | | Pleudo - Cytifus. | |
| | | VERATRUM, | <u>p. 512.</u> |
| | | Album. | |
| | | VERBASCUM, | <u>p. 103.</u> |
| | | Thapfus. | |
| | | Lychnitis. | |
| | | Nigrum. | |
| | | Blactaria. | |
| | | Sinuatum. | |
| | | VERBENA, | <u>p. 14.</u> |
| | | Nodiflora. | |
| | | Bonarienfis. | |
| | | Haltata. | |
| | | Urticæfolia. | |
| | | Officinalis. | |
| | | VERBESINA, | <u>p. 454.</u> |
| | | Alata. | |
| | | Alba. | |
| | | VERONICA, | <u>p. 2.</u> |
| | | Spuria. | |
| | | Spicata. | |
| | | Officinalis. | |
| | | Alpina. | |
| | | Serpyllifolia. | |
| | | Beccabunga. | |

INDEX GENERUM.

| | | | |
|-----------------|---------|---------------|---------|
| Anagallis. | | ULVA, | p. 357. |
| Chamædrys. | | Intestinalis. | |
| Latifolia. | | Lactuca, | |
| Agrestis. | | URTICA, | p. 484. |
| Arvensis. | | Pilulifera. | |
| Hederzfolia. | | Urens. | |
| Triphyllus. | | Dioica. | |
| VIBURNUM, | p. 153. | Parietaria. | |
| Tinus. | | Canadensis. | |
| Lantana. | | URTICULARIA, | p. 14. |
| Opulus. | | Vulgaris. | |
| VICIA, | p. 370. | | |
| Dumetorum. | | | |
| Sylvatica. | | | |
| Cracca. | | | |
| Onobrychioides. | | | |
| Biennis. | | | |
| Sativa. | | | |
| Lathyroides. | | | |
| Lurea. | | | |
| Hybrida; | | | |
| Peregrina. | | | |
| Sepium. | | | |
| Narbonensis. | | | |
| Faba. | | | |
| VINCA, | p. 119. | | |
| Major. | | | |
| Rosea. | | | |
| VIOLA, | p. 466. | | |
| Odorata. | | | |
| Canina. | | | |
| Tricolor. | | | |
| VISCUM, | p. 302. | | |
| Album. | | | |
| VITEX, | p. 308. | | |
| Agnus castus. | | | |
| VITIS, | p. 115. | | |
| Vinifera. | | | |
| Laciniosa. | | | |
| ULMUS, | p. 127. | | |
| Campestris. | | | |

X

| | |
|--------------|---------|
| XANTHIUM, | p. 485. |
| Scrumarium. | |
| Spinosum. | |
| XERANTHEMUM, | p. 435. |
| Annum. | |

Y

| | |
|-----------|---------|
| YUCCA, | p. 179. |
| Gloriosa. | |
| Draconis. | |

Z

| | |
|--------------|---------|
| ZANICHELLIA, | p. 479. |
| Palustris. | |
| ZEAL, | p. 481. |
| Mays | |
| ZIZIPHORA, | p. 16. |
| Tenuior. | |
| ZOSTERA, | p. 478. |
| Marina. | |
| ZYGOPHYLLUM, | p. 206. |
| Fabago. | |

FINIS.

ERRATA.

| | | | |
|-------------|-------------|-----------|--|
| Pag. | lin. | 9. | Florescentia. <i>leg.</i> ubique, Inflorescentia. |
| | 2. | 31. | soufouire. <i>leg.</i> sounfouire. |
| | 3. | 26. | Foliat. simplex sparsa. <i>leg.</i> Foliat. simplex sparsa petiolata integerrima. |
| | 11. | 21. | integerrimis. <i>leg.</i> inaequalibus. |
| | 21. | 27. | La Chuguette. <i>leg.</i> la chugueta. |
| | 27. | 8. | nectariferos. <i>leg.</i> nectariferæ. |
| | 46. | 2. | Briza. <i>leg.</i> Briza n. 5. |
| | 48. | 16. | Viret. <i>leg.</i> Vitium. |
| | 53. | 32. | Bigne-la-Moufon. <i>leg.</i> Bione, Lamoufon. |
| | 66. | 8. | triquetris floribus, <i>leg.</i> triquetris, floribus &c. |
| | 69. | consult. | herbe de cinq côtes <i>leg.</i> herba de cinq costas. |
| | 78. | 21. | sessilibus. <i>leg.</i> sessilibus, caule procumbente. |
| | 79. | 8. | primâ. <i>leg.</i> secundâ. |
| | 81. | 38. | d'autal. <i>leg.</i> daou tal. |
| | 89. | 31. | Guillin. <i>leg.</i> ubique, Guillen. |
| | 95. | 38. | ramos. racemosa. <i>leg.</i> ramoso-racemosa. |
| | 102. | 28. | |
| | 130. | 13. | caulog. amplexicaulis, pinnato-pinnatifida, <i>leg.</i> na amplexicaulis pinnato-pinnatifida. |
| | 130. | 30. | involucrum. <i>leg.</i> involucrorum. |
| | 136. | 13. | pili rigidi in caule (& seminibus in una specie.) <i>leg.</i> (pili rigidi in caule, & seminibus in una specie.) |
| | 142. | 11. | tuberosa fibrosa fusiformis. <i>leg.</i> tuberosa, fibro- sa, vel fusiformis. |
| | 244. | 1. | stipulosa. <i>leg.</i> fistulosa. |
| | 163. | 31. | intrâ. <i>leg.</i> infrâ. |
| | 179. | 35. | (in plurimis) bractea. <i>leg.</i> (in plurimis;) Bractea, &c. |
| | 205. | 15. | pedunculis glandulæ. <i>leg.</i> pedunculis; glandulæ. |
| | 206. | 10. | Loune. <i>leg.</i> Loun. |
| | 218. | 22. | (nulla in una specie) stipulæ. <i>leg.</i> nulla (in una specie stipulæ.) |
| | 220. | 5. | herbacea succulenta ramosa teres. <i>leg.</i> succu- lenta ramosa teres, herbacea vel fruticosa. |
| | 227. | 35. | dodecangris. <i>leg.</i> dodecandris. |
| | 235. | 11. | radicata. <i>leg.</i> radicalis. |
| | 236. | 17. | nescentibus. <i>leg.</i> nascentibus. |
| | 268. | 6. | ramosa vel fibrosa. <i>leg.</i> ramosa, tuberosa, vel fibrosa. |
| | 399. | 7. | scuteliata. <i>leg.</i> scutellata. |
| | 494. | 20. | las Pinças. <i>leg.</i> las Pinias. |

005664682

ML

